續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

人民大學圖書館藏書

上海古籍出版社

九九八・子部・醫家類

新刻校定脉訣指掌病式圖説一卷　題〔元〕朱震亨撰……一
圖注脉訣辨真四卷脉訣附方一卷　〔明〕張世賢撰……二五
察病指南三卷　〔宋〕施　發撰……一〇一
元敖氏傷寒金鏡録一卷　〔元〕杜　本撰……一二九
識病捷法十卷　〔明〕繆存濟撰……一四一
醫燈續焰二十一卷　〔清〕潘　楫撰　〔清〕王佑賢評……四八一

題丹溪重脩脉訣

莊子曰生非吾有也乃天地之委和性非吾有也乃天地之委順黃帝曰人之生也懸命於天受氣於地氣以成形理亦賦焉劉子曰民受天地之中以生故肖天地之形天之陽在南而陰在北故清陽之七竅皆見於面濁陰之二竅皆出於下地之陽在北而陰在南故三陽之脉皆聚於背三陰之脉聚於胸腹况乎脉者天地之元牲男子之寸脉盛而尺脉弱者肖乎天也女子之尺脉盛而寸脉弱者肖乎地也秦越人乃以男子生於寅女子生於申三陽從天生三陰從地長謬之甚矣遂令百犬吠聲流至於今千有餘年莫有能正其謬者獨先生以神明之資洞燭物理乃推本律法混合天人而著論闢之使千載之誤一旦昭明豈不韙哉

歲在戊申門生龍丘葉英題

新刻校定脉訣指掌病式圖說

丹溪先

新安後　校

論脉法配天地

昔軒轅黃帝之體天治民也使伶倫截嶰谷之竹作黃鍾律管以候天之節氣以觀其太過不及脩德以禳之命岐伯取氣口作脉法以候人之動氣以察其太過不及設九針藥石以調之故黃鍾之數九分氣口之數亦九分律法曰天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽九者陽之成數也其二四六八十爲陰十者陰之成數也黃鍾者陽聲之始也陽氣之動也故其數皆九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應然後寸之數始形焉此陽唱而陰和男行而女隨邵子曰陰者陽之影故脉之動也陽得九分而盛陰得一寸而弱其吻合於黃鍾者以民受天地之中以生故肖天地之形且天地之道陽健而陰順陽強而陰弱陽明而陰晦天不足西北故西北傾而東南昂人肖之左耳目明於右耳目在上者法乎天地不滿東南故東南陷下而西北壠起人肖之右手足強於左手足在下者法乎地天之陽在南而陰在北故男子寸脉盛而尺脉弱地之陽在北而陰在南故女子尺脉盛而寸脉弱肖天地之陰陽也舜齊律呂無不然者黃鍾者氣之先兆故能測天地之節候氣口者脉之要會故能知人命之死生實為醫學之先維流注一身而變化萬端皆欲取之三部九候之中其難也可知矣世之俗醫罔同陽生之妄作欲以治病求十全之效其不殺人幾希矣凡我同志宜精宜明然以習俗既久姑從舊以寸關尺分三部詳列手圖云

男女手脈之圖

男子寸脈恒盛尺脈恒弱陽在寸陰在尺也

女子尺脈恒盛寸脈恒弱陽在尺陰在寸也


寸陽盛
尺陰弱
陽九分
南
陰一寸
北
天之陽在南而陰在北
地之陽在北而陰在南
南
陰一寸
北
陽九分
寸陰弱
尺陽盛

三部九候圖說

三部者從魚際至高骨一寸名曰寸口自寸至尺名尺澤故曰尺中寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界又云陰得尺内一寸陽得寸内九分從寸口入六分爲關分從關分又入六分爲尺分故三部共得一寸九分

九候浮中沉

一部分三候三三爲九候


三部
寸
關
尺
魚際
九候
寸
關
尺
浮中沉
上中下

上候浮　初下指與皮毛相得者爲肺之部

中候中　輕按之與血脈相得者爲胃之部

下候沉　重按之與筋骨相得者爲腎之部

學診例

凡欲診脈先調自氣壓取病人息以候其遲數過與不及所謂以我醫彼智與神會則莫之敢違

凡診脈須先識脈息兩字脈者神也息者氣也脈不自動爲氣使然所謂長則氣治短則氣病也

凡診脈須識人迎氣口以辨内外因其不與人迎氣口相應爲不内外因所謂關前一分人命之主

凡診脈須先識五藏六經本脈然後方識病脈歲主藏害氣候逆傳陰陽有時與脈爲期此之謂也

凡診脈須認取二十四字名狀與關前一分相符推說證狀與病者相應使無差忒庶可依原治療

手式寸尺内外圖說


三焦命門
胃脾
大腸肺
尺尺
關關
寸寸
內以候腰下至腳
外以候心主
內以候胃脘
外以候脾
內以候胷中
外以候肺上至頭

左心小腸肝膽腎　右肺大腸脾胃命
心與小腸居左寸　肝膽同歸左關定
腎脉元在左尺中　郤與膀胱府相應
肺與大腸居右寸　脾胃脉從右關認
心包右尺配三焦　此是醫家真要領


左手
小腸心
膽肝
膀胱腎
寸寸
關關
尺尺
外以候心上至喉中
內以候膻中
外以候肝
內以候膈中
外以候腎
內以候腹中

右五藏所屬寸尺部位

左寸外以候心內以候膻中　右寸外以候肺內以候胷中
左關外以候肝內以候膈中　右關內以候脾外以候胃脘
左尺外以候腎內以候腹中　右尺外以候心主內以候腰

釋曰五藏六府十二經絡候之無踰三部要之前布六經乃候淫邪入自經絡而及於藏府後說五藏乃候七情內鬱自藏府出而應於經內外之辨顯然明白學診之士當自此始外因雖自經絡而入必及於藏府須識五藏六府所在內因鬱滿於中亦必外應於經亦須循經說証不可偏局執見故經云上竟上胷候中事也下竟下腹足中事也不可不通

陰陽相乘覆溢關格圖說

難經曰脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也丹溪先生曰陰乘陽則惡寒陽乘陰則發熱


關之前者陽之動也脉見九分而浮魚曰平太過不及者病
關以後者陰之動也脉見一寸而沉關曰平太過不及者病
陽分
陰分
陰上逆陽分曰溢為外關內格死
陽下入陰分曰覆為內關外格死

關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及太過不及者病遂上逆寸爲溢爲外關內格此陰乘陽之脈也　經曰陰氣太盛則陽氣不得相營也以陽氣不得營於陰陰遂上出而溢於陽之分爲外關內格也外關內格謂外閉而不下陰從內出而格拒其陽此陰乘陽位之脈也

關以後者陰之動也脈當見一寸而沉過者法曰太過減者法曰不及太過不及者病遂下入尺爲覆爲內關外格此陽乘陰之脈也　經曰陽氣太盛則陰氣不得相營也以陰氣不得營於陽陽遂下陷而覆於尺之分爲內關外格內關外格謂陰內閉而不上陽從外入以格拒其陰此陽乘陰位之脈也

故曰覆溢而覆者如物之覆由上而傾於下也溢者如水之溢由下而逆於上也　是其真藏之脈人不病而死也

論分按人迎氣口左右圖說

脈賛曰關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門决斷兩在關後故曰人迎緊盛則傷於寒氣口緊盛則傷於食此人迎氣口所以爲內傷外感之辨學醫之士豈可不深察而究明之也

左手人迎圖



左爲人迎以候天之六氣風寒暑濕燥熱之外感者也人迎浮盛則傷風緊盛則傷寒虛弱則傷暑沉細則傷濕虛數則傷熱皆外所因法當表散滲泄則愈

右手氣口圖



右爲氣口以候人之七情喜怒憂思悲恐驚內傷之邪其喜則脈散怒則脈激憂則脈濇思則脈結悲則脈緊恐則脈沉驚則脈動皆內所因看與何部相應即知何藏何經受病方乃不失病機法當温順以消平之其餘診按表裏名義情狀姑如後說但經所述謂神者脈之主脈者血之府氣者神之御脈者氣之使長則氣治短則氣病數則煩心大則病進文藻雖雅義理難明動靜之辭有博有約博則二十四字不濫絲毫約則浮沉遲

數總括綱紀辭理粲然浮爲風爲虛沉爲濕爲實遲爲寒爲冷數爲熱爲燥風濕寒熱屬於外虛實冷燥屬於內內外既分三因須別學者宜詳覽不可憚煩也

總論脈式

經云常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻乃可診有過之脈或有作爲爲停食頃俟定乃診師亦如之

釋曰停寧俟之即不拘於平旦況倉卒病生豈特平旦學者知之

經云切脈動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六府強弱形之盛衰可以參決死生之分

釋曰切脈動靜者以脈之潮會必歸於寸口三部診之左關前一分爲人迎以候六淫外傷爲外所因右關前一分爲

口以候七情內鬱為內所因惟其所自用肯經常為不內外因三因雖分猶乃未備是以前哲類分二十四字所謂七表八裏九道雖名狀不同証候差別皆以人迎一分而推之與三部相應而說証則萬無一失也

陳氏辯三藏本脉息数尺度

人之脉者乃血之隧道也非氣使則不能行故血為脉氣為息脉息之名自是而分呼吸者氣之槖籥動應者血之波瀾其經以身寸度之計十六丈二尺（一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸定息脉五動閏）以太息則六動一動一寸故一息脉行六寸十息六尺百息六丈二百息十二丈七十息四丈二尺計二百七十息漏水下二刻盡十六丈二尺營周一身百刻之中得五十營故曰脉行陽二十五度行陰亦二十五度也息者以呼吸定之一日計一萬

三千五百息呼吸進退既遲於脉故八息三分三毫三釐方行一寸八十三息三分三毫行一尺八百三十三息三分行一丈八千三百三十三息行十丈餘六丈二尺計五千一百六十七息通計一萬三千五百息方行盡一十六丈二尺經絡氣周於一身一日一夜大會於風府者是也脉神也陽也陽行速猶太陽之一日一周天息氣也陰也陰行遲猶太陰之一月一周天如是則應周天之常度配四時之定序春肝脉弦細而長夏心脉浮大而洪長夏脾脉輭大而緩秋肺脉浮濇而短冬腎脉沉濡而滑各以其時而候旺相休囚脉息無不及太過之患故曰平人以五藏六府皆稟氣於胃故脉以胃氣為本氣以貲色為生取其資成也合本藏氣三分叅以弦洪緩濇沉則為平脉若真藏脉見則不從矣參以形色廣加後說

右手足六經之圖


尺
關
寸
手少陽三焦脉洪散而急
手厥陰心包絡脉沉濇而軟
足陽明胃脉浮長而滑
足太陰脾脉沉軟而滑
手陽明大腸脉浮短而滑
手太陰肺脉濇短而浮
心合小腸肝合膽
脾連於胃腎膀胱

左手足六經之圖


寸
關
尺
心包元向三焦配
肺藏還歸對大腸
手少陰心脉洪大而微實
手太陽小腸脉洪大而緊
足厥陰肝脉弦細而長
足少陽膽脉弦大而浮
足少陰腎脉沉濡而滑
足太陽膀胱脉洪滑而長

足厥陰肝脈在左關上絃細而長足少陰腎脈在左尺中沉而滑足太陰脾脈在右關上沉軟而緩足少陽膽脈在左關上弦大而浮足陽明胃脈在右關中浮長而滑足太陽膀胱脈在左尺中洪滑而長手厥陰心主包絡在右尺中沉細而數手少陰心脈在左寸口洪而微實手太陰肺脈在右寸口濇短而浮手少陽三焦脈在右尺中洪散而急手陽明大腸脈在右寸口浮短而滑手太陽小腸脈在左寸口洪大而緊此手足陰陽六經脈之常體及其消息盈虛則變化不測運動密移與天地參同彼春之煖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒四變之動脈與之應者乃氣候之至脈也

素問六氣主令至脈

十二月大寒至　二月春分爲初之氣厥陰風木主令

經云厥陰之至其脈弦（一云沉短而敦）

春分至　四月小滿爲二之氣少陰君火主令

經云少陰之至其脈鉤（一云緊細而微）

小滿至　六月大暑爲三之氣少陽相火主令

經云少陽之至大而浮（一云乍疎乍數乍短乍長）

大暑至　八月秋分爲四之氣太陰濕土主令

經云太陰之至其脈沉（一云緊大而長）

秋分至　十月小雪爲五之氣陽明燥金主令

經云陽明之至短而濇（一云浮大而短）

小雪至　十二月大寒爲六之氣太陽寒水主令

經云太陽之至大而長

本脈至脈雖識體狀又須推尋六氣交變南政北政司天在

少陰之脈應與不應詳細而推知萬無一失矣

己丑己未二歲太陰司天少陰在左少陽在右故左寸脈不應



右己丑己未南政太陰司天脈圖

辰戌二歲太陰在泉少陰在右少陽在左故右尺脈沉細不應



右甲辰甲戌南政太陰在泉脈圖

巳亥二歲厥陰司天太陽在左少陰在右右手寸口脉沉細不應


南
土運
政
右寸脉不應
少陰在右
厥陰司天
太陽在左

右己巳己亥南政厥陰司天脉圖

寅申二歲厥陰在泉太陽在右少陰在左左手尺脉沉細不應


南
土運
政
太陽在右
厥陰在泉
少陰在左
左尺脉不應

右甲寅甲申南政厥陰在泉脉圖

子午二歲少陰司天厥陰在左太陰在右兩手寸脉俱沉細不應


南
土運
政
右手寸脉不應
太陰在右
少陰司天
厥陰在左
左寸脉不應

右甲子甲午南政少陰司天脉圖

卯酉二歲少陰在泉太陰在左厥陰在右故兩手尺脉俱沉細不應


南
土運
政
右尺脉不應
厥陰在右
少陰在泉
太陰在左
左尺脉不應

右己卯己酉南政少陰在泉脉圖

丑未二歲太陰司天少陰在左少陽在右兩手尺脉俱不應


北
水運
政
少陽在右
太陰司天
少陰在左
右尺脉亦不應
左尺脉不應

右乙丑辛丑丁未癸未歲北政太陰司天脉圖

辰戌二歲太陰在泉少陽在左少陰在右左手寸口脉不應


北
金運
政
少陰在右
太陰在泉
少陽在左
左寸脉不應

右丙辰庚辰戊戌壬戌歲北政太陰在泉脉圖

巳亥二歲厥陰司天太陽在左少陰在右左手尺脉不應


北
火運
政
少陰在右
厥陰司天
太陽在左
左尺脉不應

右乙巳辛巳丁亥癸亥北政厥陰司天脉圖

寅申二歲厥陰在泉少陰在左太陽在右左寸脉不應


北
木運
政
太陽在右
厥陰在泉
少陰在左
左寸脉不應

右丙寅庚寅戊申壬申歲北政厥陰在泉脉圖

歲當陽明司天少陰在泉法當兩尺脉沉細不應而反浮大兩寸脉當浮大而反沉細是大腸與少陰相反經云尺寸反者死


己酉己卯
南政
當浮大而反沉細
當沉細而反浮大
陽明司天
少陰在泉
寸
尺
寸
尺
當浮大而反沉細
當沉細而反浮大

右己酉己卯南政尺寸脉反之圖

歲當陽明在泉少陰司天法當兩寸沉細不應而反浮大兩尺脉當浮大而反沉細是陽明與少陰尺寸相反經云尺寸反者死


甲子甲午
南政
當沉細而反浮大
當浮大而反沉細
少陰司天
陽明在泉
寸
尺
寸
尺
當沉細而反浮大
當浮大而反沉細

石甲子甲午二歲尺寸相反脉圖

北政陽明司天少陰在泉法當兩寸沉細不應而反浮大兩尺脉當浮大而反沉細是陽明與少陰尺寸相反經云尺寸反者死


乙辛
丁癸
卯酉
北政
當沉細而反浮大
當浮大而反沉細
陽明司天
少陰在泉
寸
尺
寸
尺
當沉細而反浮大
當浮大而反沉細

右乙卯丁卯癸酉辛酉尺寸相反脉圖

北政少陰司天陽明在泉法當兩尺沉細不應而反浮大兩寸脉當浮大而反沉細是陽明與少陰尺寸相反經云尺寸反者死


丙戊庚壬
子午
北政
當浮大而反沉細
當沉細而反浮大
少陰司天
陽明在泉
寸
尺
寸
尺
當浮大而反沉細
當沉細而反浮大

右丙子庚子戊子壬午尺寸相反脉圖

南政少陽在右少陰在左左寸脉當沉細不應而反浮大右寸脉當浮大而反沉細不應是謂左右交經云左右交者死

巳丑巳未


南政
當浮大而反沉細
少陽在右
太陰司大
太陽在泉
少陰在左
當沉細而反浮大

右巳丑巳未左右脉交之圖

南政少陽在左少陰在右右尺脉當沉細不應而反浮大左尺脉當浮大而反沉細是謂左右交少陰在右而交於左

甲辰甲戌


南政
當沉細而反浮大
少陰在右
太陽司天
太陰在泉
少陽在左
當浮大而反沉細

右甲辰甲戌左右脉交之圖

南政太陰在左少陰在右右寸脉當沉細不應而反浮大左寸脉當浮大而反沉細不應是謂左右交　少陰在右而交於左

巳亥巳巳


南政
當沉細而反浮大
少陰在右
厥陰司天
少陽在泉
太陽在左
當浮大而反沉細

右巳亥巳巳左右脉交之圖

南政太陽在右少陰在左左尺脉當沉細不應而反浮大右尺脉當浮大而反沉細不應是謂左右交　少陰在右而交於左

甲寅甲申


南政
當浮大而反沉細
太陽在右
少陽司天
厥陰在泉
少陰在左
當沉細而反浮大

右甲寅甲申左右脉交之圖

北政太陽在左少陰在右右寸脉當沉細不應而反浮大左寸脉當浮大而反沉細是謂左右交 少陰在右而交於左



右乙巳丁巳辛亥癸亥左右脉交之圖

辯七情欝發五藏變病脉法

右手關前一分爲氣口者以候人之藏氣欝發與氣兼并過與不及乘尅傳變必見於脉者以食氣入胃淫精於脉脉皆自胃氣出故候於氣口經曰五臟皆禀氣於胃胃者五藏之本藏氣不能自致於手太陰必因胃氣而至邪氣勝胃氣衰則病甚胃氣絶真臟獨見則死假如

春肝
夏心
長夏脾
秋肺
冬腎
脉
弦 洪 濡 濇 沉
多胃少曰
肝 心 脾 肺 腎
病但
弦 洪 濡 濇 沉
無胃氣曰死

天地草木無土氣不生人無胃氣（則[illegible]）不追之大

若其乘尅相勝（雖有胃氣）而
春 夏 長夏 秋 冬
有
濇 沉 絃 洪 濡
脉微見者
秋 冬 春 夏 長夏
必病
濇 沉 弦 洪 濡
甚者爲今病

辯五臟過不及之爲病

觀夫太過不及脉之大要迫近而散不可失機審而調之爲上工矣學者不可不審察也

春肝
夏心
長夏脾
秋肺
冬腎
脉合
弦細而長
洪而微實
沉而濡長
浮而短濇
沉而緊實
太過則
實強
來去皆盛
如水之流
中堅傍虛
有如彈石
令人
善怒忽忽眩冒 巔疾
身熱膚痛
爲浸淫
四肢不舉
逆氣背痛 慍慍然
解㑊脊痛少氣不能言

不及則
微虛
來不盛去反盛
如烏之喙
毛而微
來去如數
令人
胷痛引背兩脇胠滿
心煩上見咳唾下泄氣
九竅不通名曰重強
呼吸少氣下喘聲
心懸如飢眇中清脊（中痛少腹滿小便變）

人之五臟配木火土金水以養魂神意魄志而生怒喜思憂恐故

一因
怒 喜 思 憂 恐
則
魂門弛張木
神延融溢火
意舍不寧土
魄戶不閉金
志室不遂水
氣
奮激肺金
赫羲腎水
凝結肝木
濇聚心火
旋都脾土
乘之脉
絃濇
沉散
弦弱
洪短
沉緩

此盖五情動以不正侮所不勝經所謂不恒其德恃其能乘而侮之甚則所勝來復侮反受邪此之謂也

凡怒則魂門弛張木氣奮激衝其肺上甚則子金乘其肝虛來復母讐是剋其肝木是謂侮反受邪肝脉反濇濇者肺金也是猶吳王夫差之爭盟侮楚精鋭悉行國內無備越王勾踐乘其虛而伐之遂以破吳吳本侮楚而越竟襲之侮反受邪即此義也


右
左
應氣口
寸
尺
寸
肝
尺
脉弦濇

凡久憂則魄門不閉金氣濇聚侮其肝木甚則子火乘其肺虛來復母讐是剋其肺金是謂侮反受邪肺脉反洪洪者心火脉也



凡多恐則志室不遂水氣旋却侮其胞絡之火甚則子土乘其腎虛來復母讐尅其腎水是謂侮反受邪腎脉反濡濡者脾之脉也



凡悲則傷肺故肺脉自虛經曰悲則氣消脉虛心火來乘金氣自虛故悲則淚下或因寒飲食之氣上逆畱於胸中留而不去久爲寒中或曰肺金乘肝木而爲淚



凡驚則氣亂驚則肝氣散亂乘其脾土故小兒驚則瀉青大人驚則面青者肝血亂而下降堅青其肝脉亦亂一曰驚則肝氣乘心大驚者心脉易位向裏驚氣入心者多聚血也


右
左
應氣口
脉散而亂
肝

傳授勝尅流變又當詳而論之故經云五藏受氣於其所生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所不勝如


肝 心 脾 肺 腎
受氣於
心 脾 肺 腎 肝
傳之於
脾 肺 腎 肝 心
氣舍於
腎 肝 心 脾 肺
至
肺 腎 肝 心 脾
而死

則知肝死於肺候之於秋庚日篤辛日死餘圖于後


肝 心 脾 肺 腎
候於
秋庚 冬壬 春甲 夏丙 長夏戊
日篤
辛 癸 乙 丁 己
日死
舌卷卵縮
面黑如黎
內滿唇反
皮枯毛折
齒長而枯髮無澤



凡一日之中又分五時以別死時之早晏且脾病甲日病篤乙日死則死於寅卯時以脾屬土日時俱屬木重木尅土故死於此時此內傷藏病之傳次也然暴病卒發者不必泥於傳次也或傳化不以次入者乃憂恐悲怒喜思驚七情所傷於令不得以其次傳所以令人大病此五臟傳變之指要學者不可不知也

辯六淫外傷六經受病脉圖說

左手關前一分爲人迎者以候天之寒暑燥濕風熱中傷於人其邪自經絡而入以迎納之故曰人迎前哲方論謂太陽爲諸陽主凡感邪則自太陽始以此考尋經意似若不然風喜傷肝寒喜傷腎暑喜傷心包濕喜傷脾熱傷心燥傷肺以暑熱一氣燥濕同源故不別論以類推之風當自少陽入濕當自陽明入暑當自三焦入寒却自太陽入故經云陰爲之主陽與正別於陽者知病從來此之謂也經云脩己俟天所以立命也由是古人調其臟氣而淫邪不入故先七情而後六淫經云學診之士必先歲氣故運氣又先之以其次第也

足太陽傷寒左手尺中與人迎皆浮緊而盛浮者足太陽脉也緊者傷寒脉也盛者病進也其証頭項腰脊痛無汗惡寒不惡風

足太陽膀胱經脉之圖



足陽明傷濕右手關上與人迎皆濇細而長濇者足陽明脉也細者傷濕脉也長者病衰也其証關節疼痛重痺而弱小便澀秘大便飧泄

陽　胃經之圖



足少陽傷風左手關上與人迎皆弦浮而散弦者足少陽脉也浮者傷風脉也散者病至也其証身熱惡風自汗項強脇滿

少陽膽脉之圖


右
左
寸
關
尺
寸
關
尺
人迎
弦浮而數

手少陽傷暑左手尺中與人迎皆洪虛而數洪者手少陽脉也虛者傷暑脉也數者病增也（其証身熱惡寒頭痛狀如傷寒煩渴）

少陽三焦經脉之圖


右
左
洪虛而數
寸
關
尺
寸
人迎
關
尺
洪虛而數

足太陰傷濕右手關上與人迎皆濡細而沉濡者太陰脉也細者濕脉也沉者病著也（其証身熱脚弱關節頭痛冷痺脹滿）

太陰脾經之圖


右
左
濡細而沉
寸
關
尺
人迎
濡細而沉

足少陰傷寒左尺中與人迎皆沉緊而數沉者足少陰脉也緊者傷寒脉也數者病傳也（其証口燥舌乾而渴背惡寒反發熱倦怠）

少陰腎經之圖



足厥陰傷風左關上與人迎皆弦弱而急弦者厥陰脉也弱者風脉也急者病變也（其証自汗惡風而倦小腹急痛）

厥陰肝經之圖



手厥陰心包傷著左手尺中與人迎皆沉弱而緩沉者心包脉也弱者傷暑也緩者病倦也其証往來寒熱狀如瘧煩渴聦暈背寒面垢

厥陰心包絡之圖



此已上分布六經感傷外邪之脉也除燥熱外敘此四氣揭圖於左以爲宗兆使學者易見不必再三伸間若其傳變自當依六經別論詳究所傷隨經說証對証施治以平爲期或熱燥傷心

肺亦當依經推明理例調治如四氣兼并六經交錯亦當隨其脉証審處別白或先或後或合或併在絡在經入表入裏乃時之動脉與之應氣候以時自與脉期微妙在脉不可不察察之有紀從陰陽始始之有經從陰陽生此之謂也

吾嘗觀洛書圖火七在西方金九居南位者則西南二方爲燥熱之氣明矣况乎離爲兵戈兌主殺伐平治之世生氣流行而陽以時兆民人安惡有斯氣唯淆亂之世生氣消息燥熱逆行五穀不登山川焦枯鬼神因妥災疹繁興予目擊壬辰首亂已來民中燥熱者多發熱痰結咳嗽重以醫者不識時變復投半夏南星以益其燥熱遂至嗽血骨涎逆湧咯吐不已肌肉乾枯而死者多矣平人則兩寸脉不見兩尺脉長至半臂予於內外傷辨言之備矣今略具數語以足成書爲六氣全圖

少陰太陰心肺二經傷燥熱脉圖



辯不內外因五用乖遺病症

察脈必以人迎氣口分內外所因者乃學診之要道也所以脈讚云關前一分人迎主之然既有三因豈不可盡詳而考之於理自脩且如疲極筋力盡神度量飲食饑飽叫呼走氣房室勞逸及金瘡踒折虎狼毒蟲鬼疰客忤畏壓溺水等外非六淫內非七情內外不收必屬不內外雖漢論曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食殊不知飲食入胃能助發宿蘊其所以應於氣口者正由七情鬱發因食助見本非宿食能應氣口且如

宿食（陽／陰）則脈（浮大而微濇／數而滑實）宿食（不化／成瘕）脈則（沉緊／沉重）皆傷胃也

宿食窒塞則上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死　此等名證何曾應於氣口又如疲極筋力其脈弦數而實筋痛則動

皆傷肝也　凝思則滑神耗則散皆傷心也　吟誦耗氣氣濡而弱叫呼走氣脈散而急皆傷肺也　房勞失精兩尺脈浮散男子遺精女子半產弦大而革皆傷腎也右件明文氣口何與況藏寒蛔厥脈自微浮及為緊滑　胃虛不食其脈必緩亦有微濇　五飲停伏浮細而滑　久畜沉積沉細而軟　形虛自汗脈皆微濡揮霍變亂脈自沉伏僵仆墜下脈則細滑　踒折傷損瘀血在內疝瘕癥癖並五內作痛脈皆弦緊中寒癥結脈則遲濇　五積六聚食飲痰氣伏留不散隧道節滞脈皆促結　三消熱中尺中洪大　癲狂神亂關上洪疾　氣實脈浮血實脈滑　氣血相搏脈亦沉實　婦人妊娠脈則和滑

辯祟脈

凡鬼祟附著之脈兩手乍大乍小乍長乍短乍疏乍[illegible]浮陽邪來見脈則浮洪陰邪來見脈則沉緊鬼疰客忤三部皆滑洪大嫋嫋沉沉澤澤但與病症不相應者皆五尸鬼邪遁疰之所為也又如遁尸尸疰脈沉而不至寸或三部皆緊急如診得此等脈証雖與人迎氣口相應亦當分數推尋三因交結四季料簡所謂俾內俾外不內不外亦內亦外亦不內外脈理微妙藝能難精學然後知所因此之謂也然形於朕兆簡於數義未有不學而能者未有學而不成者宜留心焉人如忽見異像驚惑眩亂脈多失次急虛卒中五臟閉絕脈不往來譬如墮溺脈不可察與夫金瘡踒折頓走血氣脈亦無準學者當看外証不必拘脈

辯脈體名狀

浮者按之不足舉之有餘與人迎相應則風寒在經與氣口相

應則營血虛損

沉者舉之不足按之有餘與人迎相應則寒伏陰經與氣口相應則血凝腹藏

遲者應動極緩按之盡牢與人迎相應則溫寒凝滯與氣口相應則虛冷沉積

數者去來促急一息數至與人迎相應則風燥熱煩與氣口相應則陰虛陽盛

虛者遲大而軟按之豁然與人迎相應則經絡傷暑與氣口相應則榮衛失本

實者按舉有力不疾不遲與人迎相應則風寒貫經與氣口相應則氣血壅脈

緩者浮大而軟去來微遲與人迎相應則風熱入藏與氣口相

應則怒極傷筋

緊者動轉無常如紉箄線與人迎相應則經絡傷寒與氣口相應則臟腑作痛

洪者來之至大去之且長與人迎相應則寒壅諸陽與氣口相應則氣攻百脉

細者指下尋之來往如線與人迎相應則諸經中濕與氣口相應則五臟凝涎

滑者往來流利有如貫珠與人迎相應則風痰潮流與氣口相應則涎飲凝滯

濇者參五不調如雨沾沙與人迎相應則風濕寒痺與氣口相應則津汗血枯

弦者端緊徑急如張弓絃與人迎相應則風走疰痛與氣口相應則飲積流疼

弱者按之欲絶輕軟無力與人迎相應則風濕緩縱與氣口相應則筋絶痿弛

結者往來遲緩時止更來與人迎相應則陰散陽生與氣口相應則積阻氣節

促者往來急數時止復來與人迎相應則痰壅陽經與氣口相應則積留胃腑

芤者中空傍實如按慈葱與人迎相應則邪壅吐衄與氣口相應則榮虚妄行

微者極細而軟似有若無與人迎相應則風暑自汗與氣口相應則微陽脱泄

動者在關如豆厥厥不行與人迎相應則寒疼冷痛與氣口相應則心驚膽寒

伏者沉伏不出着骨乃得與人迎相應則寒濕痼閉與氣口相應則凝思凝神

長者往來流利出於三關與人迎相應則微邪自愈與氣口相應則藏氣平治

短者按舉似數不及本部與人迎相應則邪閉經脉與氣口相應則積過藏氣

濡者按之不見輕手乃得與人迎相應則寒濕散漫與氣口相應則飧泄緩弱

革者沉伏實大如按鼓皮與人迎相應則中風暑濕與氣口相應則半產脱精

散者有陽無陰按之滿指與人迎相應則淫邪脱泄與氣口相應則精血敗耗

代者藏絶中止餘藏代動無問内外所因得此必死

辯七表脉病証

浮爲在表○爲風應人迎○爲氣應氣口○爲熱○爲痛○爲嘔○爲脹○爲痞○爲喘○爲厥○爲内結○爲滿不食○浮大爲鼻塞○浮緩爲不仁○浮大長爲風眩癲疾○浮滑疾爲宿食　○浮大而濇爲宿食滯氣○浮短爲肺傷諸氣○浮滑爲走刺爲飲○浮細而滑爲傷飲○浮滑疾緊爲百合病○浮數爲大便堅小便數○浮緊爲淋爲癃閉

芤主血○寸芤爲吐血○微芤爲衄血○關芤爲大便出血爲腸癰○尺芤爲下焦虚小便出血

滑爲吐○爲滿爲欬爲熱○爲伏痰○爲宿食○爲蓄血○爲

經閉○爲鬼疰○爲血氣俱實○滑散爲癱緩○滑數爲結熱○滑實爲胃熱○和滑爲姙娠○滑而大小不勻（必吐爲病進）泄痢○滑而浮大小腹痛○弱則陰中痛小便亦然

實爲熱○爲嘔○爲痛○爲氣塞○爲喘欬○爲大便不禁○

實緊爲陰不勝陽爲胃寒○爲腰痛

弦爲寒○爲痛○爲飲○爲瘧○爲水氣○爲中虛○爲厥逆爲拘急○爲寒癖○弦緊爲惡寒○爲疝瘕○爲癖○爲瘀血○雙弦脇急痛○弦而鉤爲脇下刺痛○弦長爲積隨左右上下

緊爲寒○爲痛頭骨肉等○爲欬○爲喘○爲滿○浮緊爲肺有水○緊滑爲蚘動○爲宿食○爲逆吐○緊急爲遁尸○緊數爲寒熱

洪爲脹爲滿爲痛爲熱爲煩○洪實爲癲○洪緊爲癰疽爲喘急亦爲脹○洪大爲祟○洪浮爲陽邪來見

辯八裏脉病証

微爲虛爲弱爲衄爲嘔爲泄爲亡汗爲拘急○微弱爲少氣爲中寒

沉爲在裏爲實爲水爲寒爲喘爲癥爲瘕○沉弱爲寒熱○沉細爲少氣臂不能舉○沉滑爲風水爲下重○沉緊爲上熱下冷○沉重而直前絕者爲瘀血○沉重而中散爲寒食成瘕○沉重不至寸徘徊絕者爲遁尸○沉緊爲懸飲○沉遲爲痼冷○沉重爲傷暑發熱

緩爲在下爲風爲寒爲弱爲痺爲疼爲不仁爲氣不足爲眩暈○緩而滑爲熱中○緩而遲爲虛寒相搏食冷則咽痛

濇爲少血爲亡汗爲氣不足爲逆冷爲下痢爲心痛○濇而緊爲痺爲寒濕○濇細爲大寒

遲爲寒爲痛○遲而濇爲癥瘕咽酸○遲滑爲脹○遲緩爲寒

伏爲霍亂爲疝瘕爲水氣爲溏泄爲停痰爲宿食爲諸氣上衝爲惡膿貫肌

濡爲虛爲痺爲自汗爲氣弱爲下重○濡而弱爲內熱外冷自汗爲小便難

弱爲虛爲風熱爲自汗

辯九道脉病証

細爲氣血俱虛爲病在內爲積爲傷濕爲後泄爲寒爲神勞爲憂傷過度爲腹滿○細而緊爲癥瘕積聚爲刺痛○細而滑爲僵仆爲發熱爲嘔吐

數爲熱爲虛爲吐爲痛爲煩渴爲煩滿

動爲痛爲驚爲痺爲泄爲恐

虛爲寒爲虛爲脚弱爲食不消化爲傷暑

促脉經並無文　釋曰其促有五一曰氣二曰血三曰飲四曰食五曰痰但藏熱則脉數以氣血痰飲畱滯不行則止促止促非惡脉也

結爲痰爲飲爲血爲積爲氣

釋曰氣寒脉緩則爲結數則爲促雖緩數不同結亦當如促脉分則可也

散脉經無文　釋曰六腑氣絕於內則手足寒上氣五臟氣絕於內則下利不禁甚者不仁其脉皆散散則不聚病亦危矣

革爲滿爲急爲虛寒相搏婦人半產漏下

釋曰革者革也固結不移之狀三部應之皆危脈也

代者一藏絕他藏代至

釋曰代其先脈不分三部隨應皆是

如前所說凡例皆本聖經學者當熟讀令心開眼明識取體狀然後交結互究與夫六經外感五藏內傷參以四時壯相依各部位推尋所因必使了然不疑方爲盡善其如隨病分門諸脈諸証尤當參對詳審如是精研方可爲醫門萬分之一否則循傍理教欺妄取財爲含靈之巨賊幸祈勉旃

詩曰

浮芤滑實弦緊洪名爲七表屬陽宮微沉緩濇遲并伏濡弱爲
陰八裏同細數動虛促結散代革同歸九道中在經在府并在
藏識得根源爲上工

分關前關後陰陽詩

掌後高骨號爲關傍骨關脈形宛然次第推排寸關尺配合天
地人三元關前爲陽名寸口尺脈爲陰在關後陽弦頭痛定無
疑陰弦腹痛何方走陽數即吐兼頭痛關微即爲腸中吼陽實
應知面赤風陰微盜汗勞兼有陽實大滑應舌強關數脾熱并
口臭陽微浮弱定心寒關滑食注脾家咎關前關後別陰陽察
得病源爲國手

定息數詩

先賢切脈論太素迴行一身五十度晝則行陽自陰出夜則行
陰自陽入晝夜各行二十五上合天度爲常則血榮氣衛定息
數一萬三千五百息此是平人脈行度太過不及皆非吉一息
四至平無他更加一至身安和三遲二敗冷爲甚七數六極
生多八脫九死十歸墓十一十二魂已去一息一至元氣敗兩
息一至死非怪我今括取作長歌爲汝心通并意解

六極脈（又名六絕脈皆死脈）

雀啄連來四五啄屋漏半日一點落彈石來硬尋即散搭指散
漸如解索魚翔似有一似無蝦遊靜中忽一躍寄語醫家仔細
看六脈見一休下藥

辯男女左右手脈法圖序

昔黃帝之拯民疾也參天地究人事以立脈法噫乎脈者先天之神也故其晝夜出入莫不與天地等夫神寤則出於心而見於眼故脈晝行陽二十五度寐則棲於腎而息於精故脈夜行陰亦二十五度其動靜棲息皆與天地晝夜四時相合且以天道右旋而主乎生化則男子先生右腎右爲陽爲三魂降精氣

亦以鎮丹田故男子命脈在右手尺部地道左旋主乎成物則女子先生左腎左屬陰爲七魄降真氣亦以鎮子宮故女子命脈在左手尺部若男子病右尺部命脈好病雖危不死若女子病左尺部命脈好病雖危亦不死天之陽在南而陰在北故男子寸脈盛而尺脈弱陽在寸陰在尺也地之陽在北而陰在南故女子尺脈盛而寸脈弱陽在尺陰在寸也陽強陰弱天之道也非反也反之者病故男得女脈爲不足女得男脈爲太過左得之病在左右得之病在右男左女右者地之定位也非天也蓋人立形於地故從地化楚人尚右者夷道也地道也故男子左脈強而右脈弱女子則右脈強而左脈弱天以陰爲用故人之左耳目明於右耳目地以陽爲使故人之右手足強於左手足陰陽互用也非反也凡男子診脈必先伸左手女子診脈必

先伸右手男子得陽氣多故左脉盛女子得陰氣多故右脉盛右反者病脉也男子以左尺爲精腑女子以右尺爲血海此天地之神化也所以別男女决死生者也茍不知此則男女莫辯而生死瞢然矣於是列圖於左以詔來者李希范曰近年以來人心巇嶮習俗刁薄有五手瑩命男子往往居幃帳之中面目蒙蔽伸手求診粗工受欺遂致喚笑貽譏昔諸葛公嘗以巾幗婦人之服遺司馬將軍天下耻之况乎其心卧幃帳作婦人以自欺耶斯亦不足稱也矣

傍通五臟法　横看


尺
浮
寸
男子命脉在右
尺
三焦
胃
大腸
包絡
脾
肺
沉
女子右尺爲血海

府屬陽
故脉浮


寸
浮
尺
小腸
膽
關
膀胱
心
肝
腎
沉
女子命脉在左尺
男子左尺爲精腑

臟屬陰
故脉沉

肝膽	肝爲臟	膽爲府	象木	王春	絶秋	色青	性暄仁	音角	味酸	臭羶	候眼	養筋	液泣	聲呼	氣噓	不足悲	有餘怒	平脉弦	賊脉濇	死庚辛日
心小腸	心爲臟	小腸爲府	象火	王夏	絶冬	色赤	性暑礼	音徵	味苦	臭焦	候舌	養血	液汗	聲笑	氣呵	不足憂	有餘笑不止	平脉洪	賊脉沉	死壬癸日
脾胃	脾爲臟	胃爲府	象土	王長夏四季	絶春	色黄	性兼靜信	音宮	味甘	臭香	候唇	養肉	液涎	聲歌	氣呼	不足利少氣	有餘脹滿	平脉緩	賊脉弦	死甲乙日
肺大腸	肺爲臟	大腸爲府	象春	王秋	絶夏	色白	性凉義	音商	味辛	臭腥	候鼻	養皮毛	液涕	聲哭	氣呬	不足息	有餘喘欬	平脉浮短	賊脉洪	死丙丁日
腎膀胱	腎爲臟	膀胱爲府	象水	王冬	絶長夏四季	色黑	性凜智	音羽	味酸	臭腐	候耳	養骨	液唾	聲呻	氣吹欠	不足厥	有餘腸泄	平脉沉	賊脉緩	死戊己日

心經脉圖

心屬火
故脉洪


本
脉洪
滑
脉
實
主嘔吐沉緩主留膈怒氣痛可利大便
主煩悶氣急
有止代壬癸
日死矣

肝經脉圖

肝屬木
故脉弦


本
宮
脉
弦
實
脉
脉
洪
緩
主刺
熱眼赤盜汗芤代庚
申辛酉日時死

脾經過

脾屬土故
脉緩在濡


本
宮
脉
緩
微
脉
弦
脉
實
胃氣不生飲食
不思氣脹不消

宮脉圖

肺經過

肺屬金
故脉濇


本
宮
脉
濇
實
脉
洪
脉
緩
主潮熱潮寒冷軟痰
涎勞倦胃膈痛浮
数秘結浮遲濇實下
痢與肝同腎數或有
膓癰

宮脉圖

腎經過

腎屬水
故脉實


本
宮
脉
實
脉
弦
洪
脉
微
主小便赤小腹痛頭
疼浮数膀胱數片
思熱淋與肝同弦
勞濁帶下弦長爲
夢泄

宮脉圖

包絡過

包絡屬相火故脉實

宮脉圖



論五臟沉遲數應病詩

左手心部

浮數沉遲熱胃騰浮遲腹冷胃虛真沉數狂言并舌強沉遲氣短力難成（生氣不相接續）

肝部

浮數患風筋卽抽浮遲冷眼淚難收沉數疾生常怒氣沉遲不牐損雙眸

腎部

浮數勞熱小便赤浮遲聽重濁來侵沉數腰疼生赤濁沉遲[illegible]潙耳虛鳴

右手肺部

浮數中風兼熱秘浮遲冷氣瀉難禁沉數風痰并氣喘下

弱冷涎停

脾部

浮數齦宣并盜汗浮遲胃冷氣虛膨沉數熱多并口臭沉遲腹滿脹堅生

包絡部

浮數精泄三焦熱浮遲冷氣濁難任沉數渴來小便數沉遲虛冷小便頻

診脉截法斷病歌

左右手脉

心脉迢迢恰似弦頭痛心熱數狂顛男子膀空女𣫍爲跌腎弦氣痛小腸連

心脉頻頻來得實其人煩悶氣喘疾若還止絕更加臨壬癸死

之是端的

心肝微微嘈似飢瀉心補腎邪相空若共肝微能左癱腎人調理不須疑

心脉遲遲主嘔吐沉加怒氣痛牽連斯人偃息雖無事驚恚能調便與宣

肝緊眼瞖能生癖腹痛尤加腳手酸更被醞酸來剋也調和[illegible]藥便能安

肝微內障甚筋攣失血呑酸頭更旋洪在大腸能酒利腎微脇冷定相連

肝經帶變氣須疼食拒心頭主剋酸止代庚申辛酉次驚人調理定難安

肝脉浮洪偏眼赤剋酸盜汗定相隨數脉忽然潮熱至行

胃更無疑

腎微經脉不調勻脚疼衛氣不能升帶下肝陰精不真肝微氣敗小便頻

腎緩腰疼尤腹痛小便白濁色如霜止代若逢時戊己其人必定命傾亡

腎洪白濁耳蟬鳴脚熱尤加血不勻虛熱瘡生癰又癧沉腰浮主血虛人

腎脉芤絃赤小便頭旋腹痛數兼淋血氣又來浮腹脹肝微白濁帶相并

右手

肺緩虛邪鼻塞時欠聲颯颯好猜疑緩脉浮遲能吐瀉沉遲怒氣痛難支

脉訣指掌

肺洪勞倦蒸痰熱潮熱尤兼吐瀉來大數中風兼鼻塞丙丁止代已焉哉

肺脉弦來元主嗽平時氣急喘呼呼頭痛更加身發熱十分重病也能甦

肺實冷嗽胸中痛倦勞寒熱不曾停浮數大腸能秘結浮遲冷痢更來侵

畔脉浮洪水積儲睡魔甜鬼每相如倦怠更加潮熱至其人脾困藥能除

脾脉遲弦主冷疑朝朝貪睡不曾停浮在脉中應腹脹沉弦有積腹中疼

脾實口臭胃經熱脾困寒熱又相侵胃翻酸水頻頻吐總吃些兒便逼心

脾脉微微胃不生終朝飲食　人心微濇脉來因腹脹甲寅代定歸真

命門弦主渴來侵濁帶加之更患淋實脉轉筋兼帶濁脉洪虛汗渴將臨

命門微細小便頻緩脉膀胱冷氣侵沉緩腰疼浮緩渴更兼遲緩小便生

診暴病歌

兩動一止或三四三動一止六七死四動一止即八朝以此推排但依次

池氏曰暴病者喜怒驚恐其氣暴逆致風寒暑濕所侵病生卒異動胃氣而絕即死不過日也脉兩動而一止乃胃氣相絕猶三四日方死三動一止而胃氣將盡猶將六七日殺

王叔和先生原本

四明張靜齋先生合編

圖註難經脉訣

古吳張青萬汪斗南仝校

善成堂藏板

難經脈訣合序

難經脈訣二書古之秦越人王叔和二先生遵黃帝素問而作者也洞悉至理誠為醫家之語孟迨有明張靜齋又取二書而啚註之是為啚注難經脈訣益珎重焉後之業醫者讀其書即可以按啚索理會註窮元而不病於庸矣予家藏茲集已久每暇輒出朗誦若不忍釋知其大有俾於斯世之醫者故弗敢私也而付諸梓

養松道人馮翥識

圖註王叔和脉訣辨眞目録

四明静齋張世賢　具圖

卷之一
脉賦
診脉入式歌
左右三部圖
女人背看圖
六部定位圖
覆診仰診圖
三部九候圖
臟腑各司圖
智者知治圖
下指定位圖
關前關後病脉圖

息至圖
實邪圖
時脉圖
七表八裏圖
脉息度數圖
卷之二
心臟歌
心臟圖
心脉見於三部歌
心脉見於三部圖
心脉歌
心脉圖
肝臟歌
肝臟圖
肝脉見於三部歌
肝脉見於三部圖
肝脉歌
肝脉圖
腎臟歌
腎臟圖
腎脉見於三部歌
腎脉見於三部圖
腎脉歌
腎脉圖
肺臟歌
肺臟圖
肺脉見於三部歌
肺脉見於三部圖
肺脉歌
肺脉圖
脾臟歌
脾臟歌
脾脉見於三部歌
脾脉見於三部圖

脾脉歌
脾脉圖
卷之三
七表八裏脉總論
七表脉交變略例論
七表寸部脉圖
七表關部脉圖
七表尺部脉圖
七表脉各有指法主病并歌二首
八裏脉交變略例論
八裏寸部脉圖
八裏關部脉圖
八裏尺部脉圖
八裏脉各有指法主病并歌二首

九道脉法論　九道脉圖
九道脉各有指法主病并歌二首

卷之四

左右手診脉歌　左右手診脉圖
六部脉數通論　左手寸口心脉歌
左手中指肝脉歌　左手尺部腎脉歌
右手寸口肺脉歌　右手中指脾脉歌
右手尺部命門脉歌　五臟轉至數之圖
診雜病生死候歌　五臟代脉期死圖

診暴病歌　診暴病圖
形症相反歌　形症相反圖
四時病五行相尅脉歌　四時病五行相尅圖
診四時虛實歌　診四時虛實圖
傷寒歌　傷寒病圖
熱病歌　熱病圖
陽毒歌　陰毒歌　陰陽毒圖
諸雜病生死歌　察色觀病生死候歌
五臟察色歌　五臟[illegible]死圖
診婦人有姙歌　診婦人有姙圖
姙娠雜病生死歌　產難生死歌
懷娠傷寒歌　產後傷寒歌
小兒生死候歌　小兒外症十五候歌

圖註王叔和脉訣辨眞目錄終

圖註脉訣辨眞卷之一　善成堂

西晉　王叔和　譔

四明　張世賢　註

脉賦

欲測疾兮生死。須詳脉兮有靈。（脉理通乎神明。可推測疾病之死生。）

左辨心肝之理。右察脾肺之情（左手寸部心脉。關部肝脉。右手寸部肺脉。關部脾脉。）

此爲寸關所主

（已上四臟脉。主於兩手寸口關中。）

腎即兩尺分並。（腎有兩枚。分居兩手尺部。左爲腎。右爲命門。）

三部五臟易識。七診九候難明。（三部。寸關尺也。五臟。心肝脾肺腎也。七診九候之法。並詳載於圖局。）

晝夜循環榮衛須有定數。（血爲榮。氣爲衛。榮行脉中。衛行脉外。循環無端。一日一夜。周於身五十度。故爲定數。詳見後辨經。）

男女長幼。大小各有殊形（男脉寸强尺弱。女脉寸微大盛。老人脉濡而緩。幼人脉數而急。肥壯者細實。臞瘦腎長大。是各有異形。皆得其正候。故爲之平脉。反此者爲病脉也。）

復有節氣不同。須知春夏秋冬。（五日爲候。三候爲氣。三氣爲一節。一歲三百六十日。共有七十二候。二十四氣。八節之令。與夫春夏秋冬。四時之更端。各有所生之不同也。）

建寅卯月兮木旺。肝脉弦長以相從。（正月建寅。二月建卯。足少陽膽經本旺之時。與足厥陰肝木相爲表裏。木當春發生。其脉來弦而長）

當其巳午。心火而洪。（四月巳。五月午。手太陽小腸脉。與手少陰君火心脉相爲表裏。火性上炎。其脉來當洪大。）

脾屬四季。遲緩爲宗。

（脾屬足太陰土之經。與足陽明胃經相爲表裏。土性厚重。寄旺於四季。當辰戌丑未之月。脉來和緩）

申酉是金爲肺。微浮短濇宜逢。（濇音色）（七月申。八月酉。手太陰肺經之旺。與手陽明大腸相爲表裏。金性輕浮。故脉來短濇而微浮。）

月臨亥子。是乃腎家之旺。得其沉細。各爲平脉之容。（十月亥。十一月子。足少陰腎水之旺。與足太陽膀胱經相爲表裏。水性下流。脉來沉細而滑。）

既平脉之不衰。（大抵五臟之脉。四時隨經所旺而不衰。故各得其平也。）

反見鬼兮命危（若心見沉細。肝見短濇。腎見遲緩。肺見洪大。脾見弦長。皆謂鬼賊之相尅。故爲死候也。）

子扶投兮瘥速（若心見緩。肝見洪。肺見沉之類。此子扶於母。是相生之道。雖病易瘥也。）

母抑子兮退遲。（腎病傳肝。肝病傳心之類。此母來抑子。病雖不死。然稽延難愈也。○劉氏曰。即腎得見濇。肝得沉滑。心得弦長。爲之虛邪者是也。）

得妻不同一治。生死仍須各推。（我剋者爲妻。假如心得肺脈。謂夫得妻脈也。然妻來乘夫。雖不爲正剋。生死各有推斷。解見下文。）

假令春得肺脈爲鬼。得心脈乃是肝兒。腎爲其母。脾則爲妻。

（五行木火土金水。相生也。木土水火金。相剋也。假如春屬木。見肺金脈。爲剋我之鬼也。見心火脈。是我生之子也。見腎水脈。是我生之母也。見脾土脈。爲我乘之妻也。）

春得脾而莫療。冬見心而不治。夏得肺而難瘥。秋得肝亦何疑。（訣云。春中若得四季脈。不治多應病自除。是爲微邪也。故病不治自愈。此言春得脾而莫療。反以微邪爲可畏。何耶。蓋春中獨見脾脈土乘木衰。上乘則生金來剋木故也。假如春中肝臟之脈弦而緩弦是本脈尚存。雖脾上或乘之。此則爲微邪。不足慮也。若本脈全無。而獨見脾緩之脈。此爲害也。上文所謂得妻不同一治。正此謂與夏秋冬皆以此類推。若木經脈全無。便不可以微邪論。故皆言不可治也。）

此乃論四時休旺之理。明五行生剋之義。（此結上文之義）

舉一隅而爲例。則三隅而可知。（一理既明。諸義皆通。）

按平弦而若緊。欲識濇而似微。浮芤其狀相反。沉伏殊途同歸。洪與實而形同髣髴。濡與弱而性帶依稀。（各脈形狀。詳見於後。然弦與緊。濇與微。洪與實。浮與芤。是皆頗相似。但主病名不同耳。沉與伏。形症蹤跡。主病頗同。濡與弱脈。其性形依稀。主病頗相似也。）

先辯此情。後論其理。更復通於藥性。然後可以爲醫。

（論五行生剋之情。察六脈實虛之理。又能精通藥性。則補瀉之法無差。然後方可爲醫也。）

既已明其三部。須知疾之所有。寸脈急而頭疼。弦爲心下之咎。緊是肚痛之徵。緩即皮頑之候。微微冷入胸中。數數熱居胃口。滑主壅多。濇而氣少。胸連脇滿。只爲洪而莫非。臍引背疼。緣是沉而不謬。（癥。癖氣之積也。皮頑。癱瘓也。壅。膈間滿塞也。臍。胸臆滿悶也。謬。誤也。此一節論寸口諸脈之所主病）

更過關中。浮緩不餐。緊牢氣滿喘急難痊。弱以數兮胃熱。弦以滑兮胃寒。微即心下脹滿。沉兮膈上吞酸。濇即宜爲虛視。沉乃須作實看。下重緣濡。女萎散療

之在急求攻因伏。牽牛湯瀉則令安。（弱為虛陽。數為實陰。二脉兼形於關上。主胃口心膈煩熱。弦與滑。首屬七表之陽脉。關中見之。主胃經寒怯而厥逆也。關濡主腰脚下焦虛。重關伏主脾元蓄結為癥瘕聚以成水氣。此一節論關中諸脉之所主病。）

兩乃尺中脉滑。定知女經不調。男子遇此之候。必主小腹難消。伏脉穀分不化。微即肚痛無憀。弱緣胃熱上壅。遲是寒於下焦。胃冷嘔逆。濇候腹脹陰疝。弦牢緊則痛居其腹。沉乃疾在其腰。濡數浮芤皆主小便亦濇。細詳如此之候。何處能逃（憀。賴也。痛。小便之疾也。此一節論尺脉之所主病。）

若問女子何因。尺中不絕。胎脉方真（不絕。謂脉滑也。胃居尺中。女子繫胞之所。滑脉主血盛。乃女子有孕之候。）

太陰洪而女孕。太陽大而男娠。（太陰。指右手。太陽。指左手。謂手與足之太陰皆在右手。手與足之太陽皆在左手也。）

或遇俱洪。而當雙產。此法推之。其驗若神。（或兩手俱洪。陰陽俱盛。是一男一女雙生之候。）

月數隨之。各依其部。假令中衝若動。此乃將及九旬（靈樞經曰。中衝應足陽明胃。少衝應手太陽小太衝應手陽明大腸。故知中衝主三四月。少衝五六月。太衝主必八月。今則中衝足陽明胃脉總絡之脉。滑疾而來。是知受孕二個月也。餘倣此。）

患者要知欲死。須詳脉之動止。彈石劈劈而又急。解索散散而無聚。雀啄頓來而又住。屋漏將絕而復起（劈劈。逼迫之貌。彈石之脉。若堅硬之物擊於石。劈劈然殊無息數。此肝元已絕。胃氣空虛故也。解索之脉。猶索之解散。在筋肉上。數動。散亂而不能復聚。緣精枯血竭。心腎俱絕也。雀啄之狀。來而急數頻絕而止。良久準前復來。如雀之啄食。謂來三而去一也。屋漏之狀。如屋之漏滴。不相連續。或來或去。滴於地而四畔濺起之貌。皆緣肝元已敗。胃氣之絕。穀氣俱盡。故見此兩脉也。）

鰕遊苒苒而進退難尋。魚躍澄澄而遲疑掉尾。（鰕遊之脉。若鰕之遊於水面。苒苒然不動。瞥然驚撞而去。杳然不見。須臾指下又復準前。魚躍。又曰

魚翔。如魚遊水面。頭不動而尾緩搖。倏然沉沒也。皆緣元氣已絕。榮衛兩亡。五臟俱敗。不日而死矣。）

嗟夫。遇此之候。定不能起。縱有九丹。天命而已。（此結上文死脉有六般。喻其不可治也。）

復有困重沉沉。聲音劣劣。寸關雖無。尺猶不絕。往來息均。踝中不歇。如此之流。何憂殞滅。（沉沉。神昏也。劣劣。氣少也。無。謂無脉也。不絕。謂猶有脉也。息均。息數調勻也。踝中不歇。謂大谿之脉動而不止也。流。類也。殞。歿也。）

經文具載。樹無葉而有根。人困如斯。垂死乃當更活。（其文詳十四難經。謂人之有尺。如樹之有根也。）

診脉入式歌

左心小腸肝膽腎

左者左手也。此言左手寸關尺之三部也。左寸心與小腸動脉所出。左關肝與膽動脉所出。左尺腎與膀胱動脉所出。歌句不言膀胱。蓋由字多。包括不盡。此三部寸屬火而主溫。溫主發熱。關屬木而主風。風主戰慄。尺屬水而主寒。寒主惡寒。溫風寒在表。是上有水也。治可汗之。每部一臟一腑。腑脉則浮。臟脉則沉。其取按之法。當依難經菽數。假令心部按六菽之重而得者。心脉也。浮於六菽者。小腸脉也。本部浮沉適中。悉之一息五至。此為平脉。不必更深之分別臟腑之脉。餘部傚此。潔古曰。假今病人發熱無汗。惡寒。脉浮緊。乃寒傷榮。可用麻黃湯主之。如戰慄惡風。有汗。脉浮緩。乃風傷衛。可用桂枝湯。如往來寒熱。是尺寸脉交。以小柴胡湯兩和之。如發熱戰慄。葛根解肌湯主之。如戰慄脉

浮弦。小青龍湯主之。如戰慄惡寒。脉沉弦。大青龍湯主之。如惡寒。脉沉遲。麻黃附子細辛湯。已上皆解表之法也。

右肺大腸脾胃命

右者右手也。此言右手寸關尺之三部也。右寸肺與大腸動脉所出。右關脾與胃動脉所出。右尺命門三焦動脉所出。歌句不云三焦。亦因包括不盡也。此三部寸屬金而主燥。燥主大便難。關屬土而主濕。濕主腹滿痛。尺屬相火而主熱。熱主小便赤澀。燥濕熱在裏。是下有火也。治可下之。潔古云。假令病人大便難。脉沉數。小承氣湯主之。如腹滿痛甚而脉沉數。大承氣湯主之。如小便赤澀。脉沉數。人承氣湯主之。如小便赤。不大便。腹滿痛。亦此藥主之。如小便腹痛而不滿。調胃承氣湯主之。如大實證。爲不大便是也。如小便赤。大便難。腹滿痛。大承氣湯主之。已上皆攻裏之法也。芒硝辛潤治大便[illegible]而難。厚朴枳實治腹滿痛。大黃治大便不通。乃小便赤澀。假令有表裏證者。先解表。後攻裏也。如病人大便難。發熱。謂之溫燥。先解表。左宜桂枝。後攻裏。右宜承氣湯。如雖而腹滿痛。謂之風濕。左宜桂枝湯。右宜承氣湯。如惡寒自汗。小便赤。左宜桂枝麻黃湯。右宜承氣湯。凡六氣之病。肝與命相得者生。相友者死。色脉亦然。臨病人持診之時。宜細詳消息。此上大約之言。不可執泥。印定眼目。以悞病焉。

左右三部之圖



凡此六位圭有首尾傳其位先立左寸心小腸乃君火之位。次立左關肝膽風木之位。次立左尺腎與膀胱乃寒水之位。次立右寸肺大腸燥金之位。次立右關脾胃濕土之位。次立右尺命門三焦相火之位。皆循天而右行。以此言之。病在左主表。宜發汗。病在右主裏宜下。循天左者順行十二辰。自溫而熱。自熱而濕。自濕而燥。自燥而寒自寒而風自風而濕也。所以云天行從前來者爲實邪從後來者爲虛邪其傳變之道

左必傳右。乃汗症傳作下症。下症則無傳汗症之理矣。命門心包皆係相火。圖內具心包而遺命門者蓋因心包有經而命門無經也。二者動脉皆在尺部故互言之

女人反此背看之。尺脉第三同斷病

（此者承上文六部脉而言也。六部之脉。春夏與秋冬不同。春夏天氣在上。人氣亦在上。其時爲男。其脉寸盛而尺弱。秋冬天氣在下。人氣亦在下。其時爲女。其脉寸弱而尺盛。女人反此。因其時而有其脉也。看春夏之脉寸盛尺弱而爲之平。看秋冬之脉寸弱尺盛而爲之平。故曰背看之。尺部之脉寸關并之。居於第三。苟或春夏脉同秋冬。是男得女脉寸人不足而陰盛則斷之以病在內。宜用辛甘之藥助陽而抑陰。秋冬脉同春夏。是女得男脉。乃陽火過而陰小足。則斷之以病在外。宜用酸苦之藥助陰而抑陽。人法春夏宜汗。秋冬宜下。素問熱論云。三日已前當汗。三日已後當下。春夏與秋冬四時背同）

女人背看之圖

春　夏		秋　冬
天氣在上	女人反此背看之尺脉第三同斷病	天氣在下
人氣亦在上		人氣亦在下
其時爲男		其時爲女
其脉寸盛尺弱		其脉尺盛寸弱
脉同秋冬		脉同春夏
是男得女脉		是女得男脉
爲不足 病在內		爲大過 病在外

心與小腸居左寸（左寸左手寸部也心爲君火火性上炎小腸心之腑也心與小腸之脉故居於左手寸部）

肝膽同歸左關定（主關左手關部也肝爲風木木位居東同歸者肝膽皆屬木也膽者肝之腑也肝膽之脉故居於左手關部焉）

腎居天脉亦如之（腎者北方水也其性下而不上故居於左尺寸關二部一藏一腑而於於左腎在尺部亦居於左而配膀胱之腑故曰亦如之承上文而言言腎亦在左而亦有一腑也）

用意調和審安靖（此承上文左手三部而言也言醫者當用意自已氣息指下以審他人之脉至左手三部所主溫風寒也皆客隨主變客邪不來犯主則脉安靖矣）

肺與大腸居右寸（右寸者右手寸部也肺爲燥金金位於西而至京大腸者肺之腑也故肺與大腸之脉居於右手寸部也）

脾胃脉從關裏認（關者右手關部也脾爲濕土土位西南而居於金木水火四臟之中胃者脾之腑也故脾與胃脉居於右手之關部焉）

命門還與腎脉同

（以天尺部命門亦居於尺部命門之氣與腎天通而脉形亦同於腎故曰還與腎脉同也）

用心仔細須尋趂（此承上文右手三部而言也右手三部所主燥濕暑也皆主隨客變主既隨客而變所見者惟客脉而已苟不用心仔細尋趂其源則非者是矣故醫者可不慎之至歟左手三部客隨主變不脫主脉右手三部主隨客變主脉脫矣叔和吁嗟告戒之語故右甚於左焉）

六部定位之圖

屬燥金	屬濕土	屬相火
其脉浮而短濇	其脉緩遲	其脉按之濡實指來實
大腸 肺	胃 脾	三焦 命門
浮 沉	浮 沉	浮 沉
右	右	右
寸陽	關陰陽介	尺陰
左	左	左
浮 沉	浮 沉	浮 沉
小腸 心	膽 肝	膀胱 腎
其脉浮大而散	其脉牢而長	其脉按之沉濡舉指來實
屬火	屬風木	屬寒水

右手三部之脉主隨客變客脉擅專故曰用心仔細尋趂左手三部之脉客隨主變主脉不脫故曰用意調和審安靖

診他脉覆手取要　自看時仰手認

此言用手診脉之法。覆手以取他人之脉，而仰診以取自己之脉也。知乎此，非惟有便於施診，而抑且下指不差矣。

覆診仰診之圖


診他人脉
尺關寸
診自己脉
寸關尺

三部須教指下明

三部者，寸關尺也。寸爲上部，關爲中部，尺爲下部。經曰：上部法天，主胷已上至頭之有疾；中部法人，主膈下至臍之有疾；下部法地，主臍下至足之有疾。三部之脉而爲一身之主，於下診脉之際可不探其微闡其幽哉。

九候了然心裏印

九候者，浮中沉之診於每部之中。浮候五動而法大，中候五動而法人，沉候五動而法地。一部三而能三部總得九候也。印者，定見無差也。九候之法，知之至，見的無一毫之不通，胷中定見，一有何差焉。蓋古日在天五日爲一候，在脉五至爲一候。一息之數，浮一氣十五爲天，中一氣十五爲人，沉一氣十五爲地。故一氣在上，一氣在中，一氣在下，三氣相合而成一脉，是三元也，乃氣血精總得四十五動日平脉也。故叔和於各臟言脉云：四十五動無他事。又曰：無疑慮。又曰：不須怕。此平脉也。心裏明者，浮中沉三診各有太過不及之脉也。假令左寸太過，脉浮診得六數七極者，必身熱而無汗，麻黄湯主之。不及，脉浮診得三遲二敗者，必身熱自汗，桂枝湯主之。桂枝止汗，麻黄發汗，乃表之補瀉也。關脉中診得六數七極者，是熱在中，調胃承氣湯主之。如得三遲二敗者，是不及也，以建中湯、理中湯主之。用調胃承氣，自內而瀉於外也；理中、建中乃和中補藥也。承氣、建中乃中焦補瀉藥也。左尺沉診得六數七極者，必大便難而小便赤澁，大承氣湯主之。却得三遲二敗者，必大小腹中痛，不便清，則大便澁，徹清冷，當附湯主之。承氣、當附乃下焦補瀉之藥也。夫大承氣之寒而能治下焦之熱，不能治中焦上焦之熱；當附之熱而能治下焦之寒，不能治上焦中焦之寒。建中、理中之湯能治中焦之寒，不能治上焦下焦之寒。調胃承氣之寒而能治中焦之熱，不能治上焦下焦之熱。且麻黄湯爲

第十○冊　續修四庫全書　第 4 版 正 內

瀉也而能瀉表之實不能瀉裏之實桂枝湯也。而能補表之虛。不能補裏之虛。中則察邪氣之所在。上中下或表或裏。診得常印乎此。不使一毫之差。九候之法。豈可忽哉。

三部九候之圖


九候之條
三部
九候之條
上部主胃以上至頭之有疾
天地人
上部法寸陽
肺陽中之陰
心陽中之陽
浮中沉
中部主膈以下至臍之有疾
中部法關陰陽之中
脾
下部主臍以下至足之有疾
下部法尺陰
腎陰中之陰
肝陰中之陽也

大腸共肺爲傳送

大腸者。肺之腑。乃傳道之官。傳送不潔之物而變化焉。其傳道也。必待氣往下行。肺主氣。故共爲送之也。經曰陽明之上。燥氣治之。中見太陰。

心與小腸爲受盛

心者。火之臟也。火主時令。則萬物皆盛。小腸者。心之腑。乃受盛之官。承奉胃司而受盛糟粕。心屬火。火能化物。糟粕受已。復化傳入大腸。故云心與小腸受盛。經曰少陰之上。火氣治之。中見太陽。

脾胃相通五穀消

胃者。脾之腑。脾胃爲倉廩之官。潔古曰。脾胃之氣常欲通和。胃爲戊其化火。象於天。其氣熱。脾爲己其化濕。象於地。故夏熱而上濕。其氣相通。則五穀腐熟而自消矣。如濕多而熱少。則成五泄。熱多而濕少。則多食而飢虛。名曰消中。皆脾胃之病也。經曰太陰之上。濕氣治之。中見陽明。

膀胱腎合爲津慶

膀胱者。腎之腑。乃州都之官。津液藏焉。腎主五液。故膀胱與腎爲津慶。經曰。太陽之上。寒氣治之。中見少陰。

三焦無狀空有名寄在胸中膈相應

三焦者。上中下之三焦也。上焦在心下。下膈胃上口。主內而不出。中焦在胃中脘。不上不下。主腐熟水穀。下焦在臍下。當膀胱上口。主分別清濁。出而不內。是三焦也。主持諸氣。從有上中下之名。而無其形。其經屬手之少陽。而爲外腑。叔和於本文上下俱言一臟一腑。至於三焦而不言其臟[illegible]君火也。三焦亦同火也。二者爲之表裏。俱有[illegible]而無形故三焦寄位於胸中。與膈相應。何爲與[illegible]命

門亦係相火。居於臍下。心包在膈上。命門在膈下。膈上膈下三焦俱不相失而相應。故臍下一寸半爲之氣海。而膻中亦爲氣海焉。經曰。少陽之上。熱氣治之。中見厥陰。

肝膽同歸津液腑。能通眼目爲清靜。

膽者肝之腑。肝臟血。膽之精氣。藉肝之餘氣。溢入於膽。積聚而成。故同爲津液之腑。目者肝之竅。肝氣通於目。故云能通眼目。內藏無穢物以濁。故云清靜。目其內藏精靜。外視所以得明也。經曰。厥陰之上。風氣治之。中見少陽。

臟腑各司之圖



智智能調五臟和。自然察認諸家病。

智者知之至。即上工也。凡五臟之不和者。能調而和之。此無他。由其察認諸家之病。出於理之自然。無一毫勉強憶度之爲。夫如是。所以有十全之功也。

智者知治之圖

智者能調

五臟平和

皆自然察認

由其諸家病

非勉強憶度

掌後高骨號爲關。骨下關脉形宛然。

掌後高骨。乃手踝骨也。關脉見於此骨之下。

以次推排名尺澤。三部還須仔細看。

凡診脉時。先下中指。按於高骨之下。以定關位。次以頭指按於寸部。再次以第三指按於尺部。寸部心肺之脉。三菽六菽之重。關部肝脾之脉。九菽十二菽之重。尺之一部。按法重於寸關。其脉深沉。有似於澤。以次推排其指。至於尺部。而名爲尺澤。此尺澤非尺澤穴也。從關部至尺澤穴。是尺內陰之所治。俱爲尺澤。診三部之脉。必須均呼吸以定至數。先識王脉時脉胃脉與臟腑平脉。然後及於病脉。人骨長則疎下其指。臂短則密下其指。而又分舉按尋之三法。輕手循之曰舉。重手取之曰按。不輕不重。委曲求之曰尋。而後採其脉之形狀何若。察其病之何在。既知其病在於何經。更分在氣在

（血。上下來去至止六字須要明白。上者。自尺部上於寸口。陽生於陰也。下者。自寸口下於尺部。陰生於陽也。來者。自骨肉之分而出於皮膚之際。氣之升也。去者。自皮膚之際而還骨肉之分。氣之降也。應曰至。息曰止也。仔細二字所包者廣。此特舉其略耳。還須者。應前須教二字也。）

下指定位之圖



關前爲陽名寸口。關後爲陰直下取

（關前爲陽脉。陽脉得寸內九分而浮。名爲寸口。關後爲陰脉。陰脉得尺內一寸而沉。其取脉之法。重按得之。故曰直下取也。）

陽弦頭痛定無疑。陰弦腹痛何方走

（關前爲陽。其脉九分而浮。脉浮而弦。風邪在表。在上。關後爲陰。其脉一寸而沉。脉沉而弦。風邪在裏。）

陽數即吐兼頭痛。陰微即瀉臍中吼

（陽浮脉而數。邪熱在表。在上。陰脉沉而微。寒邪在裏。）

陽實應知面赤風。陰微盜汗勞兼有

（陽脉實。是心火旺。火旺則熱。熱則生風。故知風。在表在上。陰脉沉微。是陽氣不營衛。邪在裏。疥得以妄泄。故麻而其汗自出。疥則其汗即止矣。）

陽實大滑應舌強。陰數脾熱并口臭

（陽脉浮。實大且滑。心火邪熱爲甚。心氣通於舌表。故知熱強。陰脉沉數。是脾朋有熱。故知口有臭氣。）

陽微浮弱定心寒。陰滑食注脾家咎

（陽脉浮微。表氣虛而心火衰。陰脉沉滑。寒邪在裏。食則注泄而脾經有疾矣。）

關前關後辨陰陽。察病根源應不朽

（關前脉浮。浮者陽也。關後脉沉。沉者陰也。當關立之前後。辨尺寸之陰陽。浮者法於寸。知病在表在上之根源也。沉者法於尺。知病在裏在下之根源也。非止寸口獨浮。尺脉獨沉。尺寸俱有浮沉也。知乎此。察病之因。豈有差忒者哉。）

關前關後病脉之圖

關前爲陽名寸口　關後爲陰直下取



關前關後辨陰陽　察病根源應不斷

一息四至號平和更加一至太無痾（一息一呼一吸畢也一呼脉再至心與肺脉也一吸脉再至腎與肝脉也如是上下交通爲平和脉呼吸之間更加一至是五至也乃脾受穀氣其脉在中五臟各得一至故太無痾）

三遲二敗冷危困（一息三至謂之遲脉二至謂之敗脉皆陰太過而陽不及寒冷所致當以溫熱治之）

六至七極熱生多（一息六至數多于常度謂之數脉七至過于常度又將半矣故爲極脉皆陽太過而陰不及當以寒涼治之）

八脫九死十歸墓十一十二絕魂瘥

（潔古曰一息八至是陽覆于陰也陰不勝陽則脫一息九至是陽鬬于陰也是無陰則死十至亦然十一十二乃陽欲併絕之狀也）

三至爲遲一二敗（此蓋重出以起下文）

兩息一至死非怪（兩息之間脉得一至爲陽獨絕乃死脉也）

遲冷數熱古今傳難經越度分明載（比結上文之意難經曰數則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰爲寒四至五至是爲得中不及此數爲之遲冷太過此數爲之數熱越人于八十一難之中[illegible]度而載昭然明白）

息至之圖

呼吸畢而謂之息



應指下而謂之至

熱即生風冷生氣用心指下叮嚀記（此言實邪重申遲冷數熱之意熱屬火風屬木木來火位則木中有火金有懼火之意金不得以制木而木愈盛故熱則生風冷屬水氣屬金木來金位則金中有水火有畏水之意火不得以制金而金愈盛故冷則生氣熱則生風是東方實而西方虚也法當瀉南方火補北方水火滅則金得是盛水自虚而風自止矣冷生氣是北方實而南方虚也法當瀉北方水補南方火水滅則火得氣盛金自虚而氣自衰矣此實則瀉其子也用心指下辨寄遲數虚實易記熱生風冷生氣之語也故詳言以叮嚀云）

實邪之圖



春弦夏洪秋似毛冬石依經分節氣

弦洪。毛石。脈之體樣也經者內經難經也節者四時之節也氣者寒熱溫涼也弦洪毛石之取。依內經因春夏秋冬之節氣而分難經於十五難中亦言之詳矣。不必以十二經各主爲分謂之依經夫如是不在四時脈王說矣。通眞子曰春脈如弦而大弱輕虛而滑端直以長爲平實而強者爲大過不實而微者爲不及夏脈如鈎來盛去衰爲平。來盛去亦盛爲太過來不盛去反盛爲不及秋脈如毛輕虛以浮來急去散。爲平中堅旁虛爲太過毛而浮者爲不及冬脈如石氣來沉以搏者爲平。來如彈石爲太過去如數者爲不及弦洪毛石之脈各至七十二日王機云脈從四時謂之可治

阿阿緩若春楊柳。此是脾家居四季

阿阿寬緩貌。春之楊柳其風和其枝嫩動搖寬緩有該脾脈故比而象之。脾屬土。土王四季。辰戌丑未之月各王一十八日。脾脈所以遲見矣四時也

在意專心察細微靈機曉解通玄記

在意專心。不他雜也他事不雜於胸中。精察脈理之細微則靈機自然曉悟。玄微之理貫通而不惑也靈機脈理也脈理活動而不執滯故曰靈機大則氣理短則氣病數則心煩。洪則病進。上盛則氣高下盛則氣脹大則氣衰細則氣少。短而急者病在上長而急者病在下弦而沉者病在內浮而洪者病在外滑而發者病在脹下緊上虛者病在脾長而之者病在用脈小而小者病在心大而緊者病在賢脈實者病在內脈虛者病在外浮而大者風浮而絕者氣沉細疾者熱遲緊者寒諸腑爲陽主熱諸臟脈爲陰上寒陽發則汗陰浮則自下陽數則口瘡陰數則惡寒陽芤則吐血陰芤則下血脈與肌內相得久特之至者可下之弦小緊者可下之弦遲者宜溫劑緊數者宜發汗寸口脈浮大

而病者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱寸口脈沉細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂聞人聲少氣時時出汗陰氣不足兩背不舉尺脈沉細者名曰陰中之陰苦兩脛疼痛不能久立陰氣衰少小便餘遲下濕痒痛其寸脈牢而長關中無此爲陰干陽苦兩脛重小腹引腰痛寸口脈壯大尺中無此爲陽干陰苦腰苦痛陰中傷足脛寒尺脈浮而大爲陽干陰苦小腹滿痛不能溺溺即陰中痛大便亦然寸口脈緊者中風風攻頭痛脈來乍大乍小乍長乍短爲祟脈來但實者爲心勞寸口脈弦尺脈短者頭痛脈來過寸口入魚際者遺疰脈但數者心下結熱脈盛滑緊者痛在外脈小實緊者痛在內脈小弱而浮滑久瘕脈濇浮而疾數新病脈沉而弦者有疾癖腹內痛脈來盛緊者腹脹出魚際氣逆喘急脈來緩滑者熱在內中脈來滑者主霍亂脈來大堅疾者顛病脈來弦急疾者癖病脈浮而緩皮膚不仁風寒入肌內脈來遲而濇胃中有寒有癖結脈滑而浮散者有風脈

短而滑者病酒脉緊而滑者吐逆脉遲而緩者脉胃有寒脉弦而鈎脇下如刀刺狀如飛尸至困而不死脉沉而遲腹臟冷痛脉浮而細滑者傷於寒飲脉沉而數者必然中水冬時不治自愈痺澀細而緊者庫病脉沉而滑者為下重肯脊作痛脉短而數心痛必煩脉微而弱多寒少氣脉緊而數寒熱與發必當下之乃愈脉實緊者胃中有寒若不能食時時利者難治脉弦而緊者腸下痛脉大細滑者中有短氣脉微小者血氣俱少脉洪大者血氣俱盛脉澀者氣多血少脉滑者氣少而多兩手脉前部陽絕者若心下寒口中熱脉洪大緊急病在外其頭痛發難腫深細小緊急病在中寒病疫積緊腰中病脉浮大中風鼻寒脉微浮秋告冬病脉來疾者為熱遲為寒滑為鬼疰弦為切痛脉沉重而而而絕者病血在腹間脉沉重而中散者因寒食成瘦脉沉而急病傷暑暴發虛熱脉來中散絕者病消渴脉沉重前不至寸尸併徊欲絕者肌肉澀尺脉累累如貫珠不前至者有風寒在大腸

伏留不去脉來累累而止不至寸口軟者結熱在小腸伏留不去脉微則陽不足沾熱汗出凡無陽則厥無陰即噎陽微不能呼陰微不能吸呼吸不足胃中氣促前大後小即頭痛目眩前小後大即胃滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死陽脉來見浮洪陰脉來見沉細水數來見實堅浮而滑者宿食洪大者傷寒熱病弦小者寒癖浮滑而速疾者食不消脾不磨也關脉緊而滑者有蚘脂蟲尺脉沉滑者有寸白蟲三部或至或停冷氣在脾脉不通也脉緊而急者為遁尸。脉緊而長過寸已者達病關脉浮積熱在胃中尺脉浮客熱在下焦諸浮諸緊諸弦諸沉諸澀諸滑若在寸口膈已上病若在關上胃已下病若在尺中腎已下病寸口脉沉皆中氣短若弦上寸口頭病有宿食若有表無裏者邪之所止得泉病何謂裏裏寸尺為表關上為裏兩頭有脉關中絕不至也尺脉上不至關為陰絕寸脉下不至關為陽絕陰陽皆絕皆不治也脉理細微莫能盡述學者宜究心焉

四時脉息之圖



浮芤滑實弦緊洪七表還應是本宗（此七樣脉皆屬乎陽謂係表脉故曰是本宗也）

微沉緩濇遲并伏濡弱相兼八裏同（此八樣脉皆屬乎陰謂係裏脉故曰八裏同也）

七表八裏之圖

七表八裏脉


浮 屬金
弦 屬木
微 屬土
遲 屬土
芤 屬火
緊 屬木
沉 屬水
伏 屬木
滑 屬水
洪 屬火
緩 屬土
濡 屬水
實 屬火
七表脉屬陽八裏脉屬陰也
濇 屬金
弱 屬金

血榮氣衛定息數一萬三千五百通

人受氣於穀穀入於胃乃傳之於五臟六腑皆受於氣其清者爲榮濁者爲衛榮行脉中衛行脉外榮衛周流不息五十而復大會陰陽相貫如環之無端故血爲榮氣爲衛凡人所以得全其性命氣與血也氣爲陽陽爲衛血爲陰陰爲榮二氣常流所以無病兆經曰人一呼脉行三寸一吸亦行三寸呼吸定息總行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周也故五十度復會於手太陰寸口者五臟六腑之所終始也

脉息度數之圖



圖註脉訣辨眞卷之二

西晉　王叔和　譔
四明　張世賢　註

心臟歌

心臟身之精小腸爲弟兄（心也者隨機應變主宰萬物而爲一身之主故曰身之精朱子有曰天君太然百體從令丙屬小腸而剛丁屬心火而柔剛在先而爲兄柔在後而爲弟二者俱係君火同氣連枝故言弟兄而不言夫婦心之夫膀胱是也小腸之婦肺金是也）

象離隨夏旺屬火向南生

（離之爲卦其中空虛心臟屬火亦猶是也火旺於夏所以隨夏而旺相也南方乃爲離火之位故云向南而生）

任物無纖巨多謀最有靈（任物者任視萬物也纖小也巨大也人心之應物隨其小大無不任親也朱子曰人心之靈莫不有知所以多謀）

內行於血海外應舌將榮（血海肝也心主血肝藏之故云內行血海舌乃心之竅心氣通於舌故云外應於舌而舌能嘗知味也）

七孔多聰慧三毛上智英（多聰慧者心有七孔上智英者心有三毛其次則不全矣）

反時憂不解順候脉洪驚（心屬火而旺夏反得冬脉沉濡而滑此乃腎邪乎心水來尅火謂之賊邪是可憂也順候診得夏脉也驚者大而散也其脉洪大而散謂之順候）

液汗通皮潤聲言爽氣清（腎主液入心爲汗肺主聲入心爲言水能尅火汗通則腎水平而皮潤火不受水賊矣火能尅金言爽則肺金平而氣清金不受火侵矣）

伏梁秋得積如臂在臍縈（經曰腎病傳心心當傳肺肺旺者不受邪心復欲還腎腎不肯受留滯爲積故知伏梁以秋庚辛日得之其積之形狀如手臂環於臍畔縈繫而不動也）

順視雞冠色凶看瘀血凝（雞冠色之赤者也瘀血赤而黑者也赤乃本色而爲順黑則水來尅火而凶矣通津子曰心其色赤然心藏於內不得見此云順則雞冠凶看瘀血叔和以經云五臟有五色皆見於面又當與寸口尺內相應欲令色赤者赤脉浮大而散赤心色也浮大而散心脉也以此言之五臟之色皆可察之於面也）

診時須審委細察在叮嚀（凡醫必從望聞問切四字上文言視其血色而知其吉凶聞其聲言爽而知其氣清切其脉而知其反時順候獨缺問之一字故於此言問診脉時必須詳審委曲細察病源不致差誤也叮嚀叔和致）

（驚後學之意也）

實夢憂驚怪虛翻烟火明（心臟有餘則夢中或憂或驚或怪異之事心臟不足則夢烟火光明化竭而見本矣）

秤之十二兩大小與常平（心重十二兩不分大小皆等其斤兩之數皆起於同身寸也）

心臟之圖


心火
診
視
其聲言
其液汗
其色赤

心脉見於三部頭

三部俱數心家熱舌上生瘡唇破裂（五臟更相和平一臟或有大過不及遂延及各臟也數者火脉也三部俱數心臟邪熱太過延及各臟致令脉皆見數心氣通於舌心熱盛則舌生瘡而唇破裂或曰唇屬脾唇何為而破裂也然唇之四白際皆屬於脾其紅者皆屬心火也內經曰脾之華在唇四白）

狂言滿目見鬼神飲水百杯終不歇（言者心之聲鬼神陰類也心熱盛則口發狂言目多見鬼神經曰脫陽者見鬼數甚則陰絕陰絕則陽不能獨留而亦欲脫矣所以目見鬼神也心火盛則腎水衰腎主五液衰則五液飲少而心火獨炎所以渴而欲暢飲也）

心脉見於三部之圖


寸
關
尺
三部俱數心家熱
狂言滿目見鬼神
舌上生瘡唇破裂
飲水百杯終不歇

心脈歌

心脈芤陽氣作聲或時血痢吐交橫（此一歌通言心之病脈也雲岐子曰芤主血凝而不流不流則氣道不得通暢故陽氣在內作聲心脈芤積血在於胸中氣上則吐之氣陷則下之痢吐交作也）

溢關骨痛心煩燥更兼頭面赤騂騂（溢關謂脈自關部湧出於魚際也騂騂熱盛而色赤之甚也）

大實由來面赤風燥痛面色與心同（心脈大實蓋心家有熱熱則生風故面色赤面身有風也有風有熱故致燥痛面色與心色同言赤之甚也）

微寒虛惕心寒熱（心脈當浮大而散不足則見微脈主寒而虛惕寒熱交作也）

急則腸中痛不通（通津子曰數則爲急急謂氣急也小腸乃心之腑心脈急主小腸氣急疼痛二便俱不得通利也）

實大相兼并有滑舌滑心驚語話難（心脈實大而滑謂之實邪火中有上則水不能制火而火邪愈甚甚則熱極而生風致令舌不活動而心中驚惕語言蹇澀也）

單滑心熱別無病（絜古曰謂之正邪）

濇無心力不多（血已不足所以夢來乘夫）

沉緊心中逆冷痛（謂之賊邪）

弦時心急又心懸（此一句承沉緊心中逆冷痛而言弦時乃肝邪干心致令拘急又心懸仍指賊邪而言水來剋火故心懸如病飢也心懸如病飢見靈樞腎經是動則病）

心脈之圖


心脈
芤
陽氣作聲或時血痢吐交橫
弦
心急
心懸
沉
心中逆冷痛
濇
無心力不多
實大
舌滑心驚語話難
溢關
更兼頭面赤騂騂
大實
面赤風燥面色與心同
微
心寒熱
急
腸中痛不通

肝臟歌

肝臟應春陽連枝膽共房（肝屬木而應春連枝卽心臟弟兄之義也其房肝膽同一處也）

色青形象木位列在東方（肝之色青木之色亦猶是也肝臟之形是木之幹東方屬木木所居之位故列在東方也）

舍血榮於目牽筋瓜運將（肝藏血而爲血海故能舍血其候在目其華在瓜其充在筋所舍之血榮於目牽引於筋瓜故目能視足能步掌能握指能捻而運動也）

逆時生恚怒順候脉弦長（肝屬木而應春當反得秋脉浮短而濇謂之逆時乃金來尅木木受尅則不得舒暢故生恚怒順候其脉弦而長也）

泣下爲之液聲呼是本鄉（腎主液入肝爲泣肺主聲入肝爲呼泣與呼皆屬於肝故曰木鄉）

味酸宜所納麻穀應隨糧（肝其味酸宜納穀麥或云麻字疑誤應隨糧者應肝家之糧食也）

實夢山林樹虛看細草芒（潔古曰甲剛爲木故實夢山林樹乙柔爲草故虛看細草芒也）

積因肥氣得杯覆脇隅傍

（經曰肺病傳肝肝當傳脾脾季夏適旺旺者不受肝邪復欲還肺肺不肯受故留結爲積名曰肥氣以季夏戊己日得之狀如覆杯在左脇下突出如肉肥盛之狀也）

翠羽身將吉顏同枯草殃（肝臟色青翠羽色青而紅枯草色青而白紅屬心火白屬肺金木生火故曰吉金尅木故曰殃）

四斤餘四兩七葉兩分行（肝重四斤四兩左三右四共七葉而兩行分也）

肝臟之圖


肝
木
診
逆時生恚怒
順候脉弦長
四斤餘四兩
七葉兩分行
視
翠羽身將吉
顏同枯草殃
其聲呼
其色青
液泣
積名肥氣
膽爲之腑
象木位列東方

肝脉見於三部歌

三部俱弦肝有餘目中疼痛苦痃虛（痃少腹下病也弦脉見於三部乃肝家有餘肝乃目之竅有餘生目中疼痛其經還絡陰器而抵少腹故苦痃虛）

怒氣滿胷常欲叫翳矇瞳子淚如珠（叫呼也肝邪有餘主怒氣滿於胷中而常欲叫呼肝有餘則生風風熱上攻翳膜矇蔽瞳子而淚流不止也）

肝脉見於三部之圖



肝脉歌

肝軟并弦本沒邪（此乃微弦名曰平脉已後皆言肝之病脉也）

緊因筋急有些步（少見筋急其脉必緊）

細看浮大更兼實赤痛昏昏似物遮（此乃木中有火）

溢關過寸口相應目眩頭重與筋疼（關部之脉上湧出於寸口乃木盛而風喜之也筋屬木寸口又主上部之有疾故目眩而頭重筋復作疼也）

芤時眼暗或吐血四肢癱緩不能行（芤主血凝而不流肝脉見芤不能舍血而榮故目暗血凝則血不歸宗或上行而吐血血不養病則筋緩不能自維持也）

濇則緣虛血散之肋脹脇滿自應知（濇脉屬金金來尅木肝家虛而不藏血故肋脹脇滿肝位在是而經亦於此也）

滑因肝熱連頭目（肝脉滑乃肝家有熱肝氣通於目其經至巔頂故連頭目）

緊實弦沉痃癖基

（肝部見此四脉能致痃癖之疾望曰疾癖其）

微弱浮散氣　作難目暗生花不耐看

（肝家虛久祕夫其眞也）

甚浮筋弱身　無力遇此還須四體癱

（肝脉甚浮乃金耶本衰水衰則筋支傷而不能自維持矣）

肝脉之圖



腎臟歌

腎臟對分之　膀胱共合宜

（腎有兩枚相對而垂但右爲命門有水火之異命門與三焦爲腑然其氣與腎相通但三焦有名無形膀胱一腑腎與命門具合爲宜）

旺冬身屬水　位北定無欺

（腎屬水而旺於冬位北方無欺言不虛也）

兩耳通爲竅　三焦附在斯

（耳者腎之竅腎氣通于耳故叔和以兩耳爲腎氣所通而爲腎竅三焦者手少陽之經也三焦有名無形爲原氣之別依附于兩腎之間）

味鹹歸藿豆

（素古曰腎象水而味鹹藿者藿菜常言落蘿也豆者黑豆也外則味鹹內則應骨）

精志自相隨

（腎臟對分在邉爲腎右爲命門腎藏志命門藏精精完則志備志備則精完二者自相隨也）

沉滑當時本

（腎旺亥子之月是時診得脉沉而滑是本藏之脉無他子也）

浮攤厄在脾

（攤緩也雲岐子曰腎旺冬其脉當沉而滑今反浮而緩是土來乘水故厄在脾）

同烏羽吉　形似炭煤危

（腎色木黑色似烏羽黑而帶青者也青屬肝是水生木故曰吉色似炭煤黑而帶黃者也黃屬土是土剋水故曰危）

冷卽多成唾焦煩　水易虧（水盛則火滅火滅則氣冷氣冷則水溢於上而多唾火盛則水虧於內而煩燥煩燥則津液衰而好飲也）

奔豚臍下積究竟　骨將痿（竟終也經曰腎之積名曰奔豚發于小腹上至心下若豚狀或時奔下衝發無時令人喘逆骨痿少氣此病多在夏月丙丁日得之）

貫夢腰難解虛行　溺水滑

（經曰腰者腎之腑腎邪實則精血流滯而不通故常夢腰間有所壓腎氣虛則化精而見本故常夢溺於水滑）

一斤餘二兩脇下　對相垂（腎有兩枚共重一斤二兩相對垂于左右）

腎臟之圖



腎脉見于三部歌

三部俱遲腎臟寒　皮膚燥澁髮毛乾（遲屬陰脉遲甚是腎臟有寒經曰數者腑也遲者臟也數則爲熱遲則爲寒諸陽爲熱諸陰爲寒寒則湊理閉而津液下遲故皮膚不滑潤而毛髮皆乾此腎家不足也內經曰腎主五夜腎家不足則津液衰少）

夢見鬼神時入水　覺來情思卽無懼（鬼神與水腎家不足者多夢之夢畢而覺神思不寧故無歡也）

一多一〇 冊 統傳四庫全書 第 4 版序內

腎脉見於[illegible]部之圖


寸
關
尺
進由腎臟寒
夢見鬼神時入水
皮膚燥澀髮毛乾
覺來情思自無權

腎脉歌

腎散腰間氣尿多澀滑并其中有聚散聚散且無（腎脉散則腰間氣滯澀濇則尿多其中者腎脉中聚散者或聚或散也無憑者失平常候也）

實滑小便澀淋痛濇騂騂（此是火乘水位潔古以八正散止之騂赤之甚也）

脉濇精頻漏恍惚夢魂多（腎脉濇主傷精夢遺無叙）

小腸疝氣逐夢裏涉江何（承上文濇脉而言小腸乃心之腑什與腎臟無干蓋小腸屬火腎屬水二者也然出逆腎虛寒則能別之故患小腸疝氣夢涉江河水不足也）

實大膀胱熱小便難不通（實大皆陽脉也腎居陰而見陽此陽來乘陰濕熱在下主膀胱有熱故小便赤澀而不通）

滑弦腰脚重沉腎痛還同（滑弦風濕之脉沉緊風寒之脉風濕則氣濇故見重風寒則血凝故作痛還同俱在腎也）

單匀無病傗（腎脉沉濡而滑獨見腎脉而匀平謂之順候所以無病）

浮緊耳朧聾（腎臟有風脉見浮緊腎氣通於耳風邪爲患故耳無聞）

腎脉之圖


實
沉
匀
浮
緊
散
滑
濇
耳聾
腰間氣尿
多澀滑
無病
小便難

肺臟歌

肺臟最居先大腸通道宜。（休於各臟之上。用爲各經之始。故曰居先。肺主氣大腸乃肺之腑。而行導。爲傳送之宜。而完化也。）

應卦居兌以屬金在西邊。（兌方屬金以入卦論之肺居兌位西方屬金以五行論之肺屬于西也。）

皮與毛相應。（肺主皮毛。故曰相應。）

魂將魄共連。（肝藏魂。肝水受氣。于申肺藏魄。肺金受氣于寅陽動而陰靜。魂遊而魄守陰陽相應謂之共連。）

鼻聞香氣辯壅塞氣相煎（經曰。肺氣通于鼻。鼻聞則知香臭氣壅塞不通也相煎邪氣廹于肺也。）

語過多成嗽。（肺主氣。語言太過。則氣傷矣嗽疾于是而作焉。）

瘡浮酒灌穿。（酒濕熱之物也。瘡多起于濕熱肺主皮毛。酒過多則灌熱傷肺而皮分生瘡。故曰瘡浮）

猪膏凝者吉枯骨命難全。（雲岐子曰。肺金色白而光澤。（猪膏色白而澤白者金也）光澤者。水也是金能生水故云吉也。枯骨之色白而不澤白是全也。不澤者内失其水以火尅燥也。火來尅金。故云命唯全也。）

本積息賁患乘春右脇邊。（經曰。肺之積名曰。息賁在右脇下。覆大如杯以春甲乙日得之何以言之。心病傳肺。肺當傳肝肝以春適旺。旺則不受邪肺欲復還心。心不肯受。而留結爲積。故知息賁。以春甲乙日得之也。）

順時浮濇短反即大洪弦。（肺屬金血旺于秋。其脉當秋浮濇而短謂順時若洪大而弦風火勝金謂之反候也。）

實夢兵戈競虛行涉水田。（金盛王殺。肺氣實。故夢兵戈相競北方屬水乃金衰墓之鄉肺氣虛。故夢涉于水田也）

三斤三兩重六葉散分懸。（肺重三斤三兩。凡六葉分散而懸於各臟之上。）

肺臟之圖



肺脉見于三部歌

三部俱浮肺臟風。鼻中多水唾稠濃。（寸關尺部俱浮是火來乘金金受火尅則金衰不能制木王肺臟有風肺熱則鼻中多水金受火尅則不能生水故唾必稠濃）

壯熱惡寒皮膚痛。顙乾雙目淚酸疼。（風邪于肺則壯熱惡寒風能勝濕燥熱爲患故皮肉作痛肺係于顙肺病則燥。故顙乾金衰不能制木木火俱盛。故雙目流淚而酸疼也。）

肺脉見於三部之圖



肺脉歌

肺脉浮兼實咽門燥又傷。大便難且澀。鼻內乏馨香。（肺絡循咽。大腸爲腑。候在鼻脉浮而實謂之陽結故有是病。）

實大相兼滑。毛焦涕唾粘。更和咽有燥。秋盛夏宜砭。（季夏之時肺部診得此脉而有此症乃金中有火金受火尅而不治。久則尅將盡而病欲甚故至火則盛。夏宜砭。乃迎而奪之也金冠帶于未月是時砭石以瀉其火。抑其盛氣。取其化源也案古曰五行之氣皆可迎而奪之機由此也）

沉緊相兼滑。仍聞咳嗽聲（肺部得此三脉乃有寒有風有痰故發咳嗽也）

微浮兼有散。肺脉本家形（此爲平脉。雖肺家有病當不治自愈）

溢出胷中滿氣泄大腸鳴（肺脉居于右寸。尺浮則溢上于魚由其氣不順行而胷中滿悶也。氣往下陷。故氣泄而大腸時時作聲而鳴耳）

弦冷腸中結。（肺脉見弦。乃金不兒而妻乘之也。由大腸冷而爲病結。治用溫藥其氣自通。）

芤暴痛無成（肺主氣芤主血凝肺脉見芤。其經氣多而血少氣行血亦行。故卒暴之痛不能成也）

沉細仍兼滑因知是骨蒸皮毛皆總澀寒熱兩相烝（肺脈浮濇而短外應皮毛今反沉細而滑知其病之在骨內熱不得外泄熱在內寒在外故內則骨蒸外則皮毛皆澀寒熱兩相交作也）

肺脉之圖



脾臟歌

脾臟象中坤安和對胃門（脾屬土位居金木水火之中八卦論之寄旺西南坤位前木火後金水亦居于中故象中坤其體靜而其用動也安和者不爲飲食勞倦所傷也胃爲戊其化火象于天其氣熱脾爲已其化濕象於地故下熱而上濕其氣相通故云對胃門也）

旺時隨四季自與土爲根（四季辰戌丑未月也上於辰戌丑未之月後各旺二十八日故云隨四季脾屬土土旺則脾亦旺故與土爲根也）

磨穀能消食榮身性本溫（脾濕而胃熱濕與熱相爲薰蒸而能消磨穀食也熱盛則傷胃寒盛則傷脾溫者不寒亦不熱也溫則脾胃平和於是穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成脾主裹血胃主行氣而播敷各臟榮衛一身也）

應唇通口氣連肉潤肌膚（脾之華在唇四白故應唇脾氣通于口脾和則口知五味故通口氣潤肥澤也脾主肉分氣壯則肌膚肥澤）

形扁才三五膏凝散半斤（形扁廣闊也脾之形長三寸闊五寸傍有散膏半斤主裹血）

順時脉緩慢失則氣連吞

（脾旺四季脉氣之來阿阿緩慢若春之楊柳謂之順時氣卽脉氣也脉氣如連珠而來卽雀脉水湘之脉脾衰乃見故曰失也。）

實夢歌歡樂虛爭飲食分。

（脾實則夢與故多歡樂而歌唱脾虛則夢取故致爭競也。）

濕多成五泄腸走若雷奔。

（五泄者胃泄脾泄大腸泄小腸泄大瘕泄也五十七難言之詳矣雷奔者腸走鳴也虛寒田薄則爲腸鳴。）

痞氣冬爲積皮黃四體昏。

（經曰脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久而不愈令人四肢不收致發黃疸飲食不消肌膚黃瘦以冬壬癸日得之何以言之肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王旺者不受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結爲積故知痞氣以冬壬癸日得之也。）

二斤十四兩三斗五升存。

（胃重二斤十四兩盛穀二斗水一斗五升此歌言脾今并及胃者脾胃相連故耳。）

脾臟之圖



脾脉見於三部歌

三部俱緩脾家熱口臭胃翻長嘔逆。

（緩爲陰脉諸陰爲寒今緩脉見於三部而以爲脾家熱者何也然緩脉屬土土能制水水衰則火必獨炎所以脾家有熱脾氣通于口脾熱則口臭也脾胃相連而虛熱上壅故胃家翻騰而常嘔逆也）

齒腫斷宣注氣纏寒熱時時少心力

（齒腫齒下肉浮腫也斷宣牙齒宣露也胃經入于下齒胃熱則齒腫斷宣熱在肌肉故注氣纏火來土位故時時寒熱相併而少心力也。）

脾脉見於三部之圖

寸	關	尺
齒腫斷宣涎氣纏	緩由脾家熱口臭胃翻常嘔逆	寒熱時時少心力

脾脉歌

脾脉實兼浮　消中脾胃虛口乾饒飲水多食亦肌虛（脾脉實而浮是土中有火火能化物故消中而脾胃皆虚脾氣連于口土受火邪則濕者燥矣雖飲水而口亦乾雖多食而肌亦虚由其不能榮身故也）

單滑脾家熱　口臭氣多麄（胃行液胃熱則氣麄令言脾家者脾胃相連也）

濇即非多食　食不作肌膚

（濇爲肺脉見下脾部是子來母位實邪爲患故能多食不多食則肌肉消瘦矣）

微浮傷客熱　來去作微疎（脾脉微浮乃他經之熱相干非本經正病也雖熱不久困或來或去而漸至微疎脾胃安而客熱自止矣）

有緊脾家痛　仍兼筋急拘欲吐即不吐冲冲未得穌（緊乃肝脉肝脉見於脾部則木來尅土而作疼痛土被木尅則衰土衰則木失培養筋故拘急欲吐不吐即惡逆也嘔逆則氣擾亂於肝中而冲冲未得蘇快也）

若弦肝氣盛　妨食被譏謀（脾部脉弦乃肝木之氣有餘來尅脾土脾土衰則不能磨穀消食故妨于食也被譏謀者被肝邪爲害也）

大實心中痛　如邪勿帶符（脾脉大實乃土中有火火性上安心位脾上故曰中作痛脾部脉見大實而心中作痛知之者少如有邪祟爲患常知肝脾火則心病自愈何必帶符以祛邪祟哉）

溢關涎出口　風中見羈孤（脾脉溢關而湧於寸部主木臟之液從口而出其因由於脾家中正所作羈者紏也傷也脾爲孤臟而受風傷故曰羈孤）

脾脉之圖



圖註脉訣辨真卷之三

西晉　王叔和　譔
四明　張世賢　註

七表八裏脉總論

七表者。浮芤滑實弦緊洪也。八裏者微沉緩濇遲伏濡弱也。七表。陽也。八裏。陰也表脉多見於左。而客隨主變。裏脉多見於右。而主隨客變左手三部所主。溫風寒也溫風寒。病得於外。右手三部所主。燥濕暑也燥濕暑病生於內。此脉法之大槩及其五相變見。或表脉見之於右。或裏脉見之於左。或陰陽更相乘。或陰陽更相伏。或一脉爲十變。脉理精微。非一言可盡然其要不越乎陰陽五行而已表脉有七。裏脉有八。共十五脉也。五行分之。各得三脉。三五一十五也。浮濇弱屬金。弦緊伏屬木。滑沉濡屬水。芤實洪屬火。微緩遲屬土。每三部俱有輕重之分。至於五行當更相平。一有不平。病卽見焉。或曰。謂內傷則詳矣。謂外感莫或之當耶。殊不知天地之間。六氣依於五運。人身卽小天地。外邪所

感。莫不從其類而見焉假令外感風濕則木火有餘而上。金不足水不能制乎火矣。外感乃外邪所感。致五行不平也。內傷乃五內自傷。五行自不能平也。先明金水木火土之理。次察虛實賊微正之邪。更復辯其部分之浮中沉。而又當詳審平主脉客脉之相合。何爲主。弦洪濇緩沉是也。何爲客。本部不應得之脉皆客也。能如是然後內傷外感主客標本之病。是者是。非者非。夫何差錯之有。

七表脉交變略例論

潔古曰。七表脉者是客邪來傷。主乃陰乘陽也其證若身熱惡寒。是外陽而內陰見也。七表脉但熱而不惡寒者。是內外皆陽也。七表證自汗惡風。却得八裏脉者。當用麻黃桂枝各半湯。如八裏證自汗惡風得七表脉亦用桂枝麻黃各半湯。有汗不惡風者。黃芪白朮黃芩湯。無汗不惡寒者。葱豉湯。脉如浮滑而長爲三陽禁不可發汗。經曰。陽盛陰虛汗出而死也。仲景曰。脉浮當汗三陽當汗者。謂陽中有陰。夫八表者。是陽分也。脉浮亦陽分也浮脉。客陰也故當發汗且陽中有陰者陽乃榮衛之分客陰自外而入居之故宜耗出而發去之經曰在上者因而越之此說非謂陽中有形跡之陰是陽中客邪之陰居其表也夫三陽之表是三陽標也無形經絡受客陰乃表之表也爲陽中陽分也宜發去客陰之邪故前說陽中有陰當汗若是三陽之裏是三陽本也主有形受邪膀胱與胃是也既受在有形之處惟宜利小便下大便則愈此乃陽中之陰也此說言主前說言客若不窮主客邪正之

理必傷人命三陰當下者夫三陰者藏也外有所主內無所受所主者皮毛血脉肌肉筋骨爾無所受者無所受盛也在三陰經絡中有邪者是爲無形乃陰中之陽可汗而已是經絡無形受客邪當發汗去之爲三陰標之病也三陰本者藏也盛則終歸於胃是有形病也當自各經絡中藥入胃去之此乃三陰當下也是爲陰中之陰可下而愈此爲主之陰非是客邪之陰也夫客主共論陰中有陽當下去之者陰中者主也有陽者客邪也言陰

續修四庫全書

經中受陽邪染於有形物中不得出者可下略說八裏乃陽乘陰也其證身涼四肢厥惡熱是外陰而爲陽也但寒不熱不渴者是內外皆陰也仲景云厥深熱亦深厥微熱亦微口傷爛赤因發汗得之夫七表八裏發汗吐下治傷寒必當仔細論之七表八裏互相交變乃壞證來理脉中一說六脉交變浮滑長爲三陽乃陽中有陰沉濇短爲三陰乃陰中有陽當審察表裏分其內外以辨虛實治從標本萬舉萬當夫標本者太陰有標本之化少陰亦然太陽標熱而本寒從此生七表太陰標寒而本熱從此生八裏太陰標本皆陰少陽標本皆陽惟陽明與厥陰不從標本從乎中也此舉六氣之標本也叔和所載者是七表八裏九道脉訣二十四道脉之標本也有皆從標從本從乎中假令太陽少陰各有標本之化太陽脉浮少陰脉沉此乃浮沉交內經曰若從標本論之是爲長短交長以發汗短以下長曰陽明短曰太陰長者陽明當解表利小便短者太陰當下土鬱則奪之令無壅

滯故長脉發之短脉下之者是滑與濇交滑居寸而熱濇居尺而寒滑居尺而熱濇尺寸而寒濇脉居尺寸皆損氣滑居尺寸皆助陰陽內經曰脉滑曰生脉濇曰死此是三陰三陽變化表裏略舉數端隨脉條下盡窮其理有不盡者於各部脉說內詳之

七表寸部脉圖



凡此七變或虛或實或補或瀉皆治在上焦此寸脉主上部法天主胸以上至頭之有疾也

表關部脉圖



凡此七變或虛或實或補或瀉皆治在中焦此關脉主中部法人主胷以下至臍之有疾也

七表尺部脉圖



凡此七變或虛或實或補或瀉皆治在下焦此尺脉主下部法地主臍以下至足之有疾也

七表脉



一浮者陽也指下尋之不足舉之有餘再再尋之如太過曰浮主欬嗽氣促冷汗自出背膊勞倦夜臥不安（浮陽金也按之不足陰不足也舉之有餘陽太過也內經曰寒傷形熱傷氣肺主氣受熱則傷傷則欬嗽氣促氣爲衛衛護也氣不能守護冷汗所以自出潔古曰治則宜小柴胡湯主之）

歌曰

按之不足舉之餘再再尋之指下浮臟中積冷榮止熱欲得生精用補虛

（診脉之法在內者沉取按而得之在外者浮取舉而得之有餘爲熱不足爲寒今按之不足臟中積冷也舉之有餘爲榮中有熱也陰不足而陽有餘治之宜地骨皮散）

又歌曰

寸浮中風頭熱痛（左寸主脉洪火外感風邪客脉浮金火金相合火能尅金金虛則木盛故中風而頭熱作痛右手主脉澀金外感風邪客脉浮金王客皆金浮金屬陽陽有餘則熱熱能傷氣金反腐而木反盛亦中風而頭熱作痛潔古曰太陽中風頭痛有汗脉浮緩桂枝湯無汗脉浮緊麻黃湯風在上焦如太陽頭痛汗出轉陽明頭痛白虎湯少陽頭痛小柴胡湯太陽頭痛羌活湯）

關浮腹脹胃虛空

左關主脈弦木客脈浮金木金相合水爲賊邪然二者皆陽陽之性熱金畏熱於是金反虛而木反盛矣木盛則能剋土致令胃中客虛腹作脹滿右關主脈緩土客脈浮金土中有金水爲實邪而胃反虛者何邪然浮爲陽金陽盛則熱熱則金不能剋木木盛而剋土土受木剋金乃有病之子不能復母之讎故母被他剋胃中亦致客虛腹作脹滿治以調中湯主之

尺部見之風入肺大腸乾澁故難通

左尺主脈沉水客脈浮金水金相合母令子虛子虛則水衰矣水既衰則金無所恃由是木火盛而傷金故風入肺尺部主臍下至是之有疾大腸乃肺之腑而居臍下又風能勝濕故大腸乾澁而大便莫能通焉右尺主脈相火客脈浮金金火相合金無勝火之理金必自傷故風不在於命門而在於肺大腸所以乾澁而難通風在下焦治之以七聖丸

二芤者陽也指下尋之兩頭即有中間全無曰



芤主淋瀝氣入小腸

芤陽火也潔古曰弦浮無力按之中央空兩邊有曰芤芤主失而手足太陽皆血多氣少故主病淋瀝氣入小腸脫血病者皆從太陽之說在寸口則吐血在下則瀉血在中者緩之

歌曰

下尋之中且虛邪風透入小腸居病時淋瀝兼疼

大作湯圓必自除

大作多製也湯煎劑也圓丸藥也冥岐子云芤主血凝而不流凡人之十二經絡以應滿渠是榮衛血氣不散不能盈滿經絡故見芤脈主淋瀝小便濃及血當人作湯圓也四物湯地黃丸補之桃仁

承氣湯瀉之一云大柴胡湯如秘加大黃

又歌曰

芤積血在胸中

左寸主脈洪火客脈芤火二火相合其熱必甚大抵血凝則熱主積血於胸中右寸主脈濇金客脈芤火金火相合金必受傷金屬氣火屬血血者氣之配氣升血亦升氣降血亦降氣傷則血凝亦主積血在胸中治之以犀角地黃湯血在上焦故也

關內逢芤腸裏癰

左關主脈弦木客脈芤火木火相合木挾火而侮金是肺先受邪傳入大腸右關主脈緩土客脈芤火土火相合土中有火而不能生金所以大腸成癰治之以桃仁承氣湯血在中焦故也

尺部見之虛在腎小便遺瀝血凝膿

左尺主脈沉水客脈芤火水火相合水中有火故虛在腎腎虛則小便遺瀝而血凝膿右尺主脈相火客脈芤火二火相合火盛則水乾故虛亦在腎積血在下治以抵當丸抵當湯或加減桃仁湯



三滑者陽也指下尋之三關如珠動按之即伏

不進不退曰滑四肢困斃脚手酸疼小便赤澁

滑陽水也三關寸關尺也

歌曰

脈如珠號曰陽腰間生氣透前腸脛酸只爲生寒

大瀉三焦必得康

（雲岐子曰夫小便赤澀腰中生氣是命門所生其脉流利數而疾大承氣湯主之潔古云腰間生氣者命門也透前腸者膀胱經也命門三焦陷於前腸故小便不通大便秘澀熱多寒少故宜瀉以辛寒大承氣主之）

又歌曰

滑脉居寸多嘔逆（左寸主脉洪火客脉滑水火水相合主多嘔逆右寸主脉濇金客脉滑水金水相合氣壅而作嘔逆治之以生薑半夏湯主之）

關滑胃寒不下食（左關主脉弦木客脉滑水木水相合水挾木而侮土故胃寒不食右關主脉緩土客脉滑水土水相合中虛不能下食春夏平胃散秋冬理中丸主之如有表者小柴胡加桂半夏湯主之寒在下焦）

尺部見之臍似冰飲水下焦聲瀝瀝（左尺主脉沉水客脉滑水二水相合寒結膀胱故臍下似冰水聚於下而不上濟於人故欲飲水水停下焦不能引於各臟故瀝瀝作聲右尺主脉相火客脉滑水火水相合水勝火故臍下似冰相火原係水中之火不能全勝故欲飲而作聲治以附子四逆湯）



四實者陽也指下尋之不絕舉之有餘曰實主伏陽在內脾虛不食四體勞倦（解見實脉歌下）

歌曰

實脉尋之舉有餘伏陽蒸內致脾虛食少只緣生胃壅溫和湯藥乃痊除（伏伏藏也陽伏於內則寒固於外而內熱薰蒸熱盛則傷金金受傷則虛虛則不能平木木盛則尅土故致脾胃虛脾熱致胃亦熱胃熱主壅所以食少溫和湯藥乃平胃散也）

又歌曰

實脉關前胸熱甚（左寸主脉洪火客脉實火二火相合陽氣有餘胸中熱甚右寸主脉濇金客脉實火金火相合胸中金被火尅而熱甚涼膈散主之）

當關切痛中焦恁（左關主脉弦木客脉實火木火相合治之以調胃承氣湯主之中焦有風有熱故切痛右關主脉緩土客脉實火土火相合胃中虛熱切痛）

尺部如繩應指來腹脹小便應不禁（左尺主脉沉水客脉實火水火相合水能勝火治之以乾薑附子湯右尺上脉相火客脉實火二火相合致令腹脹而小便不禁治之以大承氣湯）



五弦者陽也指下尋之不足舉之有餘狀若箏弦時時帶數曰弦主勞風乏力盜汗多生手足痠皮毛枯槁（弦者陽木也潔古曰弦脉五臟俱以藍木尅土故也）

歌曰

弦脉爲陽狀若弦四肢更被氣相煎三度解勞方始退常須固濟下丹田（弦之爲脉狀若箏弦緊而且急弦屬木木能尅上脾屬土而主四肢故四肢被陽木之氣相煎丹田者在臍下三寸乃陰陽之門戸人身之根本精神藏聚須扶陽抑陰固濟丹田治之以八味丸）

又歌曰

寸部脉緊一條弦胸中急痛狀繩牽（左寸主脉洪火客脉弦木火木相合木挾火而欲侮金金木交戰於胸中致令急痛狀若繩牽牽即急痛也右寸主脉濇金客脉弦木金木相合是知金虛而水來乘之金能勝木木不與金勝所以胸中急痛治以小柴胡湯主之）

關中有弦寒在胃（左關主客皆係弦脉是知陽木之氣有餘善尅陽土戊化火而木熱被木氣大傷熱者寒矣右關主脉緩土客脉弦木上木相合胃中有寒治之以附子理中丸）

下焦停水滿丹田（左尺主脉沉水客脉弦木水木相合水中有水則水挾木勢而不畏土上畏木勢不能制木致停水滿於丹田右尺主脉相火客脉弦木火木相合火虛不能生土制水亦令停水於丹田治以木附湯）

㊀六緊者陽也指下尋之三關通度按之有餘舉指甚數狀若洪弦曰緊主風氣伏陽上衝化爲（緊陽木也潔古曰此太陽少陽併合主伏陽上衝而爲狂病治之之法宜以黃連瀉心湯此言深矣得理學者宜玩味之）

歌曰

緊脉三關數又弦上來風是正根源忽然狂語人驚怕不遇良醫不得痊（潔古云此是三陽合病緊數太陽也弦多少陽也狂言陽明也故實則譫語雲岐子曰其脉洪緊而實陽氣有餘之象主熱即生風發[illegible]狂語可用小承氣湯主之）

又歌曰

緊脉關前頭裏痛（左寸主脉洪火客脉緊木火木相合是知火助木而生風風熱在上故主頭痛右寸主脉濇金客脉緊木金木相合是知金虛不能平木亦作頭痛潔古曰諸頭痛皆屬三陽太陽頭痛羌活湯主之必愈入腑大承氣湯下之少陽頭痛在經小柴胡湯主之入腑小承氣湯下之陽明頭痛在經白虎湯治之愈入腑調胃承氣湯下之其脉弦而頭痛者內外也大柴胡湯主之緊在上焦）

到關切痛無能動（左關主脉弦木客脉緊木二木相合木盛尅土所以作痛右關主脉緩土客脉緊木木土相合木來尅土而切痛治之以芍藥湯）

隱指寥寥入尺來激結遶臍痛手捧（激結疼痛之狀也左尺主脉沉水客脉緊令水木相合水中有木土莫能制風寒在於下焦治之以）

（桂枝芍藥湯不已風寒濕在於脾胃术附湯主之右尺主脈相火客脈緊木火木相合風熱在於下焦而作痛治法不可同左）

⊖七㊉洪者陽也指下尋之極大舉之有餘曰洪主頭痛四肢浮熱大腸不通燥糞結澀口乾遍身疼痛（洪者陽火也潔古云洪脈者按之實舉之盛洪者陽太過陰不及主頭痛四肢熱大便難小便赤澀夜臥不安治法陽症下之則愈如下之隨症虛實有大承氣湯有小承氣湯有大柴胡湯桃仁湯隨症用之此症有兩議或按之無舉之盛當解表不可下經言脈浮不可下下之則死脈沉當下之下之則愈脈浮為在表脈沉為在裏）

歌曰

洪脈根源本是陽　遇其季夏自然昌
若逢秋季及冬季　發汗通腸始得涼

（池氏曰洪脈屬陽旺於夏乃心經之本脈其脈太甚則生熱風如至六月心火漸退得脾上假之其熱自退如遇九月十二月其伏陽在內外受風熱乃表裏皆熱須發其汗或疏通腸胃方得熱氣退散雲岐子曰其脈舉按皆盛本為相火之象發汗從表通腸從裏從表宜麻黃湯從裏宜大承氣湯仲景云謂身體疼痛主夏得洪大脈知其病瘥也通腸七宣丸七聖丸大柴胡湯大承氣湯選用之）

又歌曰

洪脈關前熱在胸（左寸主客之脈。皆係洪火同心。根合胸中大熱。涼膈散加減用之。右寸主脈濇金。客脈洪火。金火相合。火盛金衰。乃熱傷肺氣。連翹湯主之。或涼膈散臨症隨意選用。）

到關翻胃幾千重（左關主脈弦木。客脈洪火。木火相合。風熱侵胃。食不停而長吐。右關主脈緩土。客脈洪火。土火相合。胃中熱甚。亦致翻胃。調中湯加減用之。但涼藥不可遽速。）

更向尺中還若是　小便赤澀腳酸疼。（左尺主脈。沉水客脈洪火。水火相合。水能尅火。但洪乃太陽之火。水莫能尅。水虛火盛。腳火亦不能致水金伺故。小便赤澀。腳作酸疼。右尺主脈相火。客脈洪火。主客皆火。洪火一見。相火不得用事。三焦夫決瀆之任。小便赤澀。腳作酸疼。右熱甚於左。澤瀉散加減用之。）

已上七表之脈雖皆屬陽。然陽中有陰。有用熱藥者。不可執一不通。以致悞病。

八裏脈交變略例論

潔古曰八裏脈者乃右手三部寸關尺受邪者也陽乘陰也。是微沉緩濇遲伏濡弱八裏脈也。有裏之表。乃三陰經絡絡稱標之名也。有裏之裏者。乃三陰之本。脾腎肝總稱之名也。且三陰標者。為陰中之陽。本者為陰中之陰也。盛則歸於胃上。乃邪染有形。故裏之表是陰中之陽。當漬形以為汗。宜

發之。主宜緩裏。之裏是陰中之陰。分也當急下之客宜急。是知諸中客邪當急諸主自病當緩前說七表。乃春夏其三陽。後說八裏乃秋冬其三陰經中論反交錯生疾。得本位以常法治。中互相爲病當推移所在主客相合脈證。依緩急治之假令惡寒者裏之表也。當與麻黃附子細辛湯緩發之。是漬形以爲汗也如不惡風寒而反欲去衣身涼面目赤。四肢逆。數日不大便。小便赤澀引飲身靜重如山譫語昏冒脈沉細而疾數。自是足少陰經反

受火邪也。是裏之裏病乃陰中之陰。陽邪也。此客邪當速急下去之。以大承氣湯除之。今將七表脈有下者。八裏脈有汗者。七表脈有汗者。八裏脈有下者。此四論爲古今之則於七表脈論。八裏脈論內交互說之更有脈與證相雜之法當取仲景內桂枝脈。得麻黃證。或麻黃脈。得桂枝證。遞用麻黃桂枝各半湯。如桂枝證二停麻黃脈一停。當用桂枝二麻黃一湯法。或麻黃證二停桂枝脈一停當用麻黃二。桂枝一湯法。更有麻黃脈桂枝證。取脈爲主脈便爲二停證爲一停用麻黃二桂枝一湯治之或桂枝脈麻黃證亦脈爲二停證作一停用桂枝二麻黃一湯治之大抵聖人謂脈者司人之命故以脈爲主多從脈而少從證也舉世脈證交互二法是不合全從於脈亦不合不從於證如合證當兩取之如證在交變狀中只合從脈不從證也然亦不拘亦當臨時消息傳受遞從元證來理所投去處設天之時令且七表有下者爲內外皆陽緩下八裏有汗者爲內外皆陰緩汗七表有汗

者爲外陽而內陰急汗八裏有下者爲內陽而外陰急下故素問說標本之化立四因之法爲此一說也表裏標本之化七表論內說之

八裏寸部脉圖


寸脉
微
氣上侵
沉
緩
濇
遲
伏
濡
弱

凡此八者或虛或實或補或瀉皆治在上焦乃上部之八法也

八裏關部脉圖


關脉
微
排心
鬱結氣
沉
緩
濇
遲
伏
濡
弱

凡此八者或虛或實或補或瀉皆治在中焦乃中部之八法也

八裏尺部脉圖


尺脉
微
臍下積
沉
緩
濇
遲
伏
濡
弱

凡此八者或虛或實或補或瀉皆治在下焦乃下部之八法也

八裏脉

一微者陰也指下尋之往來極微再再尋之若有若無曰微主敗血不止面色無光（微陰土也槩古曰微脉法象秋冬在陰爲慘陰太過陽不及促血不能守水勝火也血不止者治之以香茸湯）

歌曰

指下尋之有若無漩之敗血小腸居崩中日久爲白帶漏下多時骨木枯（槩古曰此腎氣有餘命門不足男子藏精女子繫胞崩中白帶當補命門命門者下者命門敗也醒）

（水崩下謂之骨水枯枯婦人伏龍肝散主之崩爲血不能制水水勝火也又云血去精亡筋骨皆損骨空而無髓骨不從於筋筋骨損而形枯也經曰陰成形養血補虛宜當歸芍藥湯主之）

又歌曰

微脉關前氣上侵

（左寸主脉洪火客脉微土火土相合逆氣上衝右寸主脉濇金客脉微土金土相合陰盛陽虛吸不至於腎肝可用腎氣散主之欬在上焦又云結氣上衝當以補肺散主之又治勞嗽）

當關鬱結氣排心

（左關主脉弦木客脉微土土乘木位則木鬱結而不舒右關主脉緩土客脉微土二土相合則聚而不散皆主邪鬱結之氣爲患而上排於心勻氣散主之）

尺部見之臍下積身寒飲水即呻吟

（臍下積聚脉之氣也左尺主脉沉水客脉微土水土相合陰氣太盛故身寒土能尅水故欲飲呻吟腎之聲也腎病則呻吟右尺主脉相火客脉微土火土相合陰盛陽衰治之以二氣丹）



二沉者陰也指下尋之似有舉之全無緩度三

關狀如爛綿曰沉主氣脹兩脇手足時冷

（沉陰水也沉脉帖筋皆陰氣厥逆陽氣不歸之候主虛氣衝心悶而不痛建胃理中湯建中湯主之手足冷治之以八物湯）

歌曰

按之似有舉還無氣滿三焦臟腑虛冷氣不調三部

壅通腸建胃始能除

（按之似有舉之還無沉也三焦上中下三焦部位也氣滿於三焦部位而不運於臟腑經絡氣虛則寒氣不調而三部壅滿三焦賴胃中穀氣以資生通腸以推其舊建胃以內其新三焦之氣始得充達而脉不沉矣通腸局方溫白丸主之建胃理中湯主之）

又歌曰

寸脉沉兮胸有痰

（左寸主脉洪火客脉沉水火水相合變爲痰實右寸主脉濇金客脉沉水金水相合畱滯胸中亦變爲痰治以化痰玉壺丸中加雄黃或半夏丸）

當關氣短痛難堪

（左關主脉弦木客脉沉水木水相合引寒入胃右關主脉緩土客脉沉水土水相合中焦有寒即痛可以正痛丸或橘皮半夏湯主之）

若在尺中腰脚重小便稠數色如泔

（左尺主客之脉俱係沉水寒氣有餘右尺主脉相火客脉沉水火水相合水尅火而寒盛命門三焦敗而虛故小便之色如泔八味丸加桂附治之一法用黃芪丸主之稠濃濁也小便濃濁其色如泔）



三緩者陰也指下尋之往來遲緩小於遲脉曰

緩主四肢煩滿氣促不安

（緩陰土也潔古曰緩在大腸風傷衞當服桂枝湯一云四肢煩滿氣促不安枳朮湯主之）

歌曰

必往尋之見若遲腎間生氣耳鳴時邪風積氣不循

背腦後三鍼痛即移（太陽中風脉緩頸項強急難以轉側可鍼風池風府隱白三穴再服桂枝湯則痛可移也若緩大者屬脾脉）

又歌曰

緩脉關前搐項筋（左寸主脉洪火客脉緩上火土相合火中有上而不畏水則火甚而傷金火甚則熱熱即土風風多從風府而入故項筋緊急右寸主脉濇金客脉緩土金土相合金虛不能平本風邪傷衞故搐項筋可用桂枝湯不已葛根湯或羌活湯）

當關氣結腹難伸（左關主脉弦木客脉緩土木土相合肝虛濕盛治當補肝除濕右關主脉客之脉皆係緩土脾濕太盛胃亦受傷七氣湯主之或建中湯主之腹難伸者温白丸主之）

尺上若逢癥結冷夜間常夢鬼隨人（左尺主脉沉水客脉緩七水土相合故成寒病陰盛則夢鬼隨右尺主脉相火客脉緩土火土相合陰土氣盛相火不能川事冷氣結精下元冷極所以夜夢陰鬼相隨治宜以桂枝湯加乾薑湯主之）



四濇者陰也指下尋之似有舉之全無前虛後實無復次第曰濇主遍身疼痛女子有孕胎漏無孕敗血爲病

（濇陰。金也濇脉。是精氣血皆傷）

歌曰

濇脉如刀刮竹行。丈夫有此號傷精婦人有孕。胎中病無孕還須敗血成。（潔古曰。濇生亡血失精。婦人孕病或帶下赤白或敗血。聖惠方烏金散治敗血局方四物湯。地黃丸失精權道藥。龍骨。丸主之。）

又歌曰

濇脉關前胃氣并（左寸主脉洪火客脉濇金。金來乘火是知火不足而金侮之。故胃氣并於土。右寸主客之脉。皆係濇金。金有餘則。土實胃氣。亦并於土。治之以勻氣散或利膈丸。桔梗湯。）

當關血散不能停。（左關主。脉弦木。客脉濇金。木金。相合。血散不也右關主脉緩土客。脉濇金金。土相合。謂之實邪入氣傾傷萬物。上中有金不能統血。故亦主血散不停。治之以溫經丸。如胃不利。調中丸主之）

尺部如斯逢逆冷體寒臍下作雷鳴（左尺主脉沉水客。脉濇金。木金相合。陰氣盛而陽氣虛故爲逆冷。右尺主脉。相火。客脉濇金。火金。相合陽氣內虛陰。氣有餘故致逆冷。虛寒相博腸中作鳴治之以華澄茄散。或五補丸）

五遲者陰也指下尋之重手乃得隱隱曰遲主腎虛不安

遲陰上也。陰盛陽衰則榮衛凝滯。血氣格阻。故脉一息而二至。是爲遲也。心腎相交。猶水火之相濟。今陽衰則心氣不能下降以交乎腎。陰盛則腎氣虛從而元臟不能榮。故三焦閉結。榮衛滯留其氣病必冷汗出肢節痛。飢膚黑瘦体寒腹痛。

歌曰

遲脉人逢狀且難。遇其季夏不能痊。神工診得知時候。道是脾來水必乾。

潔吉曰。遲陰也。季夏陽也。此證爲失時反候。陽盛陰虛。治之宜瀉心肺。補肝腎。瀉心者導赤散。補腎者地黃丸。季夏見遲脉。是土剋水也。故不能痊。

又歌曰

圖註脉訣　卷三　卅四　善成堂

寸口脉遲心上寒

左寸主脉洪火。客脉遲土。火土相合。陰來乘陽。右寸主脉濇金。客脉遲土。金土相合。上焦寒濕。故曰心上有寒。治之以皮丸。不已木附湯。

當關腹痛飲漿難

左關主脉弦木。客脉遲土。木上相合。腹中痛甚。右關主脉緩土。客脉遲土。二土相合。陰寒大過。腹中作痛。桂枝加附子湯

流入尺中腰脚重。厚衣重覆也嫌单

左天主脉沉水。客脉遲土。水上相合。寒濕在下。右尺主脉相火。客脉遲土。火土相合。陰盛陽虛。可用附子理中湯



六伏者。陰也。指下尋之似有。呼吸定息全無。再再尋之。不離三關曰伏。主毒氣閉塞三關。四肢沉重。手足時冷。

伏。陰木也。其脉伏而不見。重按尋之方得。其動終不離原。

歌曰

陰毒伏氣切三焦。不動榮家氣不調。不問春秋與冬夏。徐徐發汗始能消。

池氏曰。積陰令毒之氣而伏滯於三焦。致衛氣不調。榮血不行。三焦之氣閉塞。若有此症。不必問四季。須是發散通其三焦。其病可除。潔古曰。遺形以爲汗。麻黃附子細辛湯。或秋冬以升麻湯。春夏以麻黃湯。當緩與之。經曰。陰盛陽虛。汗則愈。

圖註脉訣　卷三　卅五　善成堂

又歌曰

積氣胸中寸脉伏。

左寸主脉洪火。客脉伏木。火木相合。陰來乘陽。主胸中積氣。右寸主脉濇金。客脉伏木。金木相合。主怒氣停於胸中。治之以沉香丸。

當關腸癖常瞋目。

左關主脉弦木。客脉伏木。二木同宮。風邪爲患。右關主脉緩土。客脉伏木。土木相合。主中焦氣聚而不散。乃風濕之氣。左右皆主腸癖瞋目。治之以三脘寬中散。

尺部見之食不消。坐臥非安還破腹。

（左尺主脈沉水。客脈伏木。水木相合。風寒在下。右尺主脈相火。客脈伏木。火木相合。水盛剋土。兩尺脈伏。皆致破腹而坐臥不安。治之以四白湯。）



七濡者陰也。指下尋之似有。再再還來。按之依前卻去。曰濡。主少力。五心煩熱。腦轉耳鳴。下元極冷。（濡者。陰金也。）

歌曰

按之似有舉之無。髓海丹田定已枯。四體骨蒸勞熱甚。臟腑終傳命必殂。

（潔古曰。髓者。腎之主。四體骨蒸者。腎氣衰絕。終傳者。七傳也。主來剋木。命必殂也。）

又歌曰

濡脈關前人足汗。（足多也。左寸主脈洪火。客脈濡金。火金相合。氣虛不能衛外。故多汗。右寸主脈濇金。客脈濡金。二金相合。亦主多汗。）

當關氣少精神散。（左關主脈弦木。客脈濡金。木金相合。木不能蔭子。顧母而精神散也。右關主脈緩土。客脈儒金。土金相合。土顧金而不復母譬。金有土而不為了蔭。致令精神散失。治之以四君子湯加茯神。）

人部綿綿即惡寒。骨與肉疎都不管。（綿綿。濡弱。惡寒。膀胱也。左尺主脈沉水。客脈濡金。水金相二。心不生血。肝不藏之。肝不統矣。骨自骨。而肉自肉。何相管攝之有。右尺主脈相火。客脈濡金。火金相合。氣已耗散。骨肉焉得相親。此係死脈。故無治法。）



八弱者陰也。指下尋之如爛綿相似。輕手乃得。重手稍無。怏怏不前曰弱。主氣居於表。生產後客風面腫。（弱。陰金也。表。皮膚也。）

歌曰

三關怏怏不能前。只為風邪與氣連。少年得此須憂重。老弱逢之病即痊。

（潔古曰。脈若爛綿者。陽氣弱也。以應秋毛之脈。氣血多傷。怏怏者。輕手乃得。不前者。重手稍無是也。少年得此須憂重者。乃春夏也。此時當洪大而有力。今反無力而不前。故其憂重也。是春夏為逆。秋冬為順。老弱逢之病即痊。老弱者。乃秋冬也。秋冬脈當浮毛。故為順。）

又歌曰

關前弱脈陽道虛。（左寸主脈洪火。客脈弱金。火金相合。心氣虛也。右寸主脈濇金。客脈弱金。二金相合。其性皆係陰金。陽道所以虛也。治之以玉補丸。為久補。四逆湯急治之。）

關中有此氣多疎

（右關主脉弦木客脉弱金。木金相合肝氣虚乏。右關主脉緩土。客脉弱金。土金相合氣多疎散。治之以益黃散平胃散選用之。二方皆治右弱。）

若在尺中陰氣絕酸疼引變上皮膚

（左尺主脉沉水客脉弱金。水金相合。金弱不能生水。而腎氣內絕陽散於外。右尺主脉相火客脉弱金。火金相合。陽盛陰絕酸疼引於皮膚。是三焦孤陽不能獨守。離其原也。無可治之法。）

九道脉法論

雲岐子曰。九道脉者。從天地九數之理說也。經曰。善言天者。必有應於人。是以天有九星。地有九州。人有九藏。亦有九野。故立九道脉。以應天地陰陽之法也。以長爲乾。清陽發腠理。以短爲坤。濁陰歸六腑。以虛爲離。心中驚則血衰。以促爲坎。脉進則死。退則生。以結爲兌。發在臍傍。以代爲中土。主上中下三元正氣。以牢爲震。前後有水火相乘之氣。以動爲艮。主血山衰。以細爲巽。主秋金有餘。此九道脉。以應九宫九藏之法也

九道脉之圖



九道脉

二長者陽也。指下尋之。三關如持竿之狀。舉之有餘曰長。過于本位。亦曰長。王沛身壯熱。方卧不安

（長不短也。乾之氣象。池王曰。若脉來去不絕。見于左關人迎之位。感於陽邪。蘊畜在心肝二經。傳之三焦。共熱壅閉。乃陽毒熱痰。治之須發其汗。散其陽邪。方得安愈。緊曰長法乾。此陽明脉。故尺寸俱長。故身熱目疼鼻乾。不得卧。當汗陽化氣也）

歌

長也迢迢度三關。指下將來又却還。陽毒在臟三焦

熱徐徐發汗始能安（雲岐曰陽毒在臟何由言發汗非在五臟之本陽毒之氣在五臟之標何爲五臟之本肝心脾肺腎是也何爲五臟之標皮毛血脈肌肉筋骨是也徐徐發汗者爲在標之深遠急則邪不能出發之以升脉湯發在陽明標而法加羌活脉黄芩治法以地骨皮散治運身壯熱）



二短者陰也指下尋之不及本位曰短主四肢惡汗腹中生氣宿食不消（短不長也坤之氣也）

歌曰

短脉陰中有伏陽氣壅三焦不得昌臟中寒食生寒

氣大瀉通腸必得康（潔古曰宿食生寒氣何由通腸謂陰中伏陽故也使三焦之氣不得通行於上下故令大瀉通腸使三焦之氣宜行於上下故用巴豆動藥也外藥隨證見使之此在長短脉交論內細說之病久溫白九新病備急丹）

三虛者陰也指下尋之不足舉之亦然曰虛主

少力多驚心中恍惚小兒驚風（虛不實也離之象也離中虛火象之心屬火主血血虛則脉息難成驚風治以瀉青丸）

歌曰

恍惚心中多悸驚三關穴息脉難成血虛臟腑生煩

熱補益三焦便得寧（虛脉尋之不足舉之亦然。故曰難成。大抵血虛則熱補益三焦使其氣血平和。宜以加減小柴胡湯主之）

四促者陽也指下尋之極數并居寸口曰促漸加即死漸退即生。（促。陽脉之極也。坎之象也脉來數時一止復來者曰。促。其脉陽盛而陰不能相和也漸退則陰生故得活）

歌曰

促脉前來已出關常居寸口血成斑忽然漸退人生

也若或加時命在天（潔古曰升多而不降前曲後倨。如操帶鉤曰死漸退者以陽得陰則解。加進之者。獨陽脫陰故知命在天也。）

五結者陰也指下尋之或來或往聚而却還曰結主四肢氣悶連痛時來（結陰脉之極也。兌之象也脉來緩時一止復來者曰結其脉陰獨盛而陽不能相入也。血凝而不行氣滯而不散。故四肢悶痛）

歌曰

氣生於脾臟傍。大腸疼痛陣難當只宜稍瀉三焦

莫謾多方立紀綱。（脾藏傍腹之右傍也。兌居西方。故積生於此。大腸屬金。金受火邪。乃作疼痛三焦相火也稍瀉者。因結屬陰也當緩緩穴之勿用寒藥急攻。）



六（代）者。陰也。指下尋之動而復起。再再不能自還。曰代。主形容羸瘦。口不能言。

（代更代也中土象也其脈動而中止。不能自還。因而復動由是復正尋之良久。乃復强起。主羸瘦難言。若暴損氣血以致元氣不續而上難作真代。猶可治也以人參黃芪湯。傷寒代者炙甘草湯）

歌曰

代脈時時動若浮。再而復起似還無。三元正氣隨風

去。魂魄冥冥何所拘。

（代脈。中土之象。生上中下三焦正氣風邪害於脾故云正氣隨風去也。）



七（牢）者。陰也。指下尋之。即無。按之卻有曰牢。主骨間疼痛氣居於表

（牢堅牢也。震之象也其脈沉而有力動而不移。主裏實表虛。）

歌曰

脈入皮膚辨息難。時時氣促在胸前。只緣水火相刑剋。欲待痊除更問天。

（潔古曰。牢脈木也前後有水火。相家之象也牢為陰助水剋火故云命在天。又曰水火供於胸。寒熱發於表。此為牢脈。）



八（動）者。陰也。指下尋之似有。舉之還無。再再尋之。不離其處。不往不來曰動。主四體虛勞。崩中血痢。

（動。艮山易也其脈尋之。既不離其處。又不往不來有以山上之貌崩中血痢治之以赤石脂。禹餘糧赤石指丸亦主之。）

歌曰

動脈根源氣主陰。三關指下碍沉沉。血山一倒經年月。志士名醫只可尋。

（池氏曰。動在指下。隱隱而見按之沉沉如水中一石。輕取之。脈不應指。重按之數有力而凝指。乃陰虛內損。女人經血來如山崩不止。治之宜養血氣。八物湯止之。）



九（細）者。陰也。指下尋之。細細似線。來往極微曰細。主脛酸髓冷乏力洩精。

（細微眇也。巽之象也其脈蓋因血冷氣虛不足以充。腎無所養。陰不禁於上。陽不禁於下陰陽不相守之力無精。治法春夏服黃丸。秋冬八味丸主之。）

歌曰

乏力無精脛裏酸。形容憔悴髮毛乾。如逢冬季經霜力。不療其病必自瘥

（冬季。非季冬也。乃一冬之總稱。經霜月九月十月也。門立冬之節。其症皆由腎氣不足所致。冬至氷故不療自愈。普濟。茴香丸主之。）

圖註脉訣辨眞卷之四

西晉　王叔和　譔
四明　張世賢　註

左右手診脉歌

左右須候四時脉。（凡診脉。須要先識時脉。然後及於病脉。時脉。謂春三月。六部中。俱帶弦。夏三月。俱帶洪。秋三月。俱帶毛。冬三月。俱帶沉也。）

四十五動爲一息。（動。脉至也。息。脉止也。并呼吸之息也。）

指下弦急洪緊時。便是有風兼熱謂（諸陽爲熱。熱生風也。）

忽然匿匿慢沉細。冷疾纏身兼患氣。（諸陰爲寒。冷生氣也。）

賊脉頻來問五行。屋漏雀啄終不治。（賊脉。相尅之脉也。五行。金木水火土也。屋漏雀啄。脾衰之脉也。脾屬土。而居四臟之中。土行水穀之相通灌四傍。脾衰則見是脉。人無胃氣則死。故曰終不治。）

左右手診脈圖



大部脉數通論

潔古曰。左右手各列五臟六腑之位。或有至數多而言寒。或有至數少而言熱。各隨部分推其傳變逆順。是知不拘數則爲熱。遅則爲寒。夫脉乃五行之數。各有生成之用。相尅之數。木得金而伐。火得水而滅。金得火而缺。土得木而崩。水得土而絕。五臟應五行。各有相生相勝之理。得相生者愈。相勝者死。此論若不通五臟交變相傳及虛實逆順。無由入此理趣也。

左手寸口心脉歌

左手頭指火之子。四十五動無他事。（子當作指。恐傳寫之誤也。左手。病人之左手也。頭指。醫人右手之食指也。左手寸口屬心火。醫以手按之當頭指之下。故曰火之指。動至四十五動。則無他事矣。其數動之法。不依五行相生。乃呼出心與肺。吸人腎與肝。脾脉在中。當依人身五臟次第而數。一動肺。二動心。三動脾。四動肝。五動腎。大部中指當如是之數也。）

三十一動忽然沉。頓飯却來還復此。春中診得夏須憂。夏若逢之秋絕體。秋脉如斯又準前。冬若候之春必死。

（三十一動。恰在肺上。肺上見沉。乃金生水。水漸盛則火滅。或春或夏或秋或冬。診而得此。不過三月而亡。三月者天道小變之節也。學者不必穿鑿細分晳理。或曰沉作止。非也。沉則至數尚均。但浮不如前耳。故可頓飯二字。止則脉不動矣。）

左手中指肝脉歌

左手中指木相連。脉候還須來一息。二十六動沉却來。肝臟有風兼熱極。（左手。關部脉也。肝屬木。故曰木相連。一息亦四十五動也。二十六動。輪在肺上。肺沉則病。病則不能生水。陰木制火。故木臟風熱之極。）

二十九動濇匿匿。本臟及筋終絕塞。

（[illegible][illegible]濇殺。二十九動輪在肝上。肝脈見濇。乃金來尅木。）

一十九動便沉沉。肝絕未曾人救得。（便沉沉。即在十九動上沉也。二十九動。亦在肝上。沉脈帖筋附骨。沉沉則又甚矣。此乃肝絕之候。故不可救。）

左手尺部腎脈歌

左手腎脈指第三。四十五動無疾咎。指下急急動弦時。便是熱風之脈候。（急急而動。熱也。弦。風也。故爲熱風之候。）

忽然來往慢慢極。腎臟敗時須且救。此病多從冷變來。療之開破千金。（土尅水。腎必敗。其人脈遲身寒。）

二十五動沉即來。腎絕醫人無好手。努力黃泉在眼前。縱在也應終不久。（沉即來。即在二十五動上沉也。二十五動正在腎上。腎脈本沉。今又曰沉。脈將絕也。故曰腎絕。）

右手寸口肺脈歌

右手頭指肺相連。四十五動無憂慮。（右手。病人之右手也。頭指。醫人左手之食指也。）

極急明知是中風。更看二十餘七度。（極急。弦數脈也。二十七度輪在心上。心屬火。火尅金。更看火微則生。火盛則死。）

忽然指下來往慢。肺冷莫言無大故。一朝肺絕脈沉沉。染病臥牀思此語。（肺主氣。氣虛則寒。脈遲肺冷。是故憂矣。肺之脈大浮。脈沉則病。沉而又沉。肺臟絕矣。）

十二動而又不來。咳嗽唾膿兼難補。髮直如麻只片時。扁鵲也應難救護。（十二動。輪在心上。又不來。代脈也。心屬火而尅金。故云死在片時。）

右手中指脾脈歌

右手第二指連脾。四十五動無諸疑。急動名爲脾熱

極。食不能消定若斯。（定若斯者。指脾急動。脾熱極而言也。因食不能消所致。）

欲知疾患多爲冷。指下尋之慢極遲。吐逆不定經旬日。胃氣冲心得幾時。（脾病多因寒冷所致。脾脈本緩。傷於寒冷。其脈遲緩。愈甚。嘔吐咳逆。十日已上不止。胃氣必至冲心。心受傷。半日而死。）

右手尺部命門脈歌

右手命門三指下。四十五動不須怕。二十九動默然沉。百死無生命絕也

（命脈、命門脈也。十九動輪在肝上。肝屬木。木爲生火之源。驟然沉脈不應指也。木絕則火亦絕。故曰百死無生也。）

五臟輪至數之圖



診雜病生死候歌

五十不止身無病。數內有止皆知定。（止。即代也。經曰。人一呼脉再動。一吸脉再動。呼吸定息脉五動也。五動者。一肺。二心。三脾。四肝。五腎也。一息脉五動。則遍周五臟矣。一之十。乃天地生成之數。十息五臟循環十次。五十動而不見止脉是五臟皆平。何病之有。數內五十之數內也皆知定。詎可定其該死年分時月也。）

四十一止一臟絕。却後四年多沒命。三十一止即三年。二十一止二年應。十五一止一年殂。已下有止看暴病。（五十動爲則。凡少十動。則絕一臟。其臟絕之法。悉依天地成五行之數。先從腎而後至脾也。暴病。卒暴病也。說見下文。）

五臟代脉期死之圖

四十一止四年殂

三十三	二十五	十七	九	一	肺	五	十三	二十一	二十九	三十七
三十四	二十六	十八	十	二	心	六	十四	二十二	三十	三十八
三十五	二十七	十九	十一	三	脾	七	十五	二十三	三十一	三十九
三十六	二十八	二十	十二	四	肝	八	十六	二十四	三十二	四十

三十一止即三年

二十五	十九	十三	七	一	肺	四	十	十六	二十二	二十八
二十六	二十	十四	八	二	脾	五	十一	十七	二十三	二十九
二十七	二十一	十五	九	三	肝	六	十二	十八	二十四	三十

二十一止二年應

十七	十三	九	五	一	脾	三	七	十一	十五	十九
十八	十四	十	六	二	腎	四	八	十二	十六	二十

診暴病歌

兩動一止或三四。三動一止六七死。四動一止即八朝。以次推排但依次。

一脉兩動而見一代其人死期三四日間。三動而見一代。死期六七日間。四動而見一代。死期八日。以此推之。一動得兩日之數。其故何即。十干係五行也。五行有陰陽金木水火土。陰陽各得二日

診暴病之圖



以此推排但依其次也

形症相反歌

健人脉病號行屍。病人脉健亦如之。長短瘦肥竝如此。細心診候有依稀。

假如一十五動。脉見一代。死期在應一年。身在天地間。活則爲人。死則爲屍。死期在邇而動履如常名曰行屍。病人脉健者。假如人泄瀉失血。形容羸瘦。脉見洪大而數。健者亦爲行屍。長人脉短。短人脉長。肥人脉小。瘦人脉大。皆爲死候。

形證相反之圖


長
人脉
脉人
短
健
人脉
脉人
病
瘦
人脉
脉人
肥

凡形與證相反者皆為死候也

診四時病五行相尅脉

春得秋脉定知死。死在庚辛申酉裏。（春旺木。其脉弦。秋旺金。其脉濇。春得秋脉。金來尅木。故知必死。庚辛申酉金旺之日也。）

夏得冬脉亦如然。還於壬癸為期爾。（夏旺火。其脉洪。冬旺水。其脉石。夏得冬脉。水來尅火。故知必死。壬癸子亥水旺之日也。）

嚴冬診得四季脉。戊己辰戌還是厄。（冬旺水。其脉石。土旺四季。其脉緩。冬得四季之脉。土來尅水。亦為死候。戊己辰戌土旺之日也。）

秋得夏脉亦同前。為緣丙丁相刑尅。（秋旺金。其脉濇。夏旺火。其脉洪。秋得夏脉。火來尅金。死期斷以丙丁巳午火旺之日也。）

季月季夏得春脉。尅在甲寅病應極。值逢乙卯亦非良。此是五行相鬼賊。（季月辰戌丑未也。季夏即未月也。季月乃土寄旺之月。季夏乃五行相生土旺之時。診得春脉。木來尅土。謂之死候。甲寅乙卯木旺日也。已上皆五行相尅之時。）

診四時病五行相尅之圖


木尅土
火尅金
金尅木
春得秋脉
季月季夏得春脉
尅在甲寅乙卯日
死在庚辛申酉

診四時虛實歌

春得冬脈只是虛更兼補腎病自除若得夏脈緣心實還應瀉子自無虞（虛則補其母實則瀉其子）

夏秋冬脈皆如是在前爲實後爲虛（夏秋冬之所診皆如春法從前來者爲實邪從後來者爲虛邪）

春中若得四季脈不治多應病自除（春中二月分也四季脈土脈也二月分而得四季之脈乃妻來乘夫謂之微邪況二月木居當甲之邪故不治自愈）

診四時虛實之圖



傷寒歌

傷寒熱病同看脈滿手透關洪拍拍出至風門過大陽一日之中見脫厄過關微有慢騰騰直至伏時重候危（寒者冬氣也冬時嚴寒萬類深藏君子固寄不傷於寒觸冒之者乃名傷寒偵寒不即病者其寒毒藏於肌膚中至夏至前變爲溫病夏至後變爲熱病然其發起皆傷寒所致也故看病脈之法相同洪拍拍即洪驚也傷寒之病一日巨陽受之二日陽明受之三日少陽受之四日太陰受之五日少陰受之六日厥陰受之六日傳經已異其病當愈不愈七日邪該復傳其脈洪大而透過三關其邪出至風門穴而過於太陽之經其邪欲散一日之中當得汗而愈其脈過關微帶緩慢其邪至太陽亦遲日問不汗直至伏時再等候其汗也伏時即臨臥時也承日中而言）

掌內迢迢散漫行乾瘥疼疠多未的大凡當日問程途遲數洪微更消息（傷寒熱病未汗脈須浮洪既汗脈當安靜散漫之脈不汗而愈其汗後未可全許也）

診傷寒熱病之圖


傷寒
熱病
罘脉
過關微有慢騰騰
滿掌透關洪和拍
掌後迢迢散慢行
病
直至伏時重候覓
邪出風門過太陽
日之中見脫厄
乾瘥疼疗多来的

又歌曰

熱病須得脉浮洪細小徒費用神功（陽病當得陽脉陽症而得陰脉乃死症也）

汗後脉靜當便瘥喘熱脉亂命應終（汗後邪退則生邪盛即死）

熱病之圖


熱病
須得脉浮洪
細小費神功
汗後
脉靜當便瘥
喘熱脉亂凶

陽毒歌

陽毒健亂四肢煩面赤生花作點斑狂言妄語如神鬼下痢頻多喉不安汗出遍身應大瘥魚口開張命欲翻有藥不辜但與服能過七日但能安

（滑氏曰陽症宜汗而解之如失汗則邪傳入臟瘀熱在裏不散致病健亂煩躁面赤發斑狂言妄一如見鬼神下痢瘀血如此危症病傳在裏不當汗又加之遍身自汗口如魚口開張者死能過七日乃過經陽熱退方有可救之理）

陰毒歌

陰毒傷寒身體重背強眼痛不堪任小腹急痛口青黑毒氣衝心轉不禁四肢厥冷惟思吐不利咽喉脉細沉若能速灸臍輪下六日看過見喜深（臍輪下丹田穴也速灸丹田穴回陽而抑陰過得六日陰極陽生方爲可喜）

陰陽二毒之候圖



陽毒健亂四肢煩
而赤生花作點斑
狂言妄語如神鬼
下痢頻多喉不安
汗出遍身應大差
魚口開張命欲翻
治有藥不事但與服
能過七日便能安

陰毒傷寒身體重
背強眼痛不堪任
小腹急痛口青黑
毒氣衝心轉不禁
四肢厥冷惟思吐
咽喉不利脉細沉
治法必須速灸臍輪下
六日看過見喜深

諸雜病生死歌

腹脹浮大是出厄虛小命殂須努力（病源曰腹脹由陽氣外虛陰氣內積故也脉浮大則邪在表其危脫虛小則邪在內侵正氣減少其命危浮大當發汗是開鬼門也虛小宜利小便是潔淨府也）下痢微小却爲生脉大浮洪無瘥日（仲景曰下痢微小爲欲解也經曰病若腹大而泄者脉當微細而濇反得緊大沉者誑）恍惚之病定顛狂其脉實牢保安吉寸關尺部沉細時如此未聞人救得（經曰病若譫言妄語身當有熱脉當洪大反手足厥冷脉沉細而微者也）

消渴脉數大者活虛小病深厄難脫（病源曰夫消渴者渴不止小便多是也）水氣浮大得延生沉細應當是死別（潔古曰在表則易在裏則難）霍亂之候脉微遲氣少不語大難醫三部浮洪必救得古今課定更無疑（病源曰人之溫涼不調陰陽清濁二氣交錯變亂在腸胃之間因飲食而變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先利心腹齊痛者吐利竝作挾風而實者身發熱頭痛體疼而主利虛者吐利心腹刺痛而已亦有飲酒食肉鯉膾生冷過度而得或因居處不節坐臥濕地或當風取涼）

（而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃冷則不消不瘵則水穀不消化水穀不消則心腹脹滿皆成霍亂其各有三一曰胃反言其胃氣虛逆反吐合也二曰霍萬霍之間致撩亂也三曰走哺言其哺食變其脉來代者霍亂又脉代而亂者力霍亂也霍亂脉洪大者可治微遲氣息劣不欲言者不可治）

鼻衄吐血沉細宜忽然浮大即須危（病源曰心主血肝藏血肺主氣開竅於鼻血得熱則散血隨氣上從鼻中出則為衄經曰病防吐血復衄血者脉當沉細生浮大而牢者死）

病人脉健不用治健人脉病號行屍（人病脉不病者生脉病人不病者死）

心腹痛脉沉細宜浮大弦長命必殂（裏之有病其脉當沉細而應木證則愈反浮大弦長者為相反必當死以其病與脉反故也）

頭痛短濇應須死浮滑風痰必易除（頭痛陽病也短濇陰脉也陽病見陰脉者故自應須死若得浮滑其病因風痰所致治之以祛風化痰其痛即愈）

中風口噤遲浮吉急實大數三魂孤（寒則筋急筋急則口噤中風口噤診得病脉相應故言吉脉見急實大數乃風熱之極故三魂孤）

魚口氣麄難得瘥面赤如妝不久居（魚口人口如魚口之張脾氣絕也氣麄肺氣絕而呼出氣驟也面赤如妝火色盛也）

中風髮直口吐沫（髮乃血之餘也心不能生血髮必焦枯梗直涎乃脾之液脾絕則涎不收拾故涎從口中吐出也）

噴藥悶亂起復蘇（起恐作豈潘范曰咽主嚥物咽為胃之系下連胃脘為水穀之道路胃經為風痰所擾亂悶藥不下咽噴吐於其外豈可望其復有蘇醒之期）

咽喉拽鋸水雞響搖頭上竄氣長噓（水雞響者肺主聲其聲不清乃肺氣敗壞也上竄是上喘也氣長噓出多入少也皆真元散失之候）

病人頭面青黑暗汗透毛端恰似珠（色乃神之旗神去色亦去經曰六陽氣俱絕者則陰與陽相離陰陽相離則腠理泄絕汗乃出大如

貫珠轉出不流則氣先死）

眼小目瞪不須治作汗如油不可蘇（六氣不連用也）

內實腹脹痛滿盈心下牢強乾嘔頻手足煩熱脉沉細大小便澀死多真（陽病見陰脉者死氣和則小便利血和則大便通大小便澀乃氣血不和池氏曰內實結絕氣不宣通）

外實內熱吐相連下清注穀轉難安忽然診得脉洪尺莫費神功定不痊

（外實內熱內外皆陽也內外皆陽兼之以吐既吐不宜作瀉而反下青注谷其病難痊既瀉之後脈當細小反得洪大此爲不治之證）

內外俱虛身冷寒汗出如珠微嘔煩忽然手足脈厥逆體不安寧必死拚

（經曰內外皆陰服熱藥不愈經曰寒之不寒責腎之少爲無水也熱之不熱責心之虛爲無火也）

欬而尿血羸瘦形其疾脈大必難任

（病源曰唾血則肺傷損肺者五臟華蓋易爲傷損肺爲熱氣所加則唾血如絲縷者此傷肺也脇下痛唾鮮血此傷肝也其脈沉弱則吉實大則凶）

上氣浮腫肩息頻浮滑之脈卽相成忽然微細應難

救神功用盡也無生

（上氣浮腫邪在表也肩息頻者喘也用葛根升麻湯解肌湯主之浮滑之脈亦在於表宜麻黃湯發表也微細則邪人內矣故難救）

中惡腹脹緊細生若得浮大命逡巡

（中惡腹張乃是內傷脈宜緊細若得浮大表裏俱病必不免於死亡）

金瘡血盛虛細活急疾大數必危身

（金瘡刀刃所傷之瘡也血盛出血多也血既出多脈應虛細反得急疾數大風熱乘之其身必危）

凡脈尺寸緊數形又似釵直吐轉增此患蠱毒急須救速求坤藥命難停

（釵直如轉肝氣盛也吐轉增脾氣衰也木剋則脾絕其死定無疑）

中毒洪大脈應生細微之脈必危傾

（脈洪大者毒在外脈細微毒在內在外者易治而生在內者難治而死）

吐血但出不能止命應難返沒痊平

（血上行而不止心肺俱死於毒也其命莫能全矣）

大凡要看生死門太衝脈在卽爲憑若動應神魂魄在止便干休命不停

（太衝脈肝經俞穴之脈也肝藏魂可以決人死生諸病診看太衝之脈其脈若在應神而動則魂魄共連其人不死若止而不動魂魄離矣千無一活木衝穴在足太指本節後二寸陷中動脈應手）

此一歌叔和言雜病生死之訣開導後學其辭簡逕其理易明今止直解不復具圖

察色觀病生死候歌

欲愈之病目眥黃眼胞忽陷定知亡

（眼中分屬五臟應五輪瞳人屬腎應水輪烏睛屬肝應風輪兩瞼上下兩胞屬脾應肉輪眼白屬肺應氣輪兩眥屬心應血輪兩胞黃色火能生土胃氣將行其病故知欲愈眼胞陷者五臟之氣絕也故知當亡素問曰目內陷者死言太陽之脈起於目內陷者太陽絕也故死太陽主諸陽之氣故獨言之）

耳目口鼻黑色起入口十死七難當

（黑者腎之色也腎邪凌溼各藏黑色見於耳目鼻舌居口內而屬心火黑色自外入於口內木尅火故知十死無一生火之成數在七故第七日難當）

面黃目青酒亂頻　邪風在胃衰其身

（酒乃濕熱之物飲過多則濕熱傷乎脾胃故而色黃脾胃積熱熱則生風故目青也一身皆歸胃氣資養風邪留於胃中則播於一身內經曰有病身熱懈墯汗出如浴惡風淅淅此爲何病岐伯曰酒中風也）

面黑目白命門敗　困極八日死來侵

（黑水也目木也白金也命門火也木凌溼而賊火之氣金尅木而伐火之源所以命門火敗火之成數七七日火極矣故死於第八日也）

面色忽然望之青　進之如黑卒難當

（潔古曰青黑之色爲肝腎色也元青後黑是逆則不轉神去則死也）

面赤目白憂息氣　待過十日定存亡

（息氣喘逆也赤色屬火白色屬金火尅金必作喘逆金之成數在九十乃王之成數也土能生金則生不能生金則死故曰待過十日）

面赤目青衆惡傷　榮衛不通立須亡

（面赤火也目青木也木火色見風熱傷於五臟六腑藏腑受傷血氣衰肌肉不滑榮衞之道濇而不通其死也可立而待）

黃黑白色起入目　更兼口鼻有災殃

（獨見者。謂之正色。雜見者。謂之邪色。黃黑白之三色。雜見於面。或入於目。或入於口。或入於鼻。乃病氣從外而之內。故有災殃。）

面青目黃中時死　餘候須看兩日強

（中時即午時也。午時屬火。面青目黃。肝木尅乎脾土。而到午時。木得火而不畏金。木勢愈盛。人以胃氣爲本。今土絕即死。故死在是時。其他相尅者。道賊旺二日。而斷其死生。）

目無精光齒齦黑　面白目黑亦災殃。

（目無精光者。神絕也。齒齦黑者。脾絕也。而白者。少血也。目黑者。腎虛也。有是四者。則非久長之客。）

口如魚口不能閉　氣出不返命飛揚。

（潔古曰。火勝迫於肺。大喘而死。肺敗也。）

肩息直視及唇焦。面腫蒼黑也難逃。

（肩息者。氣喘而兩肩動也。直視者。視物而不轉睛也。唇焦者。心家熱也。面乃心之候。黑乃腎之色。上句是心絕。下句是肝絕。心肝既絕。命故難逃。）

妄語錯亂及不語。尸臭元知壽不高。

（神亡失守故也）

人中盡滿兼唇青。三日須知命必傾

（人中屬脾土。青色屬肝木。土受木尅。其絕在日之生數。）

兩頰顴赤人病久。口張氣直命難停

（魏氏曰。眼睛下高骨之中。名曰顴。顴下名面。面裏名臉。面外名頰。顴面頰臉。心火所屬。久病而有赤

色。無者神外洩。口張氣出。脾脇已絕。故命難停。

足趺趾腫膝如斗。十日須知難保守。

脾主四肢。足趺乃胃經所行之處。脾胃將絕。則有是証。胃屬土。十日者。土之成數也。故死不過十日

項筋舒展定知殂。掌內無文也不久

項筋舒展。因督脉已絕。掌內無文。心包脉絕也。脉絕人必死。豈得久生乎。

脣青體冷及遺尿。背面飲食四日期。

池氏曰。脣青體冷。乃眞氣欲絕。遺尿不禁。乃膀胱不藏。背面飲食。乃神去不守。人之神氣生於肝。神不守。則肝絕。不出金數而死也。

手足爪甲皆青黑。能過八日定難醫。

肝藏其充筋。其華爪。其色青。黑色屬於腎也。腎肝俱敗。則水不能生木。故見是色。八日。木之成數也

脊疼腰重反覆難。此是骨絕五日看。

脊者。脾之候也。腰者。腎之府也。脾屬土。腎屬水。土尅水。死者五日之期。五者。土之生數也。

體重溺出時不止。肉絕六日便高拚。

體重肉絕。脾也。溺出不止。腎也。土勝水。死期故日六日。六乃水之成數也。

手足甲青呼罵多。筋絕九日定難過。

肝絕過金而死。九日金之成數也。

髮直如麻半日死。尋衣語死十知麼。

髮直如麻者。肺氣絕也。尋衣語死。神不守舍也。

五臟察色歌

肝臟歌

面腫蒼黑舌卷青。四肢乏力眼如盲。泣下不止是肝絕。八日應當命必傾

青。肝之色也。舌卷青者。子見母色也。四肢乏力者。筋不能維持也。肝不能含血榮目。則眼如盲。津液外泄。則泣出不止。凡此數者。皆肝絕所致。金能尅木。故死於金王之日。八者。從甲日數至辛日也。經曰。足厥陰氣絕則筋縮。引卵與舌卷。厥陰者。肝也。用者。筋之合也。筋者。聚於陰器而絡於舌本。故脉不營。則筋縮急。筋縮急。則引卵與舌卷卵縮。此筋先死。庚日篤。辛日死。

心臟歌

面黧肩息直視看。又兼掌腫沒文斑。狂言亂語身悶熱。一日之內到冥間。

黧黃。黑色也。掌腫無文。心氣絕也。一乃水之成數。水尅火。故死在一日之內。經曰。手少陰氣絕。則脉不通。脉不通。則血不流。血不流。則色澤去。故面色黑如黧。此血先死。壬日篤。癸日死。

脾臟歌

臍趺腫滿面浮黃。泄痢不覺污衣裳。肌肉麤澀兼脣反。一日十二內災殃。

臍。神闕也。趺。足跗上也。浮黃。黃腫也。經曰。足太陰氣絕。則脉不榮其口脣。口脣者。肌肉之本也。脉不榮。則肌肉不滑澤。肌肉不滑澤。則肉滿。肉滿則脣反。脣反則肉先死。甲日篤。乙日死

肺臟歌

口鼻氣出不復迴。脣反無文黑似煤。皮毛焦乾爪枯折。途程三日定知災。

（氣出不復迴。有呼無及也。脣反上。不能生金也。黑似煤。金不能生水也。氣不流通。則皮毛焦乾。魂不連。則爪甲枯折。從甲至丙三日也。丙屬火。火剋金。故死在三日。經曰。手太陰氣絕。即皮毛焦。太陰者。肺也。行氣溫於皮毛者也。氣弗營。則皮毛焦。皮毛焦。則津液去。津液去。則皮毛枯折。毛折者。則毛先死。丙日篤。丁日死。）

腎臟歌

面黑齒痛目如盲。自汗如水腰折頻。皮肉濡結髮無澤。四日應當命不存。

（面黑。面如垢也。目如盲。瞻人反背也。自汗如水。火獨炎也。腰乃腎之府。腎敗則腰似折。不能榮於骨髓。而骨肉不相親。濡肉而却。不能爲五液之主。故髮不潤澤。從甲至戊越四日也。戊屬土。土剋水。故命不存。經曰。足少陰氣絕。即骨枯。少陰者。冬脉也。伏行而溫於骨髓。故骨髓不溫。即肌肉不著骨。骨肉不相親。即肉濡而却。肉濡而却。故齒長補枯。髮無潤澤。是骨先死。戊日篤。己日死。）

五臟絕死之圖



診婦人有妊歌

肝爲血兮肺爲氣。血爲榮兮氣爲衛。陰陽配偶不參差。兩臟通和皆類例。

（肝藏血。肺主氣。血屬陰爲榮。而行脉中。氣屬陽爲衛。而行脉外。氣升血亦升。氣降血亦降。陰陽配偶。無一毫之參差。三陰三陽舉。肯兩臟通和。而類其例焉。）

血衰氣王定無娠。血王氣衰應有體。

（素問曰。金木者。生殺之木。始木多而生。台多而殺。）

寸微關滑尺帶數。流利往來并雀啄。小兒之脉已見帶。數月懷躭猶未覺。

（女人此脈一見乃血王氣衰經閉不行。懷孕之脈已見形也。）

左疾爲男右爲女。流利相通速來去。兩手關脈大相應。已形亦在通前語。左手帶縱兩箇男。右手帶橫一雙女。左手脈逆生三男。右手脈順還三女。寸關尺部皆相應。一男一女分形證。有時子死母身存。或即母亡存子命。往來三部通流利。滑數相叅皆替替。陽實陰虛脈得明。遍滿胸堂皆逆氣。左手太陽浮大男。右手太陰沉細女。諸陽爲男故卜女指下分明長記取。三部沉正等無疑。尺內不止真胎婦。

（三部沉正等者。三部之中。重按皆不絕而正等也。）

母乘子兮縱氣露。妻乘夫兮橫氣助。子乘母兮逆氣叅。夫乘妻兮順氣護。

（此叔和自解上文縱橫逆順四字。）

小兒日足胎成聚。身熱脈亂無所苦。汗出不食吐逆時。精神結備其中住。

（池氏曰。婦人初繫胞。乃天一生水。二月受火之氣。其妊婦身熱脈亂汗出不食。吐逆惡阻。三月受木之氣。精神結備在其中住。氣和以榮其子。子氣以潤其母。而二氣榮潤其子少佳。）

滑疾不散胎三月。但疾不散五月母。

（滑疾不散而形始成也。但疾不散。見形已成也。小兒在母腹中。三月始成形。五月則形已成矣。）

弦緊牢强滑者安。沉細而微歸泉路。

（通津子曰。前有大陰沉細之說爲有妊平安之脈。及此又以沉細而微爲死脈。似乎相反。蓋叔和以妊婦之脈弦牢緊滑爲平脈。其三部之脈。或俱沉細而微。則爲死矣。）

診婦人有妊之圖

婦人
血王氣衰應有體
左脈　右脈

左脈：
太陽浮大男
帶縱兩箇男
疾爲男
逆生三男

日微關滑尺帶數
流利往來并雀啄
小兒之脈已見形
數月懷躭猶未覺

右脈：
太陰沉細女
帶橫一雙女
疾[illegible]女
順[illegible]一女

滑疾不散胎三月
汗出不食吐逆時
兒日足胎成聚（精神結備其中住）
身熱脈亂無所苦
但疾不散五月母

弦緊牢强滑者安沉細而微歸泉路

妊娠雜病生死歌。

血下如同月水來。漏極胞乾主殺胎。亦損妊母須憂慮。爭遣神丹救得回。（通津丁曰。夫胎之漏者或食動胎之物所致。或因熱毒之氣侵損胞胎所致。或因人房室勞損所致。損輕則漏輕。損重則漏重。但漏而盡則死。然安胎有三法。因母病以動胎。治母其胎自安。緣胎自有不堅。以致母病。但治胎則母自瘥矣。）

心腹急痛。面自青冷汗氣絶命必傾。血下不止胎衝上。心腹冷悶定傷身。臨胎舉重倒仆輕。致胎死在腹中居。已損未出血不止。衝心悶亂母魂孤。

（倒仆輕跌也。擧重輕勞傷也。）

產難生死歌

欲產之婦脉離經。沉細而滑也同名。夜半覺痛應分誕。來日日午定知生。（離經。離其常經也。一呼三至一吸三至皆曰離經。）

身重體熱寒又痛。舌下之脉黑復青。反舌上冷子當死腹中須遣母歸冥。面赤舌青細尋看。母活子死定難應。唇口俱青沫又出。子母俱死總高擠。面赤舌青沫出頻。母死子活定知真。不信若能看應驗。尋知賢哲不虛陳新產之脉緩滑吉實大弦急死來侵若得重沉小者吉忽若堅牢命不停寸口濇疾不調死沉細附骨不絶生審看此候分明記長須念取向心經（已上叔和言產婦生死之訣也）

懷妊傷寒歌

傷寒頭痛連百節氣急衝心溺如血上生斑點赤黑時壯熱不止致胎滅嘔吐不止心煩熱腰背俱強腦痛裂六七日來熱腹中小便不通大便結（潔古曰懷妊婦人傷寒病者須問大小便大小便如利知不損胎黃龍湯主之）

產後傷寒歌

產後因得熱病臨脉細四肢緩者生脉大忽然肢逆冷須知其死莫留停（熱病之脉固宜洪大但產後氣血俱虛在所不宜勿作陽病見陰脉論也）

小兒生死候歌

小兒乳後輒嘔逆更兼脉亂無憂慮（變蒸未定氣息未調嘔逆脉亂不得爲病）

弦急之時被氣纏脉緩即是不消乳（小兒之脉弦急乃風邪寒氣所纏緩則脾病而乳食不消）

緊數細快亦少苦虛濡邪氣驚風助（數而細快乃小兒平脉加之以緊亦有些須表邪若虛而濡乃邪氣驚風之候）

痢下宜腸急痛時浮大之脉歸泉路（下痢之脉不宜浮大故也）

小兒外證一十五候歌

眼上赤脉下貫瞳人（池氏曰赤脉屬心瞳人屬腎乃心火勝腎水水乾則不生木致腎肝皆絕故也）

顖門腫起兼及作坑（熱勝則腫熱極則陷皆熱絕也）

鼻乾黑燥（火尅金也）

肚大筋青（木尅土也）

目多直視覩不轉睛（經曰迴則不轉是也）

指甲青黑忽作鵶聲（肝脉已絕）

虛舌出口嚙嚙咬人（心腎已絕）

魚口氣急啼不作聲（魚口張而不合也是謂脾絕氣急作喘哭而無聲是謂肺絕）

蛔蟲既出必是死形（蛔一生於胃中藉穀食以養胃絕而穀食不入蟲故出也）

用藥速救十無一生（總結上文十五證而言也小見有是證者下中莫治其一）

圖註脉訣辨真卷之四

脉訣附方

四明靜齋張世賢編次

七表脉方

浮脉

○小柴胡湯

柴胡　黃芩（去腐）　五味子

半夏（製各一兩）　白芍藥　人參

桑白皮（各五錢）

右㕮咀每服半兩水二盞生薑七片煎至七

分去滓食後溫服

○地骨皮散

人參　地骨皮　柴胡

黃芪　生地黃（各一兩半）　白茯苓（五錢）

知母（一兩）　石膏（二兩）

右㕮咀每服五錢水二盞生薑七片煎至七分去滓細細溫服連夜頓服○生精補腎者

地黃丸

寸浮

○桂枝湯（治有汗脉浮緩）

赤芍藥　桂枝（各六錢）　甘艸（炙四錢）

右㕮咀每服五錢水二盞加生薑三片棗二枚煎至八分溫服

○麻黃湯（治無汗脉浮緊）

麻黃　桂枝（各一兩）　甘艸（五錢）

杏仁（五十粒）

右㕮咀每服五錢水二盞煎八分溫服被覆取汗出爲度

關浮

○調中湯

製厚朴　陳皮（去白）　半夏（各一兩）

白术（一兩半）　人參（五錢）　甘艸（炙三錢）

右㕮咀每服五錢水二盞加生薑七片煎至七分去滓食前溫服

尺浮

○七聖丸（治風在下焦）

檳榔　木香　羌活

川芎　桂（各五錢）　大黃

郁李仁（各一兩）

右爲細末。煉蜜爲丸如桐子大。每服三十丸。漸加之。微利爲度。生薑湯送下。食後服之。

芤脉

○加減梔子湯（芤脉在上）

梔子（四箇碎）　香豉（五錢）

先以水二盞煑梔子至七分。入豉煑三五沸。去滓溫服。得吐止。

○猪苓湯（芤脉在下）

猪苓　滑石　澤瀉

阿膠（炒各等分）

右㕮咀。每服水二盞。先用前三味煎至一盞去滓。後入阿膠化開。食前溫服。

○瀉黃散（芤脉在中）

藿香葉　梔子仁　甘草（各五錢）

防風（三兩）　石膏（一兩）

右㕮咀。水二盞。煎半兩。細細服無時。

寸芤

○犀角地黃湯（血在上焦）

生地黃（二兩）　黃芩（一兩五錢）　黃連（一兩）

犀角（六錢）　大黃（五錢）

右㕮咀。水三盞。秤一兩。煎至二盞。去滓。食後服之。

關芤

○抵當丸

大黃　水蛭（如製各半兩）　䖟蟲（三錢）

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。食

後溫水下。以利爲度。未利加數服之

尺芤

○桃仁承氣湯

桃仁（五錢）　大黃（一兩）　甘草（二錢五分）

桂（三錢）

右㕮咀。每服半兩。水二盞。生薑七片。煎至一半。去滓。入芒硝三錢。化開。食後服。以利爲度未利再服。又云。上焦有血。先便後血。下焦有

血先。血後便。中焦有血。便血齊作。用藥上焦食後。下焦食前。中焦徐下。食遠兩飯間也。

滑脉

○加減大柴胡湯

柴胡　赤芍藥（各二兩）　枳實

大黃　黃芩（各五錢）　甘艸（二錢）

右㕮咀每服半兩。水二盞。生薑七片。煎至一盞。去滓。溫服。臨臥以利為度。未利再服。

○大承氣湯

厚朴（製一兩）　枳實（麩炒）　大黃（各五錢）

芒硝（三錢）

右㕮咀。每用水一椀。生薑十片。先煎厚朴枳實至一盞半。再入大黃煎至一盞。去滓入芒硝化開。午食後服。未利。次日晚食後服之。

寸滑

○半夏湯

半夏（製一兩）　茯苓（二兩）

右㕮咀每服半兩。水二盞。生薑七片煎至一半。去滓。食後服。不嘔吐者止。不止者。再服。

關滑

○加減小柴胡湯

柴胡　黃芩　赤芍藥（各一兩）

人參（五錢）　甘艸（三錢炙）　桂（四錢）

右㕮咀。每服半兩。水二盞。生薑七片。煎至一盞。去滓。溫服。

尺滑

○附子四逆湯

炮薑　附子（各五錢炮）　白朮（一兩）

甘艸（二錢）　桂（七錢）

右㕮咀。每服半兩。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服食前。

實脉

○藿香半夏散

藿香葉　半夏（各一兩）　丁香（五錢）

右為麄末。每服三錢。水一盞半。生薑七片。煎一盞。去滓。稍熱食前服

寸實

○涼膈散

山梔仁（一兩）　連翹　黃芩（各二兩）

大黃（五錢）　薄苛（一兩五錢）　朴硝（六錢）

右爲麄末。每服半兩。水二盞。同竹葉七片。煎至一盞。入硝。去滓。入蜜少許。食後服。

關實

○調胃承氣湯

甘艸（五錢）　芒硝（九分）　大黃（一兩酒浸）

右㕮咀。每服半兩。水一盞。先煎大黃甘艸至七分。去滓。入硝。煎一二沸。溫服。取利爲度。

尺實

○朮附湯

白朮（一兩）　附子（炮五錢）　甘艸（炙三錢）

右㕮咀。每服半兩。水一大盞半。煎至一盞。去滓。食前溫服。

弦脉

○八味丸（固濟丹田）

牡丹皮　白茯苓　澤瀉（各三兩）

熟地黃（八兩）　山茱萸　山藥（各四兩）

附子（炮去皮臍）　肉桂（去粗皮各二兩）

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸至二十五丸。溫酒下。空心食前。日進二服。久服壯元陽。益精髓。活血駐顏。强志輕身。

寸弦

○小柴胡湯

柴胡（二兩）　半夏（八錢）　黃芩

甘艸　人參（各七錢半）

右作五服。每加生薑三片。棗二枚。水煎溫服

關弦

○附子理中丸

附子（炮去皮臍）　人參（去蘆）　乾薑（炮）

白朮　甘艸（炙各三兩）

右爲細末。煉蜜每兩作十丸。每服一丸。用水一鍾化開。煎至七分。空心服。

尺弦

○术附湯（方見尺實）

緊脉

○黃連瀉心湯

黃連　生地黃　知母（各一兩）

黃芩（二兩）　甘艸（五錢）

右㕮咀。每服半兩。水一盞半煎服。

○小承氣湯

生地黃（一兩五錢）　黃芩　山梔仁（各一兩）

大黃（五錢）

右㕮咀水煎一兩。以利為度。

寸緊

○大柴胡湯

柴胡（二兩）　黃芩（七錢五分）　芍藥（三錢）

半夏（六錢五分）　枳實（四枚）　大黃（五錢）

右㕮咀。作三服。每加薑棗。水煎溫服。

關緊

○芍藥湯

赤芍藥（二兩）　甘艸（五錢）　桂（三錢）

右㕮咀。水煎一兩。加生薑七片。溫服。如實痛加大黃。

尺緊

○桂枝芍藥湯

桂（一兩）　芍藥　甘艸（炙各一兩）

右㕮咀。每服一兩。入薑棗煎服。

洪脉

○大承氣湯

大黃（五錢）　厚朴（一兩）　枳實（五箇）

芒硝（五錢）

右㕮咀。水二盞半。先將厚朴枳實煎至一盞入大黃。煎七分。去滓。入硝。煎一二沸。溫服。以利為度。未利再服。

寸洪

○連翹湯

連翹（一兩）　柴胡　當歸

生地黃　赤芍藥（各五錢）　黃芩（一兩）

大黃（三錢）

右㕮咀。每一兩，水煎服之。洪在上焦。

關洪

○調中湯

大黃（比衆藥減半）　葛根　黃芩

芍藥　桔梗　茯苓

藁本　白朮　甘艸（炙各等分）

右㕮咀。水煎一兩服。不拘時候。日二三服。洪在中焦。如秋冬。寒在胃中。不可用。春夏可用。胃中有餘熱也。

尺洪

○澤瀉散

澤瀉　赤茯苓（各半兩）　山梔仁

桑白皮（各一兩）

右㕮咀。水煎一兩服。得小便利爲度。不除者。腎氣下痛。可用大柴胡湯。加大黃下之。

八裏脉方

微脉

○香芎湯（血不止者）

香附（一兩）　當歸　白芍藥（各二兩）

川芎（五錢）

右㕮咀。水煎一兩。食前服。

○當歸芍藥湯

當歸　白芍藥　熟地黃（各二兩）

乾薑

右㕮咀。水煎一兩。食前服。

寸微

○補肺散（又治勞嗽）

阿膠（一兩五錢）　甘艸（三錢）　黍粘子（二錢五分）

馬兜鈴（炒五錢）　杏仁（去皮尖七箇）

右爲麄末。水煎半兩。食後溫服。加糯米煎炒。

關微

○匀氣散

丁香　檀香　木香

白豆蔻（各二兩）　藿香　甘艸（各八兩）

砂仁（四兩）

右爲末。每服一錢。入鹽少許。用沸湯點服。不

討時候。

尺微

○二氣丹

硫黃（細研）　肉桂（去皮各一分）　乾薑（炮）

硃砂（爲衣各二錢）　附子（一箇大者炮去皮臍爲末半兩）

右竝研極細。用麪糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。煎艾鹽湯。稍溫。空心下。

沉脉

○加減八物湯

當歸　白朮　人參

乾薑（各一兩）　附子（炮去皮臍）　白芍藥

桂（各五錢）　丁香（三錢）

右㕮咀。水煎一兩。不拘時候。

寸沉

○半夏丸

半夏（一兩湯洗焙）　雄黃（三錢）　白礬（一錢燒過）

右爲末。生薑汁糊丸如桐子大。每、三十丸。至五十丸。生薑湯食後送下。

關沉

○加味橘皮半夏湯

陳皮（去白三兩）　半夏（製）　枳殼（炒各一兩）

白朮　茯苓　桂（各五錢）

右㕮咀。每服一兩。生薑七片。水煎食前服。

尺沉

○黃芪丸

杜蒺藜（炒去刺）　川椒　茴香（炒）

川烏（炮去皮臍）　赤小豆　地龍（去土炒）

防風（各一兩）　烏藥（二兩）

右爲細末。以酒煮麪糊爲丸如梧桐子大。每服十五丸。空心及晚食前溫酒鹽湯任下。婦人醋湯空心下。

緩脉

○枳朮湯

白朮（一兩）　枳實（麸炒）　甘艸（炙各五）

右㕮咀半兩。入生薑七片。水煎食後溫服。

寸緩

○加味羌活湯

羌活　升麻　黃芩

葛根　石膏（各一兩）　防風

麻黃（去節湯浸焙乾）　藁本　蔓荊子

細辛（各五錢）

右㕮咀，每服一兩，生薑七片，水煎溫服無時，

關緩

○七氣湯

半夏（製一兩）　人參　官桂

甘艸（炙各五錢）

右㕮咀，每服一兩，生薑七片。煎服無時。不已再服。

○溫白丸（主腹痛難伸音）

川烏（炮去皮臍二兩五錢）　柴胡（去蘆）

桔梗　吳茱萸（湯洗七次炒）

菖蒲　紫菀（去苗葉及土）　黃連（去鬚）

乾薑（炮）　肉桂（去粗皮）　茯苓（去皮）

蜀椒（去目及閉口炒用）　人參（去蘆）

厚朴（薑汁製）　巴豆（去皮心膜及油研）

皂莢（去皮及子各五錢）

右爲細末。入巴豆勻，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服三丸。食後或臨臥生薑湯下，漸加至五七丸，

尺緩

○桂枝湯加乾薑

桂枝（一兩）　白芍藥　乾薑（各五錢）

甘艸（炙四兩）

右㕮咀，加薑棗。水煎服。

濇脉

○滋陰大補丸

牛膝（酒浸）　山藥（各一兩半）　杜仲（酒和薑汁炒去絲）

巴戟（去心）　山茱萸（紅者去核）　肉蓯蓉（酒浸焙乾）

五味子（酒洗）　白茯苓（去皮）　茴香（炒）

遠志（甘艸同煑去心各一兩）　石菖蒲

枸杞子（各五錢）　熟地黃（二兩）

右爲末。煑紅棗取肉，和煉蜜爲丸如梧桐子。

每服八十丸。淡鹽湯或溫酒空心任下。

寸濇

〇加味桔梗湯

桔梗（一兩）　半夏（五錢）　陳皮（三兩）

厚朴（一兩）　枳實（麩炒五錢）

右㕮咀。每服半兩。白水生薑。食後煎服。

關濇

〇溫經湯

阿膠（炒）　當歸　川芎

人參　肉桂　甘艸

芍藥　牡丹皮（各二兩）　半夏（二兩半）

麥門冬（五兩半）　吴茱萸（三兩）

右㕮咀。每服半兩。水一盞半。生薑七片。煎八分。空心或食、前熱服。

尺濇

〇五補丸

地骨皮　白茯苓（去皮）　牛膝（去苗酒浸一宿）

熟地黃　人參（各三兩）

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。空心食前溫酒下。

〇蓽澄茄散

蓽澄茄　阿黎勒皮　細辛（各一兩）

人參（去蘆）　草豆蔻（去皮）　荆三稜（煨）

木香　半夏（製）　五味子

高良薑　青皮（去白）　甘艸（炙各五錢）

白朮　大腹皮（各三錢）

右㕮咀。每服三錢。水一盞。生薑半分。棗一枚、

煎至六分。去滓。稍熱。不拘時服。

遲脉

〇導赤散（治小腸實熱）

生地黃　木通　甘艸（等分）

右入竹葉煎。

〇六味地黃丸

山藥　山茱萸（各四錢）　澤瀉

牡丹皮　白茯苓（各三錢）　熟地黃（八錢）

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五十丸。清

湯空心下

寸遲

○朮附湯

白朮　附子（炮去皮臍）　乾薑（炮）

桂（各一兩）

右㕮咀。如法煎一兩。食前服。

關遲

○桂枝加附子湯

桂枝　附子（炮各一兩）　甘艸（二錢五分）

右㕮咀。如法煎服。

尺遲

○附子理中丸

附子（炮去皮臍）　人參　乾薑（炮）

白朮　甘艸（炙各三兩）

右爲細末。煉蜜爲丸。每兩作十丸。每服一丸。用水一盞。化開煎至七分。空心服。

伏脉

○升麻湯（伏冬用）

升麻（一兩）　雞蘇（四兩）　地骨皮（八兩）

蜂房　甘松（洗去土）　細辛

防風　甘艸（各二兩）

右㕮咀。每服三錢。水一盞。煎至七分。去滓。熱服。春夏以麻黃湯。

寸伏

○沉香丸

沉香　木香（各一錢半）　枳殼（麩炒）

蘿蔔子（炒二錢）

右作一服。水二盞。生薑三片。煎至一盞。不拘時服。

關伏

○三膈寬中散

白豆蔻（二兩）　砂仁　青皮

陳皮（去白）　丁香（各二兩）　木香

甘艸（各一兩半）　香附（製）　厚朴（製各八兩）

右爲細末。每服三錢。白湯點服無時。

尺伏

○四白湯

白朮（二兩）　白茯苓　白芍藥

黃芪（各五錢）

右爲麄末。每服半兩。入薑棗煎服。

濡脉　其症已危。故不立方。

寸濡

○桂枝湯（方見寸浮）

關濡

○加味四君子湯

人參（五錢）　白朮　茯苓（各一兩）

甘艸（三錢）　茯神（八錢）

右㕮咀。每服四五錢。水煎服。

尺濡　乃骨痿不能起於牀。五損至骨。故不治。

弱脉　老弱之人得此。其病自痊。少壯得此。乃危症也。故不立方

寸弱

○四逆湯

甘艸（一兩）　乾薑（七錢）　附子（半生去皮臍六錢）

黃連（五錢）

右㕮咀。每服三錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。

不拘時溫服。

關弱

○平胃散

蒼朮（八錢）　陳皮　厚朴（製各五兩）

甘艸（炒三兩）

右爲細末。每服三四錢。薑棗煎湯。或鹽湯調服。

尺弱　陰氣已絕。無法可治。故不立方。

九道脉方

長脉

○地骨皮散

地骨皮　茯苓（各半兩）　柴胡

黃芩　生地黃　知母（各一兩）

石膏（二兩）

右㕮咀。入生薑煎。如自汗已多。加知母。此法在五臟之標。是皮毛血脉肌肉筋骨之病。故

徐徐發者。汗之緩也

短脉

○溫白丸（方見緩脉）

虛脉

○加減小柴胡湯

柴胡（去苗）　黄芩（各一兩）　地骨皮

人參　知母　半夏（製）

茯苓（各半兩）　甘艸（炙三錢）　白芍藥（八錢）

右㕮咀。每服一兩。薑水煎服。

促脉　漸加將死。漸退則生。故不立方

結脉　宜瀉三焦之火。禁暴用寒藥急攻

代脉

○人參黄芪湯（主暴損）

人參　茯苓　熟地黄

甘艸（炙）　地骨皮（各五錢）　黄芪

桔梗　白芍藥　天門冬

半夏（製）　當歸（各一兩）　陳皮（白三兩）

右㕮咀。入生薑十片。水煎一兩。去滓。食前服

滋養血氣。調和榮衛。和順三焦。通行血脉。若

傷寒代者。炙甘艸湯。

牢脉　此係危症。故不立方。

動脉

○八物湯

當歸　白芍藥　熟地黄

白术（各一兩）　人參　乾薑（炮）

茯苓　桂（各半兩）

右㕮咀。每服一兩。生薑七片。水煎。食前服

細脉

○茴香丸

葳靈仙（去土）　川烏（炮去及臍）　陳皮（去白）

防風（去苗）　川練子（麩炒）　萆薢（各三兩）

烏藥（二兩）　川椒（去目及閉口者炒二兩）

赤小豆　茴香（炒各八兩）　地龍（去土炒七兩）

右爲細末。以酒煑麪糊爲丸。如梧桐子大。每

服二十丸。空心及晚食前。溫酒鹽湯任下。

脉訣附方終

能醫人多矣能使人皆能醫人不多也蓋以醫醫人有限以醫教人無窮

施桂堂察病證有書曰指南考本草有書曰辨異而續易簡又有方有論　桂堂之心使人人知有此書此方此論也不特自能醫人且欲人莫不能醫人脉彔彔輩曰秘方曰家藏方小智自私靳不示人心之廣狭蓋可見

淳祐丙午正月中澣澹齋趙（崇賀）書

七月既望禱雨獲應翌日皂史遞詩筒來睨而視之乃峴山施君為喜雨作也語意偉健有宰官尋痛聲之句其知予憂民之愛者歟越數日又以哀類醫書出示議論可觀非儒而醫不能也予未甞學醫未甞無活人之心為邑于斯每訪民閒疾苦思有以起其危日夜懔懔用藥不同而用心同其相與勉之

淳祐乙巳良月冀郎趙（與訔）書

察病指南序

醫之爲學自神聖工巧之外無餘說今人往往遺其三而主其一一者何切而知之謂之巧也然亦曷嘗真見其所謂巧者特竊是名以欺世耳間有以活人自任者又弊於醫書之泰歷惑於議論之紛紜無所折衷每得其粗而不得其精余自弱冠有志於

此常即此與舉業並攻迨夫年將知命謝絕場屋盡屛科目之累專心醫道取靈樞素問太素甲乙難經及諸家方書脉書參考互觀求其言之明白易曉余嘗用之而驗者分門纂類裒爲一集名曰察病指南其間如定四季六臟平脉與夫七表八裏之主病分見於兩手三部者亦本於聖賢

之遺論特推而廣之綱類而補之其他言之未甚昭著者則附以己意發明之蓋將以貽諸子孫非敢求人之知也年來疫癘盛行病者不幸而招致多見以陽病服丹附者悉殞於非命豈惟不知脉併於證而不知吁何慘哉或者不察乃曰吾取醫之遲耳奚暇問其學之精否殊不知恃運以

言醫雖幸而或中而所喪亦多求其萬舉萬全者難矣此余所以不敢自私欲鋟梓以廣其傳庶幾與同志者共之云

淳祐改元九月立冬後四日東嘉施發政卿序

兼發賣續易簡方論

察病指南目録

卷上

十二經總括
診三部脈法
三部九候
左右三部六候
四季脈名
診五藏四季常脈
定四季六藏平脈
定四季相尅脈
診五藏賊邪脈
診四時虚實脈歌
下指輕重法
診五藏動脈法
診六腑平脈法
脈息大數
診五臟脈訣
男女反脈
觀人形性脈法
察平人損至脈法
診暴病脈法
診祟脈法
診病内外法
診瘕病脈法
診候約法
辨雜病脈吐汗温利可否法
人迎氣口脈
辨三因
定生死訣
下指踈密法

卷中

辨七表八裏九道七死脈
診七表相承病法

卷下

審諸病生死脈法
診太衝衝陽脈
論病之本
察雜病生死證
五藏虚實外候
臟腑病外候
診婦人病脈生死訣
辨胎脈
外候胎法
妊娠雜病生死外候
產難外候
診小兒雜病脈法
辨小兒生死脈
小兒死證一十五候歌
看小兒虎口訣
聽聲驗病訣
察五藏色知生死訣
攷味知病法
原夢

察病指南目録終

察病指南卷之上

十二經總括

左手寸口手少陰心藏部爲帝王（一云君主之官）屬朱雀南方丙丁君火主血脉及舌外候在舌其神神其志喜其聲笑（一云言）其色赤其臭焦其味苦其液汗其音徵其卦離其數七（此成數也其生數二）其變動爲憂其府手太陽小腸其積伏梁如臂連臍

左手關上足厥陰肝藏部爲尚書（一云將軍之官）屬青龍東方甲乙木主藏血及筋爪甲外候在目其神魂其志怒其聲呼其色青其臭臊其味酸其液泣其音角其卦震其數八（此成數也其生數三）其變動爲握其府足少陽膽其積肥氣若杯覆在脇邊

左手尺內足少陰腎藏部爲列女（一云作強之官）屬玄武北方壬癸水主藏精及骨髓通水濕外候在耳其神志其志恐其聲呻其色黑其臭腐其味鹹其液唾其音羽其卦坎其數六（此成數也其生數一）其變動爲慄其府足太陽膀胱其支脉曰巨陽其積賁豚在臍下

右手寸口手太陰肺藏部爲將軍（一云相傅之官）屬白虎西方庚辛金主藏氣及皮毛燥（一云寒）外候在鼻其神魄其志憂其聲哭其色白其臭腥其味辛其液涕其音商其卦兌其數九（此成數也其生數四）其變動爲咳其府手陽明大腸其積息賁在右脇邊

右手關上足太陰脾藏部爲大夫（一云倉廩之官）屬勾陳中央戊己土主藏智肌肉勞倦濕外候在唇口其神意其志思其聲歌其色黃其臭香其味甘其液涎其音宮其卦坤其數五（此生數也）其變動爲噦其府足陽明胃其積痞氣在胃脘覆大如盤

右手尺內手厥陰命門部屬相火（一名神門）名手心主一名心包絡主藏（心與腎同）氣男子以藏精女子以繫胞其府手少陽三焦上焦其卦乾中焦其卦艮下焦其卦巽

診三部脉法

寸部法天主上焦診自頭以下至心病也

關部法人主中焦診自心以下至臍病也

尺部法地主下焦診自臍以下至足病也

三部九候

三部者上中下即寸關尺也每部三候各自分天人地

上部天以候頭角上部人以候耳目上部地以候

口齒

中部天以候肺中部人以候心中部地以候胸中

下部天以候肝下部人以候脾胃下部地以候腎（九候雖有數說不如此說其餘今亦難用姑存之）

王子亨云一位有三候浮取之屬陽沈取之屬陰中得之爲胃氣故無胃氣則死

左右三部六候

左寸外以候心內以候膻中（其沈在兩乳間）

左關外以候肝內以候膈中

左尺外以候腎內以候腹中（腹屬下焦右手尺中亦可候也）

右寸外以候肺內以候胸中（三焦之所主也）

右關外以候脾內以候胃脘

右尺外以候心主內以候腰

四季脈名

春弦（謂端直如弓弦也）　夏洪（一云鉤謂脈如鉤者來疾去遲）

秋浮（一云毛謂如浮毛之輕柔也）　冬沈（一云營一云石謂其沈也）

診五藏四季常脈

春肝脈緩弦而長（一云弦細而長一云弦長而軟一云濡弱而長）

夏心脈洪大而散（一云浮大而散一云浮洪而駃一云洪而微實一云浮大而洪）（長一云洪大而長）呂廣云非是乃小腸脈也

四季脾脈濡濡而緩（一云軟大而緩一云沈而濡長三月六月九月十二月各王十八日）

秋肺脈浮濇而短（一云微澁而短一云輕虛以浮）

冬腎脈沈滯而滑（一云沈濡而短一云沈而緊實一云沈細一云沈實而滑一云沈濡而滑）

定四季六臟平脈

春肝脈欲弦而長

脾脈欲弦而緩

腎脈欲弦而沈濡

夏心脈欲洪大而散

心脈欲弦而洪浮

肺脈欲弦而微浮

命門脈欲弦而滑

脾脈欲洪而遲緩

肺脈欲洪而浮濇

命門脈與腎同

秋肺脈欲浮而短濇

命門脈欲微而滑

心脈欲浮而洪

冬腎脈欲沈而滑

肝脈欲沈而弦

脾脈欲沈而緩

腎脈欲洪而沈滑

肝脈欲洪而弦長

腎脈欲微而伏

肝脈欲浮而弦細

脾脈欲浮而微緩

命門脈與腎同

心脈欲沈而洪

肺脈欲沈而濇

定四季相尅脈

春得秋脈者死於庚辛日（謂金之尅木也）

夏得冬脉者死於壬癸日（謂水之尅火也）

四季得春脉者死於甲乙日（謂木之尅土也）

秋得夏脉者死於丙丁日（謂火之尅金也）

冬得四季脉者死於戊己日（謂土之尅水也）

五藏相尅所不可勝者為賊邪其難治也信矣至於所可勝者為微邪雖不治而自愈【王叔和】【脉賦乃云】春得脾而不療冬見心而不治夏得肺而難救秋得肝亦何疑反以微邪為可畏者何耶及觀【靈樞經】云木動而火明火炎而土平生盛而金生金盛而水盈乃相救和之說有所本試即土盛金生言之夫土氣既旺則生金以尅木使肝藏之脉弦而緩是本脉尚存脾或侵之此所謂微邪不足慮若本脉全無而獨見脾脉者斯足為害也餘藏可以類推

診五臟賊邪脉

東方角木春肝木畏金遇肺金乘木大逆八月死

南方徵火夏心火畏水遇腎水乘火大逆十一月死

中央宮土脾土畏木遇肝木乘土大逆二月死

西方商金秋肺金畏火遇心火乘金大逆五月死

北方羽水冬腎水畏土遇脾土乘水大逆六月死

愚

（此即前四季相尅脉也前言其所死之日此言其所死之月故兩存之）

診四時虛實脉歌

春得冬脉只是虛（謂春脉弦反得冬石脉是腎水為木之母從後來乘肝木之子為虛邪）兼令補腎病自除（母虛則補之）若得夏脉緣心實（謂春得夏洪脉是心火為木之子從前來乘肝木之母為實邪）還應瀉子自無虞（子實則瀉之）夏秋冬脉皆如是在前為實後為虛春中若得四季脉不治多應病自除（四季緩脉是脾土為木之妻木勝於夫為微邪不治而病自愈）

下指輕重法

凡診候安神靖氣男先診左手女先診右手先以中指端得關位却以第一指著寸部令微骨漸徐舉指關尺部皆然（此先重而後輕也活人書云凡浮按消息之次中按次重按此先輕而後重也亦得）

診五藏動脉法

脉來五十動不止者五藏皆有氣足其人無病

脉來四十動一止者一藏無氣謂腎氣先盡也其人後四年春草生時死

脉來三十動一止者二藏無氣其人後三年穀雨至時死

脉來二十動一止者三藏無氣其人後二年春

赤時死

脈來十動一止者四藏無氣其人後一年草枯時死

脈來五動一止者五藏無氣其人後五日死

王叔和云脈來四動一止八日死三動一止六七日死兩動一止三四日死（別本云但此止者非結脈促脈之止也此是代脈之止也至于代脈非達人者難窺者乎）

診六府平脈法

左手寸口手太陽小腸脈洪大而緊（一云洪大而長）為受盛之官名受盛之府

左手關上足少陽膽脈弦大而浮（一云大而浮一云上數下緊上短下長一云上大下小上短下長其與宗脈無異何以區別然兩手三部皆然方為衆脈今左手關部如此則謂之膽脈可也）為中正之官名清淨之府（一云中精之府）相火膽與風木肝合脈急則為驚

左手尺內足太陽膀胱脈洪滑而長為州都之官名津液之府寒水膀胱與君火腎合脈急則為瘕

心脈居午謂之君火宜也今腎脈居子亦謂之君火何義命門脈為心主居亥謂之相火宜也今膽脈居寅亦謂之相火又何耶及觀內經天元紀大論篇曰子午之歲上見少陰巳亥之歲上見厥陰少陰所謂標也厥陰所謂終也厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之少陽之上相火主之而釋者謂午亥之歲為正化子巳之歲為對化由此言之則心腎皆可言君火以其熱氣主之也厥陰既主風氣而手厥陰命門不當以相火言少陽既主其相火則膽與三焦為相火明矣

右手寸口手陽明大腸脈浮短而滑（一云短而濇）為傳道之官名傳道之府

右手關上足陽明胃脈浮長而濇（一云浮大而短）為倉廩之官名水穀之府燥金胃與濕土脾合

右手尺內手少陽三焦脈洪散而急為決瀆之官名外府

脈息太數

人一呼一吸脈各行三寸此一息也一日一夜一萬三千五百息榮衛行陽二十五度行陰二十五度為一周也復會於手太陰

診五藏脈訣

輕手於皮膚得之者肺也至肌得之者心也至肉

得之者脾也。至筋得之者肝也。至骨得之者腎也

男女反脈

男子陽脈常盛，陰脈常弱；女子陽脈常弱，陰脈常盛。男得女脈為不足，病在內（當作虛腎）。女得男脈為有餘，病在外（謂在四肢左得之病在左右得之病在右當作實腎）。男子生於寅，寅為木；女子生於申，申為金。故男脈在關上，女脈在關下。三陽從地生，故男子尺脈沈也。三陰從天生，故女子尺脈浮也

觀人形性脈法

人長則脈長，人短則脈短，人肥則脈沈（一云脈厚一云脈細而實），人瘦則脈浮（一云脈急一云脈大而長）。人壯脈欲大，人弱脈欲小，反者為逆。形盛脈細，少氣不足以息者死。形瘦脈大，胷中多氣者死。老人脈微微陽羸陰者平（一云脈濡而緩）。婦人脈當軟弱於丈夫。小兒四五歲脈實自駃，呼吸八至（一云如脈數而壯）。人性急脈急，性緩脈緩

察平人損至脈法

凡一呼一吸為一息，一呼脈再至，一吸脈再至，是一息之間脈四至并五至，不大不小，不短不長，是為平人之脈也

一呼一吸脈不及四至者曰緩（一云氣虛），其人少氣。三至者曰遲（一云損），其人可治。二至者曰敗（一云寒），其人難治，延時而死。一至者曰息，其人雖行，方當著牀，待時而死。此為陰病之損脈也。故曰陰病脈遲

一呼一吸脈六至者曰數（一云離絕），為始得病。七至者曰極（一云無魂）。八至者曰脫（一云奪精一云無魄）。九至者曰死。十至者曰墓（一云困）。沈細者困在夜，浮大者困在晝。十一十二至者曰死（一云絕魄一云天命頓）。沈細夜死，浮大晝死。此為陽病之至脈也。故曰陽病脈數

診暴病脈法

脈來急大洪直者死，細微者無害

診祟脈法

脈來乍大乍小，乍短乍長，為禍祟（別本云右尺洪大為祟脈）。寸尺有脈，關中無脈，為鬼病

診病內外法

脈浮大者病在外，沈細者病在內

診癥病脈法

左手脈橫癥在右，右手脈橫癥在左，脈頭大者臍

七表脈顯外者陽也

診候約法

浮為風為虛沈為濕為實遲為寒為冷數為熱為癖滑為驚為痛（一云數為虛為熱濇為實為下）

又云風則脈浮寒則脈緊中暑則脈虛而滑中濕則脈細而濇（活人書云脈沈緩中濕脈細者非也）為傷於陰則脈沈傷於陽則脈浮

辨雜病脈吐汗溫利可否法

弦緊者可下弦遲者宜溫緊數者宜汗脈微者不可吐遲細者不可下沈微者不可汗

人迎氣口脈

人迎脈在左手關前一分（其穴在結喉兩旁同身寸之一寸五分脈動應手者是也）診之以候六淫浮則為風緊盛則傷於寒

氣口脈在右手關前一分診之以候七情浮則為虛為氣緊盛則傷於食

辨三因

寒暑燥濕風熱謂之六淫屬外因

喜怒憂思悲恐驚謂之七情屬內因

疲極筋力盡神度量飲食飢飽叫呼走氣房室勞逸金瘡踒折虎狼毒蟲鬼疰客忤畏壓溺等為不內外因

陳無擇云凡診須識人迎氣口以辨內外因其不與人迎氣口相應為不內外因所謂關前一分人命之主也

定生死訣

陽病得陰脈者死陰病得陽脈者生脈病人不病者死（名曰行尸）人病脈不病者生（為內虛綻廢〇有人病而脈不病既蓋是息數脈與相應者可爾也難經云人病脈不病非有不病者也謂息數不應脈數也脈經云病人微代脈絡上所絕脈訣云病人脈絕不用治夫人病脈不病指安有是理當知難經之說謂息數不應脈數者是也人之初病脈非數則遲此等脈可生若健脈則急大洪數與形證相反者斷不可治）

下指疎密法

凡診視其臂長則疎下指臂短則密下指古人身長其臂亦長故寸部占九分關尺部各占一寸三部共二寸九分今人身短其臂亦短有三部共不及二寸者若依古法診之則頭指診在關部次指診在尺部第三指診在關外如何知病之所在今但以高骨為準逐三指診指其部位不必拘九分一寸之說庶幾可也

察病指南卷之上

察病指南卷之上

辨七表八裏九道七死脉

七表脉屬陽浮芤滑實弦緊洪也（秘寶以洪大浮數緊動滑實為陽傷寒論以大浮數動滑為陽）

浮脉指下尋之不足舉之有餘似水上浮物以手按之虛散舉之有力故名曰浮也（浮為在表主風虛又短氣）

左手寸口脉浮主傷風發熱頭痛目眩及風痰

左手關上脉浮主胃虛腹脹小便難（肝脉本微弦而長今見浮脉周氏云主胃虛腹脹乃是胃經受病何也黃帝云主小便難乃是膀胱經受病又何也蓋肝脉從小腹上挾胃而然耶）浮大而實主眼目昏痛溢關過寸口損應主目眩頭重筋疼浮洪盛大主筋脉緩弱身體無力浮大而長主風眩癲疾

左手尺內脉浮膀胱受風熱主小便赤澀浮而緊主耳聾及淋閉浮而大為陽干陰濇則陰中痛浮而數主小便頻併熱淋

右手寸口脉浮肺感風寒主咳嗽氣促鼻塞清涕冷汗自出背膊勞強夜卧不安（浮本肺脉但全浮則為病如浮濇而短斷為手腕也）浮而實主咽門乾燥傷損有瘡癰浮短為肺傷為逆頭氣浮滑為走刺浮緩為皮膚不仁風寒入肺內浮緊為肺有水

右手關上脉浮脾氣不足腹滿不欲食食不消化積熱在胃中浮滑而疾速者亦然浮緩不思飲食浮而實脾胃虛主消中口乾飲水多食亦飢浮大而濇為宿食滯氣浮滑為飲浮細而滑為傷飲浮而微則傷客熱邪風主病寒熱去來進退不定

右手尺內脉浮大腸受風熱主大便秘澁客熱在下焦浮數主大便堅（大腸雖肺府居下焦）寸關脉浮而疾名陽中之陽主頭痛尺寸俱浮主患氣俱浮而滑男子疝瘕婦人有孕或月閉不通浮滑疾緊為百合病

趺陽脉浮者虛（浮為風為虛風脉則指下浮有力虛脉則指下浮而無力）

芤脉指下尋之兩頭即有中間全無其脉浮大而軟按之中央空兩邊實喻似指按芤葱葉芤葉即葱類中心空虛故名曰芤也（主失血）

左手寸口脉芤主吐血微芤者衄血

左手關上脉芤主腹內作聲有瘀血亦主吐血眼暗

左手尺內脉芤主淋瀝小便赤或有血

右手寸口脉芤主胷中積血瘀血

右手關上脉甚大或腹內暴痛腸胃內有癰積瘀血（治人書云主大便血）
右手尺內脉甚主大腸血痢或下血
滑脉指下尋之三關如珠動按之即伏不進不退或云往來流利按如盤走珠子而有力替替然與數相似故名曰滑也（主熱連）
左手寸口脉滑心藏熱滑而實大心驚舌強
左手關上脉滑肝藏熱上連頭目爲患滑散爲癱緩滑而浮散者有風
左手尺內脉滑腎與膀胱俱熱主小便結澁淋瀝莖中痛尿色赤又滑爲風多血少氣少氣則四肢困弊瘦多血則疼痛小便赤滑而弦主腰脚痛滑而弱主陰中痛（脉賦解義云男子尺部見滑主膀胱冷氣纏聚小腹急脹便旋利數兩脇脹滿真以滑脉主冷亦未可當知有熱論）
右手寸口脉滑陽氣盛實主嘔逆滑而實肺藏大熱主毛髮乾焦胃膈壅滯聚氣爲痰頭目昏重涕唾稠粘咽中乾燥疼痛或時咳嗽
右手關上脉滑脾藏熱主口臭惡氣喘息麁大胃脘先受寒氣變爲熱實飲食不下下則吐逆病脾風亦滑實爲瑞熱滑而大小不勻必吐爲病進爲泄利
右手尺內脉滑下焦有實熱渴而引飲飲冷過甚臍似氷冷腹鳴時痛或下痢婦人主血氣實經月不通（然而尺脉滑者亦本形也脉賦解義云尺脉滑主胞絡極冷女經不調則以滑爲陰脉也）和滑爲姙娠滑而浮大小腹痛滑而弱大便痛（）滑爲鬼疰滑數爲結熱滑爲痰疾
趺陽脉滑者胃氣實
實脉按之洪大牢強隱指愊愊然故名曰實也（主病在內）
左手寸口脉實胸中熱甚及生寒熱實而大主咽面熱風所攻心中躁悶身上疼痛面色赤實大而滑主舌強心驚語話艱難
左手關上脉實主腹中切痛實而浮大肝氣盛主眼目赤痛昏暗
左手尺內脉實主小腹滿痛小便澁實而滑主淋瀝莖中痛尿色赤實而大膀胱熱主小便艱難不通實而緊主腰痛（或本云實緊胃中有寒苦不能食時時利者難治）
右手寸口脉實主上焦熱實而浮是熱乘肺藏咽門乾燥傷損有瘡癰及主氣塞喘咳
右手關上脉實脾藏壅弱飲食減小（熱氣蒸反胃脾虛也）

氣壅滯實而成脾家熱主消中唇口乾燥饒飲（火熱食多不飽四體勞倦陳無擇謂實而緊為胃寒然二脈雖同屬實脉則主熱痛緊脉則主寒痛今二脈俱見謂之主胃寒惡心也）

右手尺內脉實主忽下痢（此則熱痢黃帝脉經於關部云脉實腹滿寒亦下痢夫其陽脉如何主寒亦必矣之說也今下痢移於尺部屬下焦也）弦脉動急如張弓弦故名曰弦也（脉訣以為表脉則屬陽傷寒論以為陰脉賦訣義亦云弦者之脉雖屬於七表論主於陰數說不同直如法之青說共弦而緊數者為陽弦疾而沈且緩細若為陰主拘急○又巢元方王子亨以弦為虛主拘急）

左手寸口脉弦主頭疼有心氣心胸中急痛及心懸如人大飢之狀主勞氣發作乏力多盜汗手足痠痛

左手關上脉弦沈主悪痃癖（痃者懸也以懸於心下或左或右或中也　癖者側也其氣在於脇肋之側或上下左右也）弦而緊者脇下痛為惡寒為疝瘕為瘀血弦小者為寒癖

左手尺內脉弦主小腹急滿痛弦而滑主腰脚痛

右手寸口脉弦主皮毛枯槁

右手關上脉弦主胃中寒有宿食及飲

右手尺內脉弦主小腹中拘急下焦停滯水積弦數為勞瘵雙弦脇急痛弦長為積弦急中風熱（急者緊也弦緊多主寒此言中風熱何也）

緊脉繫之實數似切繩狀來疾而有力故名曰緊也（主痛）

左手寸口脉緊主頭痛緊而沈心中氣逆冷痛

左手關上脉緊主心下苦滿痛及心腹痛筋脉拘急主風氣伏陽上衝化為狂病緊而實主悪痃癖

左手尺內脉緊主臍下及腰脚痛

右手寸口脉緊而沈滑肺氣實主咳嗽

右手關上脉緊主脾中痛脇肋下拘急欲吐不吐乾嘔氣逆（沖或作悶）盛緊者腹脹緊而滑者為宿食為蛔動為吐逆

右手尺內脉緊主下焦疼痛

　緊而長過寸口者為疰病緊而急者為遁尸

　緊而數者寒熱俱發下之乃愈尺寸俱緊而數其人中毒吐逆

洪脉極大在指下舉按滿指或云來大去長故名曰洪也（主熱）

左手寸口脉洪主頭痛胸膈脹滿煩熱

左手關上脉洪肝藏熱及四肢浮熱遍身疼痛足（本屬脾部今四肢浮熱乃見肝部則知關脉主中焦病故肝脾俱可候也）

左手尺內脉洪膀胱熱主小便赤澁兩脚痠疼

右手寸口脉洪主毛髮乾焦涕唾稠粘咽喉乾燥洪而緊為喘急

右手關上脉洪胃中積熱主翻胃大吐逆口乾洪而緊為脹

右手尺內脉洪主大腸不通燥糞結澁

洪大為傷寒熱病洪實為癲洪緊為癰疽洪浮為陽邪來見為祟洪大緊急病在外苦頭痛發癰腫（洪別本云三部俱洪三焦俱熱）

八裏脉屬陰微沈緩濇遲伏濡弱也（秘寳以微沈緩濇遲伏軟弱為陰傷寒論以沈濇弱弦微為陰）

微脉指下尋之若有若無極細而浮軟往來如秋風吹毛而無力故名曰微也（主氣痞）

左手寸口脉微心藏虚多憂惕寒熱更作寒氣上侵心胷痞結陽不足惡寒虚勞盜汗微而浮弱心中寒

左手關上脉微心下氣滿欝結目暗生花四肢拘急

左手尺內脉微主敗血不止男子溺血女子崩血久為白帶

右手寸口脉微上焦寒氣痞結微弱為少氣中寒

右手關上脉微胃中寒氣脹滿飲食不化厥逆拘急

右手尺內脉微小腹寒氣積聚肚痛臍中聲叫而瀉

尺寸俱微男子五勞婦人絕產

微浮秋吉冬病

沈脉舉之不足按之有餘重按乃得故名曰沈也（沈為在裏主冷氣水病一云主瀉冷溺泄）

左手寸口脉沈胷中氣短有寒飲及胷脇痛有水氣沈而緊主心中氣逆冷沈而細名陽中之陰苦悲傷不樂聞人聲少氣自汗兩臂不舉

左手關上脉沈主心下滿氣短促兩脇滿手足時冷沈而弦者主痃癖腹內痛

左手尺內脉沈主冷氣腰背痛小便稠數色如米泔沈而細名曰陰中之陰苦兩脛痠疼不能久立陰氣衰少小便餘瀝陰下濕痒（沈本腎脉但全沈則為病如沈濡而滑則為平脉也）

右手寸口脉沈緊而滑主咳嗽沈細而滑主骨蒸病寒熱交作皮毛乾澁沈細為少氣臂不能舉

右手關上脉沈主心下滿吞酸沈緊為懸飲沈在下則為實

右手尺內脉沈主患水病腰脚沈重而弱沈而緊主腰脚疼痛沈而細者苦腎痛下重痢沈滑者有寸白蟲（此腴蟲見下）為下重背膂痛為風水（腎主水因何見此蓋命門與胃同氣故也）沈弱為寒熱沈遲為痼冷沈重為傷暑發熱沈緊為上熱下冷沈重而中散者因寒食成癥沈重而直前絕者有瘀血在腹沈重不至寸徘徊絕者為遁尸

緩脉指下尋之浮大而軟去來微遲故名曰緩也（主風結）

左手寸口脉緩主脊項筋緊急搐痛（肝主筋今見心部何邪蓋項筋屬上焦故也）

左手關上脉緩主眩暈腹內氣結痛如腹緊之狀

左手尺內脉緩腎虛耳鳴有冷結氣勞為思隨小便難有餘瀝（此冷淋也）

右手寸口脉緩主氣促不安皮膚頑痺不仁為氣不足

右手關上脉緩主風寒入肌肉胃虛不能食緩而滑胃中熱（脾之本脉軟大而緩若今緩則為病脉）

右手尺內脉緩下焦寒脚弱下腫風氣秘滯緩而滑為熱中緩而遲為虛寒相搏食冷則咽痛

濇脉細而遲往來難時一止輕手乃得重手不得按之數浮如輕刀刮竹皮或云三五不調如雨沾沙故名曰濇也（即黃帝濇脉王冰云陽氣有餘則血少故脉濇主身熱無汗此言未足信其實陰虛之脉也主血氣不足如痺）

左手寸口脉濇主榮衛不足無心力不能多言主中霧露冷氣上衝心痛

左手關上脉濇肝藏虛主而散失肋脹脇滿（兩脇下滿）

（骨處為肋肋者勒也以勒五氣肋下無骨處為脇）通身疼痛女子有孕胎痛無孕敗血（謂崩中漏下或卵瘕月信不調之候是也）

左手尺內脉濇腎藏虛亂夢泄不小便數精頻漏及患疝氣小腸氣

右手寸口脉濇上焦冷陽虛衛氣不足痞溢氣促無力背膊刺痛

右手關上脉濇脾氣不足而痛不思飲食胃冷而嘔

右手尺內脉濇主小腹冷作雷鳴及下痢足脛逆冷

澁細而緊者爲寒濕痺

遲脉一息三至去來極遲重手乃得隱隱遲慢故名曰遲也（遲爲腎虛之脉主虛惡寒氣塞滿脹）

左手寸口脉遲主心上寒

左手關上脉遲主腹中冷痛（此臍以上痛也）

左手尺內脉遲主腎虛不安小便白濁身寒體顫夜夢驚悸

右手寸口脉遲主上焦有寒

右手關上脉遲主中焦有寒胃冷不欲食吞酸吐水遲而澁胃中寒有癥結

不見

右手尺內脉遲主下焦有寒腰脚沈重

關尺遲名曰陰中之陰其人苦悲愁不樂少氣力而多汗

伏脉按之著骨乃得不出其位尋之全無故名曰伏也（主物聚）

左手寸口脉伏主胸中有聚物

左手關上脉伏主陰病常欲瞑目

左手尺內脉伏主小腹痛寒疝瘕

右手寸口脉伏主胸中氣滯有痰噎塞不通

右手關上脉伏主中脘有滯物及腸澼水氣溏泄

右手尺內脉伏主宿食不消伏而乳大便去血

濡脉按之似有舉之全無一云按之似無舉之全無力極軟而浮細一云按之不見輕手乃得不任尋指故名曰濡也（即黃帝所謂軟脉焦顛濡軟二字同呼同用主惡寒）

左手寸口脉濡主虛損多汗五心煩熱

左手關上脉濡主體重少力虛弱精神離散

左手尺內脉濡主腎虛損骨髓不溫肉不著骨齒長而枯髮無潤澤腑轉耳鳴濡而弱爲小便難（此冷淋也論大小便難在尺部當參寸部大小腸脉方準）

右手寸口脉濡主元氣敗少力

右手關上脉濡脾氣弱苦虛冷重下痢

右手尺內脉濡主發熱惡寒下元冷極

濡而弱爲內熱外冷自汗（此虛熱盜汗也）

弱脉指下尋之如爛綿輕手乃得重手稍無極軟而弱細按之欲絕指下故名曰弱也（主痠而筋萎及風氣）

左手寸口脉弱主心中悸陽氣虛汗自出

左手關上脉弱主筋痿弱微而浮散主目暗生花

婦人產後客風面腫弱而虛爲風熱（此風虛而客熱）

左手尺內脉弱主骨肉痠痛

右手寸口脉弱陽道虛損衛氣不足弱微而浮散

主氣滯

右手關上脉弱胃氣虛有客熱（不可大攻恐熱去寒起也）

右手尺內脉弱下焦冷無陽氣

古人於左右尺部診大小便往往小驗然大便出於大腸大腸乃肺之府當於右手寸口脉參之小便出於小腸小腸乃心之府當於左手寸口脉參之

九道脉屬陽者二屬陰者七

長脉屬陽指下尋之往來通度三關如持竿狀舉之有餘曰長過於本位亦曰長（黄帝脉經無長脉有散脉

云大為散乃陽盛陰虛之脉焉知散非長也）主渾身壯熱坐卧不安（是陽毒邪熱之氣居於三焦散在於表宜徐徐發表出汗而愈散脉按之滿指六府氣絕於外則手足寒上氣五藏氣絕於內則下利不禁甚者不仁其脉皆散散則不聚病亦危矣）

促脉屬陽陽盛則促疾之極數時止復來曰促主積聚氣痞四肢困劣精神交亂憂思所致（之向前而來漸出關上居寸口或數則[illegible]促也然氣成[illegible]忽然退縮則生瀉如脚冷其促有五曰氣曰血曰飲曰食曰痰以五者有滯不行則止促止促非惡脉也）

短脉屬陰指下尋之往來極短曰短不及本位亦曰短主四體惡寒陰中伏陽三焦氣壅宿食不消宜（[illegible]宜而[illegible]）大瀉通利短而滑者病酒短而數者心

痛煩躁

虛脉屬陰按之不足遲大而軟曰虛主氣血虛生煩熱少力多驚心中恍惚健忘（宜補益三焦即安）虛為脚弱為食不化為傷暑小兒主驚風

結脉屬陰陰盛則結脉往來遲緩時一止復來曰結主胸滿煩躁積氣生於脾藏之傍大腸作陣疼痛宜瀉（三焦而愈）結為痰為飲為血為積為氣（一云氣塞脉緩則為結古人書云陰盛發躁）

牢脉屬陰按之實強有似沈狀一云沈伏實大如按鼓皮曰牢（即黄帝所謂革脉也）主骨肉疼痛皮膚紅

腫胃中氣壅喘息短促（此心絕之脉也）尺脉牢男子主陰疝偏墜女人主血崩瘕聚（胞腎原尺小脉牢使然）而長關中無為陰干陽若兩脛重小腹引腰痛革為滿為急為虛寒相搏婦人半產漏下男子亡血失精

動脉屬陰指下按之無頭尾大如豆沈沈微動不來不往曰動主四體虛勞疼痛崩中血利為驚恐為攣為泄（脉經悉皆以動為陽脉則發汗關上陰陽相搏為動陽動則汗出陰動則發熱）

細脉屬陰指下尋之細如線來往極微曰



細主脛痠髓冷乏力損精囊下濕痒小便遺瀝
細為氣血俱虛為病在内為積為傷濕為後泄
為寒為神勞為憂傷過度為腹滿細而緊為寒
病為癥瘕積聚為刺痛細而滑為僵仆為發熱
為嘔吐



代脉屬陰指下尋之往來緩動而中止不能自
還因而復動或云藏絶中止餘藏代動主
形容羸瘦口不能言（若得之生少得之[illegible]婦人亦然有孕約三月餘日也）
（代為五藏氣絶之脉）
右前七表八裏九道共二十四脉按諸家脉書

皆二十四脉互有少異但無濡牢長短四脉却
有數革動散四脉若取諸家脉經觀之乃有數
革軟散大四脉（革軟散脉已見於前）
數脉屬陽指下尋之去來急速一息六至曰數
主熱數為虛為煩渴為煩滿寸口脉數主頭痛
關上脉數脾熱口臭生瘡胃熱嘔吐尺内脉數
下焦寒小便黄赤（言虛當如浮脉説）



大脉屬陽指下往來滿大主熱大為病進寸口
脉壯大尺中無此為陽干陰若腰背痛陰中僥
足脛寒大而堅疾主癲病（大脉即洪脉此陽盛之脉如何主癲經云）

重陽者狂重陰者癲謂主狂病
七死脉
彈石脉在筋肉皮按舉皆勞々急曰彈石是肺
絶死脉也（彈石脉者蕭處厚謂肝絶之脉此説既未穏呉仲賓又推廣之以為氣両方金々肝元絶其説亦似當以為腎絶之脉両也石沙腎之本脉合沈滑而濇今真藏脉現如彈石辟々然奏指殊無息數其死無疑矣）



解索脉在筋肉上動數而隨散亂無復次第曰
解索是五藏絶死脉也（王叔和云解索散散而無聚呉仲賓云解索底）
若其形見於兩尺脉來指下散而不聚其分散
兩畔更無息數是精髓已耗竭死之候也
雀啄脉在筋肉來而數急曰雀啄（是心絶死脉也王叔和云



雀啄頓來而又往呉仲賓云雀啄者木脉也）主脾無穀氣已絶胃氣
無所榮養其脉來指下連連湊指數急殊無息
數但有進而無退頓絶自去良久准前又來宛
如雞啄食之貌但數日之壽也（據此所云則脾絶之脉蕭處厚謂之心絶何耶王叔和云雀啄頓來而又往此雀啄木見也呉仲賓因其頓來之説遂認為木脉者肝脉也其説亦似當以脾絶為是）



屋漏脉在筋按之止將起而不相連曰屋漏是
心肺絶死脉也（王叔和云屋漏將絶而復起呉仲賓云屋漏脉者主胃[illegible]絶）
穀氣空虛其脉來指下按之極微二十息之間
或來至若屋漏之水滴於地上而四畔濺起
之貌立死之候也據此云乃胃絶之
脉何蕭處厚謂心肺絶脉耶

蝦遊脈在皮毛浮而再起尋還退沒不知所在進退而去速曰蝦遊是脾胃絕死脈也（王叔和云蝦遊冉冉而進退難尋其仲景云蝦遊之狀其來指下若蝦遊於水面沉沉而不動瞥然驚掉而去將手欲趁杳然不見須臾於指下又來良久准前復去如蝦蟆入水之形瞥然而上倏然而去此是神魂已去行尸之候立死也）

魚翔脈在皮肉上如魚不行而但掉尾動身躁而作又曰魚翔是腎絕死脈也（王叔和云魚躍澄澄而遲疑擺尾其仲景云魚翔之脈去腎與命門皆絕衛氣與榮血兩亡其脈來指下尋之即有沉沉身直前定而後動殊無息數若魚遊於水面頭不動而尾搖擺之貌故曰魚翔也又曰亡陽之候死矣甚旦夕死夕占旦死日中占夜半死夜半占日中死）

釜沸脈在皮肉上涌涌如羹上肥曰釜沸是死脈也

診七表相承病法

浮芤相傳中風衄血　浮滑相傳中風吐逆

浮實相傳中風下痢　浮弦相傳中風拘急

浮緊相傳中風體痛　浮洪相傳中風發熱

察病指南卷之中

察病指南卷之下

審諸病生死脈法

傷寒類

傷寒熱盛脈浮大者生沉小者死

傷寒頭痛脈洪大者可治實牢者生沉細者死

傷寒已得汗脈沉小者生浮大者死

傷寒咳嗽上氣脈散者死（亂其形損故也）

瘟病類

瘟病三四日不得汗脈細難得者死

瘟病瀼瀼大熱脈細小者死

瘟病身體溫脈洪大者可治微細者劇

瘟病大便不利腹中痛甚者死

熱病類

熱病三五日身體熱腹滿痛食飲如故脈直而疾者八日死

熱病七八日氣不喘脈不數者當後三日溫汗汗不出者死

熱病七八日脈微細小便黃赤口燥舌焦乾黑者死

熱病已得汗脈安靜者生躁盛者氣極也必死

熱病汗後脉靜者當便瘥尚熱脉亂者死

熱病脉躁盛得汗者生不得汗者陽極也十死不治

熱病已得汗常大熱不去者死（脉必盛也）

熱病已得汗熱未去脉微躁者切不得鍼灸

熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭切勿鍼灸汗不出者必死

水病類

水病脉洪者可治微細者不可治

水病腹大如鼓脉實者生虛者死

水病陰閉脉浮大者生沈細虛小者死

痟渇類

痟渇脉數大者生細小浮短者死（一云虛小者死）

痟渇脉實大病久可治脉小緊急不可治（人病口甘而渇此因數食甘美而多肥五氣之溢也謂之脾癉或病口苦而渇此因數謀慮不決膽氣上溢也謂之膽癉凡痟癉之脉實大病久可治懸小堅病久不可治）

泄瀉類

泄而腹脹脉弦者死

腹大而泄脉微細而澁者生緊大而滑者死

泄注脉緩微小者生浮大數者死

泄下脉細者可治浮大者劇

洞泄食不化下膿血脉微小者生緊急者死

下痢類

下痢脉微小者生大而浮洪者死

下痢膿血脉懸絶者死滑者生

下痢白沫脉沈者生浮者死

腸澼類（痔也）

腸澼下白膿（一云白沫）脉沈者生浮者死

腸澼下膿血脉沈小流連者生數疾不熱者死

腸澼下膿血脉懸絶者死（一云懸濇）浮大者生

腸澼身不熱脉不懸絶滑大者生懸濇者死

腸澼有寒者生有熱者死

腸澼筋攣脉細小安靜者生浮大堅者死

咳嗽類

咳嗽脉浮直者生沈堅者死

咳嗽羸瘦脉堅大者死

嗽脱形發熱脉緊急者死

嗽而嘔脉弦欲絶者死

諸嗽脉浮軟者生沈伏者死

上氣類

上氣脉數者死
上氣浮腫脉浮滑者生微細者死
上氣面浮腫肩息脉大不可治加利必死
上氣喘息低昂其脉滑手足溫者生脉澁四肢寒者死
寒氣上攻脉實而順滑者生實而逆澁者死

中風類

中風口噤脉遲浮者生急實大數者死
被風不仁痿厥脉虛者生堅者死

癲狂類

癲狂恍惚病脉實牢者吉沈細者凶
癲疾脉大而滑者久久自已脉小緊急者死
狂病妄語身微熱脉洪大者生四肢逆冷脉沈細者不日死

霍亂類

霍亂脉微細者生微遲氣少不言者死（一云脉浮洪者生）

頭目類

風痰頭痛脉浮大者生短濇者死
頭目痛卒視無所見者死
病目不見人脉濇者生浮大洪直者死
閉目不欲見人脉浮短而濇者死
開目而渴心下牢脉沈濇而微者死

心腹類

心腹痛脉沈細者生浮大弦長者死
心腹痛積聚脉堅急者生虛弱者死
心腹積聚其脉勁強者生沈小者死
心下堅硬苦渴脉沈細者生浮大而堅者死
腹脹脉浮大者生虛小者死

汗類

病多汗脉虛小者吉緊者凶
病汗不出出而不至足者死
厥逆汗出脉緊弦急者生虛緩者死

血類

吐血而欬上氣脉數有熱不得臥者死
吐血衂血脉滑小弱者生實大者死（一云沈細者生浮大者死）
（一云浮大而牢者死）
衂血汗出脉小滑者生大躁者死
唾血脉堅強者死滑者生
瘀血在內腹脹脉牢大者生沈者死

金瘡類

金瘡出血太多脈虛細者生實大者死（急疾[illegible]者死[illegible]）

（血出不斷脈大而止者三七日死一云[illegible]瘀者失血四五斗脈微緩而遲者生急疾者死）

金瘡失血脈沈小者生浮大者死（一云實大而滑者死）

墜墮類

從高頓仆內傷腸痛脈堅強者生小弱者死

中毒類

中毒藥脈洪大而速者吉細而但出不入并大小

不齊者皆凶

卒中惡毒脈大而緩者生（一云微細者生）堅而緊而浮者死

中惡腹脹脈緊細者生浮大者死（脈緊細微者生緊大而浮者死）

中惡吐血數升脈浮大而疾者生沈數細者死

患蠱毒尺寸脈緊數而直硬者死

雜病類

咳而尿血脈微細者生大者死

寒熱瘈瘲脈代絕者死

外實內熱吐瀉脈沈細者生洪大者死

內實腹脹痛乾嘔手足煩熱脈洪大實者生沈細

者死

陰陽俱竭齒上如熟小豆脈躁者死

身熱脈浮溢者死

無故而瘖脈不至此氣暴厥氣復則已

病人肌寒脈細氣少泄痢飲食不入是謂五虛其

人必死

病人漿粥入胃泄注止則肌大熱前後不通胃悶

脈盛是謂五實其人必死若得身汗後利則生

老人脈微陽羸陰強者生脈躁大加息者死陰羸

陽強脈至而代奇日而死

病甚脈洪大者易瘥脈不調者難瘥

病人脈實大急數者凶

左手寸口脈偏動乍大乍小從寸至關從關至尺

三部之位處處動搖各異不同其人仲夏得此

脈桃葉落時死脈若小急者偏枯年不滿二

十者三歲死脈至而搏嘔血身熱者死

右手寸口脈偏沈伏乍大乍小朝來浮大暮夜沈

伏浮大則上過魚際沈伏則下不至關來往無

常時伏又來者榆葉枯落時死

三部脈皆澀皆滑皆緊急皆軟弱皆如張弓皆微

而伏皆細而數皆累累如珠者長病人得之皆

死

診太衝衝陽脈

太衝穴在兩足大指本節後二寸陷中動脈是（一云一寸半）足厥陰之所注診此者可決男子之死生（或診太谿命門脈穴在足内踝後跟骨上動脈陷中也）

衝陽穴（一名會源即趺陽穴也）在足跗上五寸骨間動脈上去陷谷三寸是（即足陽明胃之所繫）診此者以察其胃氣之有無也

論病之本

肝惡風諸風掉眩其本在肝

心惡熱諸熱昏瘈瘛血疾其本在心

脾惡濕諸濕腫滿其本在脾

肺惡寒諸氣憤鬱其本在肺

腎惡燥諸寒收引其本在腎

諸厥痼泄其本在下

諸痿喘嘔其本在上

察雜病生死證

癰病腰脊强急瘈瘲者不可治

肌瘦脉形熱不去者死

尸厥體無所知耳內有聲如嘯汗出身溫者[illegible]自

脣青身冷者必死

內外俱虛身體冷汗出微嘔而煩擾手足厥逆躁不安靜者死

形羸不能服藥穀氣絕也　丁病瘥已　丁病復生五行勝復相乘也其人必死

五藏虛實外候

肝實則目赤脇痛多怒頰腫頭旋耳聾宜瀉之虛則目暗筋攣脇拘多悲恐爪甲枯不得太息宜補之

心實則胸脇背膂盡痛喜笑不休口舌乾燥宜瀉之虛則少顏色驚悸憂悲舌根强腰背痛宜補之

脾實則腹脹大便不利足萎不收行苦脚下痛身重苦飢宜瀉之虛則吐逆腹脹腸鳴飲食不化泄利無時宜補之

肺實則肩背股脛皆痛喘嗽上氣宜瀉之虛則少氣咳血耳聾嗌乾宜補之

腎實則腹脹[illegible]腫汗出憎風面目黧黑少氣[illegible]泄小便黃色宜瀉之虛則腹中冷（[illegible]）脊疼耳聾腰冷無時小便色變宜[illegible]其[illegible]補之

藏府病外候

喜寒而欲見人爲府病屬陽喜温而不欲見人爲藏病屬陰

診婦人病脉生死訣

婦人胞中絶傷有惡血久結成瘕其病腹痛逆滿氣上衝尺脉濇如堅爲血實氣虚尺脉細而微血氣俱不足穀氣不充得（此病[illegible]葉生時不）

婦人赤白帶下脉遲滑吉數（疾者凶）

婦人新産脉緩滑者生實大弦急者死沈（小者吉）堅牢者凶寸口脉沈微附骨不絶者雖疾不調者死

婦人已産脉沈小實者吉浮虚者凶

婦人産後熱病脉細四肢煖者生脉大而肢冷者死

胎蓐脉緩滑沈小細者生實大弦急堅牢者死卒

胎脉

脉動入産門者有胎也（謂出於尺脉之外名曰産門）

尺中脉數而旺者有胎脉也（一云細滑而不絶者是也一云脉微是孕）

（脉閉塞成胎也或帶數是血蓄之時有胎也）

左手尺脉浮洪者爲男胎右手尺脉沈實者爲女胎

關部脉滑者爲有子（素問曰滑爲多血少氣故有子也）

左手寸口脉浮大爲懷男右手寸口脉沈細爲懷女

足太陽膀胱脉洪大是男孕手太陰肺脉洪大是女孕

陽脉皆爲男陰脉皆爲女

陰中見陽爲男陽中見陰爲女

手少陰脉動甚者姙子也

兩手尺部俱洪者爲兩男俱沈實者爲二女（一云左手帶縱爲兩男縱者夫乘妻也即兒成脉也王氏脉經云水行乘火金行乘木名曰縱也右手帶横爲兩女横者妻乘夫也即所勝脉也謂火行乘水木行乘金名曰横也）

左手脉逆爲三男（逆者子乘母也即已所生脉也王氏曰水行乘金火行乘木名曰逆也）

右手脉順爲三女（順者母乘子也即生已之脉也謂金行乘水木行乘火名曰順也）

寸關尺脉大小遲疾皆相應雙懷一男一女（一云足太陽手太陰脉俱洪者一男一女）

脉滑而疾者三月胎候也但疾不散者五月也

關上一動一止者一月二動一止者二月（准此推之萬不失）矣

中衝足陽明胃脉連胞絡脉來澁疾者受孕多九旬

尺脉沈細而滑或離經夜半覺痛日中則生

外候胎法

左乳先有核者爲男右乳先有核者爲女

又法令孕婦面南行於背後呼之左回來者生男右回來者生女

妊娠雜病生死外候

血漏胞乾者殺胎亦損姙母

心腸急痛面目青色冷汗自出氣欲絶者死

血下不止胎衝上四肢冷悶者死

墜重頰仆致胎死腹中未出而血不止衝心悶痛者死

產難外候

寒熱頻作舌下脉青而黑舌捲上冷子母俱死

唇口俱青痰沫唾出子母皆死

面赤舌青而冷子死

面舌俱青痰沫頻出子活母死

面青舌赤口中沫出母死子活

診小兒雜病脉法

凡小兒五歲以下三歲以上只看形五歲以上漸可診脉呼吸八至是常脉也九至者病十至者困（許氏以大指按三部十至爲發熱五至爲内脹）

小兒脉浮而數主乳癇風熱之病

小兒脉浮而數主五藏壅（因乳熱或著綿衣過多加此）

小兒脉虛濡主驚風（及浮則主風促急主風驚）

小兒脉緊主風癇

小兒脉緊而弦主腹痛不安

小兒脉弦急主氣纏繞不和

小兒脉牢而實主大腸秘

小兒脉沈而數主骨中寒（此數爲虛虛則髓少故骨中寒）

小兒脉沈而細主冷

小兒脉大小不等乍大乍小皆有禍祟

小兒脉小或緩或沈皆主食不消化

小兒變蒸之時身熱脉亂汗出不欲食乳食即吐切不可醫必自瘥（其候身熱神昏或吐乳瀉黄沫多啼無青悅唇上生白珠子是也每三十二日必一變六十四日再變兼蒸或二十八日及三十日必變者亦無定期至二三五日方歇歇後精神必有異於前也）

辨小兒生死脉

小兒中風熱喘鳴肩息脉緩則生急則死

小兒痢疾脉浮大而腹痛者必死

乳子病熱脉懸小手足温則生寒則死

小兒因汗出如珠著身不流者死

小兒有病胷陷口唇乾目直視口中氣冷頭低卧下擧身手足垂軟身體強直掌中冷皆不可治

脉亂者同

小兒死證一十五候歌

眼上赤脉　下貫瞳人　顖門腫起
兼及作坑　鼻乾黒燥　肚大青筋
目多直視　覩不轉睛　指甲黒色
忽作鴉聲　虚舌出口　齧齒咬人
魚口氣急　啼不作聲　蛔蟲既出
必是死形

看小兒虎口訣

凡嬰孩生下一月至三歲當看虎口内脉兩邊有脉（黄青紅紫黒五色除黄色爲平和黒色爲危急外青紅紫色可以察病）

青色受胎氣不全主驚積多搐搦

指脉深青卧不寧　微青腹痛糞多青
青兼黒色盤腸吊　發搐牽抽不暫停
紅色驚入脾家

孩兒指脉深紅色　發熱驚悸自強直
微紅下痢腹中疼　吐瀉脾虚多不食
紫色胎驚熱
指中紋生紫色深　驚時哭泣又呻吟
微中紫色腸中痛　吐瀉紋蠶主惡心

聽聲驗病訣（聲者五藏之音也）

肝應角其聲悲而和雅

心應徵其聲雄而清明

脾應宫其聲慢而緩大

肺應商其聲促而清冷

腎應羽其聲沈而細長

聲悲是肝病（一云聲呼）

聲慢是脾病（一云聲歌）

聲沈是腎病（一云聲呻）

聲清是膽病

聲速是胃病

聲微是膀胱病

聲雄是心病（一云聲笑）

聲促是肺病（一云聲哭）

已上藏病也

聲短是小腸病

聲長是大腸病

已上府病也

聲悲慢是肝脾相尅病

聲速微細是胃膀胱相尅病

聲細長是實　聲輕是虚

聲沈麁是風

聲短細是氣（一云）聲麁是熱　一聲短遲是瀉
聲病長是痢　一聲實是秘澁
　察五藏色（知生死訣）色者氣（華也）
肝病面青如翠羽或如蒼苔之澤者生如藍如地
苔如草茲如枯草眼睛陷入者三十日死
面腫蒼黑舌卷而青四肢乏力兩眼如盲泣出
不止八日死此肝藏絶也（一云中熱嗌乾善溺心煩舌卷卵上縮）
病人筋絶爪甲枯黑八日死
面青目黃半日死（一云五日死）
手足甲青頰呼罵者是筋絶九日死

項筋舒展者死
目無精光齒齗黑者死
病人目眶絶系不能正臨絶也
心病面赤如雞冠之色或如帛裹朱者生如衃赭
如衃血如凝血一日死
面黑肩息直視掌腫沒紋狂言身熱一日死
心藏絶也
面赤目青者立死
病人脉絶口張唇青毛髮乾堅五日死
又病人兩頰顴赤口張氣直者死

脾病面黃如蟹腹如羅裹雄黃者生如枳實如黃
土色四肢腫起者九日死
面浮黃臍胅腫滿洩瀉下痢肌澁唇反十二日
死此脾藏絶也
人中滿背青三日死
唇青體冷遺尿背食四日死
肩息直視唇焦者死
體腫溺赤頻數不止者是肉絶六日死
口目動作善驚妄言冒絶也
目皆黃者病欲愈有胃氣也

面如土色不食者四日死胃氣絶也
肺病面白如豕膏或如白璧之澤者生如鹽如堊
如枯骨者死
口鼻氣出唇反無文色黑似煤皮毛乾焦爪甲
枯折者三日死此肺藏絶也
面白毛折者死
髮直如麻者半日死
腎病面黑如烏羽或如黑漆而澤者生如炲如炭
煤耳色瘦黃兼卒呻吟四日死
面黑齒痛兩目如盲白汗如水腰折泄重皮肉

濡結髮無潤澤者四日死此腎藏絶也
病人骨絶齒如熟豆十日死
耳目口鼻黑色起者死
面黑目白者八日死
面腫蒼黑者死
脊痛腰重不能反覆者死
面黑齒長而垢腹脹閉不得息善噫善嘔皮毛焦腎藏絶也
大凡黄赤為熱白黑為寒青黑為痛
病人脚趺腫起身體沈重卒失尿溺妄語錯亂忽作屣臭陰嚢皆腫口反張爪甲黑兩目直視皆死證也
頭傾視深精氣將奪謂項不能舉天柱骨折也轉腰不能腎氣已憊背曲肩隨府氣已壞其音嘶者是氣不朝肺聲散者肺損也凡見此證不出三歲

攻味知病法

好食酸則肝病　好食苦則心病
好食甘則脾病　好食辛則肺病
好食鹹則腎病
好食熱則内寒　好食冷則内熱

原夢

肝氣盛則夢怒　心氣盛則夢喜
脾氣盛則夢歌樂　肺氣盛則夢哭
腎氣盛則夢恐懼
上虚則夢墮　下虚則夢飛
陽盛則夢大火而燔灼
陰盛則夢大水而恐懼
陰陽俱虚則夢相殺毀傷
甚飽則夢予　甚飢則夢取
短蟲多則夢聚衆
長蟲多則夢相擊毀傷

察病指南卷之下

王叔和脉訣余於其滑實弦緊四脉有疑焉滑弦之脉略論於前而實緊之脉未盡其蘊仲景以浮緊為傷寒用之常驗矣嘗稱其脉或以為熱或以為寒余謂實不當以寒言姑併錄之以俟明哲者

○正保三（丙）戌歳仲春　中野小左衛門

鏡録序[illegible]

傳變不常。有本傳。越經傳。巡經傳。

[illegible]傳。表裡傳。上下傳。須刻之

人死生者。惟醫爲耳

八裡九道形似難

殺人者多也。元若

一書。只以舌

[illegible]誠

畫。如舌々黑而紫。黑而湿潤。黑而濡[illegible]而柔軟。皆寒症也。黑而腫。黑而焦。黑而乾澁。黑而捲縮。黑而堅硬。黑而芒刺。黑而拆裂。皆熱症也。學醫者。推類以盡其餘。則庶幾矣。予在南都。偶得此書。深珍重之。後會副憲篤齋湯公。出是編示之。極稱其善。已命工梓行。會稽尚矣。予患天下之人。未盡知也。復梓之以廣其傳云。

賜同進士出身大理寺左寺正陳楠書。

傷寒金鏡錄論。

傷寒一書。自漢張仲景先生。究其精微。得其旨趣。乃萬世之龜鑑也。論中梓訛難明。晉叔和成其章序成無擇明理論劉河間五運六氣參同仲景鈐法則病之所變預可知也陰陽傳變汗瘥圖局曰汗曰吐曰下死生吉凶棺墓圖局曰死曰生隨治隨效如響應聲則萬舉萬全矣元敖氏辯舌三十六法傳變吉凶深為妙也舌乃心之苗心君主之官應南方赤色甚者或燥或澁青白黑是數者熱氣淺深之謂舌白者肺金之色也由寒水甚而制火不能平金則肺自甚故色白也舌青者肝木之色也由火甚而金不能平木則肝木自甚故色青也色青為寒者訛矣仲景法曰少陰病下利漬穀色青者熱在裡也大承氣湯下之舌黃者由火甚則水必衰所以一水不能制五火而脾土自旺故色黃也舌紅為熱

心火之色也或赤者熱深甚也舌黑亦言爲熱者由火熱過極則反兼水化故色黑也五色應五藏固如此敖氏以舌白者邪在表未傳于裡也舌白胎滑者痛引陰筋名臓結也舌之赤者邪將入也舌之紫者邪毒之氣盛也舌之紅點者火之亢極也舌之燥裂者熱之深甚也或有黑圈黑點者水之萌發也舌根黑者水之將至也舌心黑者水之已至也舌全黑者水之體也其死無疑矣舌黄者土之正色也邪初入於胃則本色微黄發見舌黄白者謂熱而大腸寒也舌之通黄者則胃實而大燥也調胃承氣湯下之黄自去矣舌灰黑者厥陰肝木相承速用大承氣湯下之可保但五死一生大抵傷寒傳變不一要須觀其形察其色辯其舌審其症切其脉對證用藥在於活法如脉浮緊而濇者日數雖多邪在表也汗之而愈若脉沉實而滑日數雖少邪在内也下之而痊其有半表半裡傳到少陽只一證則小柴胡湯主之無不効也太陰腹滿自利脉沉而細者附子理中湯主之太陰腹滿時痛便硬者桂枝加大黄湯主之少陰舌乾口燥津不到咽者人參白虎湯主之少陰發熱而惡寒脉沉而遲者麻黄附子細辛湯助陽而汗之厥陰舌卷囊縮脉沉而弦者爲毒氣藏脉沉而短者用承氣湯下之若厥冷耳聾囊縮脉而弦者少陽兩感不治之症也此則三陰有可汗可下可温之理敖君立法辯舌自爲專門體認之精當時嘗著點〻金及金鏡錄二書皆秘之而不傳余於正德戊辰歲見一人能辯舌色用藥輙効因扣之彼終不言偶於南雍得金鏡錄歸檢之乃知斯人辯舌用藥之妙皆本是書惟點〻金一書則於傷寒家多有不切其與仲景鈐法與言同者特金鏡錄爾故余並刊於官

舍使前人之書皆得以行於世而四方學者亦知所去取云

序

南京太醫院院判長洲薛己識

嘉靖己丑歲仲冬吉旦

青藩良醫所良醫馬崇儒校刊

元敖氏傷寒金鏡録

清碧學士杜先生著

凡傷寒熱病。傳經之邪。比雜病不同。必辯其脉症舌表裡汗下之。庶不有悞。况脉者。血之腑。屬陰當其得病之初。正氣相搏。若真氣未衰。脉必滑數而有力。病久熱甚。氣衰脉必微細而無力。方數而甚也。但可養陰退陽。此識脉之要也。或初病即惡寒發熱。後必有渴水燥熱之證。或逆厥而利。

熱證傳經之邪也。若始終皆熱症。惟熱而不惡寒。故傷寒為病初。則頭痛必無發熱惡寒渴水之症。一病便有逆厥泄利。或但惡寒而無發熱。此寒症也。此識症之妙也如舌本者。乃心之竅。於舌心屬火。主熱象離明。人得病。初在表。則舌自紅而無白胎等色。表邪入於半表半裡之間。其舌色變為白胎而滑見矣。切不可不明表症。故邪傳於裡未能。則舌必見黃胎。乃邪已入於

最急宜下之。胎黃自去。而疾安矣。至此醫之不依次。誤用湯丸。失於遲下。其胎必黑。變症蜂起。此為難治。若見舌胎如漆黑之光者。十無一生。此心火自炎。與邪熱二火相攻。極熱則有兼化水象。故色從黑。而應水化也。若乃臟腑皆受邪毒。日深為症。必作熱症。雖宜下之。乃去胃中之熱。否則其熱散入絡臟之中。鮮有不死者。譬如火之自炎。初則紅。過則薪為黑色炭矣。此亢則害承迺制。今以前十二舌。明著。猶恐未盡諸症。復作二十四圖。并方治列於左。則區區推源尋流。實可決生死之妙也。

至正元年一陽月上澣之日

傷寒用藥說

夫醫者。何猶防之將也。凡被人疾。在究其淺深之異。而療之。且疾之襲人。若寇之侵境。方其至也。必瞰其勢之強弱。先以安撫次以講和。戒嚴守禦。以防其逆也。如堅然

不退。至再至三。恣強肆侮。意謀土地也。當此之際。柰何以選將鍊兵。剋期攻戰。寇滅乃已。若愴惶無措。則地土陷矣。豈非將者不識韜畧。不知合變。以致誤也。可勝嘆哉。夫今之醫。不閱方書。不察脉理。臨症茫然。當解而不解。當吐下而不吐下。畏首畏尾。顛倒錯亂。助病日深。殊不知醫乃司命。其可輕忽如此。大抵病之輕淺者。即為和解。深重者。即便攻擊。故曰。用藥之時。膽欲大而心欲小。毋使君臣失職。佐使不當。反嫁疾爲咎餘如將之用兵。進退合宜。操存有法。何疾之不知也。余每察脉用藥。覺有疑滯。幸承先師之誨。故姑撮其要領。以告後人云。

至正改元一陽吉日

永和三仙至人蕭璜鳴書

元敖氏掑經傷寒金鏡録

白胎舌



舌見白胎滑者。邪初入裡也。丹田有熱。胸中有寒。乃少陽半表半裡之證也。宜用小柴胡湯梔子豉湯治之。

小柴胡湯

柴胡（四錢） 黃芩 甘草 人參（各二錢）

半夏（二錢）

右㕮咀每服一兩。水一鍾半。姜三片。棗

一枚。煎至一鍾。温服。

將瘟舌



舌見紅色。熱蓄於內也。不問何經。宜用透頂清神散治之。

透頂清神散

猪牙皂角 細辛 白芷 當歸

右為細末。各等分。和匀。病人先噙水一口。以藥少許吹鼻內。吐出水。取嚏為度。如未嚏。仍用此藥吹入。凡瘟疫

之家不拘已未患者。皆宜用之。

中焙舌



舌見紅色。內有黑形如小舌者。乃邪熱結於裡也。君火熾盛。反兼水化。宜凉膈散。大柴胡湯下之也。

凉膈散

生甘草（二兩） 大黃（二兩） 連翹（四兩） 山梔子（一兩）

薄荷葉 黃芩 朴硝（各一兩）

每服一兩。水二盞。淡竹葉二十餘片。煎至

一盞。去滓入生蜜少許。不拘時熱服。以利為度。

大柴胡湯

柴胡（四錢） 黃芩 芍藥（各一錢五分） 半夏

大黃（二錢五分） 枳實（麸炒二錢）

右㕮咀每服八錢。水一鍾半。姜三片。棗一枚

煎一（鍾温服）

生斑舌



舌見紅色而有小黑點者。熱毒乘虛入胃。蓄熱則發斑。宜用玄參升

麻葛根湯化斑湯解之。

玄參升麻葛根湯（即玄參升麻湯加葛根方見後。）

化斑湯（即白虎湯人參見方後）

紅星舌



舌見淡紅中。有大紅星者。乃少陰君火熱之盛也。所不勝者假火勢以侮脾土。將欲發黃之後也。宜用茵陳五苓散治之。

五苓散

澤瀉（二兩五錢）　茯苓　猪苓　白术（各一兩五錢）

官桂（五錢）　木通　滑石（一兩）　甘草（炙一兩）

右為末。每服五錢。入薑汁。并蜜各少許。用白滾湯調服。

黑尖舌



舌見紅色。尖見青黑者。水虛火實腎熱所致。宜用竹葉石膏湯治之。

竹葉石膏湯方見後

裡圈舌



舌見淡紅色。而中有一紅暈。沿皆純黑。乃餘毒遺於心胞絡之間。與邪火鬱結。二火亢極。故有是症。以承氣湯下之。

承氣湯

炙甘草（三錢）　大黃（六錢）　硝（二錢）

右㕮咀用水一鍾半。先煎甘草大黃將熟去渣。下芒硝。再煎三五沸。頓熱服。

人裂舌



舌見紅色。更有裂紋如人字形者。乃君火燔灼。熱毒炎上。故發裂也。宜用涼膈散治之。

涼膈散

方見前

虫碎舌



舌見紅色。更有紅點如虫蝕之狀者。乃熱毒熾甚。火在上水在下。不能相濟故也。宜用小承氣湯下之。

小承氣湯方見前

厥陰舌



舌見紅色。內有黑紋者。乃陰毒厥於肝經。肝主筋。故舌見如絲之形也。用理中合四逆湯治之。

四逆湯

附子（一枚去皮生作八片）　甘草（六錢二分半）　乾姜（半兩炮）

右㕮咀每服五錢水一鍾煎六分不拘時溫服。

理中湯　以法如前

人參　甘草（炙）　乾姜（炮）　白术（炒）

裡黑舌



舌見紅色。內有乾硬黑色。形如小長舌有刺者。此熱毒熾甚堅結大腸金受火制不能平木故也。調胃承氣湯下之。　承氣湯服法照前

炙甘草（三錢）　大黃（六錢）

芒消（二錢）

死現舌



舌見黑色。水剋火明矣。患此者百無一治。　右前舌惟有色啚。恐其久而渝淡。無辨故註之

黃胎舌



舌見尖白。根黃。其表證未罷。須宜解表。然後方可攻之。如大便秘者。用涼膈散。加硝黃泡服。小便濇者。五苓散。加木通。合益元散。加薑汁少許。以白滾湯。不拘時調服。

涼膈散　五苓散　二方俱見前

寒心舌



舌見弦白。心黑。脉沉微者。難治。脉浮滑者。可汗。沉實者可下。始病即發此者。乃危殆之甚也。調胃承氣湯下之。

調胃承氣湯方見前

十五舌



舌尖白胎二分。根黑一分者。必有身痛惡寒。如飲水不至甚者。五苓散自汗。渴者白虎湯下。利者解毒湯可。此亦危症也。

五苓散方見前

白虎湯

知母（一錢五分）　甘草（炙一錢）　石膏（四錢）　糯米（一撮）

右㕮咀每服一兩用水一鍾半入糯米先煎。下諸味再煎去柤服之加人參亦可

解毒湯

黃連（一兩）　黃柏（五錢）　山梔子（二十枚）

黃芩（五錢）

右㕮咀每服五錢水一鍾半煎至一鍾去柤熱服

十六舌



舌見白胎。中有小點亂生者。尚有表證。其病来之雖惡。宜涼膈散微表之。表退即當下之。下用調胃承氣湯。

涼膈散　調胃承氣湯（二方見前）

十七舌



舌見如灰色。中間更有黑暈兩條。此熱乘腎與命門也。宜急下之。服解毒湯。下三五次。遲則難治。如初服。加大黃酒浸泡量大小用之。

解毒湯（方見前）

十八舌



舌見微黃色者。初病即得之。發譫語。此由失汗表邪入裏也。必用汗下兼行。以双解散加解毒湯兩停主之

双解散加解毒湯　防風　川芎　當歸

芍藥　大黃　麻黄　連翹　芒硝（各半兩）

石膏　黃芩　桔梗（各一兩）　滑石（三兩）　甘草（二兩）

荊芥（半兩）　白朮　山梔（各半兩）

右㕮咀每服一兩水一中半姜三片煎八分服不拘時一云有桂枝二兩

十九舌



舌中見白胎。外則微黃者。必作泄。宜服解毒湯。惡寒者五苓散

解毒湯（方見前）

五苓散（方見前）

二十舌



舌見微黃色者。表證未罷。宜用小柴胡湯合天水散主之。可下者大柴胡湯下之。表裡雙除。臨證審用之

天水散

太原甘草（炙一兩）　桂府滑石（六兩）

右各另為末。每服五錢。入生姜汁并蜜各少許。用白滾湯任意調服。如發表。用豆豉葱頭煎湯調服

大柴胡湯　小柴胡湯（二方見前）

廿一舌



舌有黃心色者。必初白胎而变黃色也。皆表而傳裡。熱已入胃。宜急下之。若下遲。必變黑色。為惡症。為惡亢害。及賊邪氣深也。不治。宜用調胃承氣湯下之

承氣湯（方在前）

廿二舌



舌左有白胎而自汗出者不可下宜白虎湯加人参三錢服之

白虎湯方見前

廿三舌



舌右有白胎滑病在肌肉為邪在半裡半表心往來寒熱宜小柴胡湯和解之　方見前

廿四舌



舌左見白胎滑者此臟結之證邪併入臟難治

廿五舌



舌見四圍白而中黃者必作煩渴嘔吐之症兼有表者五苓散益元散兼服須待黃盡方可下也

益元散

五苓散　二方見前

廿六舌



舌見黃色而有黑點者邪遍六腑將入五臟也服調胃承氣湯下之次進和解散十救四五也

調胃承氣湯方見前

和解散

陳皮（一錢）　厚朴（姜製一錢）　藁本　桔梗（各五錢）

甘草（炙五分）　蒼朮（三錢）

右㕮咀水一鍾半薑三片棗二枚煎七分去柤不拘時服

廿七舌



舌見黃夾白者表少裡多宜天水散一服涼膈散二服合而服之脉弦者防風通聖散主之

天水散　涼膈散　防風通聖散　三方見前

廿八舌



舌見黃而澁有膈瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴急宜大承氣湯下若身發黃者用茵陳湯下血用抵當湯水在脇內十棗湯結胸甚者大陷胸湯痞用大黃瀉心湯

大承氣湯

厚朴（姜製三錢）　枳實（麩炒二錢）　大黃（三錢）　芒硝（二錢）

每服一兩水一鍾半先煎枳實候熟方入大黃再煎數沸入芒硝煎二三沸去柤熱服

茵陳湯

茵陳（五錢）　大黃（三錢）　山梔子（七枚）

右每服一兩水一盞半先煎茵陳半熟次入二味再煎去柤通口熱服

抵當湯

水蛭（糯米炒七箇）　䖟虫（炒去羽足七箇）　大黃（三錢）

右作一服水一盞半煎一鍾去柤通口服

十棗湯

芫花（醋浸炒）　大戟　甘遂（煨各等分）

右每服二錢弱人減半以水一鍾半大棗十枚擘碎煎取八分去柤通口服

大陷胸湯

大黃（七錢）　芒硝（三錢）　甘遂末（四分）

右用水二鍾先煎大黃至一鍾去柤下芒硝煎三五沸再下甘遂末温服取利

大黃瀉心湯

大黃（五錢）　黃連　黃芩（各二錢五分）

右作一服水二鍾煎一鍾去柤通口服若有宿食痰飲者加半夏麯二錢

廿九舌



舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而致用大承氣湯下之熱退可愈必三四下方退五次下之而不退者不治　大承氣湯方見前

三十舌



舌見黃而黑點亂生者其症必渴譫語脉滑者生脉濇者死循衣摸床者不治若下之見黑糞亦不治下宜大承氣湯　方見前

三十一舌



舌見黃中黑至尖者熱氣已深兩感見之十當九死惡寒甚者亦死不惡寒而下利者可治宜用調胃承氣湯主之　方見前

三十二舌



舌見外淡紅心淡黑者如惡風表未罷用雙解散加解毒湯相半微汗之汗罷急下如結胸煩躁目直視者不治非結胸者可治

雙解散　方見前

解毒湯　方見前

卅三舌



舌見灰色尖黃不惡風寒脉浮者可下之若惡風惡寒者用雙解散解毒湯主之三四下之見糞黑不治

解毒湯雙解散二方見前

卅四舌



舌見灰黑色而有黑紋者用大承氣湯下之脉浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其二三

涼膈散　方見前

卅五舌



舌根微黑尖黃脉滑者可下之脉浮者當養陰退陽若惡風寒者微汗之用雙解散若下利用解毒湯十生七八也

雙解散　解毒湯二方見前

卅六舌



見舌根微黑尖黃隱見或有一紋者脉實用大承氣湯下之脉浮渴飲水者用涼膈散解之十可救其八二三

已上三十六舌乃傷寒驗症之捷臨症用心處之百無一失

傷寒金鏡錄後序

傷寒之病。傳變不一。瞬息之間。死生決焉。專門之醫。每病於此。予觀古虞廷尉陳君彥材所送金鏡一錄元敖氏立辨傷寒三十六舌畫法詳以證症附以方明白簡要可以使人緣形以察脉由粗以得精中啟劑於膏肓寄死生於呼吸不若其難而卒應其變雖病者地之良醫亦有所據而易為力其不盡然者天乎誠哉傷寒家之捷徑也用梓之以廣其傳夫良醫猶良相也[illegible]傳得斯不誤天下蒼生司命者其鑒之哉

西蜀篤齋湯紹恩謹識

嘉靖己未仲夏日

北海𡵨崗馬崇儒校刊

識病捷法叙

病之難識也尚矣人稟陰陽五行之氣冲融會萃以有[illegible]受眷一或不至則病隨之變應靡常漫無所執厥疾之不瘳也不亦宜乎吾蘋繆慕松先生雅好醫學窮本知要闡微剔幽靡不通貫迺著為傷寒撮要一書既已梓世世共珍之而先生沉默寡合不自矜衒閉門讀古方書參稽互考豁然若有得者一日别余遠徒余意其將有四方之志也叩其所業則曰吾志在醫欲成一書以濟世非靜不可故求靜耳已而烟霞高蹈杳然不可即者二三年則書[illegible]成出以示余蓋羅集先代醫師之傳會通其要分部分門以類相從而增損者什二刪繁補遺掇拾殆盡名之曰識病捷法云余非知醫者昔於傷寒撮要既以俚言矣其首今此書[illegible]成益覩先生有大過人者矣刊以傳世抑亦醫家之指南也歟雖然此不足以盡先生之仁術也先生甫弱冠先君五松以疾謝世既而吳泰伯孫女為太夫人者每歲多病先生苦弗愈遂棄舉子業從咻氏游肆力于醫太夫人得以長壽噫世之獲一命之榮者誰不謂孝親在茲矣而先生獨肆力於醫不惟得以壽親且曰以壽來世視世所謂孝親者果孰遠而孰近哉

賜進士第文林郎河[illegible]道監察御史

長洲徐仲楫撰

識病捷法叙

識病捷法者茂苑名醫繆翁慕松裒羣書而鈎其玄以指醫家而南者也翁幼業儒講母病去精軒岐家言卒長壽其母今萬曆癸未余未免喪而瘍小愈苦神理未王適翁居停余内弟王正甫待曙樓中迺需診焉譚余受病處若照腑臟已邑中就視者屢相錯糜不應手愈至有羣醫袖手莫先發其誰何者翁孝而投之刀圭亦靡不輒起也余於醫無所覩異而膚叩其說翁亦膚而應曰吾何能有加於人人哉吾蓋不務藥之施而務病之識也古方書具在厥藉以索二豎于膏肓上下者不繇望聞問切乎輓近世恒耳視而目聽以望聞識者十未見一二焉以問切識者十得二三而本或諱於病者之口脉或眩於視者之指虛實表裡瞶々爾已而姑嘗試以倖一中即慎事者亦持兩可以執其中候藥力形見以定症名嗟々參苓芪朮匪不靈于補也而以之續骨則舛矣烏喙金蝎非不良于攻也而以之益元則謬矣幾何而不倒行逆施之耶吾弗敢矣余始驚而復叩曰然則識病有法乎翁曰有之而且捷也因指其篋謂余吾所辛勤四三十年搜抉數十百弓欲以一得之見而起天下之疲癃振斯人之聾瞶者志在此也烏乎無其法余受而讀之則有全書在焉病標其名名系其類察司天之候定生死之脉列辯驗之

方無論業是業者鯈然大覺余亦庶幾不終大寐也已時余外兄盛玄圃氏在座曰吾遜志扵醫久矣嘗見翁鋟傷寒撮要意謂盧扁為之後至李朱弗論也茲書而廣其傳也活世開來彼宣公非鄉之聞人歟翁曰可哉直吾尚有幼科外科在而力未足以從剞劂氏之役也茲其先之遂付諸梓

賜進士第徵仕郎中書舍人讓里鄒龍光撰

識病捷法目録

一卷（各湯藥炮製法開第九卷）

泄瀉（二十二名不治症六名）　痢疾（三十七名不治症十一名）

脾胃（二十八名不治症一名）　瘧疾（三十一名不治症一名）

傷風（一名）　傷寒（千五百五十死症二百開傷寒摘要）

二卷（各湯藥炮製法開第九卷）

癘風（三十六名不治症二十四名）　黄疸（十七名不治症九名）

霍亂（十四名不治症七名）　內傷（十九名不治症二名）

關格（二名）　嘔吐（二十八名不治症三名）

小便（三十九名不治症四名）　大便（十五名）

三卷（各湯藥炮製法開第九卷）

癆瘵（七十名不治症二十名）　虛損（二十二名不治症十二名）

吐酸（十名）　痰飲（二十四名不治症二名）

積聚（十四名）　諸氣（二十一名不治症二名）

諸血（三十六名不治症四名）

四卷（各湯藥炮製法開第九卷）

癥脹（四十四名不治症十四名）　水腫（二十八名不治症十三名）

咳嗽（五十七名不治症十五名）　喘哮（二十名不治症二名）

暑（十四名不治症六名）　濕（十四名不治症三名）

惡寒（一名）　惡熱（名）

五卷各湯藥炮製法開第九卷
噎膈（二十五名不治症七名）　痞滿（八名）
眼科（七十二名）　燥（十二名）
火熱（九十名不治症五名）　積熱（八名）
中寒（六名不治症一名）　痼冷（四名）
六卷各湯藥炮製法開第九卷
中風（二十六名不治症十八名）　頭風（一名）
腦漏（一名）　大頭風（一名）
頭痛（二十名不治症一名）　心痛（二十八名不治症一名）
脇痛（二十六名）　腰痛（二十名名不治症一名）

腹痛（二十五名不治症二名）　諸蟲（十七名不治症五名）
七卷各湯藥炮製法開第九卷
久病（八名）　鬱病（十五名）
耳病（三十六名不治症三名）　舌口（二十四名不治症四名）
牙齒（十五名不治症一名）　痓病（六名不治症一名）
痿症（七名）　痺症（三十名）
脚氣（十三名）　鼻（十八名）
八卷各湯藥炮製法開第九卷
急救（二十二名）　異症（二十九名）
癇症（十一名不治症五名）　癲病（四名）

怔忡（三名）　驚悸（三名）
健忘（三名）　腋臭（五名）
疝氣（二十八名）　消渴
金瘡科
九卷各湯藥炮製法開第九卷
下蠱（二名）　諸毒（二十二名）
咽喉（一十七名）　咳逆（十名死症一名）
厥逆（一十二名死症二名）　破傷風（八名）
遺精（十名）　白濁（八名）
汗（七名死症一名）　斑疹（一十二名死症四名）

眩運（一十八名）　神鬼病（八名）
十卷各湯藥炮製法開第九卷
女科（二百十一名）

識病捷法卷之一

蘇郡長洲慕松繆存齊纂集

總論

夫諸書以風為百病之長悉冠於首余思人以脾胃為主經云脾臟一傷四臟俱無生氣書曰有胃氣者生無胃氣者死又曰人之命蒂皆本於中宮中宮安得不重而以風為首哉況中宮受害無甚於瀉痢故今以瀉痢為首卷凡症涉於脾胃者皆列于前脾胃充實則氣血精元四者得以化生諸邪無隙而入何病之有醫者司人之命貴乎識病且如男女長幼在於四季豈無瀉痢乃是目前之症瀉痢二字譬若人之一字乃通稱也殊不知瀉痢細名五十有二詢之於醫考之於書皆不及其數既不知其名難免於妄治之失也原情非醫之罪蓋由先代醫師二百三十七人各以所見相傳不會於一冊是以後世詳之者寡矣今將各部各門刪其重復查出病名補其缺畧理正逆順併歸於一盡開名數庶無遺漏且易曉也又以緊要科目為各卷之首章各病門附論以朗得病根因通

計病之名數有一千八百一十一名內有不治症二百二十六名分為十卷名曰識病捷法或者少有利於民歟書云人為貴又云民惟邦本又曰人命關天民命之不可忽也明矣是故良相救民甚於水火良醫濟人甚於頭燃良相良醫救民濟人莫非惻隱之心也今人不以所任為重惟究所患則投其劑竟不言病名烏得謂之識病者也且各病湯名乃前人藥案後人但可以為規矩而有執泥全用者非也古人因病製方非製方待病立方之時以望聞問切融會胸中定分南北風土老幼元氣虛實司天時令內因外因不內外因病之淺深新久苦樂勞逸情性緩急當世之病雖同已上二十七項情節安得件件皆然所以各病門加之治法秘法誠為活潑潑而有萬全之策也士庶後學潛心均覽誤治之失絕然而無矣是為論

藥規情弊犯之致危係干緊要所以開列于前

新增

一病家童僕煎藥因無干己不以為事或將藥燒乾添水則藥味已去或因主人要藥煎不得所就傾應命則藥味未全似受其無心之害須令年老小心謹慎人煎之可也

一人有妻妾房婢者多生嫉妬或有疾病須招妻妾家六親之內一人煎藥無離藥罐左右以革因病因藥陰謀下毒之意

一出仕經商多有不服水土為病者就不可用病藥先宜調理脾胃多加五茄皮服三四貼不愈後用本病藥如先用本病藥則是不知標本投劑之誤耳

一古云人有旦夕禍福不可意必疾病有無平日要用心擇醫臨期不得卜醫可否假使上醫俱占上卦世間則無下醫矣

一人有素怕服藥亦有胃虛怕服藥者不可強與服之愈傷胃氣須將甘味淡味藥為糕或為丸將米飲送下則病人悅服又免坐以待死之急也

一煎藥須要藥罐潔净水及新鮮藥帖不可近燈油之下亦不可與他藥並處四者錯一則為胥壞之隔也

一病人不知自己病之淺深倘病深藥力淺服幾劑不効意求速愈又去更醫藥劑亂投是謂急走多顛躓也

一人病先要論南北風土人之稟氣厚薄如西北二方稟氣厚風寒多雖患熱病不可純用寒藥東南二方稟氣薄濕熱多雖患寒病不可純用熱藥

校正病人六不治（病可治犯此六者反不治）

一信巫不信醫

一輕命重財

一心意不寧

一恣情飲啖勞碌 即勞役

一諱疾忌醫

一衣食不足

校正醫人五失（病雖可治失此五者反致人於不治）

一失不令女人親屬細看病者面有何色可合於脉可合於病

一失不令女人在床幃中畧說三四病原以聽其聲輕重清濁

一失問因不究至一百五十四端今已細開傷寒門問字條下

一失不知病名今以細開本集

一失用藥不分輕重奇偶古法假如輕病先用藥一味為君不愈加一味為臣又不愈加一味為佐再不愈加一味為使以漸而加病藥

相宜九味為奇十味為偶前人恐傷胃氣元氣如此立法今人不論病之輕重新久老幼虛實動手便用十二三四味豈不謂之失乎

泄瀉門 有二十二名

泄者泄漏之義時時溏瀉或作或愈瀉者一時水下如注素問云春傷於風夏必飧瀉乃是脾虛受風木之邪又曰怒則氣上甚則嘔血輕則泄瀉叔和云濕多成五瀉皆因脾胃虛弱不能制於水濕有此五瀉然泄瀉不限在中宮其他臟腑受邪皆可為泄瀉故為泄瀉之名多矣

○生脉（道三）

微　小　緩

○死脉（道四）

大　浮　洪　緊

○不治症（名六）

洞瀉兼脉急　瀉痢前後　滑瀉

皮寒兼脉細　飲食不進　少氣

○辯驗寒瀉熱瀉法

寒瀉脉沉細身不動目精不了了飲食不下鼻息不利

熱瀉脉疾數身多動聲音響亮暴注下迫大便覺熱痛

○治法

凡瀉須看時令寒熱新久補脾消食燥濕利小便為上策

凡久瀉腸胃虛滑不禁者宜急澁之用赤石脂肉豆蔻之類

凡瀉有下陷之氣用升麻防風升提其氣

凡瀉有宜汗者如火瀉飧瀉用蒼朮防風麻黃

凡瀉有宜下者如瀉止復瀉為下未盡或傷食瀉並用枳香散

凡瀉世俗多用澁藥必變他症若瀉久虛者可用

凡瀉腸鳴不止久不愈者必用訶梨勒丸

凡止瀉用肉豆蔻春一兩五錢夏一兩秋冬一兩五錢為末姜汁神麯糊為丸寒加炒熟吳茱萸熱加黃連滑石

凡白瀉用五味子二兩吳茱萸五錢同炒香熟為末每服三錢陳米飲送下空心臨卧服

凡瀉用白朮陳皮白茯苓白芍藥已上四味必不可缺

如傷食食積加神麯麥芽山楂各一錢黃連炒七分

如腹中窄挾滿悶加厚朴枳實木香各五分

如小便赤澁短少加猪苓澤瀉木通各一錢

如夏月加茵陳七分山梔四分

如口渴引飲加乾葛麥門冬各錢半升麻四分烏梅一箇

如夏秋加黃連蒼朮澤瀉各錢半升麻木通各五分

如冬月溏瀉傷飲食生冷加神麯麥芽甘草炙各一錢砂仁益智木香各七分

如發熱躁渴加乾葛石膏各一錢

如飲酒瀉加黃連茵陳各一錢木香五分神麯麥芽各八分

如久瀉胃氣陷下服利小便藥不效加人參黃芪各一錢黑瘦人去人參倍加白朮升麻柴胡各四分提起胃氣

如因怒氣泄瀉加木香怒時兼飲食加檳榔

凡瀉久雖愈必須服加減六味地黃丸一料以補陰血脾胃三因之邪始不得入經云下多亡陰陰即血也血少諸病生焉

風瀉（即飧瀉春傷風夏有此瀉）

飲食完出夏初有此症名曰飧瀉○服神术散加防風氣虗病久加人参黑瘦人去参用白术

寒瀉

瀉時腹脹滿食即嘔吐名曰寒瀉○服荳蔻散

暑瀉

瀉時發熱或煩渴引飲所下如水小便不利○服胃苓散

濕瀉

體重嗜卧四肢無力瀉無度如豆汁水腹不痛者名曰濕瀉○服五苓散

火瀉

腹痛暴注瀉水不已腸鳴痛一陣瀉一陣者名曰火瀉○服桂苓甘露飲

水瀉

脾經虗寒受濕四肢冷身重微滿不知穀味瀉無度飲食不化名曰水瀉○服白术芍藥湯

洞瀉

四肢厥冷頓瀉名曰洞瀉○服木香訶藜勒丸

濡瀉（足濕自甚）

體重軟弱手足冷心腹疼脚轉筋瀉下如水名曰濡瀉○服肉豆蔻散

滑瀉

臟腑久虗挾寒不食口生白瘡久瀉不能禁固是濕勝氣脫名曰滑瀉多致危○服百粒丸

溏瀉

漸下汚積粘垢是濕兼熱名曰溏瀉○服五苓散加黃連炒半黑

鶩溏瀉

小腹生寒糟粕不化大便色黃清冷小便清白是濕兼熱名曰鶩溏瀉○服華撥丸

脾泄瀉

五更或早晨大便或瀉或溏下一二次則止高年富貴人并齋素久者多有此症名曰脾泄瀉○服四製白术丸

胃瀉

飲食不化色黃名曰胃瀉○服煖中湯

胃寒腸熱瀉

飽脹大便似溏瀉下甚熱名曰胃寒腸熱瀉○服當歸黃連丸

腸胃虛寒瀉

飲食不化腸鳴腹痛脫肛或作膿血日夜無度名曰腸胃虛寒瀉○服訶子皮散

大腸瀉

食已窘迫大便色白腸鳴切痛名曰大腸瀉○服訶梨勒丸

小腸瀉

小便膿血小腹痛名曰小腸瀉○服七味丸

腎瀉

由腎虛五更溏瀉經年不止小便頻数盜汗名曰腎瀉○服金鎖正元丹

酒積瀉

清晨遇飲食腹便微疼下一二次即止名曰酒積瀉○服梹香散加澤瀉神麯葛根

食積瀉

噯氣吞酸腹脹滿瀉下極臭腹痛瀉後痛減名曰食積瀉○服梹香散加草菓神麯山查青皮或服胃苓散

痰瀉

或瀉或不瀉或多或少小便清白搔眉稜耳沿覺爽快名曰痰瀉○服二陳湯加赤茯苓枳實青皮

大瘕瀉

大便欲瀉又瀉不出裡急後重或莖中痛名曰大瘕瀉○服除濕防風湯

氣脫瀉

腹脹經久忽瀉数升晝夜不止服藥不効名曰氣脫瀉○服益智湯

○諸藥製度法開末卷

除濕防風湯

防風　白芍藥（各錢半）　赤茯苓

白术（各一錢）　蒼术（三錢）　甘草（五分）

右水二鍾煎至一鍾空心服

當歸黃連湯

黃連（三錢）　當歸　乾姜　甘草（各二錢）

右水二鍾煎至一鍾食前溫服

白术芍藥湯

白术（五錢）　甘草（二錢半）　白芍藥（五錢）

右水二鍾煎至一鍾食前服

益智湯

益智仁（五錢）○右水一鍾半煎至六分不拘時服

二陳湯

半夏　陳皮　茯苓　甘草（各三錢）

右水二鍾姜三片煎至一鍾食後服

桂苓甘露飲

茯苓　澤瀉（各一兩）　石膏　寒水石（各二兩）

滑石（四兩）　白术　肉桂　猪苓（各五錢）

右為末每服二三錢白滚湯調下

當歸黃連丸

當歸　黃連（各二兩）　厚朴　赤茯苓

吳茱萸　訶子　木香（各一兩）

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲送下一日服三次

蓽撥丸

蓽撥　附子　厚朴　肉豆蔻

乾姜（各一兩）　縮砂仁　龍骨　訶梨勒皮（各五錢）

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸食前米飲送下一日服二次

木香訶梨勒丸

木香　白术　高良姜　肉豆蔻（各一兩）

訶梨勒（三錢）　官桂　蕪荑（各一兩半）　附子

厚朴（各二兩）　甘草（五錢）　乾姜（一錢）

右為末神麴末煑糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前生姜盐湯送下

百粒丸

紅椒　胡椒　附子　丁香

乾姜　麦芽（各廿分）○右為末醋煑大蒜為丸如梧桐子大每服百粒食前米飲送下

金鎖正元丹

五倍子　茯苓（各四兩）　龍骨　硃砂（各一兩半）

肉蓯蓉　紫巴戟　葫蘆巴（各八兩）　補骨脂（五兩）

右為末酒煑糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心温盐酒送下

四製白术丸

鷄腿术一觔　破故紙　白茯苓　麦芽

厚朴（各一兩）　肉菓（四兩三錢）○右為末神麹糊為丸如梧桐子大每服百丸食後白滚湯送下

煖中湯

陳皮　半夏（各一錢）　澤瀉　猪苓（各八分）

肉菓（二錢）　枳實（八分）　神麹　山柤（各一錢）

桔梗（五分）　黃連（五分）○右水二鍾姜三片食後服

梹香散

即木香梹榔丸方見積聚門

五苓散

白术　楮苓　茯苓（各一兩半）　澤瀉（一兩五錢）　桂（一兩）

右為末每服三錢白滾湯調下

神术散

蒼术（一斤）　藁本　川芎（各六兩）　羌活（四兩）　粉草

細辛（各一兩六錢）○右為末每服三錢姜湯調下如要發微汗加連根葱白頭泡湯送下

肉荳蔻散

肉荳蔻　乾姜　厚朴　陳皮　甘草（各二兩）　茴香　肉桂　訶子皮　川烏（各一兩）　蒼术（四兩）

右為末每服二錢生姜紅棗煎湯不拘時調服

訶子皮散

訶子（七分）　乾姜（六分）　罌粟殼　陳皮（各五錢）

右為末分作二服每服用水一鍾半煎至七分和滓熱服空心再服全愈

胃苓散（胃即平胃散苓即五苓散）

痢疾門（有三十名外附七條）

古謂滯下又曰腸澼今名痢疾此症多由脾胃不和飲食過度停積腸胃不能尅化又為三因所干而成斯疾治宜驟用罌粟訶子之類止澁使停滯不行多致危殆

○生脉（三道）

沉　小　細

○死脉（七道）

浮　洪　緊　大　實　紘急　数兼有熱

○不治症（十一名）

便血兼身熱死　血脫兼脉實死

下如塵腐色死　大孔如竹筒死

下如屋漏水死　唇如珠紅者死

熱見七日者死　筋攣兼脉大緊死

純血半生半死　魚腦色半生半死

手足冷無脉灸不温脉不至反微喘死

○辯驗寒痢熱痢法

寒痢脉微遲小便不澁穀食不化色不變吐痢腥穢澄徹清冷不渴

熱痢脉疾數小便黄赤穀食難化色變非白

微渴

○治法（二十九條開後）

經久痢

痢一二年起至數年不愈者名曰經久痢○服

獨黄湯一帖後服固本丸調理元氣充足

休息痢

痢旬日或經月愈而復作腹疼困弱名曰休息

痢○服神助散

五色痢

下五色膿血或如爛魚腸糞小腹中攪痛呻吟

叫呼聲聞於外○先服瓜姜散不愈再服歸連

丸

禁口痢

脾胃濕熱之毒薰蒸心肺以致胃口閉塞而成

禁口不食○服蓮心散

風痢

純下清血或瘀或鮮微汗惡風○服防芍湯

冷痢

舌上生瘡飲食無味嚥下復吐小腸雷鳴時時

心悶皮乾粟起膝脛酸疼兩耳絶聞四肢沉重

日漸瘦或成塊○服猪肚丸

冷熱痢

冷熱不調下膿血不止腹痛甚不能食日漸形

瘦乏力○服阿膠丸又方用甜菜絞汁服立愈

暑痢

下鮮血甚則昏迷不省人事○服地榆散加香

薷匾豆

濕熱痢

下如豆羹汁或血水體重嗜卧脉沉細食少腹

痛後重○服胃風湯加黄芩芍藥湯

濕毒痢

久不斷體疲多困坐則閉目食不下○服蚺蛇

胆湯

熱痢

下黄赤膿血腹疼心煩困悶○服黄連丸甚者

變血下名熱毒痢○服鬱金散

穀痢

痢無期度食不化腹痛每遇冷食便發○服附

子五味散

水穀痢

不論老幼日夜百餘行○服神妙橡實散

傷食痢

飲食過傷恣食辛熱寒冷之物致傷脾胃不能運化蓄停為痢腹滿痛惡食吞酸○服枳香散

食毒痢

飲冷熱醲醖腸胃粘澁久積成毒痢○服梹香散加酒炒黃連乾姜炒黑少許澤瀉

酒痢

素能飲酒者又因一時過飲痢即發者名酒痢○服葛根湯

氣痢

先瀉後痢腸痛或心腹疞痛腹內雷鳴○服木香砂仁散不愈再服巴石丸

血痢

心煩熱燥不納穀大小便下血不止○服木香烏梅丸

又下血腹不痛謂濕毒下血○服黃連丸

勞碌痢

下痢時腹與臍腸疼○服神驗丸加青皮

憂思痢

下褐色腹微痛後重頻便食減微熱脉絃神氣大減○用参术為君當歸陳皮為臣川芎白芍藥茯苓為佐時熱少加黃連（此方出於醫學綱目）

脾毒痢

下血如鵝鴨肝狀腹痛不止○服地榆湯

心肝痢

初痢赤色身體並不增寒壯熱名曰心肝痢○服黃連一兩蜜拌一宿炙令香熟木香三錢為末每服二錢陳米湯下

腸澼痢

飲食不節起居不時者陰受之陰受入五臟䐜滿閉塞或稀或稠便似膿極滑或先為飧泄久為腸澼痢也○服荳蔻八味散

小腸痢

小腸冷氣積聚結成痢日夜三四十行○服蒼术散

腸蠱痢

先下赤後下黃白沫或下血如鷄肝體熱心腹中煩悶連年不瘥○服牛膝一两酒一升浸一

宿空心飲之

虛痢

脾胃虛弱日夜頻數身重微不知穀味或不禁裡急後重或五色鮮血○服神効參香散加椇柳

噦逆痢

吃病氣從下衝上屬火胃氣虛弱亦有痢久多見此症○服人參養胃湯加枳實玄參青皮

疳䘌痢

脣內生瘡多唾面黙時腫下部痒痛不止○服

雞子一枚取黃好漆一合和勻空腹仰頭頓服令盡當吐出虫即愈

疫痢

一家長幼傳染而痢先論病人虛實冷熱○服敗毒散倍加人參甘草陳皮

疫毒痢

毒痢不一惟寒犯心為重初痢時先發寒熱挍藥治之其熱不退反甚食則嘔逆下痢不止熱如火要在凉處思吃冷水忽思狂走渾身痛着手不得此症十難治其三四治此痢須是仔細

首尾識病根源然後吃藥初時痢先發寒熱忽頭痛或壯熱忽轉數行便下赤痢忽先下赤後變白或如紫草水或如莧菜水色澤者寒邪犯心之重也或赤白相等寒濕之氣相搏也先治其寒○並服護命方但六甲六庚逢地支子午夘辰戌年及春夏之內時氣多寒人得痢此藥通神六甲逢丑未之歲濕化偏多人得痢疾即此方內加草豆蔲一两

小兒八歲下痢純血作食積治

用蒼朮白朮黃芩芍藥滑石茯苓甘草陳皮神

麴煎藥送下保和丸

痢後脚弱漸細

用蒼朮二两白芍酒炒龜板酥炙各二两五錢黃栢五錢當歸川芎熟地陳皮各二两甘草五錢為末丸如菉豆大白湯下二錢

痢後脚痛無力

用陳皮半夏白朮川芎芍藥黃芩各二两為末丸如菉豆大食後臨卧白湯送下一錢五分每日服二次

痢後虛浮

服益元散外用甘草湯淋洗

瘧痢交作

用赤小豆同豆豉煑五味炙任性服之

痢後氣滿不能食

用赤小豆煑一頓服之即愈

痢後脫肛

治法見大便門

○治法

凡寒痢或不足症穀食雖化不能盡惟覺倦脉絃濇浮大宜温補之

凡熱痢或有餘症忌龍骨石脂粟殻芍藥初患痢忌用參术

凡初痢不分赤白宜用黄芩黄連大黄當歸芍藥輕則木香檳榔丸下之

凡痢重者反用大黄湯痢輕者前丸

凡痢五日前可用行藥厚朴青皮甘草大黄黄芩少許五日後不可用元氣壯實者五日後亦可用行藥

凡痢白色者濕熱傷氣分用黄芩芍藥湯加白术陳皮甘草桃仁滑石

凡痢赤色者濕熱傷血分用益元散加木通芍藥陳皮白术

凡痢赤白色者氣血俱傷用香連丸

凡痢青緑雜色者是風火濕用防風蒼白术山梔黄栢

凡痢赤黑色如豆汁水者是濕毒用木通澤瀉茯苓梔子

凡痢白青色穀食不化者是寒用炒黑乾姜

凡痢紅黄黑三色皆是熱用黄芩黄栢山梔

凡痢黄色者是食積用山柤枳實神麯麦芽

凡治血痢熱痢用大黄黄芩黄連黄栢枳殻川芎芍藥滑石甘草桃仁白术等分神麯糊丸服六十丸

凡久痢膿血稠粘用香連丸和之

凡下痢食少膿血稀薄如豆汁者元氣虚也用川芎當歸人參白术粟殻甘草

凡血痢久不愈用四物湯為主加凉血和血藥川芎桃仁之類

凡痢身熱挾外感不悪寒者用小柴胡湯去參如發熱悪寒身痛此為表証宜微汗和觧用

蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生姜口渴去半夏加黃連

凡痢裡急後重者用木香檳榔兼升提用升麻

凡痢大孔痛者用木香檳榔黃芩黃連久痢身冷自汗脉沉小加炒黑乾姜

凡痢嘔者因胃氣不和上焦不和用生姜陳皮中焦不和用芍藥川芎當歸茯苓有胃火逆上嘔者有胃虗嘔者有食積滯毒氣上冲嘔者有陰嘔者有寒凉傷胃嘔者

凡痢久積少反後重者用升麻防風羌活川芎升舉之腹痛甚加枳桄木香檳榔白芍滑石之類

凡痢久不止者用澁藥罌粟訶子石榴皮枯礬烏梅龍骨赤石脂芋藥

凡痢久諸藥不効六脉沉細用十全大補湯加姜棗蜜少許煎服

凡痢久秘方用烏梅二十箇水一鍾煎六分食前服分作二次

凡痢不寛何名秘方用五倍子新瓦上焙乾為末水丸如梧桐子大每服三十丸紅痢茶下白痢酒下小兒二十丸忌魚腥

凡暴痢秘方用蒜擣爛兩足下貼之

凡惡痢秘方用白頭翁草煎湯服之立愈

凡下異常積有紫黑血腹痛甚者是死血用桃仁滑石

凡治痢先瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初痢只是下之下後未愈隨證加减後方稍久不可下脾胃虗故也痢多屬熱亦有虗與寒者用黃芩炒枳殼炒各一錢半白芍炒二錢黃連炒一錢黃芩黃連芍

藥三味乃痢疾必用之藥也檳榔一錢炙甘草三分木香磨入藥五分作一貼水二鍾煎服

如腹痛加當歸砂仁各一錢再加芍藥木香各五分

如後重加滑石炒一錢半枳桄檳榔芍藥條芩各五分

如白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮各一錢

如初痢欲下加大黃五分

如食積加山查枳實各一錢

如紅痢加川芎當歸桃仁各錢半

如欲下之再加大黃

○如紅白相雜加川芎當歸桃仁各錢半以理血滑石蒼术陳皮各錢半以理氣

○如白痢久胃弱氣虛或下後未愈減黃芩黃連芍藥各七分加白术黃芪茯苓陳皮各一錢半砂仁五分去梹榔枳殼加乾姜五分

○如血痢胃弱血虛或下後未愈減黃芩黃連各五分加川芎當歸熟地阿膠槐花陳皮

白术各一錢去梹榔

如痢已久後重不除大腸墜下去梹榔枳殼用條芩升麻以提之

如痢兼嘔吐加軟石膏一錢半陳皮一錢山梔炒五分入姜汁少許緩呷之

如誤服温熱止澁之藥雖痢久亦宜用前法下之下後調之

如初痢便用下藥未愈且不可用調理法治之若久此屬虛寒而滑脫急宜温補藥加龍骨赤石脂粟殼烏梅肉澁之

地榆湯

地榆　石榴皮　赤芍藥　厚朴

甘草（各半分）　阿膠　白石脂　龍骨（各五錢）

右分作二服每服用水一鍾半煎至七分空心午間温服

獨黃湯

錦紋大黃（一兩）

右用煑酒二鍾浸半日煎至一鍾分二服先一半未利再服以利為度服後黃芩芍藥湯和之

芍藥黃芩湯

芍藥　黃芩（各一兩）　甘草（五錢）

右分作二服每服用水二鍾煎至一鍾食遠服

蚺蛇湯

蚺蛇膽大如豆二枚煑通草汁

右將通草汁研膽以意多少飲之塗五心下部

防芍藥湯

防風　芍藥　黃芩（各三錢）

右水二鍾煎至一鍾食遠服

葛根湯

葛根　枳梳　半夏　生地黃　杏仁

茯苓（各二錢半） 黃芩（一錢） 甘草（五分）

右分作二服每服用水二鍾黑豆百粒生姜五片白梅一箇煎至一鍾食前温服

倉米湯

倉粳米（半升） 香豉（三升） 薤白（一握） 羊脂（一片）

右先以羊脂油煎薤白倉米黃色入鼓汁煎取四升平旦空腹温服一升如人行十里工夫又服一升得快痢止若痢不止又服一升如痢復作更服一劑煎服法同前

人參養胃湯

人參 茯苓 半夏 厚朴 陳皮

蒼术 藿香（各一錢） 甘草（五分） 草菓（一錢）

右水二鍾姜三片煎至八分食前温服

十全大補湯 見虗損門

四物湯 見諸血門

小柴胡湯 見傷寒門

歸連丸

當歸 黃栢 黃芩 阿膠

熟艾（各二兩） 黃連（四錢）

右為末用醋二升煑膠烊下藥末煑令可為丸如豆大每服七八十丸日服二次夜服一次米湯送下產婦加蒲黃一两煉蜜為丸

黃連丸

黃連（二两半） 羚羊角 黃栢（各一两半） 赤茯苓（五錢）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸姜湯送下暑月下痢用之尤驗

蕪荑丸

黃連（二两） 蚺蛇膽（五錢）

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食前杏仁湯送下一日服二次

阿膠丸（治氣痢）

阿膠 乾姜 木香 黃連 當歸

黃芩（各一两） 赤石脂 龍骨（各二两） 厚朴（一两五錢）

右為末用蜜十一两煉成珠為度入藥末内杵千下丸如梧桐子大每服三十丸米湯送下

巴石丸

右白礬飛令雪白謂之巴石以熟猪肝作丸空心米湯下丸數隨人力氣加減得水牛肝更妙

木香烏梅丸（治大小前後下血）

烏梅（三斤取肉） 絲瓜 百草霜 木香（各二两） 黃芩

黃連　黃栢　梔子　枳殼
當歸（各一两）　半夏　大黃（各五錢）　陳皮（八錢）
神麴（四两）○右為末濃米飲為丸如梧桐子大每服百丸空心食前白滚湯送下一日服三次

神驗丸

陳麴　吳茱萸（各一两）　黃連　蕪荑（各三錢）
右為末生姜自然汁和為丸如梧桐子大每服十五丸温米湯送下

通神丸

五靈脂　乳香　没藥（各一两）　巴豆霜（半錢）

右為末滴水為丸如黃米大每服五丸小兒三丸白滚湯送下

猪脏丸

右用猪脏一具細切青蒿葉一合相和微炒以無灰酒一大升火温之乘熱入猪脏青蒿加桂心末一两於酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌食面油膩等物

香連丸

黃連（二十两用吳茱萸十两同浸炒令赤色去茱萸不用）　木香（四两八錢）
右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲送下

五苓散

方見瀉門

附子五味散

附子　細辛　白术（各五两）　乾姜（四两）　神麴（一升）○右為末米飲送下一匙稍加至二匙忌食猪肉水冷桃李雀肉

斗門散（治八種毒痢）

黑豆（一两）　乾姜（二两）　罌粟殼（四两）　地榆　甘草（各三两）　白芍藥（一两半）

右分作二十服每服水二鍾煎至七分温服

神助散

當歸　烏梅肉　黃連（各等分）
右為末大蒜研泥和藥為丸如梧桐子大每服四十丸厚朴煎湯送下

鬱金散

鬱金（無鬱金升麻代）　槐花（各五錢）　甘草（炙七分）
右為末每服二錢食前豆豉湯調下

橡實散

橡實（二两）　乾楮葉（炙一两）

右為末每服一錢不拘時烏梅湯送下

益元散

滑石（六兩）　粉草（一兩）

右為末每服三錢白水調無時服

木香砂仁散

木香（二兩五錢）砂仁（一兩五錢）枳殻　訶梨勒皮（各三兩）

右為末每服一錢空心陳米飲調下良久以食

壓之

百中散（列治法条下）

罌粟散　厚朴（各半斤）

右為末每服三錢空心米湯下忌生冷油膩鷄

魚

瓜蔞散（治五色痢久不愈）

瓜蔞（一箇）

右為末作一次服用温酒調下

地榆散

地榆　赤芍藥　黃連　青皮（各等分）

右為末每服三錢新汲水調下若血痢水煎服

荳蔻八味散

肉荳蔻　丁香（各二錢）　細辛　附子

乾姜（各四兩）　黃芪　人参（各五錢）　赤石脂（六兩）

右為末米湯送下一匙稍稍加至二三匙忌食

葱猪肉冷水

参苓散

白匾豆　木香　人参（各二兩）　茯苓

肉荳蔻（各四兩）　罌粟殻　陳皮（各十兩）

右為末每服三錢米湯調下不拘時服

倉米散

右用倉中陳黃米二合淘凈用水一鍾半煎至

七分去米空心温服一日服三次

不二散（治諸瀉痢神効開治法下去）

罌粟　青皮　陳皮（各二兩）　當歸　甘草

乾葛（各一兩）○右作九服每服用水二鍾半煎至

一鍾服如赤白加酸石榴皮一片同煎極妙

梹香散

見積聚門

蓮心散

石蓮肉（日乾）○右為末每服二錢陳米飲調下便

覺思食仍以日照東方壁土炒真橘皮為末姜

棗畧煎佐之

護命方

麻黃　官桂（各三分）　大芎　白朮（各二兩）　藁本　獨活　桔梗　防風　芍藥　白芷（各半兩）　牡丹皮　甘草（各一分）　細辛（八銖）　牽牛（四銖）○右為末每服二錢非時熱湯調下和滓熱喫若喫兩二盞寒熱不退更不請喫自別有方論在下

若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便脩合第二方第三方藥喫取安効

若寒熱已退赤痢未消減更服兩三盞然不可多喫一日只兩盞後赤痢消減忽變成白痢旋次脩合第二方喫候出後度數減少便脩合第三方喫取平安但六甲之年六庚之歲春夏之內時氣多寒人得前疾此藥通神若是六甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢疾先發寒熱即於方內添草豆蔻一兩同脩合也又不問太歲但一年間春夏之內多寒人有痢疾先發寒熱並宜喫此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤痢已消減宜進此還真散若喫前方藥寒熱未退

赤痢未消減更不宜進此藥但天地變化其候非常痢疾證候多端此不得不盡其子細

訶子（五箇用麩裹火炮熟不要生亦不要焦去麩就熱咬破訶子去核不用只用皮焙乾）石擣羅為細末每服二錢七以米湯一盞半同藥煉取一盞空心和滓喫若吐出一兩口涎更佳如此喫經數盞大腑漸安出後減少脩合第三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病熱已減所下之痢上餘此小忽下清糞或如鴨糞忽如熱湯或如濁水忽只餘些小紅丸服如此方以牢固大腸還服真氣舶上硫黃丸

舶上硫黃（二兩去砂石淨為末）　薏苡仁（二兩炒熟杵為末）

右二末相和令勻滴熟水和為丸如菉豆大每服數丸空心以米湯下

百一選方（即地榆散方見本門）　澹寮方（開卷末）
萬應丸（開卷末）　保和丸（開卷末）
敗毒散（開卷末）　貼臍法（開卷末）

脾胃門（附飲食傷共二十八名）

脾胃位居中州屬土性緩味甘色黃喜濕好乾惡寒惡熱惡濕陰陽各半稟受天地中和之氣無物不受無物不包故胃為水穀之海脾為消化之器而氣血精元四要皆賴飲食入胃脾經磨化遊溢水穀精氣上輸於脾施布於肺總統於心藏於脾肝滲泄於腎其精氣清之清者為氣清之濁者為血授之於十二經但受之者多寡不同耳所以人之命蒂皆本於中宮經云入穀則昌絕穀則亡然雖本於五穀五畜五菜五菓五味慎勿以太過不及以傷其正且人之百病皆由脾胃衰而生傷而作也及論其傷之為病不一飲食傷胃勞碌傷脾饑則損氣飽則傷氣勞則氣耗逸則氣滯喜怒憂恐皆能損胃之氣惟飲食所傷有異一則內弱強食二則內弱少食不可便以飲食所傷用峻利之劑攻逐致使中宮愈虛書曰脾臟一傷四臟俱無生氣豈可傷而復傷以陷于死乎故莫重於脾胃而列於前也

○總脈

春脈微絃　夏脈微洪　秋脈微毛

冬脈微沉

○凶脈

脈絃浮死

○不治症（名一）

飲酒發熱

○飲食總脈

右關脈沉滑是食不消

上部無脈下宜下用承氣湯

下部無脈上宜吐用瓜蒂散

○辯驗飲食傷法

傷食惡食右手寸口脈緊盛右關短滑噯氣作酸惡聞食氣欲吐不吐惡心短氣胃膈痞塞胃口作疼按之硬痛亦有頭疼發熱但身不痛為異耳

○治法

凡諸病先觀胃氣

凡脾胃虛者本經藥四君子湯

凡治諸病時常審察有無飲食傷積但見胸膈滿悶或噫氣噦酸惡食少食腹痛瀉泄

極臭便問曾食何物即先消導調理脾胃然後用本病之藥若不審察藥雖對症而不能効

凡病有食後即藥藥後即睡停積腸胃以致藥傷者或有用藥太過反被藥傷者須當識此要識藥傷法并治藥傷病詳見久病門

凡治脾胃悉用辛温燥熱之劑助火消陰變為胃脘乾枯大腸燥結脾臟漸絶死日可待殊不知脾胃屬土屬濕位居長夏故濕熱之病十居八九况土旺四季寒熱温涼各随其時不可偏用辛熱之劑

脾胃俱虚

強食填塞不化此有物也屬乎消化

脾胃俱虚

少食病満難運此不足也屬乎補養

脾胃俱虚

飲食不進或嘔吐泄瀉及大病後調助脾胃○用参苓白术散山藥各八兩白匾豆炙甘草蓮肉砂仁桔梗薏苡仁各四兩共為末丸如菉豆大每服二錢食遠白湯送下

脾胃俱虚

其證水穀不化胸腹脇脹満少食嗜卧口苦無味虚羸少氣○服加减思食丸

脾虚

其證四肢困倦腫満食少肌瘦口苦無味少氣小便不利為瀉為停食為喘○服補中益氣湯随症加减

胃虚

其證嘔吐噦逆泄瀉浮腫惡心○服補中益氣湯随症加减

脾胃俱實

其證發狂登高口内生瘡身重食不下腹脹中満癨亂○服大承氣湯

脾實

口内生瘡口臭煩悶微渴頬痛心煩唇口乾燥壅滞不食○服瀉黄散

胃實

腹脹中満停食癨亂○病輕服梹香散病重服調胃承氣湯

傷脾

勞碌傷脾憂思傷脾脾傷內閉九竅外壅肌肉此謂自傷脾氣削矣治法損其脾者調其飲食適其寒温居處

傷胃

飲食太過傷胃饑飽傷胃喜怒憂恐皆能損胃氣此謂自傷胃氣削矣治法飲食之傷消導喜怒等傷補胃順氣

心邪乘脾胃

其證必火亢乘於脾胃之位是至而不至為不及也○宜服黃連為君黃栢生地為臣芍藥石膏知母黃芩為佐甘草為使

肺邪乘脾胃

其證咳嗽短氣懶語嗜卧洒淅寒熱○服補中益氣湯

肝邪乘脾胃

其證脇痛口苦往來寒熱嘔吐四肢滿悶淋溲便難轉筋腹痛○宜服柴胡羌活桂枝芍藥茯苓楮苓澤瀉黃栢細辛

腎邪乘脾胃

其證作涎清涕肩甲背脊痛冷○宜服乾姜白术桂枝蒼术茯苓

脾虛惡服藥者

用白术蒸八兩蒼术米泔拌炒陳皮茯苓各三兩粥丸送下

怠惰嗜卧

用半夏白术肥人是氣虛宜人參蒼术白术半夏甘草黑瘦人是熱黃芩白术飲食太過轉運不調枳實白术為末白湯調服

飲酒傷

能飲酒者因飲酒而發熱者不治不能飲酒者因飲酒發熱不治治法與傷寒同發汗利小便上下分消其酒熱之毒平常酒病詳見內傷門

飲水傷

形寒飲冷湯水咳滿水瀉詳見咳嗽門泄瀉門

傷食

胸中宿食不消用半夏陳皮白术川芎蒼术

如聞食氣即嘔用半夏陳皮砂仁青皮

如脾胃壯實用黃連枳實消導之

如脾胃虛弱用白术陳皮山柤麥芽神麴

傷飲食輕者

飲食不化心腹臌脹服梹榔丸

傷飲食重者

傷寒冷之物心腹脹滿作痛大便閉塞○服備急丸

食後感寒宿食不消

服丁香砂仁華澄茄以温之

食後乘風

初飲食畢隨即乘風納涼以致食不下形瘦腹大惡寒頭多汗隔塞不通右關脉絃緩浮○服胃風湯

食自死六畜中毒

服黄栢末老酒送下二錢未愈再服

傷西瓜冷水牛乳寒濕之物

服白术二錢川烏五分防風炙甘草各一錢丁香一箇

傷羊肉麵濕熱之物

服白术黄芩黄連各一錢大黄二錢炙甘草五分白芍一錢腹不痛去芍藥枳實如痞悶加厚朴如腹脹加枳殼如胸中不利加陳皮乾姜如

內寒加巴豆如食冷物加蒼术如腹中窄挾加茯苓

傷濕熱之物胡椒姜蒜茴香燒酒等物

服枳實導滯丸或澤瀉二錢大黄一两枳實神麵各五錢黄芩茯苓黄連白术各三錢右為細末水發為丸如菉豆大每服百丸白滚湯送下老幼虛人五六十丸

枳术丸

白术（炒二两）枳實（麸炒一两）（老人虛人病人常宜服此丸助脾胃消化飲食）

如元氣虛食少加陳皮一两

如元氣素弱飲食難化多食疼痛作瀉加人参酒炒芍藥神麵麦芽炒各一两砂仁木香各半两如黑人瘦人陰虛人肺熱以白术代参

如素有痰火胸膈鬱寒嘈酸噯氣吞酸吐酸或酒積瀉結痛酒炒黄連芍藥陳皮各一两石膏生甘草各五錢砂仁木香各一錢川芎四錢

如傷食過多痞塞不消加神麵麦芽山查肉各一两食積痞塊再加黄連厚朴俱姜製各半两積堅者加蓬术醋炒昆布各三錢

如傷冷食不消腹痛溏瀉加半夏姜炒一两砂
仁乾姜神麯麦芽各半两
如性兖多怒夾氣傷食加川芎香附炒各一两
木香黄連姜炒各半两
如胸膈不利過服辛香燥熱之藥致胃中乾燥
嘔吐噎膈反胃加黄連梔子各炒半两白芍
川芎當歸各一两桔梗生甘草石膏各半两
如膈頑痰膠結及大便燥秘再加芒硝半两
如素有痰加半夏橘紅白茯苓各一两姜炒黄
芩黄連各半两

如能食好食但食後反飽加酒炒芍藥一两半
人参七錢石膏煆一两生甘草半两黄連香
附各炒四錢木香四錢
如年老脾虗血燥易飢易飽大便燥難加白芍
藥當歸各一两人参七錢升麻甘草各四錢
山查麦芽桃仁各半两黑瘦人去参用白术
○諸藥製度法開末卷
四君子湯（加陳皮半夏即六君子湯）
人参　白茯苓　白术　甘草（各三錢）
右用水二鍾半煎至一鍾不拘時服

補中益氣湯
黄芪（一錢半）人参　甘草（各一錢）當歸身　白术
柴胡　升麻　橘紅（各五錢）
右用水一鍾半煎至八分食遠服
調胃承氣湯
大黄（一两）　甘草（二錢半）芒硝（四錢半）
右分作三服每服用水一鍾半煎至九分服
加减思食丸
神麯　麦芽（各二两）烏梅（四两）　乾木瓜（半两）
白茯苓　揀甘草（各二錢五分）
右為末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸不拘時
細嚼白滚湯送下如渴時噙化一丸

瀉黄散
防風（四两）　藿香（七錢）　石膏　砂仁
山梔仁　甘草（各五錢）○右分作七服每服用水
二鍾煎至一鍾食後温服
参苓白术散
人参　茯苓　白术　白匾豆　山藥
蓮肉　砂仁　薏苡仁　桔梗　甘草
（各一两）　九節菖蒲（飯上蒸五錢）

右為末每服三錢白滾湯調下忌食韭菜

大承氣湯

大黃　厚朴　枳實　芒硝

右水二鍾煎至九分食遠服

小承氣湯

大黃　厚朴　枳實

右水二鍾煎至八分食遠服

承氣湯

大黃　芒硝　枳實　黃芩　桔梗

杏仁○右水二鍾煎至一鍾服

胃風湯

白芷（一錢二分）　升麻（二錢）　葛根（一錢）　蒼朮（一錢）　柴胡

藁本　羌活　草豆蔻　黃栢（各三分）　甘草（一錢半）

麻黃（五分）　蔓荊子（一分）　當歸身（一錢）

右水二鍾姜三片棗一枚煎至一鍾温服

瓜蒂散

瓜蒂（一兩炒黃）　赤小豆（一兩）

右為末每服三錢用水一鍾半入豉一合同煎至六分去滓温服以汗得快為度亡血体虛者不可服

枳朮丸

白朮（四兩）　枳實（二兩）　神麯（一兩）

右為末米飲丸如菉豆大每服五六十丸食後不拘時湯飲送下

備急丸

大黃　巴荳　乾姜（各等分）

右為末煉蜜和為丸如小豆大每服二丸以利為度

枳柳丸

見積聚門

瘧疾門

有三十一名

瘧之為病其名有五予復查其數故加之以五五又一也然而名数雖多其感皆由饑飽勞逸六淫七情傷諸臟腑要之總司者脾胃焉盖脾主濕脾濕動而生痰故云無痰不成瘧若脾胃充實安得停痰而成諸瘧惟體虚之人則易感發發則呵欠寒熱頭疼或先寒後熱或先熱後寒或單寒单熱或寒多熱少或寒少熱多一日一發者受病一月間日一發者受病半年易治二三日一發者難治後為瘧母接成癆瘵此症人多忽焉殊不知瘧久而不速治之誠所謂坐以待斃也

○總脉

瘧脉絃　絃数熱　絃遲寒　絃滑食
絃濇痰　絃緊風

○忌食

鷄　麸　麺　醋　生冷　魚鮮　茄子

○不治症

瘧母日久成癆瘵

○查驗瘧疾輕重來歷

瘧發在夏至後處暑前是三陽受病故輕
太陽經為寒瘧治多汗之（膀胱）
陽明經為熱瘧治多下之（胃）
少陽經為風瘧治多和之（胆）
瘧發在處暑後冬至前是三陰受病故重
少陰瘧發在子午卯酉日（腎）
厥陰瘧發在寅申巳亥日（肝）
太陰瘧發在辰戌丑未日（脾）

○治法

凡邪瘧新發者可散可截瘧十次後用如聖丹塞耳不愈服如神丸

凡虚瘧久瘧者可補氣血

凡瘧過服截藥致傷脾胃必牽延不休

凡瘧必用貝母白术柴胡蒼术米泔拌炒隨症加減

如渴加葛根一錢陳皮七分甘草五分

如熱甚頭痛加川芎石膏煅各二錢

如渴甚加石膏知母麥門冬各一錢

如間日或三日一發在午後或夜發者邪在陰分加四物湯知母炒一錢紅花酒炒黄

一第一〇〇〇册 續修四庫全書 第2 反正勾

栢炒升麻各四分提起陽分来後用如聖丹

如間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加四君子湯以補氣四物湯以補血

如陽瘧多汗用参芪白术以歛之○無汗柴胡蒼白术黄芩乾葛以發之

如陰瘧多汗用當歸芍藥地黄黄芪黄栢以歛之○無汗用柴胡蒼术川芎以發之

如胃弱食少加人参一錢半芍藥酒炒麦芽炒各一錢

如傷食痞悶或食積加神麯麦芽枳實俱炒各一錢黄連五分

如日久虚瘧寒熱不多或無寒但微熱者邪氣已盡只用八珎湯加柴胡黄芩黄芪陳皮滋補氣血

凡瘧疾後變成痢疾從虚治用脾胃藥砂仁炒黄芩炒黄連炒木香陳皮當歸各一錢白术炒錢半芍藥炒二錢水二姜三煎八不拘時

凡瘧在陰分用藥提起陽分来午後至夜半謂之陰分夜半後至午前謂之陽分用川芎當歸升麻柴胡知母貝母之類擇取

凡瘧甚者寒熱頭疼如破渴而飲水多汗可與人参黄芪黄芩黄連梔子川芎蒼术白术

凡瘧大渴大熱用小柴胡湯去半夏加知母麦門冬黄連

凡鬼瘧論時辰要查何時發起即用時下法治

肺瘧

令人心寒寒甚則熱熱間善驚目中如有所見○服人参丸

心瘧

令人煩心欲得飲水寒多不甚熱○服甘草湯

脾瘧

令人不樂好大息多寒熱汗出病至則嘔吐止乃寒寒則腹中痛熱則腸中鳴○服橘皮甘草湯

肝瘧

在經令人腰痛小腹滿小便不利如癃狀非癃意欲恐懼氣不足腹中悒悒○服木香犀角丸

腎瘧

在經令人嘔吐熱多寒少欲閉户○服蓯蓉丸

在臟令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒○服烏梅丸

胃瘧

令人先寒洒淅寒久乃熱熱去汗出喜見日光火氣快然○服枳殼湯

在胃令人善饑不能食食則支滿腹脹○服順氣湯

胆瘧

令人體微寒不甚熱惡見人見人心惕惕如熱多汗出○服升麻湯

膀胱瘧

令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熱後汗出難止○服柴胡湯

寒瘧

自感寒而得無汗惡寒攣痛面慘先寒後熱○服神効方

暑瘧（又名癉瘧）

發作有時但熱不寒頭疼通身俱黒自汗大便閉小便赤色○服茵陳湯加香薷匾豆

濕瘧

冒襲雨濕汗出洗浴得之身重肢節煩疼嘔吐腹脹○服大蒜平胃散

寒熱瘧

仆厥手足俱冷昏不知人○服四將軍散

痰瘧

發作有時熱多寒少頭疼額角幷胸前肌肉瞤動食下即吐面赤○服半夏湯

食瘧

吞酸噯氣惡食不思食胸膈飽○服紅丸子

瘧母

瘧久左脇下生一塊名曰瘧母○服瘧母丸

勞瘧

表裏俱虛真元未復病雖暫止小勞復來○服歸芎鱉甲湯

牝瘧

久受陰濕陰勝陽虛寒多不熱氣虛而泄○服人參養胃湯

牡瘧

飲食不節饑飽有傷表裏俱虛○服四獸飲

孕婦瘧

服常山湯

子時瘧

在子時發起寡婦死鬼為病令瘧人脫衣東厢床上卧左手持刀右手持杖打令聲不絶毛盆盛水著路邊

丑時瘧

在丑時發起斬死鬼為病令瘧人當户前卧頭向東

寅時瘧

在寅時發起獄死鬼為病令瘧人著窒上灰火一盆莫令火滅即愈

卯時瘧

在卯時發起鞭死鬼為病令瘧人用五色衣燒灰三指撮灰酒調服

辰時瘧

在辰時發起墮木死鬼為病令瘧人上木高危處坐

巳時瘧

在巳時發起燒死鬼為病令瘧人坐地周匝燃火

午時瘧

在午時發起餓死鬼為病令瘧人持脂火於田中無人處燒脂香假拾薪去

未時瘧

在未時發起落水鬼為病令瘧人臨發時往東過渡船一番

申時瘧

在申時發起自刺鬼為病令瘧人臨發時以刀剌塚上使得姓名字咒曰若瘧我與汝拔却

酉時瘧

在酉時發起奴婢死鬼為病令瘧人碓稍上卧莫令人道姓字

戌時瘧

在戌時發起自絞死鬼為病令瘧人左索繩繫其手脚腰頭

亥時瘧

在亥時發起盜死鬼為病令瘧人以刀一把箭一枝灰一　安瘧人腹上其箭横着底下

已上鬼瘧十二名並用神効方

○諸藥製度法開末卷

橘皮甘草湯

橘皮　甘草　厚朴（各一兩）羌活　防風

肉豆蔻　茯苓（各二錢半）○分作五服每服水二鍾生姜三片煎一鍾食前服

茵陳蒿湯

茵陳　山梔　柴胡　黃芩　桔梗

牡丹皮　貝母　荊芥　升麻　半夏

羌活　杏仁　獨活　麻黃（各五錢）○分作七服每服用水二鍾生姜三片煎一鍾待臨發之際熱服初發壯熱可服此劑其他不可服

升麻湯

升麻　鱉甲（醋炙）淡竹葉　常山（各二兩）犀角

麥門冬　知母（各二兩）甘草（五錢）○分作十服每服水二鍾煎至一鍾空心午間溫服

回歘湯

人参　白术　白茯苓　橘紅　半夏

草果（各一錢）烏梅　甘草（各五分）○水二鍾姜三片棗一枚煎至一鍾不拘時服

人参養胃湯（寒多熱少先服此藥）

人参　厚朴　陳皮　蒼术　茯苓

半夏　草果　藿香（各一錢）甘草（五分）○水二鍾姜三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

甘草湯

甘草（一兩）蜀漆（三兩）常山　鱉甲（各四兩）石膏（五兩）豆豉（一合）梔子　烏梅（各十三箇）竹葉（切二升）○右水一斗煎至三升分三服

柴胡湯

柴胡　常山　知母　鱉甲　青蒿

甘草　枳殼（各一兩）○分作十貼每服水二鍾柳枝七根蔥白頭二寸煎八分空心溫服

順氣湯

厚朴　陳皮　白术　半夏（各半兩）乾姜

柴胡　甘草（各二錢半）○分作四服每服水二鍾姜三片棗一枚煎八分不拘時溫服

枳殼湯

枳殼　厚朴　白术　白茯苓　人参（各一兩）○分作七服每服水二鍾姜一片棗一枚煎至八分溫服

四将軍散

附子（二錢）訶子（二錢半）陳皮（三錢）甘草（一錢）○右水

二鍾煎至一鍾不拘時服

大蒜平胃散

用平胃散一貼大蒜一枚搗爛井水一大碗調蒜澄清以一半調平胃散飲盡餘一半（再）飲用被盖卧汗出即愈

常山飲

常山（半兩）　甘草（二錢）　青蒿（一錢）　烏梅（七箇去核炒）

右水酒小便各一盞煎至一盞令發時五更服

半夏散

半夏　藿香　羗活　芎藭（各一錢）　牽牛（五分）○右為細末每服二錢食後白湯調下

烏梅丸

烏梅肉（兩半）　常山（三錢）　豆豉（一合）　虎頭骨（酥炙）　附子

肉蓯蓉（各五錢）　射香（一錢）　桂心　知母（各一錢）　桃仁（一兩）○右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心米湯送下未發日服

蓯蓉丸

肉蓯蓉　烏梅肉　桂心　甘草　升麻（各五錢）　豆豉（三錢）　常山（三錢）　桃仁（三錢）○右為末煉蜜丸如梧桐子大未發日酒下二十丸臨發時再下二十丸

瘧母丸

雄黃　丹砂　射香（各二錢半）　鱉甲　龜甲

木香　虎頭骨　羚羊角　犀角（剉屑）　白薇

玄參　當歸　知母　防風　麻黃

牡蠣　龍膽草　地骨皮　猪苓　柴胡

茯神　升麻　梹榔　黃連　桃仁

阿魏　烏梅肉　赤芍藥　梔子仁　萎蕤

安息香（各七錢）　龍齒（三錢）○右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸米湯送下

如神丸

黃丹（四兩）　大蒜（十箇搗爛）入丹為丸如梧桐子大清朝空心靣向東井水送下一丸小兒菉豆大一丸忌生冷油膩合藥端午日

鱉甲丸

鱉甲　蜀漆葉　烏梅　常山　知母（各五錢）　萎蕤　甘草　苦參　石膏（各二錢十）　豆豉（五錢微炒）○右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸未發前米湯送下臨發時再服

木香犀角丸

木香　羚羊角　犀角（各剉一兩半）升麻　玄參

楮苓　檳榔（各二兩）鱉甲　甘草（各五錢）豆豉（五錢）○為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米湯送下如體熱去甘草檳榔加大黄一兩

神効丸

砒霜　硃砂　乳香（各五錢）射香　阿魏

菉豆　安息香　猢猻頭骨　虎糞中骨（各一兩）

右為末米糊丸如梧桐子大未發前男左女右手捻緊一丸便睡一時後便瘥

如聖丹

人言（一錢）蜘蛛（大者三箇）雄黑豆（四十九粒）○右研細末滴水丸如豆大來日發夜間朝北斗星下獻露少頃紙裹一丸清早塞耳中一粒可治三人

神效方

硃砂　白芥子　阿魏（各一兩）香墨（五錢）砒霜（一兩酸漿水一碗與端午日五更慢火熬如稀糊便入前藥末）丸如黍米大未發前冷醋湯送下一丸忌食熱物

紅丸子（治食瘧）

三稜（炮）蓬朮（各一兩）胡椒（一兩）青皮（五錢）阿魏（一[illegible]醋[illegible]煮熟）○右為末陳米糊為丸如梧桐子大每服七、八十丸白湯送下酒亦可

傷風門

傷風初病鼻塞身熱惡風自汗宜服踈風實表藥如不愈傳經變病與傷寒同隨在傷寒門調治

傷寒門

傷寒有正病三十六名因三十六名正病變症一百十一名因一百十一名變症更變有病無名證候一千五百五十一名在十日左右就犯二百零一死症於隆慶元年編著傷寒撮要六卷凡治斯疾者宜以此書覧之

識病捷法卷之二

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

癘風門 有三十六名

癘者大也風者六淫中之一也故名癘風即大風其病敗壞面目可憎形體可畏乃惡疾也書曰風從虛入蓋人有精元氣血四者設一不足風寒暑濕燥火得以乘虛而入喜怒憂思悲恐驚之氣鬱滯不行飲食房勞跌蹼醉卧風露汗熱解衣入水浴後迎風或手足破傷引入風毒侵於肌膚流注經絡傳於臟腑發於四肢內外薰蒸而成泡瘡病狀多端痛苦難忍欲求醫治須別居靜室斷酒塩醬動氣厚味戒色慾除思慮洗心皈命至心懺悔耐性寬心然後從治法內湯藥次序服去始可獲愈

○八不治

不知戒　謹責病　風水損　年五十

怯弱　後發症　傳染病　面體黑

○不治症（名八）

烏麻風　皷毛風　李子風　打烏風

赤遊風　刃指風　振斗風　老鼠風

○死症（名八）

皮死麻木不仁者死　內死割切不痛者死

血死潰爛成膿者死　筋死手足脫下者死

骨死鼻樑塌塔者死　目昏　耳聾　聲啞

○辯驗風症法

虫食肝眉落　虫食肺鼻崩

虫食脾聲啞　虫食心足底穿膝腫

虫食腎耳鳴耳沿生瘡或痺或痛如針刺

虫食身皮痒如虫行痒甚

肺經受症眉毛先落　心經受症

肝經受症面起紫泡　脾經受症先損其目

腎經受症脚底先穿

手指麻三年內有大風至

○禁治法

亂傳手法　縱意刀針　放血艾薰

取涎毒藥　用油浸身

○宜戒

戒憂怒　避風熱　省勞碌　絕色慾

除妄想　忌鹽醬　守藥規

○靜養法

子午夘酉時端坐閉目上下齒對以舌尖虛空將及齒縫念思字待口中凉方止不要出聲自己兩耳不聞口中念思字午前午後心中暗念百拜朝天懺一遍常要譬如死去父母妻子家業不能眷顧

○食淡法

假如每日餚饌當用鹽一錢只用九分過数日再減一分逐十日減至百日全不食鹽不覺淡矣經云淡之其為五行本鹽能助火

○宜食

猪肚　腰子　白魚　黑魚　白菜　刀豆

老酒　水梨　圓眼　菉豆（除此十物其他不必想食定[illegible]）

○治法

三十六種風條下不註湯名者悉用後項第一治法藥不愈再服第二治法藥又不除根再服第二次治法藥悉開於後雜方開左

○洗浴藥

地骨皮　荊芥　苦参　細辛各二兩水煎湯無風處薰洗遍身出血為効○又方桃槐榆柳桑五枝煎濃湯一大缸浸坐沒頸半日候湯如油為度

○發汗藥

川烏　草烏　當歸　川芎各二兩　麻黃　蒼术各四兩　甘草三兩　葱薑各二兩

右藥切碎入在罐內三日取出曬乾米糊為丸如彈子大熱酒送下汗出為度不許婦人鷄犬見之

○瀉藥（先服此藥瀉出毒物惡氣又用三稜針望肉黑處針出死血不可令出太過要損人）

連翹　防風　羌活　赤芍藥　川歸　薄苛　麻黃去根節　湯泡甘草　黃芩　生地　貝母　桃仁　丹皮　皂莢實　白花蛇已上各四錢　大黃八錢　芒硝二錢

右作四貼水酒各二鍾煎空心熱服日進二服查再煎五六日再服以利為度

○敷藥

大爛遍身塗之用狗脊堅者三兩蛇床子四兩石膏一兩硫黃六錢礬二錢朴硝少許猪油調搽

○搽藥

乳香沒藥各一錢猪牙皂角各一两附子五錢雄黄五錢川烏五六錢如無附子可用辰砂少許如無亦無妨

○生眉毛藥

羊角刺焙乾鹿角燒存性各等分爲末生姜自然汁調勻擦眉上一日一次眉自生矣

○手指攣曲痛脫落

用草麻去殼黄連剉如豆大每一两水一升小瓶浸水漸添春夏三日秋冬五日取草麻拍破平旦時面東以浸藥水服一粒漸加至四五粒微利不妨忌猪肉茹淡神効

○熨法（後開）

○近見粗工

用大風子油不知此藥性熱有燥痰之功而傷血至病將愈而先失明矣用此藥者宜少

○灸法斷根

右手脚大拇指筋骨縫間手指節約半寸各灸三壯去毒氣也

○四神丹（醫未有得此四味久服可愈大風疾）

羌活玄參當歸熟地枳實各等分爲末米飲糊爲丸如梧桐子大每服百丸白酒下

○浸酒藥

用苦參五觔好酒三斗浸一月每服一合日三次當不與絕覺痺既安細末服之亦良丸治癮疹惡瘡除伏熱養肝膽氣入紫萍丸捷萍多蛭寒月於山池取之擇淨洗泥暑蒸乾用

大麻風

十来日起如白膚冬底一般節節崩斷生流有流

癩麻風

變身癩瘡膿水

鷄脚風

面上浮行眉毛十来日脫下

冷麻風

變身水冷有麻木不知痛痒○服醉仙散

蛇皮風

身上花的就是蛇皮一樣

爛麻風

身上連片爛

漏蹄風
手脚穿
燥麻風
身上白肉如麦麸皮一般
胡桃風
身上白起紅塊
馮来風
手撫脚噪
血風
身上手脚紅脹

荷葉風
如荷葉連片無髮
白虎風（又名歷節風）
走注骨節痛○服虎骨散
紫癜風
如雲頭片一般身上紅的○用四神散服烏蛇
浸酒方
白癜風
身上有白點變身虛白○用四神散服烏蛇浸
酒方

婁孫風
手除脚爛○用草麻法
胭脂風
上邊面紅○用浸酒藥
鵝掌風
手上皮粗厚微黃色○用擦藥薰洗藥
鶴膝風（又名鼓槌風）
膝上青紅腫痛○服小續命湯加草薢川練子
獨活木瓜
草鞋風

脚上疼如針刺○用草麻法
裙帶風
腿肚連片生瘡
痛風
變身麻痛○服醉仙散
四枝風
手脚麻木○服醉仙散
四患風
四肢生瘡○用浸酒藥相油丸擦
蠱風

身上如刀割○服白花蛇煎

刺風

遍身如針刺○服乳香犀角丸

惡風

頭面肢體癮疼疹瘰○服硫黃酒

癧瘍風

面項生白駁狀如白癬○服炊幕散

烏麻風

黑漆柱一般骨裡黑出来不治

截毛風

身上疼痛衣服也穿不得不治

孛子風

身上起紫潰爛深潭不治

打烏風

口吐白沫横倒在地手脚齊起不治

赤遊風

肚腹脹大的不治

剪指風

手指並做一塊不治

振斗風

手振不治

老鼠風

身上日不痛夜疼不治

○第一次治法藥

初一日服追風散瀉悪血用大黃二两蟬殼一两八錢中用小者妙白花蛇皂角刺二两共為末每服五六錢入大風子不油一錢朴硝少許用老酒一碗調化送下不可熱服夜粥不可食待戌時放前藥一碗在卓上盆内以糖煎或蜜煎少許放在盤中不得令患者先見藥服藥畢用水漱口以蜜過口切不可睡去令人伴坐良久肚腹大疼最妙瀉四五次用薄粥補之

○初二日服消風散用白芷一两全蝎一两去尖人参一两共為細末每服二錢午間吃粥晚不要吃夜粥次早温酒調服二錢早飯遲些吃身上微痒為妙

○初三日服磨風散用羗活獨活小川芎天麻細辛葳霊仙防風荊芥麻黃何首烏蔓荊子牛蒡子蝦麻草蒼耳草各一两共為細末不見

火煑酒調服二錢假如初一日服追風散初二日服消風散初三日服磨風散初四日又服追風散初五日又服消風散初六日又服磨風散瘦弱者半月一服譬如初一日服起初三日止十五日服起十七日止強壯人十日一服譬如初一服起初三止十一服起十三止廿一服起廿三止切記日数為准服两月後日日服大麻風丸藥

大麻風丸藥

大風子肉二两白色者如油透黄色者不可用

白花蛇防風烏藥羗活獨活姜蚕炒全蝎何首烏荊芥細辛甘草天麻苦参人参南星姜汁拌炒白芷川烏童便浸蒸三次牛膝當歸麦門冬地黄各四两沉香四錢米糊為丸如梧桐子大每服二錢空心午間卧卧白滚湯送下一日準準服三次神効

○第二次治法藥

醉仙散　須量病人大小虛實與之證候重而急者須先以再造散下之候補養得完復與此藥胡麻子牛旁子蔓荊子枸杞子各一两

同炒蒺藜苦参瓜蔞根防風各五錢右為末每一两五錢入輕粉二錢拌匀大人每服一錢淡酒調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫内出臭黄涎水渾身覺痛昏悶如醉後利下膿血惡臭屎為度○再造散服之當日必利下惡物或異物或臭或膿或虫口黒色乃多年者赤色是近年数日又進一服無虫乃止欝金五錢如無升麻代皂角刺黒者大黄泡各一两白牽牛六錢半生半炒加木通朴硝右為末每服半两早晨無灰酒面東送下忌毒食半月止食白粥漸至眉毛皮膚如常甚者三二次就愈須依法調理不可妄有劳動終身忌牛馬驢騾雄鷄野味糟臟犯者再舉不治○換肌散治大風年深不瘥眉毛脫落鼻樑崩壞不餘月取効白花蛇四两酒濕去皮骨地龍二两去泥當歸細辛白芷天麻蔓荊子靈仙荊芥甘菊苦参紫参沙参木賊不灰木炙甘草沙宛蒺藜天門冬赤芍藥定風草何首烏菖蒲胡麻子草烏去皮臍蒼术川芎木鱉子各一两右為末每服三錢以

酒盡量送下

○第三次治法藥

紫花丸　木香沉香各二錢半人参一两當歸七錢半天麻五錢皂角五錢射香一錢半乳香沒藥各一錢雄黄五錢辰砂五分肉荳蔻一枚定風草一錢半還童子一两右藥為末作一處包之○白花蛇一條酒應濕去頭尾皮骨何首烏荊芥穗霊仙蛇床子二錢麻黄晋根節二錢胡麻子一錢右六味什蛇浸一宿以蚍通取出晒乾仍還原酒浸曝酒盡為

度右藥為末作一處包之○防風羗活甘草細辛川芎獨活蒼术枇杷葉白芍藥赤芍藥白蒺藜金銀花五加皮白芷苦参各五錢胡麻子白附子麻黄川牛膝草烏川烏泔浸泡石菖蒲各二錢半右藥為末作一處包之○以大風子半斤去殼新鮮者佳發油黄色者不堪用磁罌盛之封其口頓滚湯中盖鍋密封之勿令透氣文武火煎候黑爛為度杵無查如油入已上三包藥加糯米飯杵膏粘丸如梧桐子大晒乾不見火每五十丸鷄鳴午時臨卧各進一服茶湯送下輕者一料可愈重者三五料斷根為度止吃時菜白粥餘物總忌庚免再舉

小續命湯

方見中風門水二鍾煎至一鍾碗底先放麝香少許去查入藥在碗内服之至数十貼後加五積散同煎服

白花蛇煎

白花蛇（四两去頭皮骨）　白蜜（三十两）　生姜汁（六两）

萡苛汁（六两）　白姜蚕（炒）　全蝎（炒）　苦参（各一两）

白附子（炮三錢）　右為末先下蜜并生姜汁萡苛汁煎滚数沸次下諸藥末和匀瓦罌中重湯熬成煎以無灰酒調下一匙

乳香犀角丸

乳香（研）　犀角（鎊）　附子（去皮臍）　自然銅（火煆醋離七次）（各一錢）

沒藥（研）　木香　蔓荊子（炒）　人参

草烏（炮去皮尖）　丹砂（研）　鐵沙（水洗十次醋一盞煮鍛内炒出煙盡為度）

香附（各五分）　右為末酒糊丸如梧桐子大每服十五丸米湯送下臨卧服

四神散

雄黄　雌黄　硫黄　白礬（並用透明者各等分）

右為末每用時先浴通身汗出次以生姜蘸藥擦患處良久以熱湯淋洗當日色淡五日除根

烏蛇浸酒方

烏蛇（六兩酒浸去頭皮骨）　防風（去芦）　五茄皮　桂心

白蒺藜（炒去刺各二兩）　熟地黄（四兩）　牛膝（去苗）　天麻

枳殼（炒）　羗活（各四兩）　右以生絹袋盛藥用無灰酒二斗放罈中浸密封七日後開每日三度温飲一小盞忌猪鷄肉

硫黄酒

用透明鋒芒硫黄二錢乳鉢内研細入酒再研空心飲其清酒將查又研再入酒飲之日日如此硫黄能殺惡虫是大便下

五参散

人参　玄参　丹参　沙参　苦参（各一兩）　白花蛇（酒浸去頭皮骨一兩五錢）　右為細末每服二錢食後臨卧温酒調下

故炊菷散

故炊菷　甑帶　履底　蛇脱皮（一條）　右以月餘夜伺候正餓時都燒成灰研令細每服不拘時候以温酒調服二錢仍以醋調藥如膏以塗傳駮上即消

虎骨散

虎骨（酥炙黄）　烏梅肉　赤茯苓　肉蓯蓉（酒浸切焙）

甘草（炙）　芍藥（炒）　鱉甲（醋炙）　白术（炒）　人参

豆豉（慢火炒）　紫苑（去土）　黄芪（蜜炙）　常山（炒）　知母

枳殼（炒）　犀角（鎊各一兩）　當歸　升麻　柴胡

桔梗　前胡　桂心　木香　桃仁（湯泡去皮尖）　天靈蓋（酥炙各[illegible]兩）　右為細末每服二錢温酒調下空心臨卧各一服

熨法

黑豆（五升）　芫花（一斤）　生姜（切半斤）　右俱炒旋入醋拌用青布裹熨痛處更番炒熨以効為度

黄疸門（附發黄共有十七名）

黄疸之病方書所載有五皆是脾胃濕熱如盦麴相似氣不得透薛而生黄也載考諸書五名之外又有黑疸鼠疸急疸五虗疸陰黄疸發黄黄胖等名及論其濕熱有微甚或兼寒兼畜血兼内傷所因不同故治例不可不分臨病之際在乎脉症辯之

○生脉（道二）

微　小

○死脉（道三）

洪　大　寸口近掌無脉

○不治症（名七）

口渴　口鼻氣冷　形如煙燻黑色　酒疸

脚軟　急黄疸　女勞疸腹如水狀

○死症（名二）

喘滿死　口渴兼大便利者死

○治法

凡諸疸先用取水法後用五苓散加茵陳山梔黄連隨症加减

凡黄疸輕者用小温中丸重者用大温中丸熱多加黄連濕多加茵陳

凡諸疸利其小便愈假如脉浮以汗解之

凡黄疸便閉自汗當下之以十八日為期治之十日已上為瘥及劇者為難治

凡黄疸倦怠脾胃不和食少用胃苓湯

如小便赤加滑石黄芩黄連山梔茵陳豬苓澤瀉蒼朮青皮龍膽草

如女勞疸加三稜蓬朮砂仁陳皮神麴

如氣實人心痛身發黄宜吐用川芎山梔桔梗芽茶薤汁探吐之

凡諸疸秘方用棗礬丸

黄疸

脉浮緊身目面如金色食已則飢遍身俱黄卧如身體帶青帶赤增寒壯熱此因飲食過度積於脾胃風濕相搏熱氣薰蒸發陰部其人必嘔發陽部其人必振寒而發熱○用搐藥瓜蒂散○服茵陳散

黄汗疸

脉沉身體俱腫發熱汗出不渴狀如風水汗出

沾衣黃如栢汁此由脾胃熱汗出或風所閉熱結其汗黃也○服桂枝加黃芪湯

女劳疸

脉浮緊身目俱黃額黑日晡發熱惡寒小腹滿急小便不利大便黑足下熱此因過於劳傷房室之後入水多渴腹脹者難治○服硝石礬石散不愈再服加味四君子湯

穀疸

脉緊数食畢即頭眩心中怫欝不安食則腹滿遍身發黃此因脾胃有熱大飢過食所致○服穀疸丸或三因紅丸子

酒疸

脉沉絃緊細身目發黃無熱腹滿欲嘔心煩足熱或心中懊痛足脛滿小便黃面發赤班此因飢中飲酒大醉當風入水○服當歸白朮湯用如神散鼻中取黃水

黑疸

女劳疸前症加足下熱變作黑疸腹滿如水狀大便必黑時溏非水氣也亦服硝石礬石散○酒疸因下後變黑或嗜酒人發黃外無熱內則

小便不利面目青大便黑皮膚不仁胷中如蒜虀狀當心足下皆熱久遠成黑疸脉若浮滑腹滿欲嘔吐者必先吐之脉若沉滑腹滿大便閉者必先下之○服白朮湯

鼠疸

鼠盜飲食五穀遺糞在內人不揀擇誤食則生黃疸諸藥不効用猫涎和解毒丹服之

急黃疸

卒然發黃心滿而喘煩躁目赤痛命在須臾謂之急黃疸但心戰發熱是也多致不治○服犀角散

五虛疸

五疸牽延加脚軟心忡口淡耳鳴微寒發熱氣急小便白濁當作虛劳治之○服養榮湯或小建中湯

陰黃疸

黃汗染衣涕唾俱黃名曰陰黃疸○服蔓青子散發黃不欲聞人言小便不利名曰陰黃○服秦艽湯

黃胖

平胃散料一分香附一分加神麯麥芽白朮丸服

胃血發黃

或跌撲打傷或食熱物積瘀血在胃發者○服桃仁承氣湯

食積發黃

惡食少食噯氣呑酸腹痛胸膈微微飽悶○服梹香散或化積丸

內傷發黃

內感寒邪勞役形體飲食失節中州變寒之病發黃非傷寒壞病之比○服小建中湯或理中湯足矣不必用茵陳

傷寒蓄血發黃

傷寒當汗解反利則小腹蓄血其病身黃脉沉小腹硬小便自利病人如狂○服抵當湯

傷寒陽症陰症發黃

當汗不汗當利小便不利小便或受水濕治法詳見傷寒門

黃病

一身盡痛熱小便澁○服五苓散茵陳黃連

抵當湯

水蛭　虻虫（各十箇）　大黃（一兩）　桃仁（十二箇）

右水二鍾煎至七分食前溫服

白朮湯

白朮　桂心（各二錢）　豆豉　枳實　乾葛

杏仁　甘草（各一錢）○水二鍾煎一鍾食前服

當歸白朮湯

當歸　白朮　黃芩　茵陳　甘草（各一錢）　半夏　杏仁（炒）　枳實（各錢半）　茯苓（二錢）○右水二鍾生姜三片煎至一鍾食後服

蓁艽湯

蓁艽（一兩）　旋覆花　赤茯苓　甘草（各五錢）○右分三服每服水二鍾牛乳一小盞煎至八分服

茵陳湯

茵陳（一兩三錢）　大黃（四錢）　梔子仁（二錢）○右水二鍾煎至一鍾不拘時服

桂枝黃芪湯

桂枝　芍藥（各二錢）　甘草（一錢）　黃芪（三錢）○右水二鍾姜三片煎至一鍾食遠服

硝石礬石散

硝石　礬石（各煅等分）大麦粥飲為丸每服二錢
日三服重衣覆取汗隨大小便去大便黑小便
黄是其候也

加減五苓散

茵陳　楮苓　赤茯苓　白术　澤瀉
（各二錢）○右水二鍾煎至一鍾不拘時服

犀角散

犀角　黄芩　升麻　梔子（各一兩）
右為末每服二錢姜湯送下

治陰黄汗染衣

用蔓青子搗末平旦井水服一匙加至二匙服
之以瘥為度

如神散

苦葫甗子（廿一箇）　苦瓠子（去皮）　黄黍米（三百粒）
安息香（二根）○右為末以少許吹入鼻中滴出黄
水一升如黄水不止即以黍穣焼灰射香少許
和勻吹些少在鼻内即止

吹鼻瓜蒂散

瓜蒂（二錢）　母丁香（一錢）　黍米（四十九粒）　赤小豆（五分）○右
為細末每夜吹入两鼻孔内便睡明日取下黄

水隨服黄連散

加味四君子湯（治色疸）

人参　白术　白茯苓　白芍藥　黄芪
白扁豆（各二錢）　甘草（一錢）○右分作二服水
二鍾姜三片紅棗一枚煎八分不拘時服

三因紅丸子

青皮（二兩炒）　阿魏（一錢）　胡椒（三錢）　三稜　蓬术
（各一兩用米醋煑為末）陳米粉打糊丸如梧桐子大每服
二百丸白滚湯下

小温中丸

白术（五兩）　苦参（夏加冬減）　山查（各二兩）　茱萸（夏去冬加）　針砂
（十兩炒紅醋淬七火再炒另研）　蒼术　川芎（夏減）　神麯
（各半斤）　香附（一斤便浸）○右為末醋糊丸桐子大
食前塩湯下一方有梔子無术山查苦参茱萸

大温中丸

針砂（十兩製同前）　陳皮　蒼术　青皮
厚朴　三稜　蓬术　黄連　苦参
白术（各五兩）　生甘草（三兩）　香附（一斤便浸）　製法同上

棗礬丸

緑礬（半斤火煅通紅）○右為末紅棗肉為丸如梧桐子

大每服五十丸或酒或姜湯下

穀疸丸

柴胡　穀芽　枳實　厚朴　梔子

大黄（各一錢）○右為末水發為丸菉豆大白滚湯送下

養荣湯

當歸身　陳皮　甘草（蜜炙）　白芍藥　白术

麦門冬（各一兩）　茯苓　茵陳（各五錢）

右水一鍾每服四錢姜三片棗一枚煎服

五苓散（見泄瀉門）　胃苓湯（胃即平胃散苓即五苓散）

四君子湯（見脾胃門）　檳香散（見積聚門）

小建中湯（見傷寒門）　化積丸（見積聚門）

理中湯（見霍亂門）　桃仁承氣湯（見諸血門）

觧毒丹（開卷末）

癨亂門　有十四名

癨亂之作與死為隣其症内有所積外有所感陰不升陽不降乖格而成先心痛先吐先腹痛先瀉心腹齊痛吐瀉並行熱乗胃則吐濕傷脾則瀉風動肝則轉筋此三氣雜合乃為癨亂而有濕乾轉筋中惡癨亂四者之分如吐瀉並行邪氣得出庻幾十存八九若不吐不瀉邪無所出多致危亡至於治療得痊之後不善調理且有一死在於其中若飲食太早脾胃損極不能消化穀入於胃則危

必矣須待飢甚始可與濃米飲漸漸加至薄粥則無咎也

○生脉（一道）

大

○死脉（三道）

沉　細　遲

○不治症（二名）

少氣　不語

○死症（五名）

轉筋入腹　食穀太早　卵縮　舌捲

乾霍亂九死一生

○治法

凡霍亂臨時無藥用方法生蒜頭研細塗兩脚心

凡霍亂用盐熨法（開後）

凡霍亂熱多欲吐用加減五苓散

凡霍亂寒多不飲水用加減理中湯

凡霍亂六壹散通療脾胃受傷風濕熱三邪

凡霍亂寒月理中湯

凡霍亂暑月黄連香薷飲井水浸冷服

凡霍亂夏月多食菓瓜飲冷乘風不化所致者六和湯

凡霍亂轉筋男子以手挽其陰女子以手牽其兩乳近兩傍此千金妙訣

凡霍亂轉筋入腹用淋足法或盐塌法

凡霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉用梓木煎湯吐雖吐再用吐為妙

凡霍亂切勿與飲食雖米湯飲之立死必吐瀉過一二時飢甚方吃稀粥

乾霍亂

吐瀉不得出○服厚朴湯

濕霍亂

吐瀉易出○服五苓散或良姜飲

中惡霍亂

外邪干內正氣飲食不化氣道不得先通心腹卒痛吐瀉煩悶精神昏昧不識人○服丹珠丸

轉筋霍亂

熱氣燥爍於筋故筋轉而痛○先用盐塌法後用附子湯淋足

中寒霍亂

用藿香正氣散

中暑濕霍亂

轉筋煩渴悶亂○服二香散

霍亂寒多肉冷脉絶

服通脉四逆湯

乾嘔不止

服韭白湯

吐瀉不止

服回陽散

吐瀉過多

服四順附子湯

絞腸沙即乾霍亂

其症心腹絞痛冷汗出脹悶欲絶俗名絞腸沙

用吐法以塩半盞滚湯数碗泡塩令患人多飲

将鷄翅毛掃咽喉即吐所飲塩盡立愈

霍亂已死腹有煖氣

用灸法以食塩安臍中艾火灸二七壯仍灸氣海穴

霍亂面青黒命欲臨死者

服活命散

霍亂後虚煩不得眠

服寢濟湯

○諸藥製度法開末卷

活命散

防風 羗活 獨活 乾姜 細辛

（各一錢） 官桂（五分） 草豆蔻 肉豆蔻 川芎

（各一錢半） 呉茱萸 乾木瓜（各七分） ○右為細末白滚湯調下二錢

二香散

藿香 白术 厚朴 陳皮 茯苓

半夏 紫蘇 桔梗 白芷 香薷

黄連 扁豆（各五錢） 大腹皮 甘草（各二錢半）

右分作四服每服姜三片葱白三根水二鍾煎至一鍾不拘時服

回陽散

天南星為末每服三錢生姜五錢紅棗三枚水二煎八分温服未醒再服

四順附子湯

附子（生用） 白姜 人参 甘草（各等分）

右水二鍾煎一鍾空心服如服痛加桂小便不利加茯苓仍用炒塩熨臍中

加减理中湯

人参 乾姜 白术（各二錢） 甘草（一錢） ○右水二鍾煎至一鍾不拘時服

薤白湯

薤白（切細一握） 生姜（切細半两） 陳皮（去白三錢） ○右水二鍾煎至一鍾分作二次温服

回生散

陳皮（去白） 藿香（去土各五錢） 右水二鍾煎一鍾服

寢濟湯

麦門冬　人参（各一錢半）淡竹葉（八分）附子（炮二分半）半夏　甘草（各五分）〇右水二鍾姜三片粳米百粒煎至一鍾不拘時服

通脉四逆湯

吳茱萸（三錢）附子（二錢）桂心　當歸　甘草（各一錢）白芍藥　木通　細辛（各五分）右水二鍾酒半鍾生姜三片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

塩熨法

炒塩二碗布包安胸肚腹上以熨斗盛火熨令氣透則醒

塩塌法

用塩三合以水五升煎取三升浸青布塌在轉筋上浸手足在胸脇轉筋洗之若轉筋入腹者倒擔病人頭在下腹中平乃止極者引陰陰縮者必死煎一大缸塩湯暖浸之

丹砂丸

丹砂（五分）附子（一錢研末）雄黃（豆大三塊）〇右用巴豆七粒去殼油後入丹雄附煉蜜為丸如麻子大每服三丸不拘時白滾湯下如未利再服利不止冷粥食之即定

厚朴湯

厚朴　枳殼　高良姜　檳榔　大黃（各一兩）朴硝（三錢）〇右分作六服每服水二鍾煎至八分溫服

附子湯

附子（一枚）川椒　生姜（各二錢）葱（一兩切碎）〇右水一斗煎数沸入盆中淋洗轉筋處

六和湯

白朮　半夏　砂仁　杏仁　人参　甘草（各五分）赤茯苓　藿香　白扁豆（姜汁拌炒）木瓜（各一錢）香薷　厚朴（各二分）〇右水二鍾生姜三片大棗一枚煎至一鍾溫服

藿香正氣散

大腹皮　白芷　茯苓　紫蘇　藿香　厚朴　白朮　陳皮　苦梗（各三兩）半夏麯（各二兩）甘草（炙二兩半）〇右為末每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎六分溫服

四逆湯

甘草（炙二兩）乾姜（一兩半）附子（五錢）〇右吹咀每服五

錢水一鍾煎七分不拘時温服

黄連香薷飲

黄連（炒七分）　香薷（三錢）　厚朴（錢半）○右水二鍾煎至七分温服

理中湯

人參　甘草　白术　乾姜（各等分）

右水二鍾煎至一鍾食前温服

洗足法

用大蓼一握水煎燻洗立効

六一散（即益元散開痢疾門）

五苓散（見泄瀉門）　良姜飲（開末卷）

加減五苓散（開末卷）

内傷門（有十九名）

東垣論勞役飲食傷之爲病亦有發寒發熱表裏之症恐治之失故作内外傷辯而内傷之名著矣内傷之症皆由喜怒勞役饑飽致傷脾胃而然也内傷飲食乃傷其氣外傷風寒乃傷其形傷内爲不足傷外爲有餘經云飲食勞倦則傷脾形寒飲冷則傷肺書曰飲食自倍腸胃乃傷亦有老幼弃修善常齋或壯年而稟氣不足者脾胃已虚久矣脾胃既虚寒邪易入飲食不能消化停積於中舊食未消新食又入新舊相雜諸病而作或有近似外感之症隨以外感而治其死可必故立内外傷辯如黑白之分明矣

○内傷總脉

右手脉來空大無力左手寸口微濇是内傷

右寸脉比左寸大兩倍傷輕　右關数大勞

右寸脉比左寸大三倍傷重　右關沉滑食

胃脉弱飲食不節寒暑失宜　胃脉隠代邪

外感六淫右手寸脉平常左寸微澁是内傷

○死症（名二）

勞役病大熱與中熱外感相似誤與白虎湯服之死

血虛肌熱煩躁誤與白虎湯服之死

○辯驗內傷外感法

內傷出言懶怯寒熱間作無汗怕些小風

外感出言壯厲寒熱齊作有汗怕一切風

內傷食減口不知味腹中不和手心熱

外感食不減口能知味腹中和手背熱

內傷近暖處就不怕寒鼻流清涕

外感近烈火只是怕寒鼻乾不利

內傷口鼻中氣短促喘午後病少加

外感鼻中氣不能出并從口出粗厲

內傷四肢倦怠嗜卧半眠半起

外感初病便着床枕非扶不起

內傷頭疼自汗身熱間或有之

外感頭疼自汗身熱常常有之

內傷久病必不渴傷重始則微渴

治法

大抵有內傷重外傷輕者必顯內症多則是內傷重外感輕當補養為發表為次

大抵有外感重內傷輕者必顯外症多則是外感重內傷輕當發散先補養為次

凡病內傷者十有六七但有挾痰挾外邪挾熱鬱於內而發者皆以補元氣為主

如挾痰用補中益氣湯加半夏姜汁竹瀝

氣虛熱甚少加附子以行参芪之功

老人幼子齊素人虛弱人久病人內傷

凡遇天氣大熱在路途勞形得病者或田野勞形得病者或少食勞役過而得病者其症肌體壯熱躁盛悶亂大惡熱發渴飲水身亦疼痛初

受病時與中熱外感有餘之症相似誤與白虎湯服之旬日必死須驗其口鼻中氣短促上喘午後病少加○服補中益氣湯隨症加減

內傷肌熱躁熱困渴引飲目赤面紅晝夜不息脉洪大而虛重按全無經云脉虛血虛又云血虛發熱症像白虎湯症惟脾脉不長常實為異耳如誤與白虎湯服之必死此病得之於飢困勞役○服當歸補血湯

內傷飲食勞役者多但有挾痰挾外邪有熱鬱在內者皆以補中益氣湯為主挾外感看何邪加

何藥疎邪挾痰加半夏姜汁竹瀝熱甚加附子以行参芪之功

内傷發班因胃氣虛甚是火遊行於外亦有痰者火則痡而降之痰熱微汗以散之切不可下

内傷煩躁

因血少不能潤理宜養陰煩躁不眠者○服六乙散加牛黃

如近似傷寒煩躁不絶聲汗後復熱脉細数五七日不睡○服補中益氣湯倍加人参竹葉甚者加麦門五味知母

如近似傷寒至五七日後煩躁吃水者○服補中益氣湯加附子

如近似傷寒三戰後劳乏煩躁昏倦○服四君子湯加當歸黃芪知母麦門冬五味甚者脉細数無序三更後吃水至天明此乃元氣虛加竹瀝大劑服之

内傷舌黑燥

舌黑燥大便滑泄食在大腸煩躁夜不安○宜服防風當歸飲子下之

内傷燥渴

内傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺○服人参黃芩炒甘草少加姜汁冷服虛者用人参湯

七情内傷

因劳心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚悸煩熱○服人参當歸麦門冬白芍酸棗仁茯神（各一錢）五味（十五粒）山梔（炒）生地甘草陳皮川芎

強食内傷

或因人強與飲食或自縱口福其症心腹滿悶惡食噯氣○服枳實丸加麦芽神麴山楂甚加枳香散

憂思内傷

因憂思之時食物結在胃中腹皮底微痛心下痞滿不思飲食○服木香化滯湯

寒冷内傷

天氣寒冷又食冷物胃口痛上肢两脇咽不通○服草豆蔻丸

熱内傷

因食極熱之物痞悶兀兀欲吐煩亂不安○服二黃丸

飲食劳役内傷

其病腹脇滿悶短氣口無味遇夏雖熱尤寒飢常不飽不喜冷物○服升麻順氣湯

大內傷

因脾胃俱虛其病怠惰嗜卧四肢不收體重節痛口乾舌乾飲食無味大便不調小便頻数食不化洒淅惡寒慘慘不樂面色惡○服升陽益胃湯

久病內傷

因病久不能食大便或結或溏○服白朮和胃丸

寒藥內傷

或久病人服寒藥過多胃脘微痛○服益胃湯

中焦內傷

因中焦火衰受寒飲食不美心腹疼大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉○服沉香温胃丸

虛冷內傷

因虛積冷心下堅痞兩脇脹滿心腹痛噫宿腐氣○服如意丸

瘀血內傷

吐瘀血亦名內傷○服承氣湯加蘇木桃仁

承氣湯

大黄　芒硝　杏仁（泡去皮尖）　枳實　桔梗

黄芩（炒）右加鉄秀水白水各半煎諸藥後入酒一小盞大黄芒硝再煎数沸服下惡物為度

葛花醒酒湯

葛花　白豆蔻　砂仁（炒各五分）　乾生姜　青皮

白朮（炒各三錢）　澤瀉（炒）　神麯（炒各二錢）　白茯苓　人参

楮苓　橘紅（各一錢半）　木香（五分）　右分作四服每服

水二鍾煎至九分熱服得微汗酒病自去矣

當歸補血湯

黄芪　當歸（各等分）　右水煎服

木香化滞丸

木香　紅花（各三錢）　當歸尾　陳皮（各二錢）　甘草

草豆蔻（五分）　紫胡（四分）　半夏（一兩）　枳實（二錢）右作四

服每服用水二鍾生姜三片煎至九分食遠服

升麻順氣湯

升麻　紫胡（各八分）　黄芪（一錢）　半夏（六錢）　陳皮

歸身（各一錢）　甘草（五分）　草豆蔻（二分）　人参（八分）　神麯

黄栢（各五分）　右水二鍾生姜三片煎至九分服

益胃湯

黃茋　陳皮　升麻（各五分）　柴胡　人參
白朮　益智仁　黃芩（各三分）　當歸（五分）　甘草
半夏（各二分）　蒼朮（一錢）　右水一中半姜一片煎至八
分食前熱服忌食生冷硬物酒麪

升陽益胃湯

羗活　獨活　防風（各五錢秋旺用三味）　柴胡
白朮　茯苓（渴者不用）　澤瀉（各三錢）　黃茋（二兩）　人參
半夏　甘草（各一兩）　白芍（五錢）　黃連（五錢）　陳皮
（四錢）右分作八服用水二鍾半生姜三片煎至一
鍾溫服服藥後如小便罷病加劇減去茯苓澤

瀉若喜食初服藥一兩日不可飽食恐胃再傷
藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄味之食
美食以助藥力慎不可淡食以損力而助邪氣
降沉但可小劳不可大劳碌

如意丸

枳殼（炒）　梹榔　橘紅　三稜　半夏
乾姜　黃連　蓬朮（各二兩）　巴豆（二十一粒）　右將
巴豆同衆藥同好醋煑乾揀去二十一粒巴豆
餘藥焙乾為末薄糊丸如菉豆大每服十丸加
至十五丸姜湯送下食後服孕婦不可服

草豆蔻丸

神麴（五錢）　草豆蔻　白朮　枳實（各一兩）　陳皮
乾生姜　青皮（各五錢）　黃芩（冬月少用）　半夏（三錢）　麦芽
盐（少許）右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服五
十丸白湯送下量所多少加減服之

二黃丸

黃芩（二兩）　黃連（一兩）　升麻（二錢）　枳實（五錢）　柴胡
甘草（各二錢）　右為末水浸蒸餅丸如菉豆大每服
七十丸白滚湯送下

白朮和胃丸

厚朴　半夏（各一兩）　白朮（一兩二錢）　陳皮（八錢）　梹榔
枳實（各二錢半）　木香（一錢）　人參（七錢）　甘草（三錢）　右為末
水浸蒸餅丸如桐子大每服三十丸溫白湯下

沉香溫胃丸

沉香　甘草　吴茱萸　人參　當歸
良姜　木香　茯苓　白朮　白芍
（各五錢）　附子　巴戟　乾姜　茴香
（各一兩）　官桂（七錢）　丁香（三錢）　右為末用好醋打
面糊為丸如梧桐子大每服七十丸米飲空心
送下一日服二次忌食生冷

枳實導滯丸

茯苓　白朮　黃芩　黃連（各二錢）　枳實
神麯（各五錢）　澤瀉（二錢）　大黃（一兩）右為末如已上法
丸每服七十丸食後白滾湯送下

檳榔丸（治食心腹脹膨）

檳榔　木香（各二兩半）　陳皮（一兩）　牽牛　枳實
（各五錢）右為末醋糊丸如桐子大米湯送三十丸

備急丸（治心腹卒暴百病）

大黃　巴豆　乾姜（各五錢）右為末蜜煉同
藥杵千下丸如小豆大每用三丸老幼虛人一

二丸白滾湯送下以利為度若中惡氣心腹脹
滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤尸卒死者以緩
水化藥三丸送下若酒服之或不下捧起頭灌
下須臾未瘥再與三丸服之待腹中鳴轉即吐
下便愈如口噤亦須析齒嚾下忌食蘆笋猪肉
冷水油膩數日

瓜蒂散

方見脾胃門若兩尺脉絕無可用此吐法輕用
恐損元氣令人胃氣不服若止是胸中塞滿悶
亂不通以指探吐如不吐以長鷄毛探吐如食
不去方用此藥吐之

防風當歸飲子

柴胡　人参　茯苓　甘草（各一兩）　大黃
當歸　防風　芍藥（各五錢）　滑石（三兩）　右作四
服每服水二鍾生姜三片煎至九分去滓通口
不拘時服如痰嗽加半夏

枳朮丸（見脾胃門）　檳香散（見積聚門）
人参湯（開卷末）　六一散（見痢疾門）

關格門（有二名）

此門與嘔吐小便二門互相查考

治病

關格二症多致於危最難治也凡治諸病下手便論關格標本緩急關者熱邪在下焦其症手足冷小便不通無出之由曰關格者寒邪在胸膈其症外熱液汗不通湯水不入嘔吐無入之理曰格關格即係標本緩急書曰急則治其標緩則治其本假如人患十分重病先要問其胸膈寬與不寬小便利與不利如云不寬或不利先治關格為急為標後治重病為緩為本又要以關格二症分為標本以小便不通為急為標先通利小便後治胸膈不寬為緩為本陰氣盛陽氣不相營曰格陽氣盛陰氣不相營曰關陰陽俱盛曰關格關格者不得盡命而死惟求速治為貴耳

○關病脉　氣口脉来比人迎大四倍

○格病脉　人迎脉来比氣口大四倍

○治法　關病即是小便不通見小便門
　格病即是胸滿嘔吐見嘔吐門

嘔吐門（附惡心有二十八名）

此病與關格小便二門互相查考

治病

嘔吐噦皆屬胃家所主究其三者之源皆脾胃虚弱而致分其腑之氣血多少為異耳嘔者胃病其經多氣多血故有聲有物也吐者太陽病多血少氣故有物無聲也噦者少陽病多氣少血故有聲無物也諸嘔吐不出乃是火與痰熱外或六淫之擾内或七情之変胃若受病飲食不化氣血不和則賊風虚邪犯其陽飲食飢飽傷其陰而成嘔吐其症危之至速又謂之關格標本緩急故列於前

○總脉
　嘔脉緩吉　浮洪為氣　浮大為風
　浮数為熱　沉遅為寒　浮匿為積

○難治脉
　朝食暮吐脉来緊濇

○不治症（名）
　胃虚嘔不食兼恐怖

○死症（名二）

女子嘔吐甚者死　諸大吐渇飲水者死

○治法

凡嘔吐多服生姜自然汁為主

凡嘔吐雖有胃症不可用瀉藥

凡嘔吐用蘆管入鼻孔内吹皂莢末少許令嚏出即止

諸大吐渇飲水者死

急以童便徐徐飲之

胃寒嘔吐

胃中停寒其症喜熱不食胃口上下綿綿而痛

○服理中湯加丁香

胃熱嘔吐

胃受邪熱其症喜冷心煩不食○服竹茹湯

寒熱嘔吐

胃口有熱胃中有寒嘔吐不止○服炮附子丸

胃虚嘔吐

用藿香丁香人參陳皮生姜水煎服

胃風嘔吐

欲吐不吐飲食不得進用防風天麻生姜汁水煎服

平日脾胃虚嘔吐

用二陳湯加藿香砂仁人參黒瘦陰虚火動肺熱四等人去人參加白术

久病嘔吐胃虚不納穀

用人參黄芪白术香附各二錢水二鍾煎八分臨服加生姜自然汁半盞温服

乾嘔者

服豆蔻湯

乾嘔而利者

服黄芩半夏

乾嘔欲死者

用半夏一两二錢半湯泡七次生姜一两每服五錢水一煎六通口服

食已即吐

用大黄甘草湯

朝食暮吐

早晨食至晚嘔吐四肢冷不食○服大養胃湯

宿食嘔吐

中脘有宿食留飲其症吞酸心疼口吐清水噯宿腐氣○服枳术丸加半夏陳皮

痰飲嘔吐

中脘伏痰小便清白右脇微疼惡心頭運不快或發寒熱○服旋覆花湯

食冷嘔吐

食冷物凝滯胃間嘔吐不止○服丁香丸

嘔吐閉利

大便閉或利時覺腹痛食不下○三乙承氣湯

傷暑嘔吐

服香薷飲

夏月嘔吐不止

服五苓散加姜汁半酒盞如脾胃虛加白术

七情嘔吐

喜怒憂思悲恐驚之氣欝積在内其症寒熱眩運胸滿不食而吐○服大藿香散

欲嘔不嘔欲噦不噦無柰者

服竹茹湯加陳皮半夏姜汁

孕婦嘔吐名曰惡阻（方見女科）

霍亂嘔吐（方見霍乱門）

脚氣嘔吐（方見脚氣門）

嘔而心下痞者

用半夏瀉心湯

噦

胆病有聲無物吐出名噦○服竹茹湯加陳皮

惡心

欲吐不吐心中兀兀如畏舟汪舡之狀名曰惡心○服白术湯加姜汁数匙如胃中有痰加半夏陳皮黄芩黄連並用姜汁伴炒

三乙承氣湯

大黄　枳實　厚朴　芒硝　甘草（各二錢）右水二鍾煎至一鍾服

大養胃湯

厚朴　生姜（各一兩）　肥棗（兩半）　白术　山藥

人参　川芎　陳皮　當歸　藿香

五味子　枇杷葉（去毛）　黄芪　甘草（各五錢）　右分作九服每服用水二鍾煎至一鍾空心服

竹茹湯

竹茹（括一兩）　葛根（三兩）　半夏　甘草（各一兩）　右分作五服每服用水二鍾生姜三片煎至一鍾服

旋覆花湯

旋覆花（一錢）　半夏　橘紅　乾姜（各半錢）　檳榔

人参　白术　甘草（各一錢）右用水二鍾生
姜三片煎至一鍾不拘時服

草豆蔻湯

草豆蔻　藿香　枳殼　陳皮　白术
山芋（各五錢）桂心　丁香（各一錢）右分作七服每
服用水二鍾棗二枚粟米少許煎八分食後服

白术湯

白术（三兩半）半夏（一兩）乾姜（五錢）丁香（二錢）右為末
姜汁丸如梧桐子大每服三十丸白滾湯送下

炮附子丸

附子　青皮（各一兩）右為末米飲丸如梧桐子
大大黄末為衣每十丸加至廿丸白滾湯送下

丁香丸

丁香　木香　糊椒　藿香（各三錢）甘草
乾姜　肉桂（各二錢）右為末米糊丸如菉豆大
每二十丸乾嚼不用湯水

理中湯（見霍亂門）　枳术丸（見脾胃門）
五苓散（見泄瀉門）　二陳湯（見痰飲門）
香薷飲（見暑門）　大藿香散（開卷末）
半夏瀉心湯（開卷末）

小便門（有三十一名附八條）

此門與關格嘔吐二門互相查究

治病

小便不通　小便五淋　小便出血
小便出糞　小便不禁　小便遺尿
小便頻數　小便尿多　小便不利
小便腫痛　小便不舉　小便囊脫
陰户瘡虫

小便不通名曰閉乃熱也淋者滴也古謂之癃名稱不同小便澁痛放出如粟之狀名曰淋病小腹痛引臍中緣熱入膀胱不能滲泄故也古云心腎氣鬱則小腸膀胱三焦不利而成五淋之患熱在脬中煎熬日積輕則凝如脂膏重則結如沙石有云冷淋者誤也殊不知淋瀝疼痛恐之身必憎寒戰慄有是乎冷岩遂作為冷此不明耳小便諸症皆可易治惟小便不通死之甚速又謂標本緩急與關格嘔吐二門合為一体者也

○小便不通生死脉

與小便淋瀝病脉相同

○小便死症名一

男女忍尿不出名曰胞轉

○淋症生脉通二

大　實

○淋症死脉通三

虚　小　澁

○淋病死症名一

下焦氣血乾者死

○小便不通治法後開

○小便五淋治法後開

小便不通（小腹急滿尿不得出不痛者是小便不通痛者非也乃小便淋病也）

小便不通兼口渴

是熱在上焦氣分○服清肺飲

小便不通口不渴

是熱在下焦血分○服滋腎丸

男女胞轉

因飲食時忍小便或忙時忍小便或房事忍小便皆致胞轉臍下急滿小便不通此症臨危面青黑多致危○用頭髮燒灰一合醋調服加葵末又方用皂莢打碎濃煎湯坐脚桶中浸洗小便

小便不通

用獨囊蒜一枚梔子二十一箇鹽花少許共擣貼臍中良久即通未通塗在陰囊上立通○又方用蘿苩子一合擂極細末調燒皂莢末二錢服之立通外用食鹽安在臍中切蒜瓣加在鹽上銅杓盛熱湯熨之○又方用皂莢煎濃湯浸洗小便以通為度湯冷易之

小便久不通

用桃枝方

婦人小便不通

婦人生産脬破終日不得小便但漏濕○服補脬飲

陰囊腫脹大小便不通

用白术木通陳皮各半兩為細末每服二錢姜湯送下五更空心服

小便孔通脹滿欲死者

用葵子二升水四升煑一升頓服入猪脂如鷄子大一塊更佳

小便五淋（小便滴瀝澁痛出如脂膏砂石者是淋病不痛者非也乃小便不通）

熱淋
小腹脹滿小便赤数澁痛○服四汁飲
○膏淋
小便肥如膏○服磁石丸
血淋
遇熱則發甚則溺血其候臭頭色黃小便難
○服當歸湯
石淋
莖中痛尿不得卒出○用導水法又方小便
時沙石下

劳淋
尿似膏出遇劳碌則發痛引氣衝○服地髓
湯
氣淋
小便澁常餘瀝○服瞿麦湯
五淋欲死
服地髓湯
上盛下虚成淋
服清心蓮子飲
諸病後體虚成淋

服皮膚子湯
小便出血（又名曰小腸漏）
見諸血門
小便出糞（名曰交腸）
因氣不循常道清濁混淆糞在小便而出○
服五苓散調氣散各一錢阿膠五分黃連木
香末各二分煎湯送下
小便不禁（是常常尿自出而不覔也）
有虛熱虛寒之分虛寒用秘元丹虛熱用六
味地黃丸加杜仲石脂五味减澤瀉

小便遺尿（睡中尿出不自知覔小兒多有此症）
用鷄腸散加桂心
小便頻数（是不時撒尿又不多也故老人多頻数乃膀胱血少火偏旺也）
用牡蠣山茱萸五味子之類
小便頻数
小便常欲撒尿如稠米泔色○服桑螵蛸散
小便頻数
小便常撒尿如有疝氣痛連小腹呼叫不已
腎經積冷所致○服益智仁湯（見泄瀉門）
小便尿多（是下元虛）

服八味丸即五苓散減澤瀉一半加阿膠一兩破故紙肉蓯蓉各五錢煉蜜爲丸如梧桐子大每服二錢空心米湯下

小便尿多

有喜盛致小便多日夜無度○服分清飲或七氣湯

小便不利（撒尿不盡不爽快也）

小便不利

津液偏滲腸胃大便瀉小便澁○服五苓散加木通

小便不利

熱搏下焦隨濕不行○治宜滲利

小便不利

脾胃氣滯不能通調水道下輸膀胱○治宜順氣

小便不利

渴多飲水○服清肺飲

小便不利

莖中疼小腹急痛○服蒲黃滑石等分爲末酒服三次

小便痛（肝經氣滯蘊熱）

用甘草稍緩其氣若病淋作痛者似難一槩論必須清肺氣而清濁自分如氣虛用四君子湯血虛四物湯各加黃栢知母滑石石葦琥珀

小便腫痛

用苦參大黃荆芥皂莢煎湯薰洗

小便不舉（由命門火衰精氣虛冷亦有火鬱而致者）

服加味地黃丸

小便囊脫（陰囊腫爛）

用紫蘇末香油調敷

陰丸冷多汗

兩丸冷陰汗如水小便後有餘滴尻臀并小便冷惡寒喜熱膝下亦冷○服固真湯

陰户痒虫

女人陰户生痒有虫○用麝香杏仁研末以小袋貯藥納入陰户中

陰囊痒

用甘草煎湯冷浸洗後以海螵蛸末敷

小兒小便難熱腫纒如螺肉狀

用伏龍肝即灶底泥韭菜汁調敷

○小便不通治法

如因肺燥不能生腎水小便不通者用車前子茯苓

如不因肺燥膀胱有熱小便不通者用黄柏知母

如因脾濕不運而精氣不升故肺不能生腎水小便不通者宜健脾燥胃用蒼术白术

如氣虚則滲泄之令不行小便不通者用人參白术升麻木通山梔先服後吐就參芪藥中

探吐黑瘦人去參

如血氣則氣不升小便不通者用四物湯先服後吐就四物湯中探吐

如痰多則氣閉不運小便不通者用二陳湯先服後吐就二陳湯加木通香附探吐

如實熱則熱結下焦小便不通者用八正散大便動小便自通

如氣不利則氣滯而不行小便不通者用木香青皮

如熱欝小便不通者用赤茯苓黄芩澤瀉車前子瞿麦滑石木通

如氣血两虚兼熱小便不通者用八物湯加黄栢知母

○小便淋病治法

如腎虚成淋當補腎精利小便不可獨用利藥

如死血成淋用四物湯加桃仁丹皮

如老人氣虚成淋用人參白术木通山梔牛膝黒瘦陰虗火動肺熱等人去人參倍加白术

如痰熱滯中焦成淋用二陳湯加木香服之以鷄羽毛喉中探吐

如諸淋疼痛或有膿血用琥珀没藥海金沙蒲黄各等分為末甘草煎湯送下三錢不愈再服葵花根水煎服

瞿麦湯

瞿麦穗（三分）　黄芩（六錢）　木通（一錢）　竹葉（一把）　茅根

冬瓜子（五錢）　滑石（二兩）　葵子（二合）　右除滑石外分作三服每服用水二鍾煎至一鍾入滑石末六錢攪匀食前温服

當歸湯

當歸　淡竹葉　灯心　竹園荽　紅棗

麥門冬　烏梅　木龍（又名野葡）甘草（各五錢）右用水十鍾煎至七鍾患此疾多渴隨意飲之

地髓湯

右用牛膝濃煎飲之極効

地膚子湯

地膚子　豬苓（各一錢半）海藻　甘草稍　瞿麥
通草　黄芩　知母　枳實　升麻
葵子（各八分）右用水二鍾半生姜三片煎至一鍾不拘時服

四汁飲

蒲萄（自然汁）生藕（自然汁）白蜜　生地黄（自然汁各五合）
右和勻每服一盞瓦器內慢火熬沸不拘時服

補脬飲

黄絲絹（生者一尺剪碎）牡丹皮（白者）白芨（各一錢）右用水二鍾煑絹爛如錫空心頓服半日不可開言如說一聲話就不効

清心蓮子飲

石蓮肉　白茯苓　人參　黄芪（各二錢半）甘草
車前子　地骨皮　麥門冬（各一錢）黄芩（二錢半）右分作二服每服用水二鍾煎至九分食前服如發熱加柴胡一錢

清肺飲

茯苓　豬苓　澤瀉（各二錢）車前子　琥珀
木通　瞿麥　萹蓄（各一錢）通草　灯心（各五分）右用水二鍾煎至一鍾食遠熱服

磁石丸

磁石（火煅醋淬二十一次）澤瀉　肉蓯蓉　滑石（各一兩）右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸不拘時服温酒送下

鷄腸散

鷄腸（燒存性）牡蠣　白茯苓　桑螵蛸（各三分）
辣桂　龍骨（各錢半）右分作二服每服用水二鍾生姜三片棗一枚煎至九分食前服

桃枝方（治小便數日不通欲死者用之）

桃枝　柳枝　木通　旱蓮子　漢椒
白礬（枯各一兩）葱白（一握）灯心（一束）右用水三斗煎至斗半用瓦瓶一箇熱盛一半藥汁薰外腎週迴無風處薰藥冷換熱通則止薰

塗臍方

大蒜（一枝）梔子（仁廿一箇）盐花（少許）右擣攤紙上貼臍

良久即通未通塗陰囊上立通

又方

用皂莢半斤打碎煎湯一斗盛脚桶內薰浸通

導水法（治石淋）

用螻蛄七箇以塩一两同於新瓦上鋪盖焙乾研為末每服一錢温酒調下

塗臍法

大田螺十五箇水養待田螺口中吐出泥澄去上面清水以底下濃泥入膩粉五分調塗臍上尿立通

八正散

甘草　大黄　瞿麦　木通　滑石　萹竹　車前子　山梔（各等分）　加灯心水煎服

分清飲

益智　萆薢　石菖蒲　烏藥（各等分）　右水二鍾煎至一鍾服

調氣散

白豆蔻　丁香　檀香　木香（各二两）　藿香　甘草（各四两）　宿砂（二两）　右為末每服二錢白滾湯下

滋腎丸

黄栢　知母（各一两）　肉桂（五分）　右為末水丸如梧桐子大每服一百丸白湯下

固真湯

升麻　羗活　茈胡（各一錢）　甘草（炙）　澤瀉　龍胆草　黄栢　知母（各錢半）　作二服水煎温服

四物湯（見諸血門）　四君子湯（見脾胃門）

二陳湯（見痰飲門）　八物湯（即四物湯四君子湯）

桑螵蛸散（見閉卷末）　五苓散（見泄瀉門）

七氣湯（見關卷末）　加味地黄丸（見注夏門）

六味地黄丸

山茱萸　山藥（各四錢）　牡丹皮　澤瀉　茯苓（白各三錢）　熟地黄（八錢）　右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下

秘元丹

砂仁　靈砂（各一两）　龍骨（三两）　訶子（一箇）　右為末糯米粥丸如麻子大酒下二丸或三丸

大便門（附脫肛）有一十五名

水穀入胃腐化輕清津液之氣上輸於脾重濁糟粕之物下歸於大腸故大腸名為傳送之官或因體虛或因攝養乖戾三焦氣澁不通運棹不行糟粕壅滯腸間遂成閉結之患又曰腎主五液津液潤則大便如常須視虛實分別燥澁與閉結如一槩用通利之劑反致病之不瘳也

○總脉

脾脉沉數連尺部為熱結

兩尺部虛沉細遲為陰結

右尺部脉浮為風結　多面黃可候

○治法

凡大便閉結西北二方人以開結為主東南二方人以潤燥為主

凡大便閉結久病之人腹中有實熱者用潤腸丸慎勿峻利

凡太陰不得大便如食腹滿響是也用木香檳榔丸

凡胃中停滯寒冷之物大便不通心腹作痛用備急丸

凡實熱大便閉者用大承氣湯

凡大便不通服承氣湯不利用四物湯加枳殼檳榔桃仁紅花即開

凡大便燥者潤澁者滑之熱者涼之

凡大便閉者通之結者開之寔者下之

凡大便不通依各病條下藥不愈隨用通幽湯小提盆散藥二法

凡大便閉不能食小便清用厚朴湯主之

七情氣閉

喜怒憂思悲恐驚之氣欝不行者○服三和散

風閉

外因肺受風邪傳入大腸名曰風結○服踈風散○又大風病或中風病大腸結而不通者○服麻仁丸

氣閉

一切氣滯後重迫疼煩悶脹滿燥結○服六磨湯

血閉

一切失血大腸枯結者○服四物湯加麻仁

燥閉

火多之人津液少大腸結者○服生地升麻湯

寒閉（又曰陰結）年高腸冷或痃癖冷氣結滯不通○服皂角丸

熱閉（又曰陽結）積熱或傷熱或肺熱移大腸結者○服承氣湯

產後閉

產後失血大便閉者不可服峻利之劑恐傷氣血反重○服地黃丸加麻仁

大實大滿心胸高起氣塞不通

服承氣湯

身熱煩躁大便不通

服大黃飲子

飲食停滯腹脹痛悶嘔惡呑酸大便閉結

服脾積丸

大便閉結極甚昏不知人

用大田螺二箇鹽少許連殼擣置臍一寸三分布緊縛之即通未通再用烏相木根三寸磨井水服多研爛敷臍亦可

年老虛弱人閉結

服地黃丸加麻仁

大便出尿

用小便出糞方見小便門

脫肛

蘊熱肛門閉結肺經虛寒肛門脫出亦有婦人產育用力老幼久痢氣熱氣虛血虛皆致此疾必須溫肺補腸胃久則自然收矣○內服吊腸丸外用五倍子為末每用三錢煎湯浸洗臨臥用瓜藤煎湯浸洗送上即收○又方用木賊草燒灰為末摻入肛門按進即愈

○治法

氣虛四君子湯　血虛四物湯　虛熱加條芩

虛寒加乾姜（炒黑）　產婦久痢同上

吊腸丸

白朮　甘草　黃連　白芍藥　桔梗

玄參　條芩（各等分）　右為末醋丸如梧桐子大

每服五十丸空心白滾湯送下

大黃飲子

大黃（二錢）　杏仁　枳殼　梔子仁（各一錢半）

川升麻（一錢）　生地黃（一錢半）　人參　黃芩（各七分）　甘草

（五分）右用水二鍾生姜五片豆豉二十一粒烏梅一枚煎至一鍾不拘時服

潤腸丸

杏仁　麻仁　陳皮（各一兩）　防風　阿膠（各五錢）　右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五七十丸食前紫蘇湯送下壯者荊芥湯送下

脾積丸

蓬朮（三兩）　三稜（二兩）　青皮（一兩）　南木香（半兩）　良姜（五錢）　皂角（三大挺）　右為末用巴豆半兩研如泥漸入藥末研勻麫糊丸如麻子大每服五丸加至十丸用橘皮煎湯送下食遠服

疎風散

枳殼（五錢）　防風　羌活　獨活　檳榔　白芷　威靈仙　蒺藜　麻仁　杏仁　甘草（各一兩）　右為末每服二錢半生姜五片蜜一匙水一鍾煎服

脾約麻仁丸

麻仁（另研五兩）　大黃（一斤）　厚朴　枳實　芍藥（各八兩）　杏仁（五兩半）　右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸臨睡用白湯送下大便利即止

通幽湯

甘草　紅花（各二分）　當歸身　桃仁泥　升麻　生地（各一錢）　熟地（二錢）　右用水二鍾煎至一鍾磨檳榔五分食前熱服

六磨湯

沉香　木香　檳榔　烏藥　枳殼　大黃（各等分）　右各件熱湯磨服

皂角丸

皂角（去子）　枳殼（各等分）　右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十丸不拘時米飲下

[illegible]結藥

蟾酥　輕粉　麝香（各等分）　巴豆（少許另研）　右研極細用孩兒乳汁和丸如黍米大每服二三丸不拘時姜湯下

小提盆散

竈突墨（一錢）　滄塩（三錢）　右研勻每用一錢竹筒吹入肛門立透

敷藥

用丹生大螺一二枚以塩一匕連殼生搗碎置病者臍下一寸三分用寬帛緊縛之即大便如

未効烏桕木根三寸研井水服亦効就多研爛敷臍下亦可

掩臍法

右用連根葱一二根帶土生姜一塊淡豆豉二十一粒塩一匙同搗碎作餅子焙熱掩臍中以絹帛札定良久氣透自通

木香檳榔丸（見積聚門）　備急丸（見脾胃門）
生地升麻湯（見開卷末）　四物湯（見諸血門）
大承氣湯（見脾胃門）　承氣湯（見脾胃門）
四君子湯（見脾胃門）　厚朴湯（見瘧疾門）
三和散（見氣門）　地黃丸（即六味地黃丸見小便門）

識病捷法卷之三

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

癆瘵（有七十名不治 証二十名）

劳瘵之證非一端嗜慾不節起居無時七情六慾之火時動於中飲食劳倦之過屢傷乎身體漸而至於真水枯竭陰火上炎發為蒸蒸熱或寒熱進退似瘧非瘧名曰蒸病是也雖名狀多端大抵不過寒熱来往咳嗽吐痰咯血自汗盗汗荏苒不愈

青瘵

為尫羸成癆瘵之候此陰虛之極痰與血相共病所謂有蟲蛔者有傳尸者身體羸瘦者骨淫火肉脫僂虛者骨氣衰共難故古有云傳变二十四種或三十六種及九十九種等皆是也今夫七十名不治証二十名以證之

〇總脉

凡此病先診胃氣和緩脉為第一義古人云神氣是也

生脉（八道）

寸口脉浮而遲浮則為虛遲則為劳虛則衛

氣不足浮則榮氣衰脉　脉直上衝者逆虛

悪脉（二道）

脉微濡相搏為癆極　微弱相搏為七傷

皆是不治之悪脉也

○治法

凡癆瘵發熱有氣虛血虛之分晝甚而自汗倦怠當補中益氣　血虛則盛于下午脉數疾口燥渴當粮血滋陰　令人但見發熱即用柴胡不知柴胡走泄之藥惟肝膽有実火者宜之哉

腎虛觔骨痿不能行宜加味虎潛丸　氣虛則生脉散不言白朮　血虛則三才丸不言四物湯

凡虛弱人須以人補人河車人乳紅鉛俱妙

凡緩心和氣人可用粗暴菜者恐反助火宜謹矣

凡虛而熱在外者八物湯加軟柴胡地骨皮

凡虛而有痰者八物湯加陳皮貝母或姜製半夏花粉類

凡虛而脾不運者八物湯去地黃加陳皮山查

神麯香砂之類此治虛勞示其端倪耳臨病增損原無一定法

○忌食

湿麪　雞肉　生冷　魚鮮　油膩　犳脊

笋　蒟蒻　茄子

○不治證（二十名）

肉脱骨立癆

狐惑聲唖癆

吐蟲氣火癆

尸瘵脉絶癆

羸憊無智癆

虛勞吐血癆

滑泄不禁癆

精竭血枯癆

飛尸遁尸癆

肺癰失音癆

久嗽肺痿蒸

噴血虛微癆

五臟崩損癆

咯血煤黑癆

羸瘦絕穀癆
脉脱絕汗癆
喘促脱脉癆
控手暴熱癆
聲嗄乾枯癆
上吐下瀉癆

○灸焫法　七條．

崔氏四花六穴灸法（見末卷）
專治男婦五勞七傷氣血虛弱骨蒸潮熱形容憔悴咳嗽痰喘五心煩熱四肢困倦如諸風體弱諸氣尫羸久病痼疾形体虛弱者並宜灸之
腎俞二穴（在第十四椎下兩旁各一寸半上一南對是治虛勞耳聾腎虛水腫腰痛小便出好獨臥身冷如冰遺精溺血五勞七傷腳膝瘦疾針三分灸三壯）
大椎一穴（在第一椎）　膈俞二穴（在第七椎）
膽俞二穴（在第十一椎）　三焦俞二穴（在第十三椎）
胃俞二穴（在第十椎）　旋俞二穴在第二十椎

○方治法

殗殢癆
令人乍臥乍起甚則寒熱往來積聚為痛○服河澗柴胡飲子

花風病
寒熱進退而不樂或咳嗽時發沉沉不語恰頸痂或腹中疼○服柴胡仰肝散

火熱癆
熱蒸久不愈遂變骨蒸瘦弱　○秦艽鱉甲散或十味人參散．

風癆
感外邪連日不愈發蒸熱生咳嗽聲音不清○參蘇飲或加減瀉白散

瘧碎癆
瘧疾連歲不愈及骨蒸盜汗壯熱或增寒○服鱉甲飲或人參養胃湯

痰碎癆
咳而喘鳴一身麻痺或虛浮時吐痰沫　○服導痰湯或青州白丸子

寒熱癆
午后潮熱不食時咳嗽夜臥不安　○服地骨皮枳殼散

憂思癆

思慮傷氣善驚好怒時蒸熱而咳嗽　○服良
方潤神散

酒癖痨
酒客者脇下生酒鱉瘕往來寒熱蒸々不止○
服葛花解醒湯或枳俱子煎汁

陰虛火蒸
房勞傷精液則虛火舜焰而咳唾稠粘失精○
服極陰理勞湯

肺痿
勞證久嗽不止漸變肺癰肺痿　○服濟生方
桔梗湯或葶藶散

飲食痨
內傷脾胃之氣傷脫漸為咳嗽生蒸熱者○服
升陽順氣湯兼保和丸

滯氣痨
一氣不流行則頻下為積塊往來蒸熱○服分
氣紫蘇飲

血痺勞
令人膚腠甲錯類瘦骨立脫肉而蒸熱○服金
匱大黃䗪虫丸

毛髮痨
血枯血乾骨蒸不治則毛髮禿落而不生古云
鬼舐頭○服人参養榮湯或髮生地黃丸

蟲蛔痨
唇赤色筋脉攣痺而青筋貫串於小腹好食土
塊○服理中安蛔湯或三因神授散

黴毒痨
傳染於徽毒不愈筋骨疼痛破爛有日遂為痨
○服仙異令奇良湯

暑痨
感傷於複暑不治則生蔚蒸咳嗽不止自汗○
服参朮調中湯

變蒸癖
兒孩時暴熱俗云變蒸若不發於此蒸則至成
童為痨○服紫圓或鱉甲散

燥痨
為秋燥所感延至蒸者咳嗽虛羸遂致脫○服
清燥湯

邪祟痨
登神廟古塚發狂熱譫言妄語不止往來寒熱

累日不愈○服五蒸湯

肺癆

洒々惡寒甚則蒸蔚而咳嗽吐辛酸汁目中如有所見○服清肺湯

心癆

令人煩心欲飲水不渴或狂走發驚而咳嗽小便頻々失○服火劑湯

脾癆

沉々而不樂呃吐不止日晡所蒸熱腹中鳴動時痛時止○肥氣湯

肝癆

令人怒或腰脇痛不能於伏仰小便澁少如癃時蒸熱而咳○服秦艽鱉甲散

腎癆

筋骨疼遺精独閉於房戸好靜或咳而吐血○服鱉甲地黄湯

胃癆

舌下苦直不得咽嚥或早辰發咳不止十指不用○樂令建中湯

小腸癆

忽々驚忘大便苦難卒發煩燥小便頻咳而吐苦酸汁○猪苓湯

膽癆

面目慘青口苦精神不守目視不了明時々驚恐而咳○服鱉甲散

大腸癆

短氣而四肢虛腫鼻不聞香臭時滑泄無度○服參苓白朮散

膀胱癆

小腹微痛胞脹癃或小便澁痛餘瀝腰中冷如坐水中○服紫苑湯

三焦癆

咳脹滿不欲飲食氣逆面腫不小便大便滑泄○服黄耆湯

浮腫癆

經絡既虛受於風濕皮膚閉塞栄衞不利○服補中治濕湯

秘結癆

腸胃有風熱故也腸裏肥滿則秘結不開時煩熱○服潤燥湯

淋閉痨

發達甲膽之氣癈則下流而不升故發淋閉而不通令陽氣上昇則瘥〇服升陽益胃湯

小便不利痨

膀胱津液之府而主水膀胱虛則胞中冷故小便難〇服金匱腎氣湯

白濁痨

労傷於腎則腎氣虛冷故小便數而白赤瀉或時莖中痛〇服草薢分消飲

下血痨

労憊及於藏腑内崩流傳於下腸則下流於鮮血〇服槐花散

嘔逆痨

労傷不安則脾胃失職胃為水穀之海今既傷敗不勝水穀故吃逆〇服安胃湯

煩悶労

由陰陽俱虛陰衰陽勝暴則乘於心部故煩悶不安〇服清心仰膽湯

舌腫痨

心候舌也血虛為贅熱所乘又脾之大絡出於舌下心脾有熱故令舌腫〇服升麻柴胡湯

唾血痨

崩損湧噴遂為唾血時煩熱進退不止或咳唾帯紅絲血〇服花蕊石散

凝唾痨

虛労久則津液凝結於咽喉是腎氣不足故也液為唾止焦熱蒸故也〇服貝母散

夢泄痨

腎虛為邪所乘邪客於陰夢交接虛憊不制精液故泄精〇服樗樹根丸

尿精痨

腎氣衰憊故也腎藏精氣從於陰故因小便而精漏　〇服金鎖匙丹

尿血痨

労衰而蘊於蒸熱血滲於胞更濕蒸則為尿血且澁痛不可忍　〇服琥珀散

失精痨

腎藏敗脫不能藏於精故精自然漏失尤七傷之一也　〇服秘精丸

目暗痨

肝血虛則目暗或雀目寒熱發作蒸々盜汗或善怒時失明　○服平肝散

不眠痨

藏腑尚虛榮衛不和陰氣虛衛氣不行於陽不入於陰故不眠○服三因温膽湯

驚悸痨

心者藏神而主血脉勞傷血脉則令心氣悸動謂之驚悸痨　○脉天王補心丹

髓筋痨

勞傷血脉則膚腠空疎而血筋横解髓脉敗乏不能於步履　○服還少丹

皮剥痨

皮膚粟起而不閉於汗孔自汗濡衣夜間盜汗腠理麻澁　○澡洗湯

痺厥痨

一身頑痒痳痺而不知於痛痒漸至勞羸氣息虛微　○蠲痺湯

痂結痨

爵痂者火陽甲膽病也不治則勞爵而生血筋之病　○烏苓通氣湯

偏枯痨

勞損人體虛易感於風邪邪氣乘虛客手身故手足不遂云偏枯痨○服人參補氣湯

濡湿痨

感冒於水湿連日不治則蒸爵而不散或歸泄滑腸遂變生勞羸　○服升陽益胃湯

滞下痨

痢疾二三歲延及數歲不愈遂成勞疾往來蒸熱咳嗽云痢痨　○伏龍肝丸

羸虛痨

血液乾涸不潤澤四肢柴瘦骨立如鬼能食而不能於坐卧　○獺肝丸還少丹

疲神痨

謀慮不決而曲蘊神氣善忘舌本強而不能言語噎咽閉　○服天王補心丹

癥瘕痨

積聚盤結而不遷或心下痞塞充脹痺結而陰痛遂發寒熱　○服枳殼散

衄血痨

肺勞連日不治發衄不止往來蒸熱咳嗽稠粘

紅疾聲嗄　○服麥門冬散

陰冷痨
腎藏虚脱則陰莖濡弱而骨節萎弱貴屬艱难精冷故也

陰痿痨
腎閉於六慾陰腎數衰則不能於榮養故陰器痿淺而不用婦人陰痛○腎氣丸科

陰瘡痨
腎經虚而多含於陰邪或下痹破爛不收故常痛疾云陰瘡痨○服何首烏湯

瘡瘍痨
瘡疾多日不愈血氣儘虛四肢瘦弱夜則咳嗽盗汗不食云痨劳○人參養榮湯

小兒痹痨
幼兒痹疾連日不愈漸四肢瘦細腹大頭細遂成劳嗽有五種五歲之月○治法錢氏爲宜

嬰孩丁奚痨
由哺食過度脾胃衰弱血氣減少不榮肌肉而柴辟羸露○獺肝丸

產婦蓐劳
產后虚羸喘促如瘧四肢柴瘦水谷之精減損無以榮其血氣○服當帰羊肉湯

崩血痨
產後敗血凝滯令人浮腫或畜血妄行爲崩漏不可作水治行其氣血○服猪腎飲

傳疰痨
劳蜩伏匿於腸頑覺憔悴夢寤顛倒尸魂揚々傳傍人早不治玉　○服青桑枝湯

河澗柴胡飲子（治一切積熱肌骨蒸往来寒熱及傷寒）
柴胡　人參　黄芩　甘草　當帰　芍藥
大黄（各等分）右㕮咀每服七錢水（三盞）煎一盞

柴胡仰肝散（治寡居独陰無陽欲心萌而多不遂恚熱）
蒼朮　香附　山梔　地骨（皮二）　赤芍　丹皮錢
柴胡（錢）青皮（二錢）川芎（七分）神麹　生地　連翹（各二）
[illegible]煎空心温服

人味人參散
人參　白朮　茯苓　半夏　甘草　當帰
赤芍　葛根　柴胡（酪一）黄芩（半両）水煎服

參蘇飲（見末巻）　加減瀉白散（見末巻）

人參養胃湯　導痰湯（見痰飲門）

青外白丸子　見中風門
地骨皮枳殼散（治骨蒸壯熱肌肉消瘦）　地骨皮　枳殼（麩炒）
秦艽　柴胡　知母　當歸　鱉甲（醋炙）各等分
每帖七錢水二盞用桃柳枝頭各七莖薑二片
烏梅一箇煎八分臨臥服
良方潤神散（治癆瘵昏壯熱口乾寒）　人參　黃耆　桔梗
麥門　淡竹葉　炙甘草　餘入麥同煎溫服
葛花解醒湯（治飲酒太過嘔吐酒痰）　白蔻　砂仁　葛花（各五錢）
木香（五分）　青皮（三分）　白茯　陳皮　豬苓　人參（各錢半）
白朮　神麴　澤瀉　乾姜（各三）　水煎或為末服
丹溪曰治酒病用瘀火消熱藥過多不効者須從
治之用藥中加枳椇子黃連多加姜汁
極陰理労湯（治陰虛火動皮寒骨熱）　生地（姜汁炒二錢）　當歸　麥冬
牡丹　陳皮（各一）　白芍　人參（六分）　薏苡　蓮肉（各三）
五味（二分）　甘草（三分）　棗一枚　水煎徐徐服
桔梗湯（治肺癰咳嗽膿血咽乾）　桔梗　貝母　薏苡（各七分）　百合
熱當歸　枳殼　瓜蔞仁　桑白皮（各七）　黃芪（一錢）
甘草節　杏仁（去皮尖）　防己（七分）　水二盞姜五片煎
葶藶散（治肺癰氣急）　甜葶藶（炒兩）　百合　白附子　北五
味子　甘草節　人參　款冬　百藥煎

紫苑（半兩）　朱砂（二錢半另研）　右為細末每三錢燈心湯下
升陽順氣湯　見末卷　保和丸　見末卷
分氣紫蘇飲　見末卷　大黃䗪虫丸　見末
人參養榮湯　見末卷　髮生地黃丸　見末
理中安蚘湯　見虫門
三因神授湯（治傳尸勞氣）　川椒（二斤去子幷合口者炒出）　右為
細末米湯下一錢必麻痺暈悶少頃如不能禁
以酒糊丸梧桐子大空心服五十丸
仙異全湯（治[illegible]）毒筋骨　土伏（乙兩）　防風　木瓜　木
通　薏苡　白鮮皮　金銀（各五）　皂子（四分）　水煎服
參朮調中湯　見咳門　千金方紫圓　見末卷
鱉甲散（治虛勞）　鱉甲（醋炙）　當歸　赤芍藥　柴胡
桔梗　甘草（炙）　人參（各一）　麝香（五分）　杏仁（去皮）　胡黃連
（三錢）　官桂（[illegible]）　地骨（一錢）　木香（酥）　宣連（一錢）　真酥（三兩）
白砂蜜（二兩）　右為細末用青蒿乙　竹童便五升　加
酥成膏搜和為丸梧子大每十五丸溫酒下
清燥湯　見末卷　清脾湯　見末卷
五蒸湯（治骨蒸勞熱）　甘草（錢二七）　茯苓（二錢）　人參（一錢）
竹葉錢　生地黃　葛根（各二錢）　知母　黃芩（各三錢）
石膏（三錢七分）　右咀每八錢水二鍾粳米錢半溫服

火劑湯 見末卷　胞氣湯
秦艽鱉甲湯　鱉甲地黃湯 同上
楽令建中湯（治藏虛損骸） 前胡 細辛 當帰 白芍
人参 橘紅 桂心 麥冬 黄芪（蜜炙） 茯苓
甘草（炙各八分） 半夏（五分） 右作一服水二盞姜枣〻水煎
猪苓湯 見末卷　鱉甲飲
参苓白术湯 見脾胃　紫苑湯
黄耆湯　補中治湿湯
潤燥湯　升陽益胃湯
金匱腎氣湯　罕蘇分消飲
槐花散（治腸風下血藏毒） 槐花（炒） 側栢葉（杵） 荊芥穗
枳殼（麩炒各等分） 為末每服二錢空心米飲調下
安胃湯（治脾胃虛弱嘔吐） 人参（二錢） 藿香 丁香（各乙） 陳皮
（八分） 右為細末每服二錢姜湯調服
清心仰膽湯　升麻柴胡湯
花藥石散（治五藏崩損瀉血） 花蕊石（火煅存性為末） 右用童便
一鍾煎温調末三錢甚者五錢食后服
貝母散（治久嗽虛寒不已） 貝母（姜汁浸） 五味子 桑白皮
黄芩 陳皮（各二錢） 半夏 甘草（炙） 桂心 柴胡
木香（各半錢） 杏仁（去皮十四粒） 乾姜（炮二分各） 右咀姜三片水煎

樗樹根丸（治夢遺精滑） 樗根皮 高良姜（三錢） 黄蘗 芍藥
（燒存性各二錢） 右為末神麴糊丸梧子大每三十丸
金鎖匙丹（治男婦精泄） 茯苓 茯神（二錢） 遠志 龍骨（煅三錢）
左股牡蛎（煅四錢） 右為末酒糊丸梧子大每四十丸
琥珀丸（治五淋小便） 琥珀 海金沙 没藥 蒲黄（各等）
右為末每服三錢食遠通草湯服為丸可
秘精丸（治元氣固遺精） 大附子 龍骨（煅） 肉從蓉（酒浸一宿）
牛膝（酒浸） 巴戟（去心） 為末煉蜜丸梧子大每三十丸
平肝散 見末　三因温膽湯
天王補心丹　還少丹 見末卷
爆洗湯（治一切風疾瘙癢） 乾荷葉 藁本 甘松 白芷
威靈仙 蒼耳草 忍冬藤 煨鹽 每用三
兩煎水一桶去滓淋洗次日愈
蠲痺湯（治手足冷痺腰腎沉重） 當帰 赤芍 黄耆 姜黄
羌活（二錢） 甘草五分 右水盞半姜五片紅枣〻一枚
烏苓通氣湯　人参頴栄湯
伏龍肝丸　礬肝丸
枳殼散（治五種積氣三焦痞塞） 枳殼 益智 陳皮 三稜
莪术 檳郎 肉桂 肉豆蔻 厚朴 青皮
木香 乾姜（各五分） 作一服姜枣水煎

麥门冬散（治鼻衄）麥門　生地　白芍　蒲黃（各一）

右水二盞姜五片煎八分食后温服

何首烏湯　當歸羊肉湯

猪腰飲（治虛勞）猪腰　白芍　當歸　水煎

青桑枝散（治烟取虫）青桑枝　柳枝　桃枝

梅枝（各長七寸四莖）青高　石榴皮　赤箭　鬼臼（各三兩）

右用童便一升半葱白七莖煎至一升半另入安息香阿槐（各一）煎一盞調辰砂一分射香一字服

虛損

有二十二名　不治証十名

虛損之證多由色慾過度善怒不節起居不時飲食恣欲有所勞傷皆其元氣氣衰則火旺火冷則乘其土而胃氣散解不能滋營百脉灌注藏腑衛護周嚴故虛損之証生焉病則百脉横解腰脚疼軟胸滿氣短必煩不安耳鳴目眩咳嗽寒熱夜作盜汗遺精白濁飱泄食少無味不為肌膚或痓中驚悸午后潮热倦怠無力此皆虛損之候也

○生脉（二道）　緩而有力　緩而有神

○虎脉（三道）　細而虛　微而濡　弱而微

○不治証（十名）

百脉至空虛死　血脱兼脉実死

絶穀而脉盛死　卒然發大熱死

䐃肉共脱者死　瘦衰骨立者死

腰尻生胝瘡死　大孔如竹筒死

坐卧發虛喘死　口鼻氣清冷死

○治法（二十二名）

肺虛損　短氣而面虛腫鼻乾不聞於香臭　○服十全太補湯

肝虛損，面目乾黑口苦精神不守眼目不明○服三才丸

心虛損　忽々喜恐大便苦难或時鳴溏口瘡○服天王神心丹

脾虛損　舌本苦不得於咽嚥四肢浮腫　○服黄耆建中湯

腎虛損　背難以俛仰小便不利色赤黄而餘瀝　○服補腎丸

氣虛極　令人內虛五藏不足正氣少不欲言語
○服補中益氣湯
血虛極　其人無顏色眉髮墮落忽々善忘　○
服八物湯
筋極虛　數轉筋十指爪甲皆痛不能於久立○
服虎潛丸
胃虛衰々　令人痠瘦無潤澤飲食不成於肌膚○
服還少丹
肌虛極　羸瘦無潤澤飲食不為於潤膚　○服
補肺湯
精虛損　令人少氣翕々然內虛毛髮禿落　○
服腎氣丸料
三焦損傷　虛損及上中下失類上吐下泄百疾
生○服人參養榮湯
病后虛憊　大病之後藏腑尚虛榮衛不和生瘵
病○服外陽補氣湯
脫汗極　藏腑損敗絕汗不止百脉大虛　○當
帰六黃湯
咳嗽損　五藏之虛咳不止則皮膚涑漏而自汗
○服蛤蚧散

過食損　過飱於生冷或飽食無置脾胃再敗○
服調中益氣湯
思慮損　謀慮不決而勞傷心肺則百損時來○
服帰脾湯
恐驚損　觸事易恐肝虛腎損之脫虛也　○服
寧志丸
婦人敗血　產後畜血生病則崩漏帶下之敗症
○服芎帰膠艾湯
邪祟傷　被附托鬼魅狐猫漸虛衰則百証隨時
生○可投大補劑

外傷損　傷損打撲湯火傷之類不愈漸之及脫
虛與內損同治可隨宜
○隨証菜方
十全太補湯　三才丸
天王補心丹　建中湯
補腎丸　黃柏　龜板（各二兩）　杜仲（酥炙）　牛膝
陳皮　乾姜（各五分）　五味子　[illegible]　右為細末姜
計糊丸或酒糊丸溫酒或白湯下
補中益氣湯　八物湯
虎潛丸　還少丹

補肺湯　腎氣丸　人參養栄湯
升陽補氣湯　當歸六黄湯
人參蛤蚧散（治虛勞咳嗽）　蛤蚧（酥炙）　人參　百部
款冬　紫菀（去苗）　貝母　黄耆　阿膠（炒）
鱉甲（酥炙）　柴胡　半夏　杏仁（去皮）　肉桂　、甘草
（各等分）右咀每服五錢水二盞姜三片水煎服
歸脾湯　寧志丸　芎歸膠艾湯

吐酸（吐酸）有十名

經云諸嘔吐酸皆屬於熱或云少陽之勝吐酸酸者肝木之味也由火勝金金不能平木則肝木自甚故為酸譬如熱天飲食則易於酸矣是以肝熱則口酸也

○總脉

脉微遲者從寒治　脉數弦者熱之甚
洪而數為熱痰在膈時吐酸水飲或反胃

○治法　十名

火鬱吐酸　火鬱於上部則木邪發動吐酸木味酸故也○服吳茱六乙散

寒鬱酸水　久病脾胃虛弱虛鬱故酸水○服補中益氣湯

脾胃虛吐水　中脘宿食留飲酸蜇心疼而吐酸○服麹朮丸

痰逆湧酸　痰飲鬱積於上膈則吐出痰沫○服二朮二陳湯

傷酒吐酸　一時宿酒吐酸胸痛古云酒客病○葛花解醒湯

湿熱吐水　水湿盛傷於人則氣惱煩熱而吐酸○服連苓茱萸湯

氣鬱吐水　鬱胃於六氣則默々不語時煩逆而吐○服大七氣湯

反胃吐苦　頑痰逆於中脘心下盤鬱而吐食及嘔苦汁○服半夏瀉心湯

虫蠆吐酸　虫蛔動搖則腹痛發作而吐水○服理中安蚘湯

選食吐酸　姙娠惡心阻食心下痞亦時吐酸○服安胎散

○治病薬方

丹溪茱萸六乙散（治吞酸自利）吳茱萸（鹽湯泡）六一散（一兩）

右以粳米飯丸梧子大每服五六十丸白湯下

補中益氣湯　　二朮二陳湯　　大七氣湯

半夏瀉心湯　　理中安蚘湯　　安胎飲

葛花解醒湯

麴朮丸（治中脘宿食）神麴（各三兩）陳皮　蒼朮（炒）右爲細末薑汁（另煮）神曲糊丸

連芩朱萸丸　見末卷

痰飲

痰飲門（有二十二名　不治証十名）

痰之爲疾誠多也何則人之血氣流行無一息之間斷纔有壅滯津液積聚而成熱痰遂生焉因証而觀病則火之變出也明矣未有痰病而不因火而成者也留飲積畜而不散亦爲病其証候千百而多端也

○總脉　二道

右関脉滑大緩有神　緩滑而有流理神氣

○惡脉　二道

沉滯而濇滑　微芤而澀滑

○不治証　十名

痰咳小便則發微喘　痰中帶敗血脉沉

絶食脉芤大而喘急　卒中作聲如索鋸

頑痰吐沫滚涸亡者　黑痰帶血聲音啞

痰臨腹中窜梗或疼　痰下流爲泄脱汁

厥痰絶汗眩而脉大　肺虛甚自汗下瀉

○治法　二十二名

氣痰　濕在肺經謂之氣痰○服小半夏湯

火痰　濕在心經謂之火痰○服滚痰丸

風痰　濕在肝經謂之風痰○服化痰湯

濕痰　濕在脾經謂之濕痰○服二陳湯

寒痰　濕在腎經謂之寒痰○服桂苓朮甘湯

酒痰　因酒飲所得爲酒痰○服青黛二陳湯

懸飲　喉中有物咯不得謂之老痰○服瓜蔞湯

溢飲　飲水流於四肢當汗不出○服澤瀉湯

支飲　心下支飲叱吐涎沫○服五苓散

伏飲　振々惡寒身瞤惕々然○服半夏橘皮湯

留飲　在心下飲癖在脇下痰塊○服五飲湯

積痰　留飲積畜不散心下痞○服半夏瀉心湯

食積痰　肉厚味炙煿過多　○服茯苓丸
眩運痰　頭眩眼前黑暗如坐舟車　○服天麻湯
嘈雜痰　凡人胸膈時如火如炙　○服三仙丸
煩燥痰　似熱非熱似寒非寒心煩　伏苓半夏湯
顛狂痰　忽然發狂語言錯亂　服驅痰飲子
小兒驚風　多是痰隨証取宜
中風不語　痰飲流入經脉偏枯痲痺　隨症
婦人驚悸　產后觸事為驚　○隨証進劑
老痰　頑痰流在周身為百怪病　○滚痰丸
鬱痰　氣滯為結痰宜開鬱順氣　○服分心氣飲

○藥方
小半夏湯（治心下支飲）　半夏（五錢）　生姜（二錢五）　水煎入姜
滚痰丸　化痰丸　二陳湯
桂苓朮甘湯　青黛二陳湯　瓜蔞枳實湯
澤瀉湯（治支飲冒眩）　澤瀉（五錢）　白朮（二錢）　右水二盞
煎七分食遠溫服
五苓散　半夏瀉心湯　五飲湯
半夏橘皮湯（治痰飲）　陳皮（半兩）　半夏（二錢半）
右水二盞姜五片煎八分溫服有熱加甘草
伏苓丸（治痰飲臂痛）　半夏　茯苓二両　枳殼（[illegible]）

風化硝（三錢半）　右為細末姜汁糊丸梧子大
半夏白朮天麻湯　分心氣飲
三仙丸（治痰飲留膈不利）　南星　半夏　香附子（熟各五兩）
右用南星半夏泡過為末用生姜自然汁和用
楮葉或荊葉包住以蒲包盦令發黃色收之再用
星二兩香附一兩同為細末煮麵糊丸如菉豆大
每服四十丸食后姜湯下
茯苓半夏湯（治胃虛有痰）　茯苓　半夏　白朮　神麴
[illegible]酪　麥芽（錢半）　陳皮　天麻　水煎姜一片
驅痰飲子（治痰飲頭痛）　南星　半夏　陳皮（去白）
青皮　菓草（各五錢）　右姜七片棗一枚水煎
八味順氣散　導痰湯　分心氣飲

積聚門　有十四名

巢氏曰積聚痼結者是五臟六腑之氣已積聚於內重因飲食不節寒溫不調邪氣重沓牢痼堅結者也若久即成癥令夫積聚之候因七情五志及飲食因滯而成者多矣素難所釋之意蓋以五行生尅之理推其理勢之有四者演而成文初不必論其情感亦不必論其還不還與其然否也讀者但以所勝傳不勝及王旺者不受邪遂留結為積治之可矣按有形為積或聚或散為聚有食積痰痰積有虫積有血積云癖云癥云瘕云塊其大略也

○總脈（四道）

脈駃而緊者積聚也

脈弦而緊細癥瘕也

脈浮而牢急亦積也

脈牢強平者吉脈也

○惡脈（二道）

虛弱而沉者死

沉遲而中散死

○法則

凡大積大聚其可犯衰其大半而已

凡堅者削之留者攻之結者散之客者除之上者下之摩者浴之薄之劫之開之發之適事為故

凡治積不可峻用下葯正氣虛者愈損真氣積久不去必先服補葯救次然后攻之或用磨積葯漸而消除融化可也

凡積塊在皮裏膜外須用補氣行氣開之達痰加補氣葯先須断厚味

凡積病下之不退當用消積葯融化開則消

○灸法

命門俞　二穴　　章門　一穴

期門　二穴　　氣海　一穴

關元　一穴

○治法

肝之積　號肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發咳逆痎瘧　○服肥氣丸

心之積　名伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心　○伏梁丸

脾之積　曰痞氣在胃脘大如覆盤久不愈如覆盤久不愈令人四肢不收發黄　○服痞氣丸

肺之積　號息賁在右脇下覆盤如杯久不愈令人洒淅寒熱喘逆骨痿少氣　○服息賁丸

腎之積　稱奔豚發小腹上至心下若豚狀上下無時久不已令人骨痿少氣　○奔豚丸

食積聚　脾胃不和中滿膨脹或心下上脘時疼痛　○服三稜丸

酒積癖　口唇乾燥目黄小水不利咽隔亦不通食少　○服草豆蔻丸

氣積聚　噫氣吞酸心下痞結而不通大便亦秘夜不睡　○服木香化滯湯

痰癖積　喘咳稠粘肩背痛不能回顧或手足麻痺　○服導痰湯

血瘀積
小腹急痛發作有時引脇下　○服桃核承氣湯

蟯蛔癖
肚腹斗大上唇瘢循之感々隱痛　○服芫花湯

茶飲茶癖
心腹脹滿氣刺疞痛　○服茶癖飲

米瘕
噯氣吞酸腹急痛發作有時　○服保和丸

鱉瘕
腹中癖結而如鱉形是多喰鱉肉及炙爛等解冷不消故生　○取白馬尿服之果愈

○附髮瘕　徐文伯字德秀篤好醫術宋明帝宮人患痛牽心發則氣絶諸醫以為肉瘕文伯視之曰此髮瘕也以油灌之即吐物如髮稍長引之長三尺頭以成蛇又能搖動懸柱水瀝盡惟餘一髮而已遂愈

○蛇瘕　隋有患者嘗飢而吞食則下至胞便即吐出醫作噎疾鬲氣翻胃三候治之無驗有太醫任度視之曰非此三疾蓋因食蛇肉不消而致斯疾但揣心腹上有蛇形也病者曰素有大風嘗求蛇肉食風稍愈後患此疾矣遂以亡硝大黄合而治之微泄利則愈醫皆請其驗而知蛇瘕也

○瓢癖　吳茵劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絶諸法不治戴人令一月之內涌四次下六次所去痰約一二桶其中有不化之

物如葵菜者烟魚腸之狀覺病積如割漸〻而平及積既盡塊痕如窪如臼罍無少損至是而面有童色經水復行

○飲癖　許叔微患飲癖三十年始因少年夜坐寫文左向伏几是以飲食多墜左邊中夜必飲酒數盃又向左臥壯時不覺三五年後覺酒止從左下有聲脇痛食減嘈雜飲酒半盃即止十數日必嘔酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無遍訪名醫及海上方間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石輩利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣自揣必有澼囊如水之有科臼不盈科不行但清者可行而濁者停滯無路以決之故積至五七日必嘔而去脾土惡濕而水則流濕若燥脾以去濕崇土以填科臼乃悉屏諸藥只以蒼朮一斤去皮切片為末油麻半兩水二錢研濾汁大棗五十枚煮去皮核搗和丸梧子大每日空腹溫服五十丸增至一二百丸忌桃李雀肉服三月而疾除自此常服不嘔不痛胸膈寬利飲啖如故暑月汗亦周身燈下能書細字皆朮之力也初服時必覺微燥以山梔子沸湯點服解之久服亦自不燥矣

○藥方

肥氣丸

當歸頭　蒼朮（各兩半）　青皮（炒一兩）　蛇含石（火煅醋淬七次）

三稜　莪朮　鐵華粉（三兩與稜朮同入醋內煮一伏時）

右為細末醋煮米糊丸菉豆大每四十丸當歸頭浸湯酒下

伏梁丸

茯苓（去皮）　厚朴（炒）　人參　枳殼（炒）

三稜（煨）　半夏（泡）　白朮（各半分）　右為末麪糊丸梧桐子大每服五十丸食遠米湯送下

痞氣丸

大烏頭（一分炮去皮尖）　附子　赤石脂（火煅醋淬）　川椒（炒出汗）

乾姜　桂心（各半兩）　右為末煉蜜丸梧桐子大硃砂為衣每服十丸米湯下

息賁湯

半夏　桂心　人參　吳茱萸（泡）

桑白皮（炙）　葶藶　甘草（炙各等分）

右水二盞姜五片棗一枚煎一盞食前服

奔豚湯
甘李根皮（焙）　乾葛　川芎　當歸
桑白皮（炙）　黃芩　甘草（錢半各）　半夏（泡 二錢）
右水二盞姜三片煎一盞食遠服
三棱丸　消積聚去米麵五穀等積
陳倉米（一兩巴豆新者五枚去殼同米慢火炒巴豆焦色去巴豆不用）
三棱（煨）　砂仁　麥芽（各二）　南木香（一錢）　陳皮
右為末醋糊丸菉豆大每服十五丸至二十丸
食遠姜湯送下
草豆蔻丸　治酒積胃口痛咽鬲不通
草豆蔻（煨）　白朮（各一兩）　麥芽（炒）　神麴（炒）
黃芩　半夏（泡各五錢）　枳實（麩炒 二）　橘紅
青皮（各三錢）　乾薑（二錢）　炒塩（五分）　右為極細
末湯浸蒸餅為丸菉豆大每服百丸煎水下
木香化滯湯　治因憂氣食濕麵結於中脘腹皮
微痛心下痞滿不思飲食食後不散常常痞氣
木香　柴胡　橘皮　草豆蔻（各錢半）
當歸　枳實（麩炒各錢）　半夏（三錢）　紅花
甘草（炙各五分）　右水二盞姜三片煎八分食遠服
導痰湯

桃核承氣湯　見末卷
芫花湯　上半月頭向上易治下半月頭向下難
治先以肉汁及糖密食引虫頭向上用芫花湯
苦楝根皮　檳榔子　鶴虱　芫花（各五分）
右水盞半煎減半空心溫服
茶癖飲　治茶積
石膏　黃芩　升麻（各等分）
右為末砂糖水調下二錢
保和丸　治一切飲食所傷肚腹飽悶不安
山查肉（三錢）　神麴（炒三錢）　半夏　茯苓
諸氣
陳皮（各錢）　蘿蔔子（炒一錢）　連翹　麥蘖（炒乙錢）
右為細末神麴糊為丸麻子大每服三五十丸
白湯或清米飲送下
白馬尿方　治鱉瘕及魚鱉積
用白馬尿汁一升雞子白三枚煎至二合空
心頓服不移時當吐出小鱉而瘥

諸氣門（有二十一名　不治二名）

人者小周天地也周流于人之一身以為主者氣也陽往則陰來陰退則陽復一升一降無有窮已苟内不傷于七情外不感于六淫其為氣也何病之有今夫曰滞氣曰短氣曰乏氣皆是肺受火邪氣得上炎之化有升無降而薰蒸於清道以変現於若干之病魔耳嗚呼氣疾之起種々不同經不言乎凡氣之變未嘗不詳豈理之書歟夫五志過極七情交攻牵戾失常帰清者遽變而為濁行者抑遏而反常表氣失護衛而不和内栄無徤悍而亡降當斯時乎隨其所感疾狀應之為治者須審虛実新久或求所起之因滞於何經可施治焉若槩以耗氣之藥惟能却氣之標而不能制氣之本豈有可治之理乎古所謂氣有餘便成火者以性屬陽故也依是以亟矩無誤耳

總脉（五道）下手脉沉便知是氣

長則氣治　緩長而安

短是氣病　実大而輕

所為貴有脉行流理

〇惡脉（四道）

濇短則氣病

大数則病進

形瘦脉大胸中多氣死

形肥脉細少氣不足以息死

〇不治証（二名）

冷氣之候蔵氣虛生内寒其形腹脹吐食或腹痛氣逆而喘面青勝厥冷脉微濇者死

乏氣之候虛極人栄衛減耗蔵腑敗脫氣不足呼吸氣短面青黒脉虛弱而時一止危

〇治例

原病式曰上氣脉躁而喘者屬肺肺脹欲作風水發汗愈

凡氣刺痛皆屬火當降火薬中加枳殻稟受素壯而氣結痛加烏薬

凡氣從左邊起者肝火也瀉青丸加青皮主之從右邊發者肺火也瀉白散主之

〇凡氣不帰元破故帋為主白朮亦可以其能和胃胃和則氣帰元

凡氣不升降香附半斤橘紅六兩甘草一兩為
粗末姜棗煎湯每服四錢大効

凡肥人氣滞必有痰〻以二陳二朮香附川芎燥
以潤之

瘦人氣滞心有火且燥宜降以潤之蘇子莱菔
子梔子帰芍之類

凡婦女性執多儒属陰氣易於動如痞悶脹痛
上湊心胷或攻築脇肋腹中結塊月水不調
或眩運呃吐往来寒熱一切氣假正氣天香
湯或四七湯酌用之

凡清濁不分膨脹浮腫二便不利無非破氣分
利似难執方因時制宜可也

凡陰虚氣滞四物湯加玄参黄柏知母

凡稟壯氣实氣不順而刺痛當用枳殼烏菜不
已加木香

凡調氣用木香性温氣上升加氣鬱而不達固
宜用之如陰火衝上阻塞有如氣滞邪用之
反助火邪用知母黄柏佐木香

凡七情鬱結遂成鬱氣者难治必須自能醒戒
服菜方可

凡諸腹脹大須利小便兼理脾氣之菜不可輕
用大戟芫花甘遂巴豆牽牛泄瀉耗其正氣
則邪氣愈脈病必难治

子和治一書生労苦大過大便結燥欬逆上氣
時唱々然有聲嗌呃鮮血以苦劑解毒湯加
木香漢防已煎服時々咽之後以木香檳榔
丸瀉其滞氣不月餘而痊

又治一婦人之思不眠子和令觸其怒婦果怒
是夕困睡捷于影响喘息低仰其脉滑手足
温者生脉濇而四肢寒者死

〇治法

喜氣
氣和志達榮衛通利故氣清若滞結而不順流
則病　〇服四磨飲

悲氣
心系急肺葉挙而上焦不通榮衛不散流　〇
服正氣天香湯

怒氣
上焦氣逆甚則呃吐及飧泄大僕云怒則陽氣
逆而肝木乘脾土〇服建中湯

恐氣
上焦閉塞則氣亂不下降故氣不流行耳聾頭
眩而小便頻々○服治氣湯

冷氣
腠理閉而氣不流理則氣收大僕所謂身冷則
衛氣沉　○服溫中分氣丸

火氣
腠膚開發而榮衛㾦則通身汗出氣泄故津液
隨汗脫而氣亂　○服三黃湯

驚氣
心無所依神無所歸慮無所定故氣煩亂以不
歸着　○三因溫膽湯

思氣
心有所思謀則神有所歸藏思氣留而不行故
閉結默々然○服三香正氣湯

勞氣
喘息汗出內外皆越故氣耗散神疲勞役久則
氣奔　○服調中益氣湯

憂氣
思慮過度不置且推悲則膀絡急而為筋攣為
麻痺婦人血崩　○服大霍香散

鬱氣
六鬱氣滯于胸膈則膨脹發滿于手足則四肢
浮腫小水赤澀　○服沉香降氣湯

滯氣
陰陽不和中脘窒塞則五鬲吐噫不止不能飲
食口乾　○五膈寬中湯

刺氣
氣攻而屬火稟受素推而氣刺痛肝氣之衝逆
也　○服指迷七氣湯

上氣
滯結之氣上逆而喘促不安面目虛腫胸中痞
悶不欲飲食　○服半夏湯

清氣
經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生䐜脹
○服升陽順氣湯

欠氣
呼吸微弱而欠氣胸膈不通者水氣在藏腑陰
氣在內故欠氣○服勝金散

奔氣

肺為五藏上蓋主流行若受邪則氣道不利故奔氣　○服治氣湯

結氣

為憂愁所生也心有所積神亦有所止氣留而不行故結於內　○服分氣紫蘇飲

短氣

無寒熱而短氣不足以息肺虛則氣少弱而令息短　○服紫沉通氣湯

遊氣

五藏不和則三焦氣滿滿則氣逆於內不宣通其病煩滿虛逆○服小降氣湯

疑氣

七情鬱結於內則肝氣不舒再為謀慮鬱塞心氣滞由狐疑無置　○服壓氣散

○考按

○吳括蒼云有一仕子因親賀壽過飲甚醉送宿花軒夜半酒渴欲茶门户深閉彼無奈何遂將口呷石礶中喫水碗許天明起觀礶中俱是小紅蛆心陡然而驚鬱々不散心中如有蛆物胃脘便覺閉塞日想月疑漸成痿羸遍請諸醫調治不愈一日延予診視病者備告予乃悟之彼是疑心遂生意用紅綫線分開剪斷如紅蛆形狀用巴豆二粒同飯搗爛入線丸如十粒（丸）予令病人暗室內服之置宿桶內於水須臾欲瀉令病人坐桶瀉出前物蕩漾如蛆然後開窓令伊親視其病從此解疑調理半月其患瘳矣

○吳括蒼云龍泉李廷用曾有一風廢僧至彼求食本家施飯僧遂與齋飯廷用從外而入口渴欲茶而小蒼頭將僧喫茶碗傾茶捧至廷用不悟飲之細觀僧人烈唇眉脫真麻風也延用心疑毫上遂痒擦起紅腫一塊則遍身皆痒憂鬱狀々無奈之何因得明者陳君解其疑延用悟其患止矣（釋疑錄）

○治方藥例

四磨飲　治諸氣

沉香　烏藥　枳実　檳郎子（各等分）

右四味白湯磨服

正氣天香湯　治諸氣滞結

香附子（二錢）　陳皮（去白）　烏藥　紫蘇（各一錢）

乾薑　甘草（各三分）　右水盞半煎七分不拘
時空心溫服

建中湯　補土氣制風木
赤芍藥　肉桂　飴糖（各六分）
右水盞半加大棗一枚生薑二片煎七分服

治氣湯
枳殼　青皮　紫蘇　半夏（製）
茯苓（各六分）　甘草（四分）　右水盞半薑三片煎服
○氣鬱作痛加川芎香附厚朴○食積氣痛加
木香砂仁神麴○胸膈飽悶加蘿菔子香附○
杞寒痛加吳茱萸良薑附子○氣鬱成火加黃
連山梔子

溫中分氣湯　治三焦氣不升降胸膈滿悶
南星　半夏（各一）　香附（二兩三味各薑製）　白朮
茯苓（各半）　木香　青皮　陳皮　良薑
乾薑（四味各一兩共醋水各一盞煮）　右為細末酒打糊為丸梧桐
子大每服三十九無時薑湯下

三黃湯
黃連　黃芩　大黃（各等分）　右剉劑溫湯
麻空心服無時

三因溫膽湯，治膽虛寒僵仆目黃失精
酸棗（二兩）　茯苓（二兩）　半夏　麥門冬半（各一兩）
甘草　桂心　遠志　黃芩　人參
萆薢（各一兩）　右每服四錢長流水服

三香正氣散　治嘔吐清水胸膈痞滯
木香　丁香（錢三）　香附子　陳皮　厚朴（薑汁炒）
益智仁　縮砂仁　甘草（各六分）　烏藥　蓬莪朮
乾薑（炮各四分）　右水盞半薑三片棗一枚　煎七分
不拘時候溫服

調中益氣湯

大藿香散　治七情傷感氣鬱
藿香葉　半夏麴　人參　白朮
茯苓（錢一）　木香（五分磨服）　桔梗　枇杷葉（去毛）
官桂　甘草（炙各錢）　右水二盞加薑棗煎一
盞溫服無時

沉香降氣湯　一治一切氣不升降（一名沉香升麻散）
見前　沉香　檳榔（錢二）　人參　大腹皮（洗）
訶子（錢五）　白朮　烏藥　香附子（炒）　紫蘇葉
厚朴（薑製）　神麴（炒）　麥芽（一兩炒）　京三稜（炮）
蓬莪朮　益智仁（各二兩）　陳皮（去白）　薑黃　甘草（炙）

分鹽　右為細末每服二錢食前用沸湯調服

五膈寬中湯　治七情四氣傷于脾胃
香附（十六兩）　厚朴（一斤）　青皮　陳皮　丁香
砂仁（各四兩）　木香（三兩）　生姜水煎或為細末姜鹽
湯點服

指迷七氣湯　治七情相干陰陽不得升降
香附子（二錢）　藿香　桔梗　蓬朮
青皮　陳皮　肉桂　甘草（各五）　益智
仁　半夏（各一錢）　右水二鍾姜五片煎八分
食遠溫服

半夏湯　治上氣嘔逆不能食
半夏（一錢半）　陳皮　白朮　甘草（五分炙）
桂心（四分）　人參　厚朴（二錢姜製）　右水盞半姜
五片棗三枚煎八分溫服

升陽順氣湯　治七情所傷及勞役
人參（一錢）　黃芪（二錢）　陳皮　半夏　升麻
柴胡　當歸　黃柏（各七分）　草豆蔻（四分）
神麯（炒一錢）　甘草（五分）　右水盞半姜三片棗一
枚煎七分服　恐則氣下者亦宜服之

勝金散　治男婦五臟諸氣搶心不語欲絕

天台烏藥（酒浸一兩）　茴香　青皮　良姜
各一兩　右為細末每服二錢空心溫服調服
婦人姜湯童便調下

分氣紫蘇散　治一切諸留帯氣
枳殼（一錢）　青皮　紫蘇　半夏（製）
茯苓（各八分）　甘草（四分）　大腹皮　桑白皮　麥門
冬　南木香（磨汁）　厚朴（八分）　檳榔　桔梗
香附子　藿香　右水盞半姜三片棗二枚煎
八分食遠服

紫沉通氣湯　治三焦氣滯不能宣通
紫蘇葉　枳殼　陳皮　赤茯苓
甘草　檳榔子（各一錢）　沉香　木香（磨汁各四分）
麥門冬　五味子　桑白皮　黃芪
乾生姜　薄荷葉　荊芥穗　枳實（麩炒各八分）
右水二盞煎八分空心溫服

小降氣湯　治氣不升降上盛下虛痰盛壅滯
紫蘇　天台烏藥　白芍藥　陳皮
（各一錢）　甘草（炙五分）　右水盞半姜三片棗一枚煎
七分食遠溫服

墜氣飲　治上氣呃逆諫利太過虛氣上攻短氣

木香　人參　白茯苓　藿香葉

陳皮　枳殼（麸炒）　甘草（酢一）　附子（一枚炮）

右為細末每服二戔煎紫蘇木瓜生薑湯調入銀器內重湯煮五七沸溫服

血證門（有三十六名　不治証四名）

經曰榮者水穀之精也和調五臟洒陳於六腑乃能入於脉也源源而來生化於脾充於心藏受於肝宣布於肺施滿於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脉少則濇充則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汁變化稍微而赤為血也生化旺則諸經恃此而長養衰耗竭則百脉由此而虛可不謹養哉故曰血者神氣也持之則存失之則亡是知血盛則形盛血弱則形衰神靜則陰生形役則陽亢陽盛則陰必衰又何言陽旺則生陰血也蓋謂血氣之常陰從乎陽隨氣運行於內苟無陰以羈束則氣何以樹立故其致病也易調治也難以其比陽常虧而又損之則陽易亢陰易乏之論可以見矣諸經有云陽道実陰道虛陰道常乏陽常有餘陰常不足以人之生也年至十四而經行至四十九而經斷可見陰血之難成易虧知此陰氣一傷所變之證妄行於上則吐衄衰涸於外則虛勞忘反於下則便紅積熱膀胱則癃閉溺血滲透腸間則為腸風陰虛陽搏則為崩中濕蒸熱瘀則為滯下熱極腐化則為膿血火極似水血色紫黑熱勝於陰發為瘡瘍濕滯於血則為痛痒癮疹皮膚則為冷痺畜之在上則人喜忘畜之在下則人喜狂墮恐跌仆則瘀惡內凝惡內凝若分部位身半以上同天之陽身半以下同地之陰此特舉其所顯之正者

○總脉（三道）

寸口脉微而弱　血氣俱虚也

関上脉微而芤　血氣俱病也

血病脉沉細者生有神者亦生

悪脉（三道）

血病上氣脉数浮大者死

血衰喘氣脉滑実大者危

脉極虚芤遟為血虚衰敗失精

○不治証（四名）

噴血脉実大而濇絶食吐瀉者

咳血脉数大小便不利氣喘乏力者

衄血身大熱脉微細者

亡血身大熱煩而大汗不止脉濇微者

○治例

凡血證上行或唾或咳或咗或吐皆逆也若変而下行為悪痢順也上行為逆其治難下行為順其治易無病人忽然下痢其病進今病血証上行而後下行悪痢其邪欲去是知吉也

凡四物湯為治血之総剤而不能治氣虚而不生血者若脾胃虚而血不生當従仲景之補以人参氣分之薬陽旺則生陰血也

凡閩廣嶺南多蠱毒中之者下血如雞肝或臟腑俱壊惟心未傷用馬藺根末水服方寸匕隨吐毒極神

凡九竅出血皆可用墻頭苔蘚可以塞車前草汁可以滴火燒連房用水調鍋底黒煤可以喫石榴花片可以塞生萊菔汁可以滴火燒龍骨可以吹

凡病後咳嗽吐血脉大而亂属上焦陽絡傷下血溺血為陰絡傷俱危

世傳経験方下血用乳香没薬羯血兒茶各一銭巴豆霜五分丸菉豆大空心酒下神效不可言

凡飲酒人下血日二三次四物加條芩防風荊芥白芷槐花升麻不應加橡斗灰二三錢煎成薬中調服佳

凡血症不断酒色厚味縱上必發終成癎疾

凡諸見血皆是陽盛陰虛君相二火亢甚煎逼其血而出諸竅也悉宜四物湯加知母黃柏補陰降火之劑為主

丹溪曰經云人年四十而陰氣自半起居衰矣又曰男子六十四而精絕女子四十九而經斷夫以陰氣之成正供給三十年之運用已先虧矣人之情欲無涯此難成易虧之陰氣若之何而可以縱欲也

凡怒氣勞氣皆能致血証但怒氣致血証者則暴甚故經云抑怒以全陰者是矣否則五志之火動甚火載血上錯經妄行也

凡血証飲食過多咳嗽辛熱或墜墮車馬傷損所致者為不内外因

凡上焦一切血症稍止即服六味地黃最不可緩庶絕病根有血症者終身不可脫妙在澤瀉茯苓淺見者謂瀉腎殊可恨

凡諸失血過多體倦食少及血不止扶正氣為急人參一錢黃耆二錢五味子十三粒芍藥麥門冬甘草歸身各五分加鬱金末亦可

凡試血法　吐在水碗内浮者肺血也沉者肝血也羊浮羊沉者心血也各隨所見以羊肺羊肝羊心煮熟蘸白芨末日々食之

凡氣虛不能攝血吐血不止身涼脈微弱丹溪法用人參一味為末雞子清投新汲水調下一錢服効一法加四君子芎歸

凡吐血勢不可遏胃中氣壅上吐紫黑血此瘀血内熱盛也桃仁承氣湯加減下之打撲内損有瘀血者必用

凡吐血脈洪大用犀角地黃湯調鬱金黑梔子灰或荊芥穗灰不已三黃補血湯

○治法

血滑

血脫不止者或因病久而滑或歲久氣衰而滑或因氣虛或因誤用攻擊以致氣陷下而滑凡動血之因多由於火及火邪既衰而仍有不能止者非渋即滑當以固渋為主宜勝金丸

下血

雖因大腸積熱亦當分虛實不可純用寒涼藥血色清而鮮者為腸風屬胃與大腸之積熱○服槐角丸

肌衄

血從毛孔出名肌衄皮膚虛也　水中白不拘多少瓦上用火逼乾研令極細每服二錢入麝香少許溫酒下○服三黃補血湯

血汗

病人汗出污衣皆血汗因大喜傷心是喜則氣散故血隨氣上或婦人產蓐多此証治之　服葎草汁

大便血

陰結便血非傷寒之凡邪在五藏則陰脈不和脈不和則血留而結陰為内結不得外行無所稟滲入腸間為便血

瘀血

有累吐紫黒成塊者是熱傷血結于中吐出○服黃連湯加桃仁紅花

吐血

衄血吐血下血三証雖去多是從脾胃與大腸肝藏來也是經氣血俱多身冷脈微為無妨○服藕汁飲　○胸中氣塞上吐紫黒血此瘀血之内畜盛也○服桃核承氣湯

痰涎血

涎唾中有血不嗽或時喉中吐出鮮血古方謂出于脾胃是以胃熱所致最多○服一方

溺血

小便痛者為血淋不痛為尿血宜分新久虛實不可例用寒冷壯盛人屬肝火○服當歸龍薈丸　○腎虛血隨溺出脈洪數無力○服知柏四物湯

咯血

不嗽而咳出血也咯與唾少異唾血出于氣上無所阻也咯血出于痰鬱于喉嚨之下滞而不得出咯而自出　○服救脈散

唾血

出于腎藏之虛痰中帶出血絲二三條是也勞傷之証也　○服生地黃飲子

衄血

陽熱怫鬱于足陽明而上熱則血妄行血衄○服四生丸

咳血

欬血止從肺出他無可言耶曰肺不能欬血而

亦嗽血蓋肺主氣氣逆為咳腎主水水化涎為唾腎脉上入肺循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中故二藏相連病則俱病於是皆有欬唾血也亦有可分別者〇服是齊白朮散

耳衄

耳中出血為陰虛陽盛有升無降血隨氣上出耳竅法當補陰抑陽降氣則血歸經　〇服柴胡清肝散

血淋

多欲之人腎陰虧損血隨溺而出脉洪數莖中有痛為淋或屬下焦胞熱赤澀〇服五淋散

藏毒血

風濕入于腸胃下血不止色清是風如豆汁者濕蒸可酌量　〇服胃風湯

腸澼下血

其血另作一派唧出有力而遠射四散如篩腹中大痛乃陽明熱毒所作　〇服升陽除濕防風湯　或槐花散

酒血

酒毒積熱結畜大腸而下血者名酒血宜清解於腸胃　〇服枳椇槐角丸

嘔血

脉大發熱喉中痛者屬氣虛因怒吐血者服梔子平肝之藥脾統血肺主氣勞神多言脾肺致傷血妄行者忌冷劑　〇服團參丸

血溢

心火熾極則血有餘而熱氣上逆甚則為上下血溢熱勢亢極血變紫黑也〇服黃連解毒湯

舌衄

舌上無故出血不止名舌衄是心火自灼之候也　〇服麥门冬湯

牙宣血

有三因一因陽明胃熱一因少陰腎虛一因厥陰風壅非此三者牙不出血也　戴氏曰風壅牙宣消風散揩之腎虛者為下虛上盛宜鹽湯下安腎丸用黑錫丹仍用姜鹽炒附子黑色為末揩擦甚妙不可言也　〇服消風散　安腎丸　黑錫丹

膕中血

呂滄洲治一人偶搔膕中瘡出血汩々如湧泉

竟旦不止困甚其二尺脉如蛛絲他部皆無予曰夫脉氣血之先也今血妄行故榮氣暴衰二尺尚可按當益榮以瀉陰火以四神湯加防風荊芥連進脉漸出更服十全太補湯遂愈

心漏

病後虛弱人胸前有一細孔常出血水名曰心漏遂敗之　○服鹿茸丸

血衄

畜血衄端於上部則隨逆氣而越出于上竅法當補陰抑陽逆氣下降則血歸經　○服生地黃飲

痔血

糞前者名近血自大腸出○四物湯加檳榔子槐花枳实條芩以瀉大腸　糞後者名遠血自小腸出○四物湯加木通黃連以瀉小腸　○或服樗皮湯

肝血

厥陰肝經之熱内畜而不散則風木妄動衄火扇熾而肝藏所貯之血流隨上下二竅亂出其色紫黑或鮮血　○服當歸厚朴湯

血積

婦人經水不通日久則成瘕小腹隱痛或引而脹痛心腹疼痛項困黃瘦名云血積　○服乾漆丸

血枯

血液乾涸而皮膚失潤澤生白屑肥膩粟立手足麻痺婦人居經寒熱往來○服當歸飲子

婦人崩漏

最為大病年少之久火熾而血熱扇炎或房欲過多當行經時而交感俱為此疾漸变出赤白帶下　○服冷血地黃丸

錯經妄行

婦人經閉多日隨熱蒸之逆氣而經水亂出于口鼻名云錯血　○服牡丹皮散

膿血

癰疽發背發出黃膿日久四肢懈怠羸瘦此紫時發大熱者血虛也　○服當歸補血湯

凝血

一名畜血人飲食起居失甚宜皆能使血瘀結不流行故名凝血　○服逃桃散

血箭

蘊熱不解生四肢瘡瘍瘡口發出鮮血（如）箭其血似煤汁　○服生地黄飲子

血痣

瘀血結滯經脉則肉上生黑子不癢不痛似雀瘢之血痣　○服滑石散

淚堂

肝藏虛則目翳失明眼中多冷淚其淚赤色而加鮮血不急治當下成青盲　○服助陽和血湯兼用六味丸料

○治法藥劑

勝金丸　治男婦血妄行流溢者

小薊　人參　蒲黄（炒）　熟地黄（酒浸）

當歸　烏梅　川芎（各一錢）

右咀作一服水二盞煎一盞不拘時溫服

槐角丸　治腸胃不調下血不止

蒼朮　厚朴　陳皮　當歸

枳殼（各一錢）　槐角（一錢）　烏梅（三）　甘草（五分）

右水盞半煎七分食前服

三黄補血湯　治面赤善驚上熱六脉大按之虛

乃手少陰心之脉也此氣虛而亡血瀉火補氣以墜浮氣

當歸　芍藥（各錢半）　生地黄　熟地黄（各一錢）　黄芪

升麻（各八分）　川芎　牡丹皮　柴胡

右水盞半煎七分服血不止加桃仁十枚酒大黄量虛實用之減去升麻柴胡

一方　治血汗

葎草不拘多少俗名葛勒蔓是蔓生葉似草麻而小薄有細刺花黄白子如麻子

地榆湯　治腸風熱証下血

地榆　黄芩　茜根　梔子仁　茯苓　黄連（各等分）

右為粗末每服三錢韭白五寸同煎

黄連湯　治便后下血腹不痛名濕毒下血

黄連　當歸（各三錢）　甘草（五分）　右水二盞煎八分食遠服或加紅花桃仁

桃核承氣湯（見前）

古一方　治痰中帶血不嗽者　葛根　黄芪

黄連　芍藥　當歸　沉香　甘草（各等分）

右為細末空心白湯送下

知柏四物湯　治腎陰虧損血隨溺出

四物湯加知母黄柏牛膝　水煎空心溫服

救脉散　治吐血虚羸脉虚而洪
人参　黄耆（蜜炙）　當帰　芍薬
熟地黄　蒼朮（各一钱）　陳皮　升麻
柴胡　蘇木　甘草（炙五分）　右水二盞煎八
分食遠温服

生地黄飲子　治諸見血無寒吐衄血溺血屬熱
生地黄　熟地黄　枸杞子　地骨皮
黄芩　芍薬　天门冬　黄芪
甘草（各等分）　右咀每服七銭水二盞煎八分去
查食遠服如脉微身冷悪風加桂五分

四生丸　治吐血衄血陽乗於陰血熱妄行
生薄荷葉　生艾葉　生側柏葉　生地黄（各等分）
右爛搗如雞子大每服一丸水二盞煎一盞濾
去查温服

是齋白朮散　治積熱吐血咳血若因飲酒過度
負重傷胃而吐血者忌湿麺煎煿之物
白朮（一钱）　人参　白茯苓　黄耆
山薬　百合（各六分）　甘草（五分）　柴胡
前胡（各三分）　右水盞半姜三片棗一枚水煎服

柴胡清肝散　治肝膽二経風熱怒火血証
柴胡　黄芩（各一钱）　山梔子（各七分）
當帰（一钱）　川芎（六分）　牡丹皮（一钱）　升麻（八分）
甘草（三分）　水煎温服若脾胃虚去芩連加茯苓

五淋散　治肺氣不足膀胱有熱水道不利
赤茯苓（六钱）　赤芍薬　山梔子（二钱）　生甘草
當帰（各五両）　條芩（三両）　水煎空心服

胃風湯　治風湿入于腸胃下血不止
人参　白朮　茯苓　川芎
當帰（酒洗）　白芍（炒）　桂（各等）　水煎服

升陽除湿防風湯　治泄瀉頭痛者
蒼朮（四钱）　防風（一钱）　白朮　茯苓
芍薬（各一钱）　水煎温服

槐角丸加枳椇子方　治飲酒人下血日二三次
枳椇子　槐花（炒両）　地榆　黄芩
當帰　防風　枳殻
共為末糊丸桐子大毎服五十丸空心下

團参丸　治吐血咳嗽服涼薬不愈者
人参　黄耆　飛羅麪（各一両）
右為細末滴水和丸如梧桐子大毎服五十丸
用茅根湯送下

黃連解毒湯　治一切大熱毒狂躁煩心
黃連（去鬚）　黃蘗　黃芩　大梔子（各半兩）
右剉如麻豆大每服水一盞煎至四分溫服
麥門冬湯　治思慮傷心吐衄血
麥門冬　天門冬　遠志（去心）　當歸　白芍藥
生地黃　人參　黃芪　蛤粉炒阿膠
藕節　甘草各一錢　右作二服每服水二盞
姜一片煎一盞不拘時服
消風散　治諸風上攻頭目昏眩有（[illegible]）
荊芥穗、炙甘草　陳皮　人參　茯苓
白姜蚕　防風　川芎　藿香　蟬退
厚朴　羌活各一錢　右水二錢煎一鐘溫服
安腎丸　治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴
桃仁（去皮四十八箇）　肉桂（去粗皮十八兩）　白蒺藜　巴戟天（去心）
肉蓯蓉（酒浸）　破故帋（炒）　茯苓　白术　石斛
草解（各四十八兩）　川烏（炮四十八兩）　右為末煉蜜丸梧子大每
三十丸空心溫酒鹽湯任下
黑錫丹　治腎氣久冷沉寒固冷
金鈴子（去皮核）　胡蘆巴（酒浸）　木香（不見火）　附子
肉豆蔻　破故帋（酒浸）　沉香　茴香（炒）　陽起石

（研細各二兩）黑錫（去滓）　硫黃（透明者各二兩）　為細末（[illegible]）和勻
酒糊為丸如梧桐子大陰乾　鹽湯或棗湯下
十全大補湯　見前
鹿茸丸　治心漏腎虛腰痛
嫩鹿茸（去毛酥炙）　附子（炮去皮尖）　鹽花（[illegible]分）
共末棗肉丸每服三十丸空心酒下
生地黃飲　治衄血從來久不愈甚效
生地黃　熟地黃　地骨皮　枸杞子
各一錢　右為末每服三錢蜜湯調下日三服
樗皮湯　治下血及血痢已經下後不止此藥能
除根　樗根白皮（二兩）　槐角仁（四兩）　枯白礬
（二兩）　甘草（炙）　右為細末每三錢清米飲調下
當歸厚朴湯　治肝經之血虛善怒
厚朴　良姜各二錢　當歸　肉桂（[illegible]）
右剉每服三錢水二盞煎八分空心服
通經丸（一名乾漆丸）　治婦人室女月信不通
桂心　青皮　大黃（酒濕煨）　川椒　莪朮
乾姜　川烏（炮去皮）　乾漆　當歸　桃仁
（去皮尖各等分）　右為細末老米糊醋丸梧桐子大每服
二十丸空心淡醋湯或溫酒下

當歸飲子　治血熱癮疹痒痛或膿水淋漓

當歸　芍藥　川芎　生地黃

防風　白蒺藜、　荊芥（各錢半）　黃耆（炒）

何首烏（各一錢）甘草（三分）　右水煎空心溫服

結陰生地黃膏　治便血帶下

生地黃（汁）　小薊（汁）　沙糖（一盞大碗）　阿膠（一兩）

側栢葉　地榆（各兩半）　右用四宗汁熬成膏

方入栢葉地榆末和勻空心米飲調下三匙

牡丹皮散　下血色清而鮮者為腸風

條芩　升麻　牡丹皮　黃連

槐角　青黛　秦花（各等分）

右剉每服三錢水盞半煎至八分空心溫服

當歸補血湯　治血虛大熱類白虎之証者

黃耆（六錢）　當歸（二錢）

右㕮咀每三錢水盞半煎至七分空心服

越桃散　治下血痢血

梔子仁　槐花（炒）　大棗　乾姜（炒等分）

右為末每服三錢米飲調下

生地黃飲子（見前）

滑石散　治腸下血

滑石　當歸　生地黃　黃芩

蒼朮　甘草（等分）　右水煎服

助陽和血湯　治眼發之後猶有上熱白睛赤色

隱澁難開而多淚眵等証

黃耆（炒）、當歸、甘草　防風

柴胡（各五分）　白芷　蔓荊子（二分）　升麻（七分）

右水煎食前空心溫服

○灸法

氣海一穴　灸脫血而色白脉濡手足冷飲食

少思強食即嘔宜灸之効如神

命門穴　在背骨中與臍付灸七壯即止

脊中第二十椎下隨年壯灸之

○醫案

一人年四十二歲形瘦因強飲酸酒火時腹痛泄

傳下痢無度十餘日便後見血或紅或黑腸鳴時

痛諸醫以為血熱用芍藥栢皮丸未効仍不欲飲

食則嘔酸形愈瘦面色青黃不澤心下痞悪冷物

口乾有時煩躁不安脉弦細而微遲手足稍冷經

曰結陰者便血一升再結二升三結三升又邪在五藏陰脈不和則留之陰氣內結不得外行無所稟滲入腸間故便血也其脈虛澀非腸風臟毒也外灸中脘三里氣海等穴內服平胃地榆湯而愈

丹溪治一人嗜酒因逆難下血而痔痛脈沈澀似數此濕歸於陰者也以蒼朮芎芷苓木香附白芍乾葛炒麯生姜半夏湯調服

一人虛損大便下血每日三四碗身黃瘦以四物湯加藕節汁一合紅花蒲黃一錢白芷升麻槐花各五分服之愈

識病捷法卷之四

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

癥脹門 有四十四名

癥脹者腹大脹如鼓外雖堅滿內則空空無物腹之虛大也有單脹蠱脹似有蟲食於內之義論曰太陰所至為中滿又曰濁氣在上則生䐜脹諸濕腫滿皆屬於脾或六淫七情之侵擾或饑飽勞役房慾致損脾土則為痞膈遂使清濁相混血成瘀熱氣化成濕濕熱相搏合成鼓脹但病入於臟腑氣血胸脇皮膚之中各有其狀當推其原而療之

○吉脉（一道）

脉来浮

○凶脉（一道）

脉来虛

○不治症（九名）

唇腫　齒黑　面蒼黑　陰囊陰莖俱腫

口張　足腫　足趺腫　不拘何處卒腫

臍大如斗狀

○死症（名五）

面腫有白點肺敗　掌中無紋為心敗

腹滿青筋為腎敗　臍突出者為脾敗

脚跟腫脹為肝敗

○辯驗男子中滿胸痺氣分法

中滿是氣虛

胸痺是氣實

氣分病是熱飲所隔氣血不行腹滿腸鳴陽氣不通身冷陰氣不通骨疼陽先通惡寒陰通則痺不仁陰陽相得其氣乃行

○辯驗婦人氣分血分法

氣分是先断月經後患水病名曰氣分

血分是先患水病後断月経名曰血分

○辯驗胃中脹

脾寒　中濕　心痺　肝虛

脾傷　脾熱　飲聚　女疸

○辯驗小腹脹

面腫　肺水　肺中風　腎虛熱

胃寒　腸癰　腎中風　女劳疸

三焦虛寒

○治法

凡臌脹朝寬暮急血虛

凡臌脹朝急暮寬氣虛

凡臌脹朝暮俱急氣血俱虛

凡臌脹産後必大補氣血少佐蒼朮茯苓為使其水自降

凡虛脹補脾以養肺流濕以散氣治以參朮佐以平胃茯苓血虛加四物湯瘀血加桃仁

凡臌脹補中行濕利小便降陰火生新血切不可下用人參二朮陳皮為主佐以黃芩麦門

冬制肝厚朴木香木通氣下陥柴胡提之血虛加血藥隨症加减

凡中滿瀉之於內此良法也

凡腹脹按之不堅不痛宜消之次補之

凡臌脹病淺脾胃尚壯畧與疎導不可峻利

凡臌脹用禹餘粮丸制肝木補脾土切須隨症加减

凡飲食失節為脹受病之始也

凡臌脹年深求速効者反取禍須知戒助藥力

凡初得病是氣脹久久則成水脹

○禁忌

遠音樂　断妄想　遠地板房

遠楼房　却厚味　忌塩醬醋

蠱脹

似有蟲食於内之義其繆固之氣結於腸間難治○服消脹丸或遇仙如意丹

濁氣脹

濁氣在上生䐜脹清氣在下生飧瀉○服木香順氣丸

氣脹

氣入血分逆則為氣脹○服木香流氣飲

氣虗中滿

用四君子湯加川芎芍藥厚朴陳皮甘草

怒氣腹脹

用青皮陳皮香附木香青黛

血脹

血入氣分逆則為血脹其症煩燥喘急虗汗厥逆小便赤大便黒○服木香流氣飲加蘇木紅花

蓄血腹脹

用抵當湯

風寒濕腫

有傷風濕而腫有傷冷濕而腫氣血凝澁脉浮緩治宜發散風濕

寒脹

冬月感寒胸中痞滿脉来沉細名曰寒脹○服中滿分消丸

暑脹

夏月寒熱胸腹堅滿脉来虗弱名曰暑脹○服清熱分消丸

熱脹

腹脹發熱大便秘實脉来洪数名曰熱脹○服枳實湯

胸腹急脹

内有伏熱或因瀉痢及熱乗虗入脾脉数○治宜解熱

腸覃

寒氣客腸外與正氣相搏其始如鷄子至大如懐胎按之則堅推之則移月水不准女人有此症治宜導下

外寒欝内熱腹脹

用藿香麻黄乾葛為主藥

虚脹

皮膚殼殼然而堅不痛但氣滿名曰虚脹○服參香散

産後腹脹

大補氣血藥加白术厚朴茯苓半夏陳皮黄芩

實脹

挾宿食邪實扵内按之堅痛名曰實脹○治宜疎氣滌食木香檳榔丸

壯盛脉實人腹脹

是氣聚下焦可攻之便收拾以白术厚朴佐之

久病脹

凡人病久腹脹滿者脾土已敗是為危證○姑用白术四两飯上蒸厚朴姜汁拌炒為末每服一錢陳皮湯送下一日服三次

久脹

腹脹經久忽瀉數升晝夜不止○方見泄瀉門

膨脹

飢飽傷脾脾氣既虚遲扵尅化少有停滯即為脹滿脉来浮滑○治宜消導所滯

積聚脹

五積久必心腹脹亦有不待成積即致者○服海金砂丸

穀脹

因失飢傷飽痞悶停酸旦食不能暮食○服大異香散

諸虫毒脹

方見積聚門

酒積腹脹

切不可用瀉藥用生地人參白芍藥木通乾葛厚朴黄連海金砂陳皮甘草夜服温中丸

腹脹挾内傷

服木香順氣湯

肥胖人腹脹

是濕痰在脾胃用平胃散五苓散合而服之

瘦人腹脹

是脾胃積熱用黄連厚朴香附白芍為主藥

肥白人腹脹

是氣虚用人參白术厚朴陳皮為主藥

三焦脹
大小便不通卒然脹滿脉来沉伏名曰三焦脹
肺脹
虚滿咳嗽
心脹
煩心短氣卧不安
脾脹
善噦四肢倦躰重不勝衣卧不安
肝脹
脇痛引小腹

腎脹
引背央央然腰髀痛
胃脹
腹滿胃脘痛妨食聞焦臭大便難
大腸脹
腸鳴痛冬寒飱瀉
小腸脹
小腹䐜滿引腰痛
膀胱脹
小腹氣滿氣癃

胆脹
脇痛口苦善大息
膚脹
寒氣客於皮中空空不堅腹身大色不變按之
不起
鼓脹
腹脹身皆大色蒼黃腹筋起
石瘕脹
寒氣結子門閉塞不通惡血當瀉不瀉衃血留
止日漸大如胎月水不惟此女子生於胞中名

石瘕治宜導下
單脹（脹與蠱同）
加味枳朮湯
枳殼　白朮　辣桂　紫蘇梗　陳皮
檳榔　桔梗　木香　五霊脂（各一钱）
半夏　茯苓　甘草（各五分）每服水二鍾半
姜三片煎至一鍾食前服
麦門冬湯
麦門冬　甘草（各半钱）　旋覆花　白茯苓　羌活
白芍藥　玄参　白朮　柴胡　人参

桑白皮　升麻　當歸（各一錢）　木香（五分）　熟地黃（一錢五分）　胡黃連（三分）　右分作二服每服水二鍾煎至一鍾不拘時服

大腹木香湯

大腹子　半夏　木香（各二錢）　枳殼　前胡

白芷　肉桂　陳皮　白术（各一錢）　當歸

玄胡索　紫胡　芍藥　旋覆花　甘草（各五錢）　乾姜　人參（各三分）　右分作二服每服用水二鍾姜三片煎至八分食前熱服

枳實湯

枳實　大黃（各二錢）　厚朴（三錢）　桂心（八分）　甘草（一錢）　右水二鍾姜三片煎八分服

參香散

人參　官桂　甘草（各七分）　桑白皮　桔梗

陳皮　枳實　麥門冬　大腹皮　半夏

青皮（各一錢）　茯苓　香附　紫蘇子　木香（各錢二分）　右分作二服每服水二姜三煎一食前服

大異香散

三稜　蓬术　半夏麯　陳皮　藿香

桔梗　枳殼　香附　益智（各一錢半）　甘草（五分）　右分作二服每服水二姜三煎一食遠服

平胃散

陳皮　甘草　蒼术　厚朴（各半分）　右水二鍾生姜三片煎至八分食遠服

三白散

白牽牛（一兩）　桑白皮　白术　木通　陳皮（各五錢）　右為末每服二錢空心姜湯調小兒五分

神効木香散（治二十四腫鼓病）

木香　沉香（各二錢）　砂仁　苦葶藶　益智

連翹（各三錢）　甘遂（四錢）　椒目　桑白皮　枳殼

白牽牛（炒半）　木通　黑牽牛（炒半）　陳皮　青皮

澤瀉　大黃（炒各五錢）　檳榔　胡椒（各一錢）　右為末醋糊丸如梧桐子大每服五錢空心五更爵葱白湯下（消上）次服橘皮湯送下（消中）第三服桑白皮湯送下（消下）尚有餘腫沉香湯送下忌盐醬

消脹丸

木香　茯苓　厚朴　澤瀉（各一兩）　滑石

黑牽牛（取頭末各六兩）　右為末水丸如梧桐子大每服五十丸食前白滾湯送下

遇仙如意丹

白茯苓　青皮　陳皮（各一錢）　石菖蒲　人参
白豆蔻　丁香　三稜　蓬术　白术
砂仁　官桂　遠志　木香（各三錢）　牽牛（取頭末炒八兩）　山藥　甘草（各五錢）　香附（童便浸炒五兩）　右為末醋糊丸如梧桐子大每服一百二十丸臨睡白滾湯送下看老少虛實加减服水臌每服三百丸婦人月事不調腹中有惡物並宜服之利後飲水一口即住利後可服甘露飲補之

海金砂丸

沉香（三錢）　海金砂（一錢半）　輕粉（一錢）　牽牛（炒頭一兩末）　右

為末用獨頭蒜丸如梧桐子大每服三四十丸空心用燈心木通湯送下

中滿分消散（治中滿寒脹）

川烏　澤瀉　黃連　人参　青皮
當歸　生姜　麻黃　蓽澄茄　柴胡
乾姜（各二錢）　益智　半夏　茯苓　木香
升麻（各三錢）　黃芪　吳茱萸　草豆蔻　厚朴
黃栢（各五錢）　右分作十服每服水二鍾姜三片煎至八分食前熱服

中滿分消丸（消中滿熱脹）

人参　白术　甘草　姜黃（各一錢）　茯苓
生姜　砂仁（各二錢）　澤瀉　陳皮（各三錢）　黃連
半夏（四錢）　枳實（各五錢）　厚朴（一兩）　黃芪（一兩二錢）　知母
猪苓（一錢）　右為末蒸餅陳米粉糊丸如梧桐子大每服百丸白滾湯送下

禹餘粮丸

蛇含石（三兩）　針砂（五兩）　禹餘粮（三兩同針砂炒）
已上三味為主其次量人虛實入下項藥
木香　牛膝　蓬莪术　桂心　川芎
茴香　三稜　白蒺藜　羌活　茯苓

乾姜　青皮　白豈仁　陳皮　附子
當歸（各五錢）　右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒下

木香順氣丸

京三稜　石三稜　蘿蔔子　檳榔　半夏
白茯苓　陳皮　人参　雞爪三稜（各一兩）
白豆蔻　縮砂（各半兩）　木香（一兩）　黑牽牛（取頭末五兩）
右為末姜汁麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後姜湯送下

木香流氣飲

半夏（二兩）　香附子　厚朴　紫蘇葉　青皮
甘草（各一斤）　蓬莪朮　肉桂　丁香皮　檳榔
大腹皮　藿香葉　草果仁　木香（各六兩）　白芷
赤茯苓　麦門冬　石菖蒲　乾木瓜　人參
白朮（各四兩）　陳皮（去白二斤）　木通（去節八兩）　右㕮咀每服四錢水盞半姜三片棗二枚煎七分熱服

温中丸

白朮（二兩）　乾姜　半夏（各一兩）　細辛　糊椒（各五錢）　右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心姜湯送下

木香順氣湯（見諸氣門）　清熱分消丸（開卷末）
木香檳榔丸（見諸氣門）　大橘皮湯（見水腫門）
塗臍膏（即取水法見水腫門）　四君子湯（見脾胃門）
四物湯（見諸血門）　抵當湯（見黃疸門）
五苓散（見濕門）

水腫門

有二十八名

水氣腫脹與鼓脹形症相似治各不同另立篇目水氣本於腎末於肺腎病為跗腫肺病為喘呼不得卧諸臓皆可患水故有十水之名及論其陽水陰水老少虛實不可便用大戟芫花甘遂巴豆之藥大利其水暫取一時之効水去則脾土愈敗臨症詳審不致危殆也

○生脉（三道）
洪　大　實

○死脉（四道）
微　細　虛　小

○死症（十二名）
肚臍凸出死　缺盆平者死　虛者死
腹大脉實死　足心平者死　唇焦死
脚腫入腹死　手掌無紋死　背平死
腹起青筋死　腫從四肢後入腹者死
滑泄者死

○辯驗水腫法

看驗之法在何部分微腫先見於目下如卧

蚕之狀脛脉動時欬股間寒足脛腫腹乃大其水病已成以手按腫處隨手而起即此侯也濕腫氣腫初起頗相似但以手按或凹不即起者濕也水腫有濕熱相兼朝急暮寬是氣虚朝寬暮急是血虛朝暮俱急是氣血俱虛

○禁法

禁食羊頭蹄肉食之百無一愈

遠音樂遠楼板房断盐醬厚味

○治法

凡水腫利小便順氣和脾水自行

凡少壯病腫脉浮大宜導去其水

凡老弱病腫脉微細宜補中行濕

凡腰已上腫者宜發汗之

凡腰已下腫者宜利小便

凡十腫水腫並用神助丸

一青水先從左脇腫起根在肝　大戟

二赤水舌根或脚跟腫起根在心　葶藶

三黃水從腰腹腫起根在脾　甘遂（微炒）

四白水從脚腫起根在肺　桑白皮

五黑水從外腎腫起根在腎　連翹

六玄水從面腫起根在腎　芫花（醋炒）

七風水從四肢腫起根在胃　澤瀉（微炒）

八石水從腎腫起根在膀胱　槀本

九蒿水從小腹腫起根在小腸　巴豆（去油）

十氣水或盛或衰根在腹　赤小豆

○取水法

地龍楮苓去皮鍼砂各一兩為細末擂葱涎調成膏敷臍中約一寸高濶絹帛束之以小便多為度一日兩易

湧水（肺移寒於腎）

囊裹裡漿或遍身腫滿按腹不堅疾行則濯濯有聲或喘欬不定○服葶藶丸

陽水

遍錢腫煩渴小便赤大便澁脉沉數○服五皮散磨入生松脂不愈再服踈鑿飲

陰水

遍錢腫不煩渴大便溏小便少脉沉伏○服木香流氣飲

水在上（肺病）

喘呼不得卧○服甘草麻黄湯

水在下（腎病）

胕腫腹大○服五苓散

濕氣似水

見濕門

脚氣似水

見濕門

通身虛腫

見濕門

濕熱爲水

濕熱內甚心腹脹小便不利大便滑洩○服大橘皮湯

水氣熱脹

見痞滿門

脾腎俱虛發爲水腫

四肢俱浮心腹堅脹小便不通兩目下腫○服復元丹

男子陰腫

大如升核痛○用馬鞭草搗塗之

女人陰腫

婦人陰户腫硬○用松實半斤剉碎炒熱布裹熨之冷再炒再熨

脬囊腫

用五苓散水煎湯洗再温再洗仍與五苓散加灯心煎服

浮腫

脾寒久不愈傳爲浮腫○治宜袪寒益脾土滲濕

遍身浮腫

肺氣膈於膜運行不得脉浮○治宜調肺通氣

泄瀉後通身腫似水

或胕腫或水氣者○服茯苓湯

脾胃濕勝傷冷似水

泄瀉胕腫如水氣者○服胃苓湯

大橘皮湯

大橘皮（兩半）木香（一銭）滑石（六銭）檳榔（三銭）楮苓
澤瀉　白术　桂枝（各五銭）茯苓（一兩）甘草（二銭）右分作六服每服水二鍾煎至一鍾服

五皮散

五加皮　地骨皮　大腹皮　茯苓皮　生姜

皮（各二錢半）右水二鍾煎至一鍾食遠服忌生冷油膩堅硬之物一方去五加皮加陳皮桑白皮

神功丸（治十種水氣面目四肢浮腫）

黑牽牛（頭末）　澤瀉（各二錢）　豬苓　椒目（各二錢半）　葶藶（五錢）右作二服每服水二鍾葱白三根煎至一鍾入酒半盞清早向東立服如人行十里又以漿水葱白煑稀粥候葱爛入酒五合量人所飲多少須服一升自早至午當利小便三四升或大便微利喘定腫减隔日再服

十水丸

遠志　椒目　肉豆蔻　菖蒲（一寸九節）　羌活　大戟（各一兩）　豬苓　乾葶藶　白牽牛（頭末）　澤瀉（各五錢）右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前米湯送下

葶藶丸

乾葶藶　黑白牽牛（生半炒半）　白朮（各五錢）　羌活　桑白皮　赤茯苓　漢防己　陳皮　澤瀉　郁李仁（湯泡去皮尖炒紫色另研各三錢）右為末煉蜜為丸如梧桐子大初服十丸加至三十丸空心晚間食前陳皮湯送下一日服二次以利為度

敷藥（治腹[illegible]如石陰[illegible]大）

大戟　芫花　甘遂　海藻（各等分）右為末醋麵和藥攤綿紙上先用甘草口內嚼後用此藥貼腫硬處以布最佳

甘草麻黃湯

麻黃（四兩）　甘草（二兩）右㕮咀每服三錢水一鍾煑麻黃再滞後入甘草煎七分取汗慎冒風老人虛人不可輕用

茯苓湯

黃芩（錢半）　當歸（二錢）　肉桂　甘草（各二分半）　猪苓　茯苓（各三分）　澤瀉（五分）　芍藥（七分半）　蒼朮　柴胡　生甘草　升麻（各一錢）右作一服水二煎一熱服

木香流氣飲（見蠱脹門）　胃苓湯（胃即平胃散苓[illegible]五苓散）

疎鑿飲（[illegible]）　五苓散（見[illegible]門）

復元丹（[illegible]）

咳嗽門（有五十七名）

咳者無痰有聲是肺氣傷而不清嗽者無聲有痰是脾濕動而生痰咳嗽者有痰有聲因傷於肺氣又動於濕也凡有痰者寒少熱多咳嗽始閑於肺終則聚於胃使人多涕唾五臟咳嗽不已傳之於六腑六腑咳嗽不已面浮氣逆遂成水腫而不救也

○生脉（二道）

浮　軟

○死脉（五道）

小　沉　伏　大　堅急

○不治症（九名）

乾咳嗽　肺脹嗽　肺癰嗽　肺痿嗽

多房室　多性躁　多怒　多憂　多思

○死症（六名）

水腫　形脫　熱不去　腹脹　嘔　瀉

○治法（開後）

日夜嗽

是六腑氣乘或外邪日夜無度嗽不得安卧○服紫金散

五更多嗽

胃中有食積至此時火氣流於肺諸邪或痰皆然○用藥與上半日多嗽相同

上半日多嗽

胃中有火有食積痰○服貝母石膏黃連

下半日多嗽

屬陰虛即癆嗽○服四物湯爲主加知母黃栢

黃昏多嗽

是火氣浮於肺不可用寒藥○用滋陰藥加五倍子五味子訶子之類斂而降之

喉啞嗽

是寒包熱此言乍感邪而嗽○治宜散寒祛熱

聲嘶嗽

血虛受熱○服四物湯加青黛沙参桔梗紫苑

語聲不出嗽

諸咳嗽喘急語言不出○服人参散年久多服見効杏仁煎

又內外挾邪語聲不出○服天門冬丸

肺破嗽

嗽出聲音覺破鑼聲啞血○服阿膠散

乾咳嗽

有痰鬱火邪在肺用補陰降火藥加桔梗開之○如瘦人腠理踈多汗血液少而爲燥熱故多成痨有聲無痰也治宜降火補水

肺癰嗽

咳口中辟辟燥咳胸中隱隱痛曰肺癰○服桔梗湯

肺痿嗽

心火尅肺咳口中有濁唾涎沫胸膈痞滿咽嗌不利名曰肺痿○服人参平肺散

肺脹嗽

咳動喘滿氣急息重名曰肺脹或左或右不得睡此挾痰血凝氣而欬○用四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝○凡人發喘而欶必爲肺脹欲作風水症汗之則愈

虛嗽

肺氣虛或久嗽○用五味子款冬花紫苑馬兜苓

脾肺虛寒嗽

服参蘇飲

脾胃虛寒欶

喘急坐卧不安○服人参清肺湯

氣血虛嗽

發寒熱自汗喘急痰涎○服寕肺湯

實嗽

肺氣壯實或有火邪○用黄芩天花粉桑白皮杏仁

上盛下虛嗽

膈壅痰實喘嗽咽乹不利○服降氣湯又方加減瀉白散

久嗽

嗽如面浮者○服滴油散

風入肺或積痰於肺脘中或挾濕○用雌黄丸○多年不已常自汗服藥不効○服寕肺散

劳嗽

或左或右止可一邊眠卧轉一邊嗽甚不得卧盜汗出兼痰多作寒熱○服補肺湯

老人嗽

久嗽不已睡卧不得○服杏仁煎

傷風嗽

咳嗽聲重身熱頭疼惡風自汗日夜嗽○服消風百解散或橘蘇散

傷寒嗽

頭疼身熱鼻塞無汗惡寒煩燥不渴○服麻黄湯

又因形寒飲冷或冬月坐卧濕地或冒風冷秋冬水中感之嗽急而喘○亦服前湯

傷冷嗽

因冷雨水淋身嗽○用喝藥

傷暑嗽

煩熱引飲面垢自汗或吐涎沫聲嘶咯血○服黄連香薷飲

中暑嗽

身熱自汗肺虚○服清暑益氣湯

傷濕嗽

骨節煩疼四肢重著洒淅○服白术湯或五苓散

傷燥嗽

咳嗽不已胸膈疼痛唾中有血皮膚乾燥細瘡痒大便秘澁涕唾稠粘○服五味子散

傷火嗽

有聲有痰面赤火邪在中咳喘上壅涕唾出血甚則七竅皆出○服黄連解毒湯

傷熱嗽

喘急面赤潮熱手足寒○服加减小柴胡湯

寒熱嗽

肺經寒熱不調痰涎不已○服八味款花散

寒熱往来嗽

寒熱往来肺氣不利嗽喘滿痰涎盛喉中呷呷

○服款花散

肺嗽

嗽時發喘息有聲甚則唾血○服麻黄湯

心嗽

喉中如梗狀甚則咽腫喉痺○服桔梗湯

脾嗽

右脇下痛痛引肩背甚則不可動動則咳極○服升麻湯

肝嗽

兩脇下痛痛甚不可轉側兩肋下滿○服小柴

胡湯

腎欬

腰背相引痛甚則咳涎○服麻黄附子細辛湯

胃欬

欬時嘔嘔甚長虫出○服烏梅丸

胆欬

嘔苦水如猪胆汁○服黄芩半夏生姜湯

大腸欬

欬則遺屎○服赤石脂禹餘粮湯

小腸欬

欬時失氣○服芍藥甘草湯

膀胱欬

欬則遺溺○服茯苓甘草湯

三焦欬（因前五藏欬不已傳六腑六腑咳不已傳三焦）

腹滿不欲食多涕唾面浮腫氣逆○服異功散

氣逆欬

欬時氣上喉中如水鷄聲○服射干麻黄湯

七情欬

喜怒憂思悲恐驚或因一件成欬者○七氣湯

飲食欬

飲酒過度煎煿辛熱傷肺咽痒痰多喘急脇痛不得安卧○服紫苑湯

喘欬

腫滿欲變水氣者○服白术木香散

痰欬

停痰流飲胸滿頭目眩○服和中化痰丸

欬時面青脉絃四肢滿小便澁多怒○服青州白丸子

欬時面赤脉洪煩熱心痛口乹○服滚痰丸

欬時面黑脉沉小便急痛足寒○服温中丸

欬時面黄脉緩肢躰沉重嗜卧腹脹○服白术丸

欬時面白脉澁氣上喘促洒淅寒熱喜悲不樂○服玉粉丸

欬時發熱吐瀉○用黄連炒瓜萎仁甘草各半两白芍藥炒二两滑石半夏各一两姜汁糊丸

○治法

凡咳欬須分五臟六腑有聲有痰無聲無痰新久老幼虚實雜病外感

凡咳嗽須分四時五更上半日下半日黃昏日夜

凡嗽而無聲有痰者用半夏五味子白朮防風枳實甘草

凡嗽而有聲無痰者用生姜杏仁升麻五味子防風桔梗甘草

凡嗽而有聲有痰者用白朮半夏五味子防風久者加茯苓阿膠

凡喘嗽或肥人脉細氣弱少食有汗者用蒼朮調中湯加黃芩蘇梗痰加半夏瓜蔞仁貝母

凡肺虛喘嗽懶倦不食不睡自汗發熱脉洪大虛沉細用補中益氣湯加五味子知母麥門冬汗多去升麻柴胡喘嗽甚加桑白皮地骨皮

凡肺實喘嗽或大邪治宜瀉肺抑火

凡新嗽治宜劫（開後）

凡久嗽治宜收歛

凡雜症嗽隨症用藥

凡外感嗽治宜發散

凡嗽春是春升之氣用二陳湯加杏仁知母五味子川芎白芍藥麥門冬炒黃芩

凡嗽夏是夏火炎上最重潤肺益肝用二陳湯去半夏加杏仁五味子桔梗桑白皮知母黃芩麥門冬石膏

凡秋嗽是濕熱傷肺用二陳湯去半夏加杏仁桔梗五味子桑白皮黃芩梔子蒼朮

凡冬嗽是風寒外束用二陳湯加桔梗麻黃杏仁桂枝生姜防風頭痛鼻塞加藁本川芎

凡嗽脇痛用二陳湯加南星香附青皮白芥子姜汁

凡嗽心煩用六一散加辰砂

凡嗽寒熱交作用小柴胡湯加知母

凡嗽嘔吐喘促用瀉白散加青皮五味茯苓

凡熱嗽胸滿用小陷胸湯

凡氣血俱虛嗽吐血用八物湯加知母麥門冬阿膠紫苑

凡失音咳嗽用潤肺散訶子五味子五倍子合粉蜜調噙化

凡夜多嗽是風寒欝熱在肺用三拗湯加知母脉浮大有熱加黃芩生姜

凡遇冬便嗽是寒包熱也用桔梗麻黄陳皮防風紫蘇木通黄芩

凡肺虚受風寒兼内因過度咳嗽惡風用人參四錢麻黄一錢半連根節二三貼愈

凡腹痛中脘冷氣嘈雜腸鳴吐清水脇肋急脹用二陳湯加細辛桂枝桔梗芍藥

凡酒嗽用青黛瓜蔞仁去油蜜丸噙化

凡人壯實好酒脉實数嗽者用京膈散

凡痰多喘嗽用白术蒼术半夏香附杏仁各一兩黄芩三錢姜汁糊丸如痰積非青黛瓜蔞仁不除

凡乾咳嗽乃痰鬱火邪在肺用桔梗開之用補陰降火藥不止成癆須用倒倉法

凡用劫嗽藥五味子五錢五倍子風化硝各一錢甘草二錢半為末蜜丸噙化

凡新久諸嗽用劫藥自胸膈下塞停飲至臟腑用知母貝母各一兩為末巴豆三十粒去油另研入二藥和匀每用四五分姜三片兩面醮藥末對合細嚼嚥下次早下一次即温補之小兒用藥末二三分

凡病久嗽屬虚屬鬱氣虚用四君子湯血虚用四物湯兼開鬱用撫芎貝母杏仁去皮尖沙參白茯苓各一錢橘紅五味甘草炙巳上之藥為主四時隨證加减服此則治久虚嗽之法也

凡食積嗽食積成痰用香附瓜蔞仁滑石半夏麯山查肉枳實黄連姜汁炒為丸服

凡咳嗽見血多是肺受熱邪忌用人參甘温之藥氣虚嗽出血者不在禁限

凡先咳嗽而後有痰者治嗽為重消痰次之

凡先有痰而後嗽者治痰為重寧嗽次之

凡酒色過度損傷肺腎咳嗽吐痰血服參芪甘温之藥則病日增服之過多則死

凡用杏仁瀉肺氣散風熱然性實有熱因於寒者用之得宜肺虚久嗽一二服劫止

凡用桑白皮瀉肺氣然性不純良用之多者宜戒

凡用瓜蔞仁秘汗補肺潤肺能下氣胸有痰肺受火逼失降下今得甘緩潤下之功痰自降治嗽良藥也

凡用訶子味酸苦有收斂降火之功

凡用五味收肺氣補五臟津液虛火熱必用之藥但有南北之分用南五味發散風寒用北五味生津液止渴此藥不可輕用恐阻邪氣在内必先發散後用之可也

凡用半夏南星口燥咽乾不可用

凡用馬兠苓能去肺熱補肺

凡用生姜味辛能發散

射干麻黄湯

射干　細辛　款冬花　紫苑（各一錢半）　麻黄　生姜（各二錢）　半夏（二錢半）　五味子（一錢）　右大棗二枚水二鍾煎七分作一次服

白术木香散

白术　猪苓　甘草　澤瀉　茯苓（各半兩）　木香　檳榔（各三兩）　陳皮（二兩）　桂枝（二錢）　右為末每服五錢姜一片水煎服

五味子湯

五味子　桔梗　紫苑　甘草（各二錢）　生地　桑皮（各半兩）　竹茹（三錢）　續断（二錢）　右分作二貼用水二鍾煎七分服

加減小柴胡湯

柴胡　半夏　黄芩　五味子　乾姜　甘草（各等分）　右用水煎服

加減瀉白散

桑白皮（一兩）　地骨皮（七錢）　陳皮　五味子　青皮　白茯苓　人参（各五錢）　右分作八服每服用水煎入粳米二十粒

寧神散

粟殼（一兩醋炒）　烏梅（半兩）　右為末每二三錢沸湯調下

補肺湯

桑白皮　熟地（各二兩）　川五味　人参　紫苑　黄芪（各一兩）　右為末每服二錢水煎入蜜少許服

白术丸

南星　半夏（各一兩）　白术（一兩半）　右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五六十丸姜湯下

玉粉丸

南星　半夏（各一兩製）　陳皮（一兩去白）　右為末湯浸蒸餅為丸梧桐子大每服三四十丸人参姜湯下

黄芩加半夏生姜湯

黄芩　生姜（各三錢）　甘草　芍藥（各二錢）　棗（二个）

半夏（半合）右用水煎服

桔梗湯

苦桔梗（三錢）甘草（六錢）右用水煎服

芍藥甘草湯

芍藥　甘草（各四錢）右用水煎服

升麻湯

升麻　白芍藥　甘草（各二錢）葛根（三錢）水煎服

烏梅丸

烏梅（三十箇）細辛　附子　桂枝　人參

黃柏（各六錢）乾姜　黃連（一兩半）當歸　蜀椒

（各四錢）右酒浸烏梅一宿去核煮之與米飯搗如泥和諸藥末相得加蜜為九如梧桐子大每服三十九用白湯送下

麻黃湯

麻黃（三錢）桂枝（二錢）甘草（一錢）杏仁（廿箇）水煎服

赤石脂禹餘粮湯

赤石脂　禹餘粮（各二兩止打碎）右用水煎服

麻黃附子細辛湯

麻黃　附子　細辛（各一錢）右用水煎服

甘草湯

茯苓（二錢）桂枝（二錢半）生姜（五大片）甘草（一錢）水煎服

異功散

人參　茯苓、白术　甘草（各等分）右為粗末每服二三錢入姜棗水煎服

華蓋散

麻黃　紫蘇子　杏仁　赤茯苓　桑皮

橘紅（各一錢半）甘草（一錢）右用水二鍾生姜五片紅棗一箇煎至一鍾去滓不拘時服

橘蘇散

橘紅　紫蘇葉　杏仁　五味子　半夏

桑白皮　貝母　白术（各一錢半）甘草（七分半）右用水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

白术湯

白术（三錢）白茯苓　半夏　橘紅（各二錢）甘草

五味（各一錢）右用水二鍾生姜五片煎至一鍾服

麻黃湯

麻黃（不去節）杏仁（不去皮）甘草（生用）荆芥穗　桔梗

（各三錢）右用水二鍾生姜三片煎至一鍾食遠服

咽喉痛者煎熟後加朴硝少許

和中化痰丸

良姜　青皮　乾姜　陳皮（各半兩）右為細末醋煮麫糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後用米飲送下

人参清肺湯

人参　阿膠　杏仁　罌粟殼　知母
烏梅　桑白皮　甘草　地骨皮（各一錢）右用水二鍾入紅棗一箇煎至一鍾食遠服

八味款花散

款冬花　紫菀　五味子　甘草（各一錢半）麻黄
桑白皮　杏仁（各一錢）右用水二鍾煎一鍾入黄

蠟一塊如皂角子大食後服

降氣湯

紫蘇子　川芎　細辛　當歸　桔梗
白茯苓　厚朴　陳皮　前胡　肉桂
半夏麹　甘草（各一錢）右用水二鍾生姜五片紫蘇五葉同煎至一鍾去滓食後服

桔梗湯

桔梗　貝母　薏苡仁　桑白皮　當歸
枳殼　防己（各一錢）瓜蔞仁（一錢）甘草節　杏仁
百合（蒸）黄芪（各一錢半）右用水二鍾生姜五片煎一鍾不拘時服大便秘加大黄少便少加木通

紫菀湯

紫菀　款冬花　百合　杏仁　阿膠
貝母　半夏　蒲黄　經霜桑葉（各一錢）
犀角　人参　甘草（各七分半）右用水二鍾生姜五片煎至一鍾食後服

杏仁煎

杏仁　胡桃肉（各廿分）右共碾為膏入煉熟蜜少許和丸如彈子大每服一丸食後細嚼生姜湯送下

人参平肺散

人参　青皮　天門冬　地骨皮　陳皮
甘草（各一錢）知母（一錢半）桑白皮（二錢）五味子（三十粒）右用水二鍾生姜五片煎一鍾食遠服如熱加黄芩紫蘇半夏各一錢

寧肺湯

人参　當歸　熟地黄　五味子　白术
川芎　白芍藥　麥門冬　桑白皮　茯苓
甘草（各一錢）阿膠（一錢半）右用水二鍾生姜五片煎至一鍾食後服

一第〇七〇八册 續修四庫全書 第 8 反正勺

人參散

人參　知母　貝母　馬兜苓　麻黃

杏仁（生用）　半夏（各一錢半）　天仙藤（一錢）　右用水二鍾烏梅二箇蜜一匙煎至二鍾臨睡服

紫蘇飲子

紫蘇葉　五味子　青皮　桑白皮　杏仁

麻黃　陳皮　半夏　人參　甘草（各一錢二分）　右用水二鍾姜三片煎一鍾食後服

款花散

款冬花　桑白皮　半夏　知母（各一錢半）　貝母

阿膠　麻黃（各三錢）　杏仁　甘草（各二錢）　右作二貼每用水二鍾姜三片煎七分不拘時服

杏仁煎（治欬失音）

杏仁（二兩）　生姜汁　蜜糖（各一兩半）　桑白皮　貝母

木通（各一兩）　紫菀　五味（各一兩）　右剉碎用水三升熬至半升去滓入前杏仁等四味再熬成膏

每服一匙含化

青州白丸子

大半夏　白附子　天南星　川烏　天麻

全蝎（各等分）　右為末用生姜自然汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食後用熱水送下癱瘓風用溫酒送下日進三服常服永無風痰膈壅之疾小兒驚風服二十丸用薄荷湯化下

滴油散

右以真蛤粉一味新瓦炒令通赤地上出火毒拌青黛少許同酸虀水滴麻油數點服即愈

紫金散

天南星　白礬　甘草（各半兩）　烏梅肉（二兩）　右為麄散用慢火於銀石器內炒令紫色放冷研為細末每服二錢臨卧時身躰入鋪卧內用酸虀

汁七分溫湯三分緩令稍熱調前藥末服之嚥下便仰卧低枕想藥入扵肺中須臾得睡其欬立止

治久咳嗽

右以蝙蝠去頭燒令焦為細末每服二錢不拘時米湯調下

天門冬丸

天門冬　紫菀　百合　杏仁　貝母

麥門冬　人參　半夏　桔梗　桂心

阿膠　橘皮　甘草　生乾地黃（各三兩）

右為細末煑糯米粉與黃蠟一兩成粥更入蜜再熬勻和前藥末丸如櫻桃大每服一丸同生姜細嚼下歎時服咳嗽膿血者服之大効

阿膠散

阿膠（二分）　天門冬　北五味　生地黃　人參
茯苓（各一分）　白芨（二分）右除白芨別為細末餘藥每三錢（水）一大盞入蜜五匙臨熟入白芨末少許食後温服

欵花散

右用欵冬花一斤晒乾為末到夜上床睡如燒香一般置香炉於布帳中燒烟起吸烟入口則嚥之不吸亦可若咽乾口燥用冷茶呷之重嗽數日見効

三奇散

款冬花〇物耳草（一兩）熟地黃（二兩）俱為末香炉中燒之用紙作筒子一頭大一頭小大頭安在香炉上以口含小頭吸烟盡為度以冷茶吸之如有涎唾之兩服除根

參蘇飲

木香　紫蘇葉　人參　乾葛　半夏
前胡　茯苓（各七錢半）枳殼　桔梗　甘草
橘紅（各半兩）右㕮咀每服四錢水盞半姜七片棗一枚煎六分去滓不拘時服以氣盛者去木香

三拗湯

甘草　麻黃（不去節）杏仁（不去皮尖各錢八分）右㕮咀用水一盞姜五片煎服以得汗為愈

團參飲子

人參　紫菀茸　欵冬花　阿膠　百合
細辛　杏仁　天門冬　半夏　五味
經霜桑葉（各一兩）　甘草（半兩）右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎七分食後温服

温中丸

白术（二兩）　乾姜　半夏（各一兩）細辛　楜椒（各五錢）右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九空心姜湯送下

七氣湯

半夏（五兩）　厚朴　桂心（各三兩）人參（一兩）茯苓
白芍（各四兩）紫蘇葉　橘皮（各二兩）右㕮咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚煎五分空心熱服

涼膈散

大黄　朴硝　甘草（各半錢）　連翹（一錢）　梔子

黄芩　蒲荷（各二分半）淡竹葉（五片）右用水一盞煎

至八分去柤入蜜一匙和勻服

消風百解散

荆芥　白芷　陳皮　麻黄　蒼术

甘草（各等分）右用水二鍾生姜三片煎八分服

黄連解毒湯（見火門）　小陷胸湯（見傷寒門）

蒼术調中湯（見關末卷）　小柴胡湯（見熱門）

補中益氣湯（見脾胃門）　二陳湯（見痰飲門）

黄連香薷飲（見暑門）　滚痰丸（見痰飲門）

姜桂丸（見關末卷）　清暑益氣湯（見暑門）

雌黄丸（見關末卷）　八物散（即四君子湯四物湯）

六一散（見痢疾門）　四物湯（見諸血門）

五苓散（見泄瀉門）　倒倉法（見關末卷）

喝藥（見關末卷）

喘門（附哮共二十名）

火熱動於上喘急乃作屬肺主之又曰諸氣上而不行升而不降否塞膈中氣道奔迫喘息有聲也有風寒濕邪氣干肺作喘者有喜怒氣鬱而生痰作喘者有脾腎俱虚不能攝養一身之痰而喘者有脾濕腫滿水氣乘肺而喘者有陰血虚少而上喘者名雖不同而病皆出於肺治宜滋陰養血外感喘者袪撒之內之氣鬱而喘者以順氣為先腎虚喘者宜温補痰盛喘者當以踈導臨期消息治之無不愈矣

○生脉（一道）

脉滑手足温

○死脉（一道）

脉濇四肢冷

○難治症（二名）

産後發喘　四肢冷兼脉濇

○辯驗喘法

喘與脹兩症相因必皆小便不利喘病則變脹脹病必變喘但要識得漂本先後先喘而

後脹者肺主之先脹而後喘者脾主之
肺邪而上喘則失降下之令故小便漸短以致水溢皮膚而生腫滿此則喘為本腫為標治當清肺降氣為主行水次之肺病用燥脾之藥喘反甚
脾受傷不能制水濕行浸肌肉水既上溢則邪反浸肺氣不得降而生喘此則腫為本喘為標宜實脾為主清金次之脾病用清肺之藥則脾寒脹甚

○治法

凡治喘須分虛實新久
久病是氣虛用阿膠人參五味子補之
新病是氣實用桑白皮葶藶瀉之

凡喘降氣化痰為主

凡喘大炎上者降心火清肺金

凡喘陰虛兼痰喘者宜四物湯加枳殻半夏

凡有痰亦短氣而喘用導痰千緡湯

凡上氣喘而躁者是肺脹欲作風水症汗之則愈

凡喘不得卧卧則喘甚用神秘湯

凡久喘未發時扶正氣為主已發攻邪為主

凡喘急甚火盛故也宜溫藥刼之後因痰治痰
因火治火

凡喘急有風痰者用千緡湯

凡食積壅滯氣喘者用半夏瓜蔞仁去油神麯
炒山查肉姜汁竹瀝為丸白湯下

凡憂慮多痰喘者用四物湯加半夏陳皮甘草

凡喘氣實服參芪藥過多用三拗湯瀉之

凡熱痰暴喘將死者用大黃黑牽牛炒各等分
為末蜜丸服二錢

凡傷風寒喘者用三拗湯

凡肺脹喘急聲啞痰壅用大黃白牽牛半生半
熟檳榔各等分為末每服二錢水下涎多加
膩粉少許下涎為度

風寒冷濕發喘
服華蓋散

傷風發喘
服麻黃散

傷寒發喘
見傷寒門

肺氣上喘
服人參定喘湯
肺氣不利發喘
服團參湯
肺氣不足發喘
服人參潤肺湯
肺壅有膿發喘
服消膿飲
脾胃不和發喘
服分氣紫蘇飲

邪入六腑發喘
身熱不得卧○治宜發表
虛陽上攻發喘
服蘇子降氣湯
酒熱上攻發喘
服五苓散去薄桂加黃芩乾葛
飲食煎煿發喘
服葶藶散加黃連
痰喘
痰喘不得卧人扶或倚靠可坐○服千緡湯

七情鬱結發喘
服四磨湯
墮跌驚恐發喘
服杏仁散
年久發喘
服安神散
哮病
大率主痰戒服凉藥要淡薄滋味藥中多用醋
治宜用吐虛人不可吐須帶散表藥
治哮年深時作時止

用雄猪肚一箇入杏仁四兩線縫醋三碗煑乾取出先食肚次以杏仁新瓦上焙氣皮皮旋食永不發○又方用猫兒頭骨燒灰酒下一服即止
哮喘
壯實人遇秋冬發者用大承氣湯
哮喘
遇厚味發者用蘿蔔子淘净蒸熟曬乾為末姜汁糊丸如粬大每服三十丸津嚥下
神秘湯

人参　桑白皮　木香　茯苓　紫蘇
陳皮（各半分）右水二鍾姜三片煎八分服

調中益氣湯

升麻（二分）　黄芪（一錢）　甘草（五分）　蒼术（四分）　柴胡
橘皮（各二分）　木香（一分）　人参（五分）右用水二鍾煎八
分食前熱服

定喘丹

杏仁（另研）　馬兜苓　蟬蛻（洗去土并足翅沙巳上各一两）砒（二錢煅別研）　右爲末蒸棗肉爲丸如莱子大每服六七
丸臨睡用葱茶清放冷送下忌熱物半日

消脹飲

南星　半夏　生地黄　知母　川芎
防風　貝母　桑白皮　阿膠　射干
桔梗　薄荷　天門冬　杏仁　紫蘇
白芷　烏梅　白芨（各半分）　甘草（減半）右每服
一两水二鍾生姜五片煎至一鍾食後服

安神散

粟殼（蜜炒）　人参　陳皮（各三錢）　甘草（一錢半）　右爲
末每服一二錢食後烏梅湯調服

加味控涎丸

大戟　芫花　苦葶藶　甘遂（各三錢）　牽牛
（頭末一两）　巴豆（一錢）右爲末滴水和丸如粟米大
每服三丸茶清下湯亦可

千緡湯

半夏（七箇泡七次每箇切作四片）　皂角（去皮絃子炙一寸）　甘草節（一寸）
右作一服用水一鍾生姜如指大一塊煎至半
盞服数貼瘥

加減瀉白散

青皮（二两）　桑白皮（一两）　地骨皮　知母　陳皮
桔梗（各半两）　甘草（各三錢）　右剉如麻豆大每服半两
水二鍾煎至一鍾食後温服数貼愈

麻黄散

麻黄　欵冬花（三錢）　杏仁（一錢半）　肉桂（二錢四分）　訶子
肉（一錢）　甘草（一錢）右作二貼每貼水二鍾茶一
錢煎至一鍾食前服

葶藶散

甜葶藶　桔梗　瓜蔞仁　桑白皮　苡仁
葛根（各錢半）　甘草（一錢）右水二鍾加升麻一撮生姜
五片煎至一鍾食後服

人参定喘湯

人參　半夏麴　五味子　罌粟殼　麻黄
阿膠　甘草（各一錢）　桑白皮（二錢）右用水二鍾生
姜三片煎至一鍾食後服

團參散
紫團參（三錢）紫苑茸（三錢）款冬花（二錢）右水二鍾烏梅
一箇煎至一鍾食遠服

杏仁散
杏仁　大腹皮　人參　橘紅　檳榔
白术　訶子肉　半夏　桂心　紫苑
甘草　桑白皮（各一錢）右用水二鍾姜三片紫
蘇七葉煎至一鍾去滓不拘時服

四磨湯
沉香　檳榔　人參　天台烏藥○右
各濃磨水共取七分煎三五沸不拘時服
人參潤肺湯（見咳嗽門）　華盖散（見咳嗽門）
蘇子降氣湯（方見氣門）　五苓散（見泄瀉門）
分氣紫蘇飲（方見氣門）　四物湯（見諸血門）
大承氣湯（見脾胃門）　三拗湯（見咳嗽門）

暑門（有十四名）

炎暑之氣在天為熱在地為火在人臓為心且暑者相火行令夏月人感自口齒而入先着於心伏三焦腸胃之間凡中之者其熱傷氣而不傷形也乃六淫中無形之火五行中有形之水制之則輕如注夏之病重則面垢發渴昏不知人或吐或瀉或眩暈頑痺至甚瞀悶懊憹而死每歲夏令天道氣虛人身肖天地豈不虛乎故孫真人用人參五味子麥門冬名曰生脉散當此之時而服也益金水以滌火土之旺又令人夏食寒以扶陰氣養其陽也每夏陽氣浮於肌表散於皮毛腹中之陰氣實而陽氣虛矣槩古治暑分傷暑中暑最為切當暑熱之時無病之人在高堂大厦乗風納涼靜而得之名曰中暑行人農夫日中勞役動而得之名曰中熱寒邪傷形暑熱傷氣若元氣虛極受病有一時不能救者與傷寒陰毒傾刻害人無異人之元氣虛實不同治之之法豈可執一者也

○總脉

脉浮大散熏惡臭身熱煩心痛為正邪

傷暑脉虛兼身熱是爲賊邪

○死症（名六）

中熱脉絃細芤遲其症發熱惡寒身重疼痛毛聳手足冷口開齒燥死　五臟中熱死

傷暑服燥熱藥致發班發黃小便不通悶亂死　傷暑服冷藥死

面垢發渴昏不知人或吐或瀉或眩暈頑痺死　悶瞀懊憹者死

○辯驗暑症法

暑症其脉虛其症頭疼口乾面垢自汗倦怠少氣或背寒惡熱

○治法

凡暑病道途無湯藥即以熱土熨臍中仍使更換熱土不可移在冷地上卧

凡覺中暑急嚼生姜一大塊水送下如已迷悶嚼大蒜一大瓣水送下如不能飲水研灌之立醒

凡夏月暑症不可服燥熱藥致班毒發黃小便不通悶亂而死

凡傷暑切不可服冷藥服之則死

凡暑病須分傷暑中暑傷熱中熱

凡暑症宜清心利小便甚妙如自汗不可利小便宜白虎湯清解之次分表裏症表症必頭疼惡寒服雙解散加香薷

凡暑症在半表半裏泄瀉煩渴飲水吐逆以五苓散治之熱甚煩渴益元散治之若表裏熱甚半夏解毒湯（開末巻）

凡虛弱老人冒暑脉微下利渴而喜溫或厥冷不省人事宜竹葉石膏湯加熟附子一片冷飲

凡暑症用黃連香薷飲清暑益氣湯五苓苄湯

挾痰加南星

如肥白人或元氣虛者加人参

如微熱食不知味清暑益氣湯

如倦卧脚弱精神少頭痛惡熱燥大渴有汗服白虎湯加人参

如暑病頭痛惡寒拘急肢節疼無汗服大順散或白虎湯加蒼术主之

如氣虛身熱少食自汗脉細弱或洪大服補中益氣湯加麦門冬五味子知母

中暑

富貴者在高堂大厦乘風納凉名中暑頭疼惡寒身躰拘急肢節疼痛煩心肌膚火熱無汗○服大順散

中暑

行人農夫勞役名中熱其症頭痛發燥熱惡熱肌膚大熱大渴欲飲汗大出無氣以動○服蒼朮白虎湯

暑傷肺

喘滿痿躄○服六和湯

暑傷心

噎悶昏不知人○服龍鬚散加香薷

暑傷脾

昏睡不覺○服人參益氣湯

暑傷肝

眩暈頑痺○服枇杷葉散

暑傷腎

消渴○服桂苓甘露飲

已上五臟傷暑則病中熱則死治之切不可用冷藥惟宜溫養得冷則死

暑傷脾胃

怠惰嗜卧四肢不收精神少兩脚軟早晩痿日高之後熱如火乃脾胃俱虛○服十味香薷飲

暑傷心胞絡

其脉虛外症頭疼口乾面垢自汗倦怠少氣或背惡寒惡熱氣甚者迷悶不省為霍亂為痿為瀉痢痰滯嘔逆為發黃生斑若其脉虛浮暑兼風邪名曰暑風○服黃連香薷飲加羌活

暑傷血

四肢倦精神少懶動作胸膈氣促肢節沉疼或

氣喘身熱煩心下膨痞小便黃少大便溏頻或利黃沫或如泔色或渴或不渴不思食自汗體重或汗少出乃血病氣不病○服清暑益氣湯

暑風

夏月卒風不省人事挾火挾痰○用二陳湯加黃連實者可用吐法

傷暑老人虛人素弱人

其脉微其證下利渴喜溫厥冷不省人事○服竹葉石膏湯加熟附子半箇冷飲次服五苓散

陰虛熱厥

四肢如在火中腹中有熱〇服竹葉石膏湯

氣虛寒厥

四肢寒冷腹中有寒〇服黃連香薷飲減去黃連

桂苓甘露飲

桂　人參　藿香（各半兩）　茯苓　白朮

甘草　葛根　澤瀉　石膏　寒水石（各一兩）　滑石（二分）　木香（一錢）　右為末每服三錢白滾湯送下

人參益氣湯

黃芪（八錢）　甘草（七錢）　人參（五錢）　升麻（二錢）　五味子（一百四十粒）　白芍藥（三錢）　柴胡（二錢半）　右作四貼水二鍾煎七分服

大順散

甘草　乾姜　杏仁　桂（各等分）　右先將甘草白砂炒次入姜下杏仁炒篩去砂靜合桂為末每服二錢白湯調下

清暑益氣湯

黃芪　升麻　蒼朮（各一錢）　人參　白朮

神麯　陳皮（各五分）　甘草　黃栢　麦門

當歸（各三分）　乾葛（二分）　五味子（九粒）　澤瀉（五分）　青皮（二分）　右水二鍾煎八分服

六和湯

砂仁　半夏　杏仁　赤茯苓　人參

藿香　香薷　厚朴　白匾豆　木瓜

甘草（各等分）　右水二鍾煎至八分不拘時服

竹葉石膏湯

石膏（五錢）　麦門冬　人參（各二錢）　甘草（五分）　半夏（一錢五分）　右用水二鍾姜三片青竹葉十四片粳米一撮煎至一鍾不拘時服

黃連香薷飲

香薷（二錢）　厚朴　黃連（各一錢）　右先將厚朴黃連同生姜搗細在藥礶內慢火同炒令紫色取起入香薷水酒各一鍾煎至八分去柤水中浸冷服

治中暑迷悶欲死

用蒜一瓣生嚼以新汲水送下如不能嚼水研灌之立可劾熱死人切勿與冷水及臥冷地正如凍死人須先與冷水若近火即死〇一法行路熱死人惟得置日中以熱湯灌之即活

枇杷葉散

枇杷葉（去毛）　厚朴　陳皮　丁香（各五錢）　麥門
白茅根　乾木瓜　甘草（各一兩）　香薷（七錢半）　右為
細末每服二錢冷水調服

龍鬚散

五味子（二兩）　烏梅肉（二兩）　甘草（一兩半）　飛羅面（二兩）　枯白
礬（一兩）　右為細末每服二錢新汲水調下一服愈

十味香薷飲

香薷　人參　白扁豆　陳皮　白朮
黃芪　甘草　厚朴　木瓜　茯苓

（各五錢）　右為細末每服二錢白滾湯調服

雙解散

滑石（一兩）　甘草（二兩）　防風　川芎　當歸
芍藥　大黃　蒲苛　麻黃　連翹
芒硝（各二錢半）　石膏　黃芩　桔梗（各五錢）　荊芥
白朮　梔子（各二錢）　右為末每服二錢水一大
盞生姜三姜煎至六分温服

補中益氣湯（見脾胃門）　益元散（見痢疾門）
蒼朮白虎湯（開末卷）　五苓散（見泄瀉門）
白虎湯（見門）　二陳湯（見痰飲門）

注夏門（一名）

春末夏初火氣浮泄於表濕熱隆盛每遇斯時人多見日色則目昏惡心肢體困倦精神短少身熱頭疼脚軟少食脉大乃是陰虛元氣不足謂之注夏緣客氣旺主氣衰熱傷元氣而然也故古人立法夏服補劑者補天真元氣也用補中益氣湯去柴胡升麻加黃栢芍藥挾痰加半夏陳皮

加減地黃丸

熟地黃（八兩）　乾山藥（四兩）　山茱萸（四兩）　牡丹皮（三兩）　人參

白茯苓　麥門冬　澤瀉（各二兩）　五味子　黃栢
（各一兩）　右為極細末用蜜一觔半煉蜜滴水成珠
為度入前藥末石臼內杵千下丸如梧桐子大
空心服三錢午間服二錢俱用白滾湯送下臨
夜服二錢或酒或湯或米飲送下每日準準服
三次俱要飲食壓之則不發飽每歲三月預先
服起至八月中止

補中益氣湯

見脾胃門

濕門有十四名

此門與膨脹水腫二門互相查考治病

濕乃土氣土乃濕之毋故濕病多從熱生盖火熱能生土濕也六氣之中濕熱為病十居八九書曰因傷濕熱大筋緛短小筋弛長緛短為拘急弛長為痿内之濕是酒麵湯液膩物甘滑炙辣膏粱過度薰蒸濁液不行湧溢於中重則令人病強直癨亂吐利輕則令人痞滿急脅嗜卧沉重無力濕流關節煩疼注絡脉屈伸不可轉側滯經絡發腫肉軟如泥按之不起其脉沉濇此從上從内而起治法急食苦以燥之宜利小便為之治内治下之法也外之濕是霧露隂雨澡浴為風所關或涉水為寒所收汗出迎風坐卧卑濕之地令人頭重鼻塞發寒熱身色似薰黄濕入骨節重痛足趺浮腫其脉浮緩此從下從外而起急食甘辛之藥宜發汗為之治上治外之法也全存醫之識病分内外虗實六淫七情所感的在何經受症治之始為盡善也

○總脉

沉細微緩濇濡皆中濕　兼浮脉風濕

○不治症

大下後汗出喘小便澁　大便利不止

○死症

中氣弱挾痰冒風作中風治

○辯驗濕法

強直痞膈中滿吐下體重胕腫以手按之不起其濕不速治生熱濕熱傷大筋則短縮為拘攣傷小筋則弛長為痿弱濕重體腫不能轉側

○謹戒

遠卑濕地　羊肉　鯉魚　白酒　麸　醋

潮潤衣被　猪肝　鱖魚　胡椒　麵　蒜

○治法

凡治濕理脾胃清熱利小便治濕不利小便非其治也

凡濕病分濕熱寒濕

濕熱脉洪小便赤渴身熱煩喘胸滿發黃或痛

寒濕脉遲小便清大便或溏或瀉身疼不熱

汗

凡治濕病切不可大下

凡治濕用瓜蒂取水法

凡治濕用米泔伴蒼术炒為主藥

凡濕病在腰已上自外起者宜發微汗解衣為主隨虛實證俟加減

凡濕病在腰已下自內起者五苓散為主隨虛實證加減

凡滲濕湯治本論中一應外傷濕病

凡清燥湯治本論中一應內傷濕病

凡濕病非白术不可以去非蒼术不可以去濕欝

凡用二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼术散風行濕最妙

凡濕勝氣實人用神祐丸或舟車丸虛人用桑白皮白术葶藶木通

凡肥人多濕用白术澤瀉為主藥

重濕

令人小便不利大便反快身痛煩脉來沉緩宜急利小便○服大橘皮湯

風濕

令人一身盡痛發黃小便自利肢體重着不可轉側額上微汗不欲去衣被身微腫脉來浮當燥陰土宜微微發汗隨服麻黃薏苡仁甘草白术喘加馬兜苓杏仁五粒

寒濕

身體重着腰脚酸疼大便溏泄小便亦濇○服除濕湯

暑濕

傷濕復傷暑者不可發汗若發汗令人耳聾不能言不知痛痒○服四君子湯加香薷澤瀉木通

濕熱

心腹脹滿水腫小便不利大便滑泄○服大橘皮湯

濕溫

凡經發汗過多風去濕存兩脛逆冷腹滿頭目痛多汗妄言其脉陽濡弱陰急小○服四君子湯五苓散各半

濕火

五苓散加山梔杏仁黃栢若徒其性治亦麻柴
胡

濕痰
脾胃積蓄痰冒風露令人涎潮壅塞口眼喎斜
半身不遂昏不知人與中風相似但脉沉濇細
若作中風治致危○服白朮酒

酒濕
男子婦人雜症酒濕○服金砂流濕丸

濕痺
令人關節疼煩而體重頑麻脉來沉細○服四

物附子湯

濕傷血
其症身如破杖乃濕傷血也

陰濕
脉緩弱昏迷腹痛身重自汗失音不利不禁用
白虎湯愈白乾姜附子白朮

下焦濕
腫痛并膀胱有火邪者用防已黃栢知母龍胆
草去蒼朮

肥人多濕

四物附子湯
附子（一錢半）肉桂（一錢）白朮（三錢）甘草（一錢）右水二
鍾煎至一鍾不拘時服

瓜蒂取水法（治傷濕鼻塞頭疼）
瓜蒂為末先含水一口用芦管吹藥少許入鼻
內流出黃水効

白朮酒
白朮（一兩）酒三鍾煎至一鍾服

天麻散（風濕疼痛黃腫）
天麻　全蠍（各四錢）熟地黃　木瓜　烏頭

當歸（各三錢）牛膝（二錢）乳香　沒藥　川芎
川山甲（蛤粉炒去蛤粉各一錢）右為末每服二錢酒調服

金沙流濕丸（男婦雜症風濕酒濕）
海金沙（五錢）朮通　郁李仁　木香（各一兩）澤瀉
白茯苓　大黃（各兩半）滑石　黑白牽牛（取頭末各
五兩）右為末水丸如梧桐子大每服六七十丸生
姜湯下忌麩麵○婦人血氣不調當歸湯送下
小便不通灯草湯下　傷酒生姜湯下
食黃蘿蔔湯下　心疼韭根湯下
以高良姜湯送下　膈氣枳實湯下

肢節疼痛溫酒送下

除濕湯

半夏麯　陳皮（各一錢半）　茯苓（二錢）　厚朴　藿香　甘草（各一錢）　白朮（二錢半）　分作二服每服水二鍾姜三片煎至八分食前服

滲濕湯

白朮（三錢）　乾姜　白芍藥　附子　茯苓　人參（各一錢）　桂枝（不見火）　甘草（各五分）　右水二鍾煎至一鍾不拘時服

清燥湯

黃芪（一錢半）　黃連（一分）　蒼朮（一錢）　五味子（九箇）　白朮　橘紅（各五分）　人參（三分）　麦門冬　生地黃　當歸　猪苓　神麯　甘草（各二分）　白茯苓（二分）　黃栢　柴胡（各一分）　升麻（三分）　澤瀉（五分）　右用水煎服

白虎湯

石膏（四兩）　知母（二兩半）　甘草（一兩）　粳米（一合）　右㕮咀每服用一两水二盞半煎一盞去滓服

大橘皮湯（見水腫門）　五苓散（見泄瀉門）

四君子湯（見脾胃門）　二陳湯（見痰飲門）

舟車丸　神祐丸（已上二丸其藥峻利後人甚速不祿）

惡寒門 一名

此門與火熱門互相查考治病

惡寒非寒明是熱症亦有久服熱藥而惡寒者謂之火極似水熱甚反覺自冷的非寒也有誤服熱藥而少愈者為辛溫發散鬱遏之氣暫開所以少愈耳

○總脉

脉滑数但按之鼓擊於指下

○辯寒

病人身寒厥冷非寒也名曰陽盛格陰

○治法

用升麻柴胡澤瀉羗活黃栢黃芩此則通應通用之劑甚則大黃朴硝

凡惡寒兼發熱用柴胡蒼朮

凡惡寒病久亦用解散鬱藥

凡惡寒不得熱是無火此乃明是熱症而反惡寒為心火不足宜益心火制瀉腎水有餘

凡肥白人久病虛弱惡寒是氣虛用人参黃芪之類

惡熱門　一名

此門與虛損門互相查考治病

惡熱非熱明是虛証經云陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節則精血耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡寒也當作陰虛治之

○總脉

脉数但按之不鼓擊於指下

○辯熱

病人身熱非熱也名曰陰盛格陽

○治法

用加减地黄丸方見註夏門

凡惡熱不得寒是無水此乃明是虛症而反惡熱為腎水不足宜補益腎水制瀉心火有餘

識病捷法卷之五

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

噎膈門　附番胃共二十五名

噎者凡遇飲食覺有阻滯噎之不下乃是六腑所成氣為病也膈者膈在心肺之間上下不通若格拒之狀是五臟所生血為病也皆三因氣聚成痰之積久血液俱疼血液枯槁在上近咽之下湯可飲物難食名曰噎血液枯槁在下與胃相近食可食良久復出名曰膈噎膈日久胃氣太虛朝食暮吐名曰翻胃名雖不同病出一體徒有別名治之則一男多因下元虛冷女多由氣血虛損全在切脉用藥先難擬治雖有古方恐不對病脉理治法細開五噎五膈條下貴乎臨時審察此症乃神思間病非藥能療惟內觀自養始可獲生矣

○生脉

浮　緩

○死脉

沉　細

〇翻胃難治脉
緊　濇

〇不治症（名三）
年高　肉脫　糞如羊屎

〇死症（名四）
吐臭痰　吐痰血　吐寸虫　口沫大出

〇治法

凡噎膈大率宜疎氣化痰生血降火和胃之劑更加童便竹瀝姜汁韭汁牛羊乳六味不可缺也

凡翻胃腹内有虫須用驢尿驢尿有毒不可服多要熱飲

凡翻胃切不可用香燥藥

凡噎膈用糯米為末以牛涎拌作小丸蒸熟食之遂愈隨服調理藥取牛涎法將荷葉包牛口使走力乏涎大出收用

凡噎膈用馬剥兒燈燒存性一錢好棗肉平胃散各一錢酒調服食即可下馬剌兒即野甜瓜味帶酸黄時香其皮色肉味一似家園甜瓜如鷄子大北方多有

凡噎膈痰實火盛之人先以瓜蒂散吐之後用大黄角黑丑朴硝等分粥丸服

凡膈病初起因内傷外感而致痞塞呑酸嘈雜等症用辛香燥熱之藥劫之而愈復病復劫延久成噎膈

凡噎膈氣虚用四君子湯血虚用四物湯有熱加黄栢有痰加貝毋宜淡薄滋味

凡噎膈有氣者用童便浸香附蒸熟用

凡噎膈有陰火上炎者用黄栢知毋玄参

凡噎膈有積血者用桃仁承氣湯為丸食後酒送下五十丸隔一日服一次十次為止其藥韭汁糊丸

五噎（氣結咽間則成五噎結者結聚之義其症妨碍飲食吐之不出嚥之不下）

憂噎
關部脉結伏用開欝氣藥

怒噎
兩關脉俱絃甚用抑氣順氣藥

勞噎
關部脉大無力人参為主

食噎

其脉短濇用消導藥其症食後心下隱隱然痛不可忍吐出痛止

氣噎

寸關脉沉濇用開滯導氣藥○七情之氣其脉緩濇用踈氣藥

五膈（氣結胃間則成五膈其症胸膈痞滿嘔吐煩悶食不下噫氣吞酸時聞食臭大小便閉）

風膈

風邪其脉浮絃防風為主其症食入即吐此心經中風邪

寒膈

寒邪其脉沉遲炒黑乾姜為主其症痛出飲食此肝經中寒

熱膈

熱邪在胃右關脉數大用黄連為主

痰膈

痰邪在胃寸關脉沉或浮大二陳湯為主

水膈

血氣不足停水積飲在胃脘即臟冷脾不磨化宿食食不化隨逆氣而吐右關脉沉無力用白术當歸澤瀉葶藶山柤姜汁為主

翻胃

因噎膈日久或食燥熱藥大便自結食不得食食則反出

如氣虛用四君子湯右寸口脉無力

如血虛用四物湯左寸關脉無力○先服秦椒剪紅丸去瘀血痰虫次服大効散不愈再於臞仙方内選用

三陽結為噎

小腸熱結則血脉燥

大腸熱結則大便不通

膀胱熱結則津液涸

已上三陽既結則大小便不通氣反上行食噎不下此皆熱症並服化鐵丸

諸氣為噎

怒氣飲食噎塞不下用桔殻青皮

劳氣為咽噎喘促用三白湯為主

思氣為中噎用撫芎貝母枳實炒

三焦氣閉塞為咽噎不利用黄柏枳殻

陰中伏陽為噎

噎為七情所發或因三焦傳化失常皆主于氣

也或胃脘血液虧少○服通幽湯

三焦為痛

上焦吐是氣也其脉浮洪其症食已暴吐渴飲水大便結氣上衝胸作痛治宜降氣清熱

中焦吐是積也食與氣併作痛其関脉浮先痛後吐或先吐後痛○服木香檳榔丸

下焦吐是寒也其脉沉遲朝食暮吐小便清大便不通治宜通其閉塞散其寒氣和中焦

瘀血為痛

或被人打傷或墮跌內傷或好熱飲食或多怒

積瘀血在內忽吐不食○服桃仁承氣湯

脾敗為痛

食罷即吐朝食暮吐酸臭黃水○服安脾散

壯年翻胃

用益元散加陳皮半夏姜汁竹瀝甘蔗汁

化鐵丸

五靈脂（去沙石）　青皮（炒）　陳皮（各一兩）　陳倉米（一合炒）

巴豆（三十五粒去油）　先炒五靈脂香透次下青皮炒色變又下陳皮亦炒色變陳米同巴豆炒黃色揀出巴豆以紙攤在地上出火毒各為末米醋為

丸如綠豆大每服十五丸加至二十九丸男用茶送下女用醋湯送下

秦椒剪紅丸

雄黃　木香（各五錢）　檳郎　三稜　蓬朮

貫仲　乾漆　陳皮（各一兩）　大黃（半兩）　為末

麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前米湯送下

敵痰丸

半夏麯　枯礬（各一兩）　皂角（二兩）　黑牽牛（炒二兩）

為末蘿蔔煮爛和藥丸如梧桐子大每服五十

丸食後薑湯送下

五膈丸

琥珀（一錢）　訶蔾勒　木香　陳皮　昆布

桃仁　白朮（各三錢）　肉桂　半夏　枳殼

五味　檳郎　大黃（各五錢）　為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心薑棗湯送下

五噎散

人參　桔梗　半夏　白豆蔻　木香

沉香　蓽澄茄　枇杷葉　生薑　白朮

各一錢　甘草（五分）　右水二鍾半薑三片棗一

枚煎至一鍾食後服

大効散

田螺殼黃蜆殼二件不拘多少在土中多年陳者尤佳各另燒成白灰研細每料用田螺殼灰（二兩）黃蜆殼灰（一兩）烏梅肉（四兩）同搜和作團以砂礶盛蓋鹽泥固濟火煅令焦黑存性取出研細每服二錢砂仁湯調下

安脾散

良薑一兩以百年墻上土三合敲碎用水二碗煮乾薄切成片南木香草　陳皮人參白茯苓白术胡椒丁香各三錢甘草五錢為末每服二錢食前米湯調下

十膈散

人參　茯苓　肉桂　枳殼　甘草

神麴　麥芽　訶藜勒　蓬术　三稜

生薑　陳皮　白术　厚朴　檳榔

木香（各五錢）為末每服二錢白滾湯調下如脾胃不和腹脇脹滿用水一盞薑七片棗一枚鹽少許煎服

通幽湯

桃仁　歸身（各一錢）　生地　熟地（各二錢）　升麻

紅花（五分）　檳榔末（一錢）　右水煎調檳榔末服

三白湯

白术　白芍藥　白茯苓（各等分）　右用水煎服

平胃散

陳皮　甘草　蒼术　厚朴（各等分）　右為末生姜湯調服

柿蒂散（見脾胃門）　木香檳榔丸（見積聚門）

四物湯（見諸血門）　桃仁承氣湯（見諸血門）

二陳湯（見痰飲門）　四君子湯（見脾胃門）

臞仙方（見卷末）

痞滿門 有八名

此門與脹門互相查考治病・

痞與否同不通泰之謂有陰伏陽蓄氣與血不運而成處心位中央膹滿與脹滿輕重之分痞則內覺痞悶外無脹急之形脹滿外有形也前人皆以誤下為裡氣虛而致之傷寒表邪乘虛入於心下雜病受邪亦蓄心下世俗不明此理往往用峻快藥下之多致於于危可不痛哉

○總脉

寸脉沉濡　關脉浮絃

○辨分痞滿虛實

虛痞大便利少食

實痞大便閉能食

○治法

凡治痞要問曾患傷寒可曾經下（如傷寒經下在傷寒門治下）

凡治痞要問曾患雜病可曾經下（如雜病經下甘草瀉心湯）

凡治痞宜用升胃氣以氣血藥煎（用升麻白朮炒當歸酒洗）

凡治痞切不可全用耗氣之藥也

凡痞滿服通利藥必變成中滿膨脹

凡痞滿有中氣虛弱而成其症者（用補中益氣湯隨症加減）

凡痞滿有濕熱太甚而成其症者（用五苓散去尊桂加黃芩）

凡痞滿有瀉痢失血而成其症者（用四物湯加[illegible]參[illegible]實少）

凡痞滿有傷於飲食而成其症者（用木香檳榔丸加白朮炒）

汗下後痞滿

服半夏瀉心湯去乾姜加生姜四兩

下後腹中雷鳴痞滿

服甘草瀉心湯

一切心下痞滿年久不愈

服大消痞丸

右關浮絃惡食懶倦虛痞

服枳實消痞丸

停痰痞滿

服消飲丸

三焦痞滯水飲停積脇滿

服三脘痞氣丸

憂氣結胸中腹皮微痛不思食痞滿

服木香消痞丸

內傷痞滿

服補中益氣湯

半夏瀉心湯

半夏（半升洗）　黃連（一兩）　乾姜　人參（各三兩）　黃芩　甘草（各三兩）　大棗（十二枚）　右用水一斗煑取六升温服一升一日服三次

甘草瀉心湯

即前半夏瀉心湯去人參加甘草一兩

大消痞丸

黃連（炒）　黃芩（炒各六錢）　姜黃　白术（炒）　甘草　砂仁　乾姜　神麯（各炒一錢）　人參　陳皮　猪苓（各二錢）　澤瀉　厚朴（各炒三錢）　半夏（四錢）　枳實（五錢）　右為末姜汁糊丸如梧桐子大每服五十丸起至百丸止百滾湯送下

枳實消痞丸

枳實（炒）　黃連（炒各五錢）　乾姜（一錢）　大麦麯（二錢）　茯苓　甘草（炒各錢半）　人參（三錢）　半夏麯（三錢）　厚朴（姜製四錢）　白术（炒二錢）　右為細末濃米飲為丸如梧桐子大食後白滾湯送下五十丸

三脘痞氣丸

木香　白豆蔻　京三稜（煨）　青皮（炒各一兩）　檳榔　砂仁　沉香（各五錢）　半夏（姜汁拌蒸）　大腹子　陳皮（各二兩）　右為末神麯糊為丸如梧桐子大每服三十丸加至六十丸食後白滾湯送下

木香消痞丸

木香（五錢）　柴胡（四錢）　陳皮（三錢）　半夏（一錢）　乾姜　歸尾（各三錢）　紅花（五分）　右為末濃米飲為丸服

木香檳榔丸（見大便門）

補中益氣湯（見泄夏門）

四物湯（見血門）

五苓散（見泄瀉門）

消飲丸（鬨末卷）

眼科有七十二名

余不專於是科凡遇斯疾真心辭之考究諸書不得精詳惟徽州府刊行七十二症有詩七十二首不甚盡善又覔七十二問與七十二症名少異摘而梓之

第一問人身中天地所禀貴者何也

岐伯答曰人身最貴是眼眼者如天之日月盈喪清朗不可不明也

第二問人之眼或患者何也

答曰善哉問也或因酒色或犯憂愁或因思慮或悲哭或食醎酸使氣不營肝經肝經損眼即病矣

第三問目赤痛者何也

答曰此五積毒流傳於肝木乃肝之外像受熱邪使血散亂流經於目故赤痛也當以酒調散當歸散四順散八正散主之老人赤腫風症也

第四問目赤不痛者何也

答曰此肝之實肝者血之源其侯於目肝實則血盛盛則泝注四散血氣上灌衝行於目血侵於睛睛受其血所以赤而不痛也當以撥雲散當歸散道赤散治之

第五問赤而昏者何也

答曰此肝之虛也肝屬於木木生火火發則木滅火屬心心生血血生懽目皆侵於瞳人故赤而昏也當以當歸活血煎黃芪丸主之

第六問大眥赤者何也

答曰此心之實也五輪分布大眥屬心心為帝主位南方其像火赤色大眥赤者心實也當以三黃丸菊花散急應散主之

第七問小眥赤者何也

答曰此心虛也心者五藏之主六府之宗上應熒惑星其病屬南方之火當以硃砂膏人参茯苓煎定志丸主之

第八問眵出結凝者何也

答曰此肺之實也肺者西方金金生水水滿則泝溢病本肺生其色故白經云淚本屬肺肺之津液出目為眵結而凝者肺實也當以瀉肺散主之

第九問眵淚不結者何也

荅曰此肺之虚也肺屬金金受心之邪金得火衰而化水水沵溢出故淚常沵而不結當以阿膠散艾煎丸主之

第十問羞明怕日者何也

荅曰此脾之實也脾屬土土化濕濕氣傳於肝肝受脾之邪上騰於目目受脾濕氣脾主肌肉壅熱難開明屬太陽真氣氣勝其濕土濕熱相勝津華灘結不榮於目故羞明也當以密蒙花散千里光丸主之

第十一問視物不明者何也

荅曰此肝藏虚也眼有五輪屬五藏有黑睛有白睛有青睛有赤睛有黄睛黄輪屬脾即褐睛也目本應肝其色青屬木脾屬土本木尅土青黄相争黄不勝青目睛遺雜而視物不真也當蒼术湯主之

第十二問茫茫黑花者如蠅羽何也

荅曰腎藏太實也腎屬水其蠅羽象黑也腎者肝之毋毋能榮子肝受腎之邪傳經膽膽者目之經腎肺入目時復茫茫如蠅羽者腎之實也當以猪苓湯苦参湯主之

第十三問迎風有淚者何也

荅曰腎虚也五輪論曰黒睛為腎經曰肝屬木木生風腎屬水水不勝風目乃神水之源故迎風有淚也腎之虚也當以地黄丸燕子主之歧伯以眤系冰湯艾煎丸素問曰淚者肝之液也迎風淚出者腎虚也眵者出肺又液者出心流而不覺者出於肝虚也

第十四問赤筋附睛者何也

荅曰此心尅肝也心屬火火主血肝屬木木主觔血侵於睛者肝之侵也目者肝司也流傳於

目即漸灌交故曰赤觔附睛也當以大黄當歸散主之有瞳而生赤觔至背者背疋腎熱也緣腎者少陰之經化君火者也

第十五問白膜遮睛者何也

荅曰此是肺尅肝也肺屬金肝屬木金尅木金色白木化為風風邪在肺其經木旺白輪勝風輪白輪指青輪之復即漸蘿變是子毋邪尅子化也白膜遮睛者金尅木也當以連翹湯密蒙花散蟬花散主之

第十六問迎風痠痒者何也

荅曰肝之邪自傳肺也肝屬風風燥動動即痒也當以二霜膏青鹽膏苦芥子散主之

第十七問早晨昏者何也

荅曰此頭風攻注也頭者六陽之會肝藏屬陽早晨真陽欲旺其目昏者為六陽脉俱朝也在寅卯之時寅卯為木主風故為頭風攻注也當以芎藭石膏丸白蒺藜散主之

第十八問日中昏者何也

荅曰此痰之所作也在巳午之時火旺於心今火勝肺肺實壅痰兩暈暈而昏也當以半夏丸辰砂丸螵蛸丸主之也

第十九問夜晚昏者何也

荅曰腦之損也腦者天真之物行於陰道而不行陽也故在申酉戌時寒氣欲生腦損則風寒所至目睛所昏不甚者當以灸風府穴

第二十問晝日害痛者何也

荅曰此陽毒盛也經曰晝則陽生夜則陰長少陽者膽之旺在寅絕在申乃一陰之氣也故夜則不痛晝則痛也當以瀉心湯乳香丸主之

第二十一問夜則痛者何也

荅曰此陰毒盛也經曰陰好靜陽好動血氣散漫而行陰道寒邪繞之使邪氣火盛夜氣屬陰旺在申從申時痛至寅時者陰之去也當以同陽散補真丸乳香丸主之

第二十二問浮翳遮睛者何也

荅曰肺經火熱也肺者西方金其色白肺者氣之源氣勝則熱血勝則寒肺之熱氣灌注瞳人瞳人者目之根白膜者肺之苗根實寒苗勝白膜遮睛乃肺經大熱也當以瀉肺湯順氣散三黃丸主之

第二十三問抱螺突出睛者何也

荅曰此睛之損也睛者五藏之源六府之宗從府積毒外發癰疽肝藏偏衰而發於目本患瘡膿血結硬真睛突出故曰蚫螺突出也當以拔睛丸蟬花散珍珠膏琥珀珊瑚膏主之抱螺翳者有赤睛突出有傷寒陽毒返睛熱而出有小兒瘡疹而出

第二十四問眼睛倒入者何也

荅曰此五藏之損也眼應五行外顯青黃赤白黑內應心肝脾肺腎五藏之宗睛深枯入者五

藏之損也當以真人五補丸主之枯入者此五藏六府之損也損者緣五藏虛弱而受眼疾醫以重藥消之故見睛疼重藥者邪熱相隨墮藥泄下即枯也

第二十五問青膜遮睛者何也

荅曰此外障也目者腎水之源精華之府五藏積蘊熱氣攻衝外發於目目屬於肝其色青故主青膜也當以蟬花散洗肝散桑螵蛸丸退翳復明膏珊瑚琥珀膏救睛丸決明丸主之

第二十六問瞳人背側者何也

荅曰此內障也五行應变外降為先氣血皆衰榮衛凝滯不能榮於目故瞳人側倒也當以救睛丸當歸鹿茸丸夜光椒紅丸地黃丸活血煎麻黃生犀丸五肝丸珊瑚琥珀膏當歸散五参丸主之

第二十七問頭暈昏矇目前赤白星亂者何也

荅曰此血之聚也血者經也周流百脉血衰則百脉不旺六陽沵舉頭暈昏冢頭者六陽之首也陽經不行則頭目昏暈也當以芎藭石膏丸當歸活血煎石膏散主之

第二十八問不痛癢赤昏者何也

荅曰此氣衰也榮屬陰衛屬陽陰好静陽好動氣血流行升降即榮衛通矣血結則癰疽氣滯則麻癢癢則不痛不癢但赤而昏當以透經匀氣丸通明蟬花散順氣丸主之

第二十九問赤而熱痛者何也

荅曰此血實也緣經屬陽絡屬陰經主血絡主氣氣勝則肺壅血勝則肝實外應於兩目赤而熱痛者血實也當以大黃當歸散牡丹丸主之

第三十問血浸睛者何也

荅曰此肝經虛熱也目者肝之應津液之道宗脉之所聚也有邪熱客於肝肝虛血脉流傳於兩目赤而侵睛也當以五靈散及補肝丸連翹湯主之不退則名曰血灌睛注瞳人泄也

第三十一問久昏如遮者何也

荅曰此衛經實也衛主氣經云榮在上而為天衛在下而為地素問清氣分輕為天黑氣重濁為地清陽發腠理濁陰走五藏肝受衛之邪氣流傳於目故昏而遮也當以木賊湯連翹湯主之

第三十二問痛而增寒者何也

荅曰此衛氣之虛也衛屬陰而為陽榮屬陽而為陰經曰榮者肝之司衛者腎之府皆北方壬癸水衛來歸府故增寒也當以附子猪苓湯白术散益黄散主之

第三十三問痛而体熱者何也

荅曰榮衛之實也經曰榮屬陽能發熱衛屬陰能發寒陰陽之道路在上屬心與肺在下屬腎與肝痛而發熱者邪在心心者手少陰君火之化而發炎熱也當以洗心散解肌散菊花餅子大黄當歸散主之

第三十四問乍明乍暗者何也

荅曰榮之虛也榮衛者陰陽之祖血氣之宗榮衛流利氣血朝行榮衛相爭榮不及於衛則復不明乍暗也當以調氣丸當歸艾煎丸夜光椒紅丸主之乍明乍暗有隨心氣者心喜則明憂愁則暗亦皆有之

第三十五問左目右目何也

荅曰此陰經之旺也經曰有陽中之陽陰中之陰陽中之陽者心也陰中之陰者肺也心經邪熱蘊積於肺肺受心邪傳於目也左目屬太陽右目屬太陰左目傳右目者太陽經旺也當以木通散三黄丸洗心散主之

第三十六問右目傳左目者何也

荅曰此陽之症也脉有陽經有陰經有陽絡有陰絡之屬氣肺之經其經繫於右目右日傳左目者是肺經有邪熱絡肺太旺當以瀉肺湯橘皮湯導赤散主之

第三十七問左右相傳者何也

荅曰此邪氣攻衝也肝藏不足為風邪所使熱氣相爭左右往來脉有偏勝偏邪故往來相爭

也當以蚕紙散芍藥湯分珠散主之

第三十八問赤而痒溢者何也

荅曰肝者厥陰之經而化風內邪相攻風濕相搏血氣瘖溢時復風邪動作而發痒溢也當以芍藥湯二霜膏清華散主之

第三十九問兩瞼赤爛者何也

荅曰此風邪濕氣攻也目者精華之宮魂魄所聚血脉之源陰陽之會經絡之宗風邪克於瞼理濕氣相爭停於兩瞼之內因而浸注濕爛也當以麻黄省風湯除濕二礬丸主之

第四十問眼睛通黄者何也

荅曰此酒之毒也或承渴時飲酒如漿或飲之腹痛滲入四肢随經絡注流上下往来夜随血氣朝於肝夜至晨朝於目故引酒之毒灌注入於瞳人使目睛之黄也當以雄黄丸晋仲湯主之或有太病之後新痊血氣不足亦積睛黄伏暑邪之氣積入於睛輪與白赤有黄也

第四十一問目不遠視者何也

荅曰此劳傷五藏也目者肝之外候風邪克之使精華之氣衰弱肝氣不足致不能遠視也當以補肝散蟬花散主之

第四十二問年年發者何也

荅曰此乃随天令而病也經曰冬至之後少陽旺復得甲子陽明旺復得甲子太陽旺復得甲子太陰旺復得甲子少陰旺復得甲子厥陰旺旺各六十日六六三百六十日其氣一周假人之太陽經受痛得於来年夏至前六十日而發也當以随經流利假如太陽受病只流利太陽

第四十三問拳毛倒睫者何也

荅曰此肺之損肺者五藏之華盖主於皮毛經

曰一損損於皮毛皮聚而毛落拳毛倒睫者肺之損也當以補肺湯阿膠煎主之

第四十四問積年細小者何也

荅曰此脾之損也經曰肌肉者脾之主肌肉消瘦飲食不成肌膚外感風邪克於腠理使肌肉緊急積毒於目故細小也當以人参和脾湯四物猪肚丸麻黄省風湯主之

第四十五問努肉侵睛者何也

荅曰此脾之毒也脾者倉廩之官肌肉之府毒氣攻衝肌肉壅塞邪氣衝於肝肝受脾毒邪傳於目努而出者或以努力而生當以大防風丸三黄丸青塩膏蕤仁膏主之有怒氣而生努肉不可割

第四十六問数年赤者何也

荅曰風熱傷肝也肝主目風熱傷之則目昏赤肌肉虗弱則風邪熱氣不去故積年不瘥當以麻黄省風湯當歸活血煎牡丹丸主之此因赤眼者以冷藥點噏血冷凝坟数年赤也

第四十七問两目非時腫者何也

荅曰此風腫也目者肝之候肝不足則風邪上

衝目外两臉結核数年不出[illegible]盾而發故腫也
當以犀角消毒飲洗心散瞿麥散主之
第四十八問珠子脫出者何也
荅曰藏府陰陽不和也目者陰陽之精魂魄之
宗肝藏之候風熱痰飲積於藏府之間陰陽不
和蘊積生熱攻衝於目使睛疼痛甚者風虛下
入於腦故瞳人脫出當以救睛丸陰陽二和散
主之也
第四十九問眼前而時黑者何也
荅曰此肝之虛也目者肝之侯藏府之華氣血
之宗津液血氣不足肝虛不能榮於目神形昏
亂時時見紗帛之黑也當以夜光紅丸補肝虛
芎藭丸救睛丸主之
第五十問目中飛火者何也
荅曰足厥陰經之旺也其脉起於足大指之端
從之於血血氣太旺風熱相盛故目中飛火也
當以芍藥湯夜光椒紅丸主之
第五十一問目澁者何也
荅曰此藏府勞動也或即悲哭或因淚出過極
冷淚不止津液道閉而不開液道枯竭藏府勞

動邪氣勝於肝冲發於目故澁也當以補肝益
黃散二姜丸三霜丸主之
第五十二問大病後微昏者何也
荅曰此五藏不調也陰陽否塞血氣不榮即神
光無輝無輝則茫茫昏矣大体氣血皆虛也當
以人參芍藥湯橘皮煎黃芪丸主之
第五十三問陽毒病後微昏者何也
荅曰此下之過也五藏為陰六府為陽六經宣
利藏府俱虛脾胃未和肌肉未解勞動氣血使
肝藏肉動故目微昏也當以蒼术湯黃芪丸蟹
甲紫胡湯夜光椒紅丸主之
第五十四問陰毒病後微昏者何也
荅曰此熱過極也或服暖藥或燒艾灸大病已
退風邪冲擊新病復起肝氣大勝風火相搏攻
目昏也當以三黃丸瞿麥散菊花餅子主之
第五十五問因遇水至昏者何也
荅曰此水氣攻於目也如過水則兩脛先入水
緣足之下者有大谿穴大溪之下名曰復溜復
溜之下名曰湧泉湧泉之穴者腎之經也絡於
膀胱其真者從腎上灌於肝水氣攻於兩足脛

而搏於肝肝者目之候邪氣攻之所以視昏也當以仙术湯猪苓散夜光椒紅丸主之

第五十六問妊婦眼昏者何也

答曰此血之病也妊孕以血養胎血不榮肝又氣不足故目昏也當以伏龍肝散靈光丸椒紅丸主之

第五十七問產後眼昏者何也

答曰五藏氣血皆虛也妊孕時當出敗血一斗三升肌血寬慢骨節解散筋脉中絕真氣不足即五臟不榮六府不安目者乃五藏六府之根苗根苗衰故昏也當以椒紅丸當歸活血煎菊花餅子主之

第五十八問小兒未滿歲兩目赤爛者何也

答曰此胎赤也乃是小兒初生之時浴湯冷熾毒不盡拭之未乾留於兩目瞼上外感於風故兩目赤爛也當以樺皮南星散黃連散主之

第五十九問小兒瘡疹初發入於目者何也

答曰此小兒在腹中飲其血氣食其胎胞穢毒瘡疹入於目中者藏府毒發也當以蛇退散犀角散密蒙花散主之

第六十問小兒眼生障翳者何也

答曰眼者五藏之精華肺之外應於目小兒純陽也外感風熱內有瘻壅積於肝冲發於目而生翳障當以蟬花散菊花餅子珊瑚琥珀膏主之

第六十一問小兒白障者何也

答曰此肺壅痰實熱也肝屬木木者青香之物痰熱攻冲灌注瞳人瞳人內傷黑暗黑暗悉白漸漸散漫皆白而為白障也當以救睛丸珊瑚琥珀膏小半夏丸順肝丸主之

第六十二問小兒青盲者何也

答曰此小兒藏府虛弱內伏停飲冷氣過極不宣不通故作障翳而不見物也當以决明散蟹黃散人參菊花餅象牙羌活散主之

第六十三問雀目者何也

答曰此小兒五藏內蘊積熱風邪搏血經絡凝澁陰陽不和榮衛不通使目晝明夜暗昏如雀目也當以熊膽膏蝙蝠丸三黃丸主之

第六十四問小兒眼瞼生瘡者何也

答曰此風邪客於腠理血氣相搏蓋以洗浴之

時拭而未乾穢毒侵睛遇風即發如粟米之狀連臉損爛也當以二礬丸省風三白散主之

第六十五問臉生風粟者何也

荅曰脾肺受邪也脾者肌肉之府肺者皮毛之源邪熱相搏脾經虛弱風熱相乘沖發於目臉之間如粟米之狀故為之風粟也當以黨魚皮散兼烙省風湯主之

第六十六問青盲有翳者何也

荅曰肝者木之源目者津液之府五藏風熱相乘於氣血內攻外溢發於目睛之間而生翳如

𥂕羽之狀當以決明丸沙魚皮散象牙犀角散蠻黃散人參菊花散羌活煎救睛丸主之

第六十七問眴目之候者何也

荅曰涓者沵也邪風克於目津液來之客熱於目此日常發痒冷淚出不絕名曰眴當以艾煎丸綾綿散主之

第六十八問朦漏者何也

荅曰目者五藏之宗六府之華津液之道風熱客於臉上津液乘之冷熱相攻瞳人內損故成朦也名曰漏睛當以救睛百步通神丸

第六十九問目偏視者何也

荅曰陰陽之氣血脉之留風熱沖於目藏府偏勝偏衰陰陽不和故偏視也當以換經陽救睛丸五肝丸主之

第七十問眇目者何也

荅曰目者藏府之精宗脉之聚血氣之源為風邪倚飲經絡偏絕肌肉否溢氣血凝滯使目大小不勻故曰眇目也當以省風湯勻氣湯主之

第七十一問眼目肥者何也

荅曰此邪熱沖肝五藏內成肝者上達於目使

瞳人洩瀉注於外或白或青或黑或赤或黃往來不定謂之肥目當以五肝丸神月定華散主之

第七十二問或針或割或取翳除痛不止血出不止者何也

荅曰目者經絡之苗五藏之源血脉之道路或針割損之即痛不止血出不止也當以三白散乳香散蟬花散主之

蒼朮湯

蒼朮　玄參　遠志　甘草　陳皮

茺蔚子（各六分）石用水一鍾煎至六分食後溫服

楮苓湯

楮苓　木通　滑石　山梔　澤瀉　狗脊　地萹蓄　車前子　大黃（各四分）右用水一鍾煎至六分入塩少許溫服

苦參湯

苦參（四錢）　丹參（二錢）　地膚子（一錢）右用水二鍾煎至八分食遠服柤

連翹湯

連翹　夏枯草　香附（各半分）右為末每服二

錢清茶調下

瀉心湯

當歸　大黃　生地黃　黃芩（各半分）　甘草　右為末每服二錢水一鍾煎八分熱服

瀉肺湯

桑白皮　地骨皮（各一兩）右入糯米（三十粒）水煎服

木賊湯

木賊　玄參　地骨皮　甘草　當歸（各半分）右用水煎服

連翹湯（在三十一問內用）

連翹　赤芍藥　大黃　山梔　當歸　荊芥　龍胆草（各半分）右用水煎服

附子楮苓湯

附子（去皮臍）　楮苓　白术（各一兩）　甘草（半兩）右㕮咀姜三片用水煎服

芍藥湯

芍藥　川芎　甘草　生地黃（各半分）右為末用酒調服

麻黃省風湯

麻黃　五味子　防風　天門冬　大黃

桔梗（各一兩）　細辛　芍藥（各五錢）右㕮咀水煎服

管仲湯

管仲（二兩）　甘草（二錢半）右㕮咀用水煎食後服

人參和脾湯

人參　黃芪　防風　茯苓　甘草　訶子　陳皮　地骨皮（各半分）右為末每服二錢米飲湯調下

蒼术湯（在五十三問內用）

蒼术（六兩）　甘草（七錢五分）右為末空心塩湯調服

鱉甲柴胡湯

一号 6696 冊 續修四庫全書 名 0 反正內

鱉甲（醋炙）　柴胡　知母　貝母　秦艽

蒼术　麻黄　乾葛粉　赤芍藥（各等分）　右

為細末無灰酒調服

當歸散

當歸　大黄　黄芩　龍胆草　菊花

甘草（各等分）　右為末用好酒調服

酒調散

當歸　芍藥　甘草　大黄　菊花

連翹　川芎　天麻　桑螵蛸　蒼术

羗活　麻黄（各等分）　右為末每服二錢酒調下

八正散

大黄　瞿麥　滑石　甘草　木通

山梔　車前子　地萹蓄（各等分）　右入燈心用

水煎服

四順散

當歸　芍藥　大黄　甘草（各等分）　右用

水煎服

撥雲散

菊花　防風　甘草　蒺藜　羗活

柴胡　大黄　山梔（各等分）　右水煎服

導赤散

生地黄　木通　甘草　連翹（各等分）　右用

水一鍾每服七錢入竹葉三片煎七分温服

急應散

千里急　甘草（各等分）　右每服四錢水煎服

菊花散

菊花（四兩）　甘草（二兩）　生地（二兩）　白蒺藜（三兩）　右為

末每服二錢米飲湯調服

瀉肺散

桑白皮　地骨皮　甘草（各等分）　右㕮咀每服四

錢入粳米三十粒水煎服

阿膠散

阿膠　杏仁　甘草（各五分）　款冬花（五分）　糯米

（二兩）　右㕮咀用水煎食後温服

密蒙花散

羗活　菊花　石决明　木賊草　蔓荊

枸杞子　白蒺藜　青葙子　密蒙花（各等分）

右為末每服二錢食後清茶下

石燕子散

石燕（一對）　玳瑁（二兩）　羚羊角（一兩）　右為末每服一

銭薄荷湯調下

大黄當歸散

大黄　當歸　甘草（各等分）右為末新汲水

入蜜調服

苦芥子散

苦芥子（三銭）右為末用水二盞煎七分去柤温服

白蒺藜散

白蒺藜　蔓荊子　甘菊花　白术　甘草

决明子　覆盆子　升麻　川芎（各等分）右為

末每服二銭米泔水調下

回陽散

陳皮　枸杞子　當歸　熟地　茴香

破故紙　威靈仙　防風（各等分）為末盐湯調下

雄黄散

雄黄　冰片　硼砂　乳香　牙硝

姜霜（各等分）右為極細末每用少許點眼

蛇退散

蛇退（一條燒存性）　蟬退（一兩）　黄連（一兩）　甘草（半兩）右為細

末蜜湯調下日三服忌毒物

瞿麥散

瞿麥　大黄　木通　芒硝　水煎服

分珠散

梔子　蚌粉　槐花　牛蒡子（各一兩）

春加赤芍藥夏加當歸秋加龍胆草冬加大黄

右為末茶調食後服

解肌散

赤芍藥　乾葛　麻黄（不去節）　升麻　甘草

半夏（泡各等分）右㕮咀用水煎服

益黄散

丁香（二兩）　陳皮（一兩）　青皮　甘草　訶子

（各五銭）右㕮咀用水煎服

白术散

人參　白术　茯苓　藿香　甘草

乾姜（各等分）右用水二鍾姜三片煎服

五靈芝散

五靈芝　大黄　威靈仙　白芷（各等分）右為

末用好酒調服

大黄當歸散

大黄　當歸　牡丹皮　生地黄　黄芩

芍藥　甘草（各等分）右㕮咀用水煎服

洗肝散

山梔　當歸　甘草　大黃　防風　川芎　海螵蛸（各等分）右用水煎服

順氣散

生地黃（四兩）大黃（二兩）麻黃（一兩去節）皂角（五錢炒）乾姜（少許）右為末每服二錢熟水調下

鯊魚皮散

鯊魚（皮二兩燒）防風　麻黃　荊芥　訶子　青皮（各五錢）右為末不拘時用米飲湯調服

三白散

白芷　白术　白僵蚕（各等分）右為細末每服一錢姜湯下

決明散

草決明　川芎　白芷　木賊　菊花　蔓荊子（各一兩）右為末用白滾湯調下

木通散

木通　山梔　茵陳　赤芍　荊芥　大黃　防風　甘草（各等分）右為細末每服一錢米泔水調服

象牙羌活散

羚羊角　犀角　象牙屑　琥珀　甘草　牛蒡子　防風　荊芥　羌活（各等分）右為細末茶清調下

石膏散

川芎（五錢）石膏（二兩）藁本　細辛　白本　甘草（各五錢）右為末茶清下

黃芪丸

黃芪　防風　白蒺藜　茴香　烏藥　牡丹皮（各等分）右為細末酒糊丸如梧桐子大每服三五十丸食前鹽湯送下婦人淡酸湯送下

三黃丸

大黃（四兩）黃芩（三兩）黃連（兩半）右為細末蜜水為丸如梧桐子大每服二十丸溫白湯送下

定志丸

人參　遠志　天門冬　菖蒲　茯苓（各等分）右為細末煉蜜為丸鷄頭大每服一丸細嚼陳皮湯送下

艾煎丸

當歸　白艾（醋炙）晚蚕沙（炒）秦艽（各等分）右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸桑葉湯送

下桑白皮湯亦可

千里光丸

千里光（即枸杞葉也一名消[illegible]草）　菊花　甘草（各等分）右為不煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸茶清下

地黄丸

熟地黄　遠志　當歸　芍藥　黄芪　甘草（炙各等分）右為末蜜丸熟湯下

艾煎丸

艾葉（醋浸炙）　蓯蓉　當歸　山藥　防風　桑白皮　牛膝　甘草（炙各等分）右為細末煉蜜

為丸如彈子大每服一丸茶清嚼下

芎藭石膏丸

石膏　芎藭　白芷　川烏　附子　羌活　甘草　仙靈脾（炒各等分）右為末蜜丸彈子大辰砂為衣每服一丸薄荷清茶嚼下

半夏丸

半夏（泡一兩）　露蜂房（炒）　南星（各一兩）　殭蚕（五錢）　朱砂　雄黄（各一分）　五靈芝　白礬（各一兩）　蟬蜕（一兩）右為末滴水丸雞頭大每服八九丸薄荷清茶湯嚼下

辰砂丸

辰砂（一錢）　枯礬　天麻（各二兩）　杏仁（四十九個去皮尖）　楮實（一兩）右為末水糊丸梧桐子大每服十五丸姜湯送下

螵蛸丸

蟬蜕　殭蚕　羌活（各一兩）　桑螵蛸（劈破炙二兩）　威靈仙　防風（各一兩）　南星　半夏　當歸（各五錢）右為末姜糊為丸如梧桐子大每服二十丸臨卧時姜湯送下

乳香丸

白蒺藜（炒）　茴香（炒）　川練子　地龍　烏藥

乳香　没藥　黄芪　防風　陳皮　右等分為末水糊丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯送下

補真丸

人參　地黄　川牛膝（各等分）右為末煉蜜為丸梧子大每服三五十丸空心鹽湯送下

加味乳香丸

乳香　没藥　川烏（炮）　京墨（煅研）　赤靈芝　附子（炮一個）　百草（霜各半兩）　木鱉子　南星（炮）　當歸　延胡索（炒）　全蝎（去尾炙各一兩）右為末蜜丸彈子大每

服一九分四服薄苛湯磨化服婦人血氣當
酒臨卧服不可食熱物

救睛丸

蒼朮（泔浸） 甘草 楮實 川芎 荊芥
薄荷 當歸 蟬蜕 羌活 木賊
草（各二兩） 穀精草 蛇蜕（各一兩） 右為末蜜丸如
彈子大每服一丸細嚼茶清湯下

芎藭丸

蒼朮（二斤泔浸） 白芷（二兩） 甘草（三錢） 細辛 藿香
防風 芎藭（各一兩） 川烏（一箇） 右為末油餅劑為
丸彈子大每服一丸細嚼茶清下

四物猪肚丸

海螵蛸（一兩） 黃連（三兩童便浸一宿） 右為末猪燗煑為丸
如梧桐子大每服四十丸米飲湯送下

雄黃丸

雄黃（二錢） 蒲黃（炒） 當歸 芍藥 熟地
黃（各一兩） 右為末酒糊丸陳皮湯下

二礬丸

白礬（飛過） 生礬（各等分） 右為末糊丸梧桐子大每
服七丸姜湯送下

當歸艾煎丸

當歸 艾葉 防風 桑葉 山藥
牛膝 從蓉（各等分） 右為末蜜丸如彈子大食
後細嚼白湯送下

調氣丸

密蒙花（丙兩） 蟬蛻（一兩） 石决明（水浸） 蒺藜（炒刺一味） 防風
山藥（炒焦[illegible]味） 甘菊花 茯苓皮 青箱子 甘草
（各一兩） 右為末蜜丸桐子大每服五十丸茶清下

補肝丸

羌活 石决明 山藥 五味子 細辛

車前子 人參 茯苓 藁本（各等分） 右為
末煉蜜為丸梧子大每服三十丸熟水下

夜光椒紅丸

川椒（一兩） 生地黃 熟地黃（各二兩） 右為末蜜丸
彈子大每服一丸細嚼溫酒下

真人五補丸

枸杞子 山梔 芍藥 薄荷（各五錢） 蒼朮
荊芥（各四兩） 右為末砂糖丸彈子大每服一丸細
嚼麥門冬湯送下

順肝丸

生地黃（四兩）大黃　當歸（各二兩）皂角（半斤）瓜蔞實（三十箇）右為末水煎皂角膏為丸梧桐子大每服十丸新汲水送下

熊膽丸

黃連（二錢）　硼砂（皂角子大）　冰片（一字）　蕤仁（一粒去油）　蜜（半兩）

右五味為末將竹筒一箇入藥在內油紙縛定用水二升新綿濾汁點

蝙蝠丸

飛蝙蝠（一箇燒）　玄參（一兩）　蚌粉（一兩）　桑螵蛸（三十箇酒浸）

右為末羊膽汁為丸如粟米大每服二十丸猪膽湯送下

決明丸

石決明　草決明　玄參　蟬退　蛇退

防風　甘草　羌活（各等分）為細末煉蜜丸如雞頭大食後茶清嚼下

百步通神丸

黃芪（半兩）　知母（三錢）　地骨皮　防風　遠志

人參　茯苓　大黃（各二兩）右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸麥門冬湯送下

五參丸

人參　玄參　丹參　苦參　沙參（各等分）右為末糊丸麥門冬湯送下

麻黃生犀丸

麻黃　犀角　防風　枸杞子　當歸

石決明　楮實子（各等分）右為末糊丸茶清下

加味三黃丸（二十二問內用）

黃連　黃柏　黃芩　大黃　門冬

生地黃（各等分）右為末糊丸白湯下

烏頭煎丸

枸杞子　牛膝（各五錢）　甘菊花（一兩）　川烏頭（一兩去皮生用）

川芎　荊芥　羌活　地龍（去土）　當歸

薄荷　白蒺藜（各五錢）右將牛膝以下十味為細末用烏頭膏子和丸如桐子大每服二十丸空心茶酒送下

煎烏頭法

用青橘皮五錢去穰同烏頭黑為末以水一升三合浸一宿微火煎成膏

蕤仁膏

蕤仁（半兩去皮）　蕪荑（一兩去皮）　杏仁（去皮尖油）右三味各製入乳鉢內研細入腦子少許研極細濾去粗柤成

膏子點之

硃砂膏

硃砂（另研）　膩粉（另研）　蕤仁（去殼油）　杏仁（去皮尖油）　黃連　青鹽（另研）　連翹　川椒（去合口者炒各等分）右為細末蜜調成膏點之

二霜膏

生姜（研汁四兩）　糖霜（）右和勻點

青鹽膏

青鹽　滑石　黃連　乳香（各一錢）　硇砂（一字或加硇射香須）右為細末和勻煉蜜成膏點之

琥珀珊瑚膏

蘆甘石　海螵蛸　丹參　硇砂　當歸　白丁香　黃連　沒藥　乳香　青鹽　青礬　輕粉（各等分加射腦一字）右為末蜜熬成膏點

退翳復明膏

明泮砂（五錢）　蕤仁（三十箇）　海螵蛸　玄胡索　射（各少許）右為末蜜調成膏以文烟薰以竹箆挑入砂銚內水一盞煎三錢綿濾粗點

當歸活血煎

當歸　黃芪（炙）　沒藥　白茯苓　川芎　羌活　蒼朮　菊花　熟地黃　麻黃（各等分）右為末蜜丸如彈子大每服一丸細嚼食後茶清送下

人參茯苓煎

白茯苓（二兩）　續斷（一兩）　人參（一兩）　白附子（五錢炒）右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼陳皮湯送下

菊花餅子

菊花　栢枝（各二兩）　黑豆（去皮）　蒼朮（各四兩炒）　枸杞子（一兩炒）右五味用水一碗煮乾為末糯米飯為餅子如棋子大每服五餅細嚼茶清送下

燥門（有十二名）

肺經主燥肺屬秋之陰金金體本燥能令燥者火也肺金乃陰之主為腎水之源而受火熱之邪寒水生化之源竭絕於上不能灌溉周身營養百骸熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝於水濕而為燥也夫燥之為病血液衰少氣血不能暢而有枯涸乾勁皺揭諸症枯形容枯槁也涸者無水液也乾者不滋潤也勁者不柔和也皺揭者皮膚啟烈也此皆陰血為火熱所傷燥金主於收斂故為筋脉勁強緊急口禁風癇發作者由熱甚風燥其風熱燥各有微甚不等所謂中風或筋緩者因其風熱勝濕而為燥乃燥之甚也或筋緩不收而痿痺故諸膹鬱病痿皆屬肺金乃燥之化也譬如秋甚則燥燥甚則草木痿落而不收也

○總脉　沉　澁　微

○辯驗燥法

燥由水液衰少氣行壅滯不得通利滑澤遍身中外皆乾澁如唇燥大便乾秘毛髮落指甲折身不柔和麻木皮膚起烈筋緊縮○燥加風熱其證筋脉勁強緊急口噤脾胃乾枯成消渴筋脉拘急惕搐煩滿閉結風癇昏冒強仆或中風筋緩燥之甚也

○治法

凡治燥降心火潤肺金清邪熱兼疎風藥少許

凡治燥用當歸天門冬麥門冬黃芩黃連薄荷枳殼酥蜜麻仁生熟地之類

凡治燥要問曾經大病或吐或利用加減地黃丸如黑瘦人減去人參加白术代之

凡治燥要問曾經房勞服補澁藥用黃栢知母少加木香為主藥

凡治燥要問平日喜食辛辣厚味炙煿用解散熱毒藥隨即淡薄滋味

凡治燥世或有言風熱為燥誤用辛涼驅風苦泄之藥倍加燥其血液損之又損風燥之疾固有當求其本而治之

凡遇辯驗法內病症便用當歸潤燥湯為主隨症加減服之

當歸潤燥湯（通治諸燥）

大黃　桃仁　麻仁　熟地黃　當歸

生地黃　甘草（各一錢）升麻（三分）紅花（五分）右水二鍾煎至一鍾空心熱服

導滯通幽湯（治便閉）

當歸　桃仁（各錢五分）生地黃　熟地（各二錢）升麻　紅花（各錢）右用水二鍾煎至一鍾調檳榔末二錢溫服

升麻潤燥湯（治噎膈不利急氣裏急大便不行）

升麻　生地黃　熟地黃　蒼朮　青皮

黃柏　當歸（各一錢）黃芪（一錢五分）槐子　桃仁

甘草（各五分）右用水二鍾煎至一鍾食前熱服

麻黃白朮湯（治大便閉小便赤身腫色黃麻木体重沉困四肢痿喘唾清水吐痰時躁熱發去衣須臾振寒有時氷冷頭旋眼黑目中流火冷淚鼻塞小腹手疾頸痛）

麻黃（連節三錢）吳茱萸　草豆蔻　厚朴　生甘草（各一錢）神麴（炒）升麻　柴胡　白朮

蒼朮　茯苓　澤瀉　人參　黃芪

桂枝　猪苓　杏仁　橘紅　黃柏（酒洗各五分）黃連　炙甘草　青皮（各三分）右用水二鍾先入麻黃煎沸去沫下諸藥煎至一鍾去柤食遠稍熱服

導氣除燥湯（治小便澁或不通乃血澁致氣不通而竅澁也）

知母（酒製）澤瀉（各三錢）滑石（末炒黃色）茯苓（各二錢）黃柏（酒製錢半）右用水二鍾煎至一鍾空心稍熱服

活血潤燥丸（治大便風閉不通常燥結）

當歸　防風（各三錢）大黃（濕紙裹煨）羗活（各一兩）桃仁（三兩湯泡去皮尖研）麻子（二兩半研）皂角（用子燒存性一兩半其性濕滑能除燥症）右除桃仁麻仁另研餘藥為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸白滾湯送下三兩服後大便日久不能結燥以磁器盛勿見風

潤腸丸（治脾胃伏火大便或乾或澁或不通不思食）

麻子仁　桃仁（湯泡去皮尖各一兩）當歸尾　羗活

大黃（濕紙裹煨各五錢）右除桃仁麻仁另研如泥餘藥為細末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心白滾湯送下

清涼飲子（治熱）

大黃　當歸　芍藥　甘草（各等分）用水二鍾煎七分溫服

當歸龍胆丸（治熱）

當歸　龍胆草　梔子　黃連　黃柏

黃芩（各一兩）大黃　蘆薈（各五錢已上諸藥俱要蒸熟）射（五分）

青黛（五錢）　木香（一錢）右為末煉蜜為丸如小豆大每服三十丸淡姜湯送下

大秦艽湯（治血虚不能養筋筋燥手足不能運動指甲燥）

方見暑門

加減地黃丸（滋陰降火）

方見注夏門（治陰虚火動黑瘦人本方中減去人參）

大補丸（滋陰降火）

方見虚損門

火熱門

有九十名

六氣所入風寒在下燥熱在上湿氣在中惟火遊行能發上下五行之中惟火有二心經為君火也右腎配三焦為相火也以名而言形質相生配於五行謂之君相書曰心君泰然百體從令君火一動相火熖然而從之天非此火不能生物人非此火不能有生君火之氣經以暑熱言之相火之氣經以暴悍酷烈言之相火易起易動無時不有變化莫測煎熬真陰陰虚則病陰絶則死經所謂一水不勝五火者乃五臟之火五志激之其火隨起臟腑之火有虚有實故言治火為難且前人備述其詳全在臨病處方庶免實實虚虚之禍也

○生脉（道二）

浮　大

○死脉（道二）

沉　遲

○不治症（名二）

火起湧泉穴　陰虚火動人

○死症（名三）

心火自焚死　煎熬真陰陰絕死

虛火旺盛若正治立死

○傷風傷寒發寒發熱

見傷寒門

○辨發熱在內中外

○輕手捫之熱甚重手捫之反不覺甚熱其熱在皮毛血脉

○輕手捫之微熱重手捫之熱甚其熱在筋骨

○用手不輕不重捫之熱者其熱在肌肉

○辨分晝夜熱

晝發熱夜安靜是氣盛

夜發熱晝安靜是氣陷血分

晝夜發熱是氣存血亡急瀉其氣峻補其血

○辨分潮熱

平旦潮熱肺氣主之用白虎湯加黃芩（寅卯時）

日晡潮熱腎氣主之地骨丹皮知母黃栢（酉時）

辰戌時潮熱黃芩黃連生甘草羌活

巳午時潮熱黃芩黃連生甘草

未時潮熱用黃芩黃連生甘草石膏

申時潮熱黃芩黃連生甘草柴胡升麻

亥時潮熱黃芩黃連生甘草當歸

○治火法（後開）

○治熱法（後開）

心火為病二十名

身熱　惡寒　戰慄　驚惑　譫語　安言

驚悸　怔忡　結核　癨亂　瞀悶　鼻塞

衄血　溢血　吐酸　暴注　下迫　轉筋

喘　嘔　癰　疽　瘡　小便濁

瘤　淋　閟　悲　笑　腹如鼓

相火為病二十六名

暴死　暴病　暴瘖　躁擾　狂越　罵詈

驚駭　喉痺　僵仆　目昧　耳鳴　瞤瘛

暴注　氣逆　禁慄　跗腫　瘡瘍　嘔逆

昏不知人　如畏神守　時眩仆

洒淅惡寒　洒淅振寒　食不下

不避親踈神明

心火

喜則火起於心　諸痛痒瘡（本經正病）

有餘火用黃連　不足火用人參　黑瘦人去人參白朮代茯神菖蒲

小腸火（其症癃閉淋瀝赤白帶濁）

有餘火木通　不足火生地

肺火

悲則火起於肺　諸氣膹鬱痿（本經正病）

有餘火用枯芩　不足火用人參天門冬麥門冬五味子

大腸火（其症舌胎實痛便閉不通）

有餘火條芩　不足火天門冬

脾火

醉飽火起於脾　諸濕腫滿（本經正病）

有餘火芍藥　不足火白朮白芍藥

胃火（其症牙疼腮頰腫脹）

有餘火石膏　不足火陳皮甘草人參黑瘦

人去人參白朮代之

肝火

怒則火起於肝　諸風掉眩（本經正病）

有餘火用柴胡、不足火天麻川芎

膽火（其症目黃口苦坐卧不安）

有餘火龍膽草　不足火酸棗仁

腎火（左腎）

房勞火起於腎

有餘火知母　不足火熟地遠志丹皮

膀胱火（其症小腹作痛小便下利）

有餘火黃柏　不足火玄參

命門火（右腎）

有餘火山梔（炒黑）　不足火玄參

三焦火（其症頭眼体倦手足心熱）

上焦有餘火熱山梔　不足火知母炙甘草

中焦有餘火熱大黃　不足火黃芩炙甘草

下焦有餘火熱黃柏　不足火黃柏炙甘草

火起湧泉穴

此病十不救一熱腳下起入腹者虛之極也用四物湯加玄參黃柏山茱萸煎服又以附子為末津調塗腳底心用布裹之

肌熱煩熱

肌膚間熱心煩面赤食少喘咳有痰右關脈緩弱或浮數○服瀉陰升陽湯

四肢熱及心煩熱

熱伏脾胃或血虛得之或胃虛多食冷物得之

○服火鬱湯

手背發熱

見傷寒門

手心發熱

用山梔香附蒼朮白芷半夏川芎神麯糊姜汁為丸如菉豆大每服一錢五分白滚湯送下

骨蒸癆熱

五臟齊損自汗發熱盜汗下血〇見癆瘵門

骨蒸寒熱

大便如常脉細數食少〇用八珎湯加知母黄栢

虛熱

不能食自汗氣短屬脾虛〇用甘寒温劑

實熱

能食口乾口燥大便難〇用調胃承氣湯

〇治火法

凡心火正治　凡相火可治

凡火輕可降　凡火重可發（即是發汗自任何經）

凡氣有餘便是火　凡青皮收五臟之火

凡氣從左起肝火　凡用玄參去無根火

凡氣從臍下起陰火　凡用山梔去心腎火

凡臟腑火須論虛實　凡鬱火可發當看何經

凡虛火旺盛者以生姜汁與服若正治立死

凡不足之火用滋其陰火自降炒黄栢生地

凡人壯實火盛顛狂者可用正治

凡火急甚者必用緩之甘草為主

凡火盛不可驟用寒凉必須温散

〇治熱法

凡痰熱能生異症　凡用凉膈散退六經熱

凡暴熱病在心肺　凡鬱熱病貝母滑石炒

凡積熱病在腎肝

凡用軟石膏煆研末醋丸菉豆大大瀉胃熱食積痰火

凡濕熱相火為病多諸病要尋看有無痰飲并火熱挾

凡陰火發熱用四物湯加黄栢知母降火補陰之妙劑

凡陰火甚者用龜板酥炙為主藥如氣虛加白朮黄芪

噙化三黄丸

大黄　黄芩　黄連（各二兩半）山豆根　黄栢

苦參　硼砂（各一兩）京墨（三錢）片腦（錢半）麝香

黃藥子　白藥子（各一兩半）右為末用猪胆汁調匀攤在瓦盆內蒸三次露一宿入腦射硼砂為丸如豆大每服一丸食後噙化冬月加知母

神芎丸

大黃　黃芩（炒各一兩）牽牛（取頭末）滑石（各二兩）黃連　薄荷　川芎（各二兩半）右為末滴水丸如梧桐子大每服五十丸食後白滾湯送下

三黃丸

黃連　黃芩　大黃（俱炒各十兩）右為末蜜丸

如梧桐子大每服四十丸白滾湯送下

酒煮黃連丸

黃連（半斤洗淨）用酒二升浸用瓦器貯藥甑上蒸晏蒸晏晒酒乾為度晒乾為末滴水為丸如梧桐子大每服五十丸食前白滾湯送下

人參瀉肺湯

人參　黃芪　梔子　枳殼　薄荷

連翹　杏仁（炒去皮尖）桑白皮（炒）大黃　桔梗

甘草（各一錢）右作一服水二鍾半煎至一鍾食後服

凉膈散

大黃（二錢）連翹（四錢）黃芩（炒）山梔　薄荷

朴硝　甘草（各一錢）右用水二鍾蜜一匙竹葉十片煎至一鍾溫服

洗心散

白朮（一錢）麻黃　當歸　荊芥　大黃

芍藥　甘草（各二錢）右作二服每服水二鍾生姜三片薄荷少許同煎至一鍾不拘時溫服

甘露飲

枳殼（炒）石鑊　枇杷葉　熟地黃　黃芩

麥門冬（去心）山梔　茵陳　天門冬（去皮木）

甘草（炙各二錢）右分作二服每服水二鍾煎至一鍾食後服

消毒犀角飲

防風（一錢）荊芥　甘草（各二錢）鼠粘子（炒三錢）右用水二鍾煎至一鍾溫服

瀉陰火升陽湯（治肌熱煩熱面赤食少喘）

柴胡（兩半）人參　黃芩（各七錢）石膏（煅五錢秋冬不用）

黃連（炒五錢）黃芪　蒼朮（米泔浸炒各一兩）共為粗末每服水二鍾煎至八分綵綿利去粗服

黃連解毒湯

黃連（炒一兩）　黃芩（炒）　黃柏（炒各五錢）　梔子（四枚）　右分作一服每服用水二鍾煎至一鍾服

火鬱湯

羌活　升麻　葛根　芍藥　人參　柴胡　甘草（炙各五錢）　防風（二錢半）　葱白（三寸）　右分作四服每服水二鍾煎至八分服

八珍湯

即四君子湯四物湯合用

調胃承氣湯

見脾胃門

四物湯

見諸血門

積熱門　有八名

積熱者熱毒蘊積於內也因徇情縱慾以致積熱非一朝一夕之過或有體氣素實一時感觸熱毒之氣者或有酒麵煎煉雄附峻補諸熱鬱積臟腑之間或在心肺之內且以積熱治法言之始而涼取次而寒取寒取不愈則因熱從之從之不愈則技窮矣凡熱皆出於心熱甚則能傷血或先服三黃丸洗心散或噙化三黃丸四順清涼飲此皆前人立論處方後人須分陰陽虗熱實熱陰盛格陽之熱如槩以積熱症治之則反誤多矣

○虗實脉

浮大虗三脉為虗　洪細小三脉為實

○難治脉

沉細數三脉難治　病熱有火者可治脉洪是也　無火者難治是脉沉細

○治法

凡小熱之氣涼藥和之

凡大熱之氣寒藥治之

凡甚熱之氣發汗解之

凡甚熱發汗不盡姜治（發表以思治熱名曰後治）

積熱

大小男婦積熱其症以舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘塞小便不利一切風熱○服涼膈散

胃中積熱

牙宣斷腫咽膈乾燥吐血腥臭或受溫伏熱在裡身黃如疸○服甘露飲

積邪熱

大小男婦痰涎壅滯或肥頰結核遍身生瘡癤

已潰未潰○服消毒犀角飲

心經積熱

大小男婦咽乾口燥目赤睛痛大小便赤色或閉或澁○服神芎丸

肺經積熱

喘咳欬脇膈脹滿痰多大便澁○服人參瀉肺湯

脾肺二經積熱

虗煩上塞咽喉生瘡○服利膈湯

三焦積熱

咽喉腫閉心膈煩躁小便赤　大便閉○服三黃丸

積酒熱

因酒太過○服酒煮黃連丸

涼膈散

見火熱門

甘露飲

見火熱門

神芎丸

見火熱門

消毒犀角飲

見火熱門

人參瀉肺湯

見火熱門

酒煮黃連丸

見火熱門

三黃丸

見火熱門

利膈散

開末卷

中寒門

有六名

寒者天地殺厲之氣在天為寒在地為水在人為腎故腎司寒倉卒受邪且速且危蓋由胃虛觸冒大寒其症初發便拘急攣痛昏不知人四肢厥冷禁閉僵直無所知覺牙緊口噤與中風相似其脈緊弦或沉細名曰中寒非比傷寒為病循經入表傳裡若內外俱虛寒邪獨盛目瞪色青白自汗或下利名曰內脫治之稍緩脉散而死人能知命而保身者冬月早卧晏起必待日出乃去寒就溫安

有中寒之患且如辛苦之人饑寒勞役不避風雪觸冒嚴寒本然病者五臟皆有所中中不自知但[illegible]寒自覺何時日所傷必先頭痛身熱惡寒無汗骨節疼此是傷寒也當以傷寒法內治之惟中寒時刻之間便有挾風兼濕為躰虛甚又逢天道之虛兩虛相應則傷五臟不可妄行汗吐下三法治以附子理中湯藥始可救也

○中寒脉

絃緊沉細遲　兼風脉浮　兼濕脉澁

○死症名一

內脫

中寒

初病便拘急攣痛昏不知人四肢冷僵直牙緊口噤服附子理中湯又用熨法

中寒嘔吐

服姜桂湯

外感風寒內傷生冷

服人參養胃湯

中寒腹痛

服理中湯

中寒乾嘔

服沉附湯

內脫

目瞪色青白自汗或下利為內外俱虛寒邪獨盛名曰內脫多致不治服服附子理中湯

姜桂湯

乾姜（煨）　良姜（各錢五分）　辣桂　木香　甘草

半夏麴（以各二錢）右用水二鍾姜三片煎至一鍾服

附子理中湯

附子（炮去皮臍）　乾姜（煨）　人參　白朮（各二錢）　甘草

（炙一錢）右（二）用水二鍾煎至一鍾食前服如血少加
當歸一錢
理中湯
人參　乾姜（炮）　甘草（炙）　白术（炒各二錢）右用
水二鍾煎至一鍾不拘時服
沉附湯
附子（炮去皮臍）乾姜（各二錢半）白术（炒）　沉香（各錢二分）右用
水二鍾煎一鍾食前服
熨法
肥葱（細切）　麸皮（各二升）　食鹽（二兩）右三味入水一大
盞和勻分作二次炒極熱用絹作二包將一包
熨臍上一包冷易如乾添水拌
參蒼胃湯
甘草（炙五分）人參　茯苓　草菓　藿香
橘皮（各錢二分）蒼术（米泔拌炒）厚朴（姜汁拌炒）半夏（姜汁製各二錢）右
用水二鍾烏梅一箇煎至一鍾不拘時服

痼冷門　有四名

痼冷者年久謂之痼寒極謂之冷人之臓腑禀賦厚薄不同亦有調理失宜者如真氣衰微脾胃之氣不足必致胃寒或食冷物粘膩難化生硬之類累月積久以成痼冷之疾前人立論致詳後之用藥隨證依經則無夭閼之禍矣

○總脉

遲　沉

○治法

先用熨法可治

陽虛陰盛

其症大便洞泄小便頻數鼻多清涕吐涎沫水穀不化腸胃絞痛肚腹如氷洒洒淅淅○服沉香蓽茄散

陰毒

又傷寒冷手足冷腰背強臍腹築痛咽喉不利嘔吐下利身如被杖脉細欲絶此由腎虛寒外傷風冷○服洞陽丹

陰勝

四肢逆冷額上手背冷汗出不止或眠不思唇口手足爪甲俱青脉沉細伏匿○服附子理中湯

脾胃積冷

手足厥冷畏冷憎寒飲食不化或嘔吐咳嗽或癥瘕大作○服金鎖正元丹

沉香蓽茄散

沉香　蓽澄茄　附子（炮去皮臍）　葫蘆巴（炒）　肉桂　補骨脂（炒）　川楝子（去核）　茴香（炒）　巴戟（去心）　木香（各一錢）　桃仁（炒去皮尖）　川烏（炮去皮臍各五分）　右用水二鍾食塩少許煎至一鍾不拘時服

洞陽丹

陽起石（火煅）　硃砂（另各五錢）　鍾乳粉　附子（炮去皮臍各一兩）　川烏（炮去皮臍）　天雄（炮去皮臍各三兩）　右為末神麴糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心淡塩湯送下

附子理中湯

見中寒門

熨法

見中寒門

金鎖正元丹（[illegible]開末）

識病捷法卷之六

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

中風門

有三十六名

夫風為百病之長也風之為病善行而数變者也天有八風人之臟亦有五風八風之邪有中臟中腑中血脉之分西北二方風氣剛勁民病於中風者誠有之矣東南二方地卑多濕人病於中風者非外中風也皆是濕生痰痰生熱熱生風耳但病之形狀與中風相似更有中氣之病亦與中風相類若便與中風藥治多致殺人凡人年衰氣弱之際或因憂喜忿怒房勞傷其臟氣邪氣乘虛而入多成此疾壯歲之時無是病也若肥胖之人間而有之雖肥而由氣衰所致治斯疾者不辯中風中氣不論地方南北不審從外入八風從内熱生五風不察元氣虛實不分中血脉中腑中臟混以風藥療之名雖活人而反傷人可不慎哉

○中風脉

脉浮盛　脉浮洪　脉絃緊

○中氣脉

脉沉　脉伏

○生脉

脉来虗

○死脉

脉来緊急疾

○不治脉

脣病脉不至

○不治症（有十四名）

髮直　直視　吐沫　遺尿　汗綴如珠

口開　眼合　手撒　揺頭　面赤如粧

上竄　鼻鼾　頭面青黑者　昏不知人

○死症（有四名十日左右死）

尋衣　摸床　撮空　指地

○辯驗中風法

中風之病當半身不遂經絡空虛賊邪不散或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪為口眼歪斜入絡脉皮膚不仁邪入經脉重着不勝邪入六腑不識人邪入五臓難言吐沫

○辯分中風中氣法

風中六腑多着四肢有外證惡風寒拘急不仁

風中五臓多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞目瞀大便閉

風中血脉口眼喎斜

氣中與中風相似但手足不甚偏廢為異耳

氣中六腑不識人

氣中五臓語蹇塞或不言

氣中血脉肌膚不仁重着

治法

凡中風大率主血虗有痰或挾火與濕

凡中風以痰為先補養次之或挾火與濕亦有死血流滯有外中於風

凡中風初中時急掐人中能醒然後用去痰藥二陳湯四物湯四君子湯加減用

凡中風痰擁盛者口眼歪斜不能語言皆用吐法

凡中風輕者醒者用瓜蒂散或蝦汁或稀涎散吐之

凡中風重者口噤者用藜蘆五分或三分麝香

少許灌入鼻内吐之一吐不已再吐之子和用三聖散

凡中風虛弱人年老産後久病者俱不可吐

凡中風氣虛卒倒参芪補之挾痰則濃煎獨参湯加竹瀝姜汁

凡中風血虛用四物湯補之挾痰俱用姜汁炒過更加姜汁竹瀝能食者去竹瀝加荆瀝

凡中風半身不遂大率多痰在左屬死血血少宜用四物湯加桃仁紅花姜汁竹瀝

凡中風半身不遂大率多痰在右屬痰與氣虛

宜用二陳湯四君子湯加姜汁竹瀝

凡中風肥白人多濕氣虛宜四君子湯合五苓散加附子烏頭行經

凡中風因憂思氣鬱右手癱口渇宜補中益氣湯加姜汁竹瀝有痰加半夏貝母

凡中風黑瘦人陰虛火動人宜四物湯加牛膝黄芩黄栢姜汁竹瀝有痰加天花粉

凡中風遺尿屬氣虛参芪補之

凡中風小便不利者不可用利藥宜清其熱熱退自利

偏枯風

半身不遂口眼喎斜肌肉偏而不用且痛言不變智不亂○服神照散加麻黄

風痱

身無疼痛四肢不收智亂不甚言微有知可治甚則不能言不治○服伏龍肝湯

内奪風

厥則為瘖痱腎虛所致瘖痱之狀舌瘖不能語足廢不能用○服伏龍肝湯

風懿

奄忽不知人事痰涎上迷心竅咽中窒塞舌強不語牙關不開手足拘攣氣不升降風中臟則危中腑肢躰廢其脉短滑或洪數内熱外汗當清解消痰祛風

風痺

諸痺類風状脉緩筋骨痿弱肢體麻痺不仁○見痺門

風痓

身如板直遍身鞕強牙關緊急心神昏昧○服天麻湯

卒中風
目瞑牙噤無門下藥○用南星擂為末白龍腦
二件各等分其藥端午合以中指點藥揩齒三
二十次指牙左右其口自開始得下藥

暗風
倒地牙關緊急人事昏沉○用搐鼻三聖散

走注風
其症兩足疼腫起或偏一足痛行履不得其痛
遊走不定或上項頭目昏亂或走左手或走右
手或一手指上或一脚指上○服獨活散加黑

羌活生姜

賊風
身體拘急古強言澁十足不遂○服溪防已散
或一字散取出涕涎
如口噤角弓反張○服舍公酒

緩風
左癱右瘓拳攣半身不遂脚軟不能行履屈伸
艱難○服至聖一醉膏

風濕
口眼喎斜大便結澁體重或麻皮膚瘙癢筋脉

拘急言澁手足不遂時覺不仁○

風癔
奄忽不知人喉中噫噫有聲舌強不能言身輭
自汗口吐涎沫項背強直神志昏憒○服金泊
丸

卒中惡風
倒悶在地口噤不言肝厥尸厥死不識人閉目
針灸不知痛○服甘竹瀝湯不愈再服還魂湯

風毒
風毒上攻頭面發熱頰赤唇焦眼澁鼻出熱氣

項背拘急○服羗活飲　又風毒入四肢筋脉
拘攣疼痛服羗活散

熱毒風
頭面壅熱口乾心煩不欲吃○服前胡散
如心神煩躁頭目昏痛○服天竺黃丸一切風
熱毒方

肺風
胸滿短氣胃悶汗出噓吸顫悼聲嘶塞身重四
肢痿多汗惡風時欬晝瘥夜甚其狀偃卧鼻過
眉○服五味子湯

肝風
筋脉拘攣手足不收屬風入肝坐踞不得胸背
強直脇肋脹痛目眩心煩語澁頭面疼痛口眼
喎斜脚膝無力○服犀角散
心風
多汗惡風善怒心神顛倒語澁舌強口乾面赤
頭疼翕翕發熱胸背拘急手心熱盛多偃卧不
得傾倒驚悸汗出恍惚口喎冒昧好笑○服麻
黄散

脾風
多汗惡風體急四肢不欲動微黄不嗜食言澁
口喎肌膚不仁腹膨心煩翕翕發熱神思如醉
手足不能舉脉浮緩○服獨活湯
腎風
腰疼不得俯仰或偏枯兩耳虛鳴語聲不清面
色浮腫骨酸疼精神昏憒喜恐好忘體黧黑沉
重多汗惡風隱曲不利脚冷弱○服獨活散
肉苛風
血虛氣實肌肉不仁名曰肉苛○服苦參丸
血風
婦人頭皮腫痒名曰血風○服消風散
風眩
眩倒屋傳吐逆惡聞人聲○服茯神湯
[illegible]風眩加目痛耳聾者○服附子散
風眩加項悶頭運不止○服六神散
風厥
志意不樂身背疼頭多驚呵欠噫氣○服人參
湯
瘌風
刺後脚痛緩弱不能行履名曰瘌風○服大防

風湯
亿
涎潮牙關緊閉不開○用興膏鼻中取涎
風痰
頭疼目眩運倒嘔喘恍惚不寧神思昏憒肢體
倦痛頭項強硬手足頑麻○服上清白附子丸
偏風
手足一邊不遂筋骨煩疼○服枳殼人參湯
腦風
見腦漏門

目風

見眼科門

漏風

身熱懈惰汗出少氣因飲酒腠理踈風邪入名曰漏風○服牡蠣白术散

內風（又名勞風）

因房劳中風多汗出粘衣不能劳事躰盡痛○服附子湯加人参當歸

首風

新浴感風旋暈昏眩名曰首風○服大川芎湯

腸風

見諸血門

泄風

見泄瀉門

獨活散

獨活　附子　當歸　防風　天麻

桂心（各一錢）川芎　甘菊花　枳殼　黄芪

山茱萸　丹参　牛膝　萆薢　甘草

細辛　菖蒲　白术（各半錢）右用水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

犀角散

犀角屑（二錢）石膏（二錢）羌活（錢半）羚羊角（錢半）人参

甘菊花　獨活　黄芩　天麻　枳殼

當歸（去芦）黄芪　芎藭　酸棗仁　白术

防風　白芷（各五分）甘草（三分）右作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

渫洗藥

乾荷葉　藿香葉　威靈仙　藁本（各三兩）茅香

陵零香（四兩）香白芷　甘松（各二兩）煎湯在無處帶熱洗渫

獨活湯

獨活（錢半）防風　茯神　人参　附子

前胡　沙参　半夏　旋覆花　黄芪

羚羊角　甘草（各一錢）右用水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

治中風牙關緊急方

用甘草比中指節截作五截生油內浸過炭火上炙候油入甘草以物斡開牙關令咬定甘草可人行一里時候又換甘草一截後灌藥極効

白神散

用白梅末不拘多少將指牙立開蓋酸能收斂自然齒骨易開也

五味子湯

五味子　杏仁　桂心（各一錢）　防風　甘草　赤芍藥　川芎（各二錢）　川椒（三分）右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時服

搜風順氣丸

人參（兩半）　麻子仁　栢子仁　大黃（各一兩）　皂角　威靈仙（二兩）　朴硝（五錢）　黑牽牛末（一兩）右為末麵糊和丸如梧桐子大每服五六十丸温酒送下

還魂湯（千金方內有桂）

麻黃（去節六錢）杏仁（五十粒）甘草（炙二錢）右分作二服用水二鍾煎七分去滓灌之去口噤斡開若更不下分病人髮左右提搦肩引之藥下漸甦若唇青身冷為人臟即死身和汗出即愈

金箔丸

金箔（研一百片）　銀箔（研一百片）　犀角屑（另研）　牛黃　丁香　龍腦　沉香　珍珠末　木香　麝香　琥珀　蓬砂（已上另研）　烏蛇（去皮骨酒浸炙）　雄黃（另研）　鍋硝　白殭蠶（炒）　附子（炮裂去皮）　天麻（酒浸切焙）　南星（炮各一分）　墨（燒研）　丹砂（各一兩另）　防風（去叉）　白附子（炮）　甘草（炙各一分）右將九味各依製度研為末却入另研藥一處和內金銀箔入水銀三分同研如泥與諸藥再研和勻煉蜜為丸如菉豆大每服大人五丸薄荷酒下水兒二丸薄荷湯化下

麻黃散

麻黃（去節一錢）　白朮（一錢）　防風（去芦一錢）　川芎（一錢）　甘草　漢防已　當歸（各一錢）　人參（去芦一錢）　羌活（錢半）　遠志　茯神（各半錢）　川升麻（八分）　桂心（五分）右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾入竹瀝半盞再煎一二沸不拘時服

十二味正氣散

人參（二錢半）　厚朴　半夏　藿香　甘草　茯苓　白朮　石菖蒲　遠志（去心）　陳皮　薏苡仁　木香（各五錢）右每服三錢水一盞生姜三片棗一枚煎至七分不拘時服

搐鼻通天散

川芎　細辛　藜蘆　白芷　防風　薄荷（各一錢）　猪牙皂角（刮去皮二錢）右研為極細末每用少許入蘆筒內吹入鼻中

大防風湯

防風　熟地黃　白朮　羗活　人参

川芎　黃芪　牛膝（各二錢）　附子（炮去皮臍）　當歸

杜仲（薑炒去絲）　芍藥（各錢半）　甘草（炙五分）　右作一服水二

鍾生姜五片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

漢防己散

漢防己　黃芩（各一兩）　麻黃（去根節）　石膏（各一兩半）　川芎

赤芍藥　附子（炮去皮臍）　防風　羗活（各三錢）　白朮

杏仁（湯浸去皮尖炒各五錢）　當歸（三錢）　右為末每服三錢

以水一鍾姜半片煎至六分去滓不拘時温服

稀涎散

晉礬（一兩）　猪牙皂角（四箇肥實不蛀者去黑皮）　右為末碾匀

每服二錢温熱水調下以吐為度

獨活散

獨活（去芦）　阿魏（[illegible]少許和薄餅子火上煿[illegible]末已上各一錢）　桂心

大黃（炒）　赤茯苓　牛膝　鱉甲（醋炙）　羗活

當歸（焙）　乾蝎（炒）　黃芪　蔓荊子　川芎

麻黃（去根節）　木香（各一分）　吳茱萸（一錢半）　荊芥穗（二錢）　麝（少許）

虎骨（酥炙四錢）　白花蛇　芫花（各一兩）　狼毒（搥碎以醋三升同芫

花於石器內煑乾五錢）　半夏（一分）　牽牛（取頭末一兩）　右將狼毒芫

花二味別作一處為末牽牛半半夏亦別作一處

為末其餘衆藥共作一處為末每服芫花狼毒

半錢半夏牽牛末一錢衆藥末一錢五分共作

一服臨卧時葱湯調下

上清白附子丸

白附子（炮）　半夏（湯泡）　川芎　菊花　南星

殭蠶（炒）　陳皮（去白）　旋覆花　天麻子（一兩）　全蝎

（炒五錢）　右為末薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每

服三十丸食遠生姜湯送下

瓜蒂散

右用瓜蒂末一錢熟水調下吐痰如吐不止者

以真麝香少許温水服之瓜蒂（一兩）右剉如麻豆

炒令黃色為細末每服量虛實新久或三錢茶

末茶一錢酸虀汁一鍾調下若用此法天氣晴

明陰晦無用如病卒暴者而若用此法吐時辰

午巳時前春宜吐是天氣在上人氣亦在上也

一日之氣寅卯辰候也不宜暴亦宜夜先令病

人隔夜不食服藥有功月熱虀水投凡火要辯

其人虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚

朴不可一槩用之吐罷可服降入利氣安神定

志之劑

天麻湯

天麻（五錢）　羌活　人參　桂心　白术

麻黄　杏仁（各三錢）　附子　右剉如麻豆大每服五錢七分生姜三片水二鍾煎至一盞去滓入酒半盞再煎一沸熱服服後以生姜稀粥投之取汗日三服

治口眼喎斜奇方

桂心用酒煑取汁紙蘸貼患處左喎貼右右喎貼左口一方用大鱔魚一條以針刺頭上血左

喎塗右右喎塗左正即洗去鱔魚血

羌活散（治中風舌本強難轉語不止神効）

蝎稍去毒（十四箇）　茯苓（一兩）　右作二服水二鍾姜五片煎至一鍾溫服

一字散

烏頭（生用）　青礬（各半兩）　右為末每用一字搐入鼻內取出涕涎

蒜塗法

用椽斗盛蒜泥塗合谷穴右喎左貼正則止之

消風散

荊芥穗　甘草（炙各錢半）　陳皮　茯苓（去皮）　人參

白殭蠶（炒）　藿香葉　防風　川芎　蟬腿

厚朴　羌活（各一錢）　右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時服

小續命湯

麻黄（去節）　人參（去蘆）　黄芩　芍藥　甘草

川芎　杏仁（去皮尖炒）　防已（各一錢）　肉桂（七分）　附子（炮去皮臍二錢）　防風（一錢五分）　右作一服用水二鍾生姜三片煎至一鍾食遠服

大秦艽湯

秦艽　石膏（各半錢）　甘草　川芎　當歸

白芍藥　生地黄　熟地黄　白茯苓　羌活

獨活　防風　黄芩　白芷　白术（各一錢）　細辛（五分）　右作一服用水二鍾生姜三片煎一鍾不拘時服如心下有痞加枳實（一錢）

治中風失音

以白姜蚕七枚為末用酒調服方寸匕立効

治感風不能語

以黄芪防風煑湯數斛置床下薰之

聖散（治中風左癱不能語）

沒藥（研）琥珀（各一分）乾蝎（全七枚炒）右為末每服三錢七用鵝梨汁半盞皂角末一錢七濃煎湯盃盃與梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能言

甘竹瀝湯

甘竹瀝（一斗）生姜　防風　甘草（炙各三兩）防已

麻黄（去節）人参　黄芩　白术　細辛

芎藭　秦艽　桂心（各一兩）附子（一枚炮）右湯漬藥令赤合竹瀝煮取四升分為四服

白礬散（治急風口噤不開一切）

白礬（五錢）塩花（一分）右研細末揩齒延下

枳殼人参丸（印瘍）

枳殼（麩炒）人参　羌活（各半兩）甘菊（去梗）防風

葛根　桂心（各一兩）羚羊角（半兩）熟地（半兩）麻黄

黄連（各二兩）薏苡仁（炒）右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十丸漸加至三十丸空心酒送下

羌活散

羌活　酸棗仁（炒）栢子仁　羚羊角　天麻

骨皮（各半兩）鹿角膠（炒）白附子（炮）側子（炮去皮臍）人参

川芎　薏苡仁　海桐皮　桂心（各一兩）犀角

員販肉（酒浸各三分）牛膝（二兩）右為末每服二錢以豆淋酒調下不拘時候服

人参湯

人参　川芎　枳殼（麩炒）芍藥　防風

細辛　附子（炮）甘草（炙）桂心（各五錢）桔梗

茯神　木香（各一分）右每服五錢七分用水一鍾半姜半片煎至八分去滓温服

茯神湯

茯神（去木）獨活（各四兩）生姜（三兩）黄蓍　遠志

防風（各五兩）甘草　人参　當歸　白术

牡蠣（煅）蓯蓉　附子（各二兩）右以澇水一斗

二升煮取三升每服五合一日夜盡

六神散

川芎　防風　甘草　羌活（各一兩）鷄蘇

荊芥穗（各半兩）右末每服一錢不拘時米飲調下

伏龍肝湯

右用伏龍肝末五升水八升和攪取汁飲之以盡為善

羌活飲子

羌活　獨活　白蒺藜（去刺）川芎　柴胡

前胡　細辛　麦門冬（去心）山藥　黄芪

紫蘇葉　升麻（各二錢半）　烏梅（去核）　枳殼（麩炒）　防風
蔓荊子　藁本（去土）　荊芥穗　甘草（炙）　桑白
皮（炙，各半兩）　乾葛（一兩）　右每服三錢水一盞半生姜
三片竹葉五葉同煎至八分去柤食後温服

前胡散

前胡　子芩　山梔仁　防風　沙參
甘菊　甘草（炙，各半兩）　羚羊角　麥門冬　枳殼
（去瓤炒，各一兩）　石膏（二兩）　右每服三錢水一盞煎六分
去滓不拘時温服

天竹黃丸

天竹黃（二）　朱砂（研，水飛過）　子芩（各一兩）　犀角屑（半兩）　甘菊
防風　苦參（各三分）　甘草（炙，半兩）　石膏（二兩）　右為末
入藥和勻煉蜜為丸如桐子大每服二十九不
拘時煎竹葉湯送下

附子散

芍藥　甘草（炙）　麻黃（去根節）　白朮（各一兩）　防風
防已（各半兩）　附子（一枚，炮）　人參　黃芩（去黑心）　桂心
獨活　川芎（各一兩）　天雄（一枚，去皮臍，炮）　右㕮咀如麻豆
大每服五錢七水一盞半入生姜半分煎至八
分去滓空心日午夜卧各温服如人行五里並

生姜粥投之微汗出併外風

神照散

白茯苓　木香　川芎　蒺藜（炒，去角）　人參
獨活（去蘆）　黃芪（各兩一分）　附子　遠志（各三分）　蓽薢
茵芋（各一兩）　梔子仁（二兩）　右為末每服一錢七分温
酒調下加至二錢三錢空心日午夜卧服

至聖一醉膏

滴乳香　沒藥　黃明（各半兩）　附子（一兩）　天麻
安息香（一分）　麻黃（四兩）　片腦（少許）　右件七味一處搗
羅為細末每服四錢用法酒一升於銀石器內

熬成膏後却出分在四盞內別用法酒看病人
喫酒多少漸調膏子服盡為度令枕病處卧以
衣被蓋汗出或似蟲行即効次日再喫一服手
足必已舉得待五十日已上方治若髮直者不
在治限俱以不治

苦參丸

苦參（二兩，取粉）　丹參（去土）　沙參（去土）　五加皮　人參
防風（去叉）　蒺藜（炒，去刺）　烏蛇肉（酒浸）　蔓荊子　玄參
敗龜板（酥炙黃，各一兩）　右為末用不蛀皂角一斤剉碎
以水三升後取汁去滓入無油鐵器內煎熬成

青用煉蜜四兩拌勻為丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食後良久夜卧共三服冬用薄荷荊芥酒送下

附子湯

附子（主去皮臍）人参（各半兩）甘草（炙）乾薑（炮各三分）茴香茯苓　山藥（各一分）右每服四錢水二鍾薑三片鹽少許煎七分去滓食前服

牡蠣白术散

牡蠣（三錢）白术（兩二錢半）防風（二兩半）右每服五錢水二盞煎七分食遠溫服惡風倍加防風白术汗多面腫倍加牡蠣

倉公酒

當歸　防風（各三分）獨活（一兩二分）麻黃（一兩一分）細辛（半兩）附子（一个）右每服四錢水酒各一盞煎七分服口不開者扶開納藥一服甦二服少有汗三服大汗愈

浸酒藥仙方（四肢不舉者服三日舉手十日行步十月除根）

甘菊花　防風（去蘆）瓜蔞根　牡丹皮　羌活
白蒺藜　牡蠣（煅）牛蒡子　枸杞子　杜仲
紫苑　菖蒲　人参（各半兩）白花蛇　桔梗
白术　山茱萸（去核）白茯苓　晚蠶沙（炒）官桂
遠志　牛膝（各一錢半）虎脛骨　牛蒡根　乾姜
萆薢　熟地黃　柏子仁　蛇床子　附子
續斷　肉蓯蓉　兔絲子　狗脊（去毛）芍藥
天雄（炮去皮）石斛（各三錢）右味並要川廣好者依方揀擇為粗末用新絹袋盛藥用新小瓮兒一箇放藥在內以無灰酒二斗將藥浸之密封固春夏浸十四日秋冬浸廿一日開瓮清晨午間臨夜取冷酒三盞服之每服一盞久病者不過一月見効男婦小兒骨節四肢浮腫眼目昏暗半身不遂語言蹇澁口眼歪邪中風失音並治

二陳湯（見痰門）　四君子湯（見氣門）
四物湯（見血門）　大川芎湯（開卷末）
四苓散（見瀉門）　補中益氣湯（見脾胃門）
獨參湯（開卷末）　搐鼻三聖散（開卷末）
熨膏（開卷末）

頭風門（有二名）

頭風有新久留去之分其病日久名曰頭風其痛作止不常愈後遇邪復發但半邊頭痛名曰偏頭風是肝胆二經風邪爲之

頭風

年深日久不常痛者名曰正頭風○服天香散

用急風散塗貼痛處

偏頭風

或在左邊痛或在右半邊痛名曰偏頭風日久一要損一目○用生蘿蔔汁仰卧滴鼻中左痛滴右右痛滴左數十年痛用之皆効服大川芎湯

川芎四两天麻一两共為細末用蜜五两摶成珠為度入藥末石硏内杵千下作九十丸毎服一丸細嚼或湯或酒送下不拘時服

急風散（見頭痛門）

天香散（開卷末）

大頭風（有一名）

大頭風症是四時疫癘之氣初病增寒體重次傳頭面兩耳前後腫大紅赤上喘咽痛口乾舌燥由陽明胃經之不利合少陽相火二經之邪熱傳於太陽膀胱經視其腫勢在於何部分濕熱為腫肝火為痛治之大不宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病自外入内者是血分受邪治主病當緩治客病當速先以（黄朮黄芩）黄連甘草通炒半熟水煎少少不住服服畢不愈用新瓦上炒鼠粘子有香氣同大黄煎去滓入芒硝少許俱各等分亦時時呷之無令飲食腫勢甚者宜砭刺之

服普濟消毒飲（開卷末）

腦漏門 有一名

夫人身肖天地所以天有四時人有四肢地有四海人亦有之在首謂之腦海在胃謂水穀之海在臍下謂之氣海血海腦海之後名曰風府且諸陽之氣皆會於首設若氣之不足風邪易入歌云腦後入風人不壽風寒入於腦海不得發散停積日久腐壞腦水從鼻流出臭不可近其危有期其門無載關係匪輕於今立之

用辛夷藁本各一兩水五鍾煎至一鍾乘熱入兩箇瓦酒壺內壺口用紙塞緊壺嘴入兩鼻孔薰藥氣到腦海中壺內藥冷以滾湯盪熱每日薰三次以瘥為度

頭痛門 有二十名

頭痛為病少陰心經是真頭痛旦發夕死夕發旦死其痛甚入連於腦手足寒至節則亡六經令人頭痛雜症頭痛各各不同治之亦異惟傷風傷寒頭痛悉開傷寒撮要一書耳

○生脉

浮 滑

○死脉

短 濇

○死症名

真頭痛

○治法

凡頭痛用一捻金吹鼻中

凡頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

凡頭痛多主於痰痛甚者是火

凡頭痛有血虛者血不上營

凡頭痛有諸經氣滞者氣聚而不行

凡頭痛有吐者有下者

真頭痛（又名[illegible]歌）

[illegible]入腦手足寒至節○服黑錫丹（死症也 用斗斗）

太陽膀胱頭痛

惡風寒脉浮緊○服川芎麻黃獨活用羌活主之

少陽胆頭痛

寒熱往来脉絃緩○用柴胡主之

陽明胃頭痛

自汗發熱惡寒脉浮緩長實○服升麻葛根石膏用白芷主之

太陰脾頭痛

體重腹疼吐痰脉沉緩○用蒼术半夏主之

少陰腎頭痛

手足寒厥脉沉細○服麻黃附子用細辛主之

厥陰肝頭痛

項痛或痰厥冷脉浮緩○用川芎吴茱萸主之

血虚頭痛

或吐下失血或産後瀉痢亡血○用當歸川芎

氣虚頭痛

耳鳴九竅不利久病或肥白人○用順氣和中湯即補中益氣湯加芍藥川芎細辛蔓荊子

風熱頭痛

風熱上攻頭痛不止○服菊花散

風寒頭痛

在腦中痛眩暈嘔吐不止○服小芎辛湯

久病頭痛

久病之人畧感風寒便發寒月須綿裹頭屬熱欝熱乃標病世人不識悉用辛温解表藥治宜瀉火凉血為主辛温劑加少許

壯熱頭痛

大便結燥者○用大承氣湯

肥人頭痛

多是濕痰○用半夏蒼术為主藥

瘦人蒼黑人頭痛

屬熱血虚○用酒炒黃芩川芎當歸

食積頭痛

胃中有食積不化上攻作痛右寸脉緊盛○服備急丸

劳役頭痛

下元虚之人因劳碌非傷寒似傷寒一般樣發熱兩太陽作痛此相火自下冲上○服補中益

氣湯加川芎當歸甚者加知母蔓荊子

痰厥頭痛

用川芎茶調散或用瓜蔕散吐之

頭項痛

用藁本柴胡防風

腦痛（名曰腦風）

大寒犯腦腦痛極齒亦痛脉緩大難治○服羌活附子湯

羌活附子湯

麻黄　黒附子　防風　白姜蚕　白芷

黄芩（各三分）羌活　蒼朮（各五分）黄芪（一分）升麻

甘草（各二分）佛耳草（三分無実者去之）右用水一鍾半煎至七分食後服

小芎辛湯

川芎　細辛　白朮（炒）　甘草（炙各五分）右剉水二鍾半生姜五片茶芽少許煎一鍾食後服

本事方（治八般頭風）

草烏尖　細辛（各等分）右以黄丹少許為末搐入鼻中立効

治頭痛不可忍

青黛（二錢）玄胡索（七枚）猪牙皂角（二箇）右為末水丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰卧水化開用竹管送入鼻中男左女右鼻中覔藥至喉少酸令病坐却令咬定銅錢一箇於當門牙當見涎出成病即愈

搐藥瓜蒂散（治偏頭久不愈是温氣在頭也）

瓜蒂一味為末少許吹鼻中清水徐徐出痛止為度○張子和黙目出淚搐鼻出涕口含漉涎皆同乎吐也

貼藥

防風　羌活（各三分）紅豆（三粒）右為末和葱白搗泥為膏貼兩額上

菊花散

甘菊花（去梗）旋覆花（去核）防風（去芦）川羌活（去芦）枳殼

蔓荊子　石膏（煅）甘草（炙各半錢）右作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾不拘時服

大川芎丸

川芎（四兩）天麻（一兩）右為末煉蜜和丸每兩作十丸每服一丸細嚼茶任下不拘時服或酒送下

急風散

川烏（生去皮臍）　辰砂（研各一兩）　南星（生用二兩）　右為末用酒調塗痛處小兒貼顖門

大芎辛湯（頭風用）

生附子　生烏頭　天南星　乾姜　細辛

川芎（各一兩）　甘草（三分）　右每服四錢水二鍾生姜七片茶芽少許煎至六分去滓食前服

葫蘆巴丸

葫蘆巴（炒）　三陵（剉醋浸炒）　乾姜（炮各一兩）　右為末用韭根取汁和丸如梧桐子大每服十五丸食後用薄荷茶清送下

止痛太陽丹

天南星　川芎（各等分）　右為末用連鬚葱白同搗爛作餅子貼於太陽痛處

治頭痛不可忍者

右用蒜一顆去皮研取汁令病人仰卧垂頭以銅筯點少許滴入鼻中急令搐入眼中淚出瘥

黑錫丹

葫蘆巴　破故紙（炒）　川練子　茴香（炒）　巴戟

附子（製各一兩）　肉豆蔻（製）　木香（五錢）　錫硫砂（四兩）　沉香

桂心（各五錢）　右為末同研勻酒煮麵糊和丸如梧桐子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四十丸空心姜塩湯送下一方有陽起石

順氣和中湯

黃芪（錢半）　人參（一錢）　白芍藥　當歸　陳皮

白术（各五分）　升麻　茈胡（各三分）　蔓荊子　細辛

川芎（各二分）　甘草（二分）　右作一服水二鍾煎至一盞去滓食後温服

治偏頭痛不可忍方

萆麻肉（半兩）　大棗（十五枚去核）　右研令熟塗於紙上用筯一隻捲之去筯入鼻中良久取下清涕即止

治頭風攻注口眼不正

全蝎（三枚去毒）　赤足蜈蚣（一條醋炙）　射香（少許）　辰砂（一字）　右為細末酒調下一字食後服

治眉异梁骨疼

用二陳湯送下青州白丸子立驗

備急丸（見積聚門）　補中益氣湯（見脾胃門）

二陳湯（見痰門）　青州白丸子（見[illegible]）

一柱金（補[illegible]）　川芎茶調散（開卷末）

大承氣湯（見脾胃門）

心痛門

有二十八名

心為君主之官百骸之所以聽命者也心之正經果為風冷邪氣所干氣血痰水所犯卒痛掣背脇脹胸煩咽乾兩目赤黃手足俱青至節名曰真心痛旦發夕死夕發旦死心之包絡與胃口相應往往卒痛連心諸心痛者皆少陰厥陰之氣上衝也遂有九種心痛之名一虫二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九來去且古人論諸心痛皆因六淫七情所致有寒厥有熱厥有實大有虧勞饑飽跌蹼以成諸痛也

生脉（二道）

沉　細

死脉（四道）

浮　大　絃　長

難治脉（三道）

堅大實　浮大長　滑數緊

死症（名一）

真心痛

治法

凡心腸痛湏分新久若知身受寒氣口食寒物初得之時宜温散或温利之藥病稍久則成鬱熱熱久生火

凡治此病湏問平日起居何如有因平日喜食熱

凡心痛用温藥附子之類不可用参术亦不可用純寒純熱之藥

凡心痛用山梔并刼藥止之又復痛者前藥必不効以玄胡索為末一服立愈

凡心痛調血順氣逐水豁痰

凡心痛熱者涼之寒者温之風者散之

凡心痛用山梔為主加熱藥為向導則邪易伏而病易退山梔十五枚大者九枚去皮炒濃煎佐以姜汁令辣服之或以二陳湯加川芎蒼术倍梔子煎服甚者加乾姜輕者以麻黃桂枝之類散之或以桔梗韭汁開提之再重者加石鹼

真心痛

胸脇脹煩咽乾兩目赤黃手足俱青

熱厥心痛

其症身熱足寒痛甚煩燥吐額自汗其熱厥無疑脉浮大洪○用金鈴子散

寒厥心痛

手足冷通身冷汗出尿清大便利不渴氣微力弱○急以朮附湯温之

大實心痛

因氣食卒然發痛大便成秘久則注悶心胸高起按之愈痛不能飲食○宜煮雄丸下後以藁本湯去其邪也

病久心痛

病久氣血虛損及素作勞羸弱之人皆虛痛也○虛以炒塩補之

足厥陰心痛

兩脇急引小腹連陰股徹背心煩掌中熱咽乾目黃赤脇滿○

足太陰心痛

腹脹滿大便不利膈閉咽塞○

手太陰心痛

短氣不得倚息季脇空痛遺尿胸滿煩心○

足少陰心痛

煩劇面黑心懸若飢胸滿腰脊痛

風冷寒邪心痛

服加味四七湯

熱氣乘心作痛

服靈脂酒（消末卷）

婦人惡血入心脾痛猶甚别樣心痛

服桃仁承氣湯（見痢疾門）

瘀血心痛

平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛○服

桃仁承氣湯（見痢疾門）

諸虫心痛

心腹痛懊憹發作腫聚往来上下行痛有休作喜渴涎出面色乍青乍白乍赤嘔吐清水○服蕪荑散

急心痛

禁了牙關欲死者可急散○將隔年老葱白三五根去皮須搗為膏以病人口斡開用茶匙將膏送入喉中香油四两灌送葱膏油不可少但得葱膏下喉中其人即甦少時將腹內停虫病

物化為黃水微利為佳
卒心痛久不愈
服玄胡索散
發熱心痛
內攻五臟拘急不得轉側○服加味麻黃湯
七氣心痛
喜怒憂思悲恐驚七情為病心腹刺痛不可忍
或外感風寒濕氣作痛者○服加味七氣湯
胃心痛
腹脹滿不下食雖食不消化○服備急丸（見積泄門）

飲咳生冷心痛
菓菜冷飲留積中焦心脾大痛○服煖脾散
痰飲心痛
咳逆上氣○用海蛤粉煅瓜蔞仁帶穰等分研
細米糊丸如菉豆大每服二錢食後白滾湯下
虛心痛
心痛時以手按心就不痛者○用二陳湯加乾
姜炒黑煎服
心大痛
走注胸背發厥諸藥不効即用吐藥先以鵝毛

探吐
因怒氣心痛
用木香檳榔丸（見積聚門）
肝心痛
色蒼蒼如死狀終日不得太息○
脾心痛
如針刺其心腹蘊蘊然氣滿○服手拈散
肺心痛
從心間起動作痛益甚不變色○
腎心痛
與背相引善[illegible]如物從後觸其心身傴僂○

九痛丸（治九種心痛）
附子（炮三錢）吳茱萸（炒）生狼牙（炙）巴豆（去皮研以）人參
乾姜（各一錢）右為末煉蜜為丸如梧桐子大強壯
人每服三丸酒送下虛弱人一二丸
朮附湯
白朮（炒四兩）甘草（炙一兩）附子（炮去皮臍一兩五錢）右分作十
服每服用水一鍾半煎至八分食後溫服
金鈴子散

金鈴子　玄胡索（各一兩）右末每服三錢酒調下

手拈散

草菓　玄胡索（炒）五靈脂　沒藥（各等分）右為末每服三錢溫酒調下

加味七氣湯

半夏（二兩五錢）玄胡索（炒）桂枝（各五錢）乳香（一錢半）人參　甘草（各二錢半）右分作十服每服水一鍾半生薑二片煎至七分食後溫服

加味四七湯

桂枝　白芍藥　半夏（製）人參（各七錢）厚朴　白茯苓　枳殼（炒）甘草（炙各二錢）紫蘇（錢半）右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾服

失笑散（治心腹痛百藥不効）

五靈脂　蒲黃（各等分）右為末每服二錢醋調熬成膏入水一盞食前溫服

玄胡索散

玄胡索（一兩）甘草（二錢）右作一服用水二鍾煎至一鍾服如吐逆分作三五次服

加味麻黃湯

麻黃（去節）白芍藥　半夏（製）乾姜（炮）桂心

香附（炒）細辛（各一錢）甘草（炙錢半）右作一服用水二鍾生姜五片煎至一鍾食前服

煖脾散

乾姜（炮）厚朴（製）麥芽（炒）草菓仁　橘紅　神麯（炒）良姜（炒）砂仁　甘草（炙各等分）右為末每服三錢不拘時用熱塩湯調服

煖胃散

右將茱萸同四色炒過良姜再同炒令乾喂為末用浸茱萸酒煑麪糊和丸如桐子大每服五十丸更看病人腹中冷熱加減空心生姜湯下

蕪荑散

蕪荑　雷丸（各半兩）乾漆（搥研炒大碎[illegible]一兩）右為末每服三錢溫水調和不拘時服甚者不過三服

煑雄丸

雄黃（一兩）巴豆肉（半兩）白面（二兩）右水丸如梧桐子大每服時先煎沸湯下藥二十四粒煑三十沸撈入冷水沉水冷一時下二丸一日夜二十四丸加至微利為度用浸藥水送下

二陳湯（見痰門）　藁本丸（開末卷）

脇痛門有二十六名

兩脇痛引小腹善怒厥陰肝經自病也左右脇而為陰陽之道路肝生於左連於右左脇痛者多因留血右脇痛者悉是痰氣論病之由當分外之六淫內之五邪推其歲氣別其左右辯其氣血痰積量其形症虛實用藥則可收其全功也

○順脉　絃濇

○逆脉　洪大

○辯驗脇痛來歷法

肝中風（左脇偏痛）　肝中寒（左脇痛）

肝實肝虛筋實　飲水（脇下鳴偏痛）

懸飲息積（九者右脇咳痛）　妨於食脇痛（肝傷脾）

血枯症脇胸支滿（肝氣不行）　胆實熱（左脇下熱痰痛）

脇痛病至先聞腥臊氣出清液（肺病肝葉傷之）

○熨法

脇痛用芫花菊花躑躅花等分用布囊貯蒸熱熨痛處冷復易之服木通散

○治法

凡脇痛用熨痛法或貼法

凡脇痛用當歸龍會丸瀉肝火要藥

凡脇痛大率有三肝氣實用川芎蒼朮青皮肝火盛用當歸龍會丸死血用留尖桃仁紅花川芎香附青皮

兩脇痛

痛引小腹善怒○服木通散

左脇痛

蓄血○服枳芎散

右脇痛

痰積○服推氣散

兩脇走注痛

用控涎丹

氣弱人脇下痛

或因勞碌怒氣作痛○用八物湯加木香青皮

肥人因氣虛發寒熱脇下痛

補虛用參芪退熱用柴胡黄芩調氣用木香青皮

瘦人脇下痛

發寒熱多怒者必有瘀血用桃仁紅花當歸柴胡青皮大黄梔子龍胆草

發寒熱脇痛

似覺有積塊○服龍會丸

食積脇痛

脇下有一條紅起○用呉茱萸黄連

寒氣脇痛

脇引小腹○服木通散加桂

濕氣脇痛

濕勝能化痰停脇間作痛○服二陳湯加蒼术

瀉青皮

燥甚脇痛

兩脇下小腹俱痛○服木通散加酒炒當歸

火熱脇痛

脇肢滿痛連胸中○服木通散加黄芩

肝熱脇痛

手足燥不得安卧○服木通散加柴胡酒炒黄芩

肝欬脇痛

兩脇下滿痛甚不可轉側○服木通散

脾欬脇痛

右脇痛引肩背○服木通散

肝欝脇痛

胃脘當心痛至兩脇咽膈不利飲食不下○服青皮陳皮各一錢柴胡三分為末酒調下

胃經脇痛

心脇痛不能轉側○服調胃承氣湯

胆經脇痛

痛不得息咳而汗出○服小柴胡湯加青皮

膀胱脇痛

拘攣背急引脇痛○服木通散加羗活

心經脇痛

先心痛一日後欬脇痛○服木通散加玄胡索

肺經脇痛

先肺病三日後頭目眩昏脇滿痛○服木通散加防風

肥氣脇痛

肝血蓄左脇作塊為肝積名曰肥氣○服芎歸芍藥湯

息奔脇痛

肺氣鬱在右脇痞硬而痛喘欬為肺積名曰息
奔○服白朮丸

傷寒脇痛
見傷寒門

七情脇痛
喜怒憂思悲恐驚七氣鬱在中脘不快胸脇痛
脹○服香橘湯

推氣散
片姜黄　枳殼（麸炒）　桂心（各五錢）　甘草（炙二錢）　右為
末每服三錢姜棗湯調下食遠服

枳芎散
枳實　川芎（各五錢）　粉草（炙二錢）　右為末每服二
錢姜棗湯調下食遠服酒調下亦可

香橘湯
香附（炒）　橘紅　半夏（各三錢）　甘草（炙一錢）　右作
一服水二鍾姜五片紅棗二枚煎一鍾食遠服

小柴胡湯
柴胡　黄芩（各二錢）　人参　半夏（各錢半）　枳殼
牡蠣粉　甘草（各二錢）　右作一服水二鍾生姜三
片紅棗二枚煎至一鍾食遠服

木通散
木通（去節）　青皮（去白）　蘿蔔子（炒）　茴香（炒）　川楝
子（取肉用巴豆半两同炒黄去巴豆不巳上各一两）　滑石（另研）　莪术
木香（各五錢）　右為末每服三錢不拘時用葱白湯
調服即愈甚者不過三服

白朮丸
白朮　枳實　官桂（各两半）　人参（二两）　陳皮
桔梗（醋炒）　甘草（各一两）　右為末煉蜜為丸如梧桐
子大每服五十丸不拘時温酒送下日三服

當歸龍會丸

草豆蔻　當歸　梔子　黄連（各一两）　大黄
蘆薈　青黛（各五錢）　木香（二錢）　黄芩（一两）　麝（五分）
右為末神麯糊為丸姜湯下有方用柴胡半两
青皮（一两）两

貼法
用芥菜子水研付或茱萸醋研敷或琥珀膏貼

控涎丹（開卷末）　調胃承氣湯（見脾胃門）
龍會丸（開卷末）　芎歸芍藥湯（開卷末）
八物湯（開卷末）　一陳湯（見痰門）

腰痛門（附腰軟有三十三名）

腰乃腎之府轉摇不能腎將憊矣且人之腰一身之關節六經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛諸邪易入或風寒暑濕客之或血凝氣滯鬱鬱悶悶而不伸積水沉重則小腸不得宣通其症遂作未嘗不由腎虛及肝脾所致緣腎肝脉通脾胃也

○總脉

沉滑遲可治　沉緊弦寒邪　沉弦浮風邪

沉弦澁細濕　沉實為熱邪　沉弦實閃肭

沉濇氣血病　單濇瘀血痰　尺脉大腎虛

○不治症

腎憊腰痛不能轉側

○治法

凡腰痛用磨腎膏止除房劳并熱痛餘病並用

凡腰痛日輕夜重是瘀血宜行血順氣藥加挑仁

凡腰痛久而不治則成痿

凡腰痛不宜補氣藥亦禁寒凉

凡腰痛不已是腎虛用杜仲龜板黄栢知母枸杞子五味子

凡腰痛用如神湯甚者不過二服熱痛勿用

凡腰痛遇天陰或久坐作痛是濕

凡腰痛四肢緩足寒腰冷如氷冷汗精滑濕熱用蒼术柴胡黄栢杜仲川芎桂等分

凡腰痛房劳者多其痛引脊膂之大便

凡閃肭腰痛山查肉四两北茴香炒二两為細末酒下

腎着腰痛

腰冷如氷身重不渴小便自利飲食如常腰重如帶五千錢○服腎着湯即四君子湯去参加乾姜

腎肝腰痛

腰間滯滯而痛○服牛膝丸

太陽膀胱腰痛

腰痛引項脊尻背如重伏○服如神方合附子理中湯

陽明胃經腰痛

痛時不可以顧顧則如有所見善悲○用蒼术當歸各五錢水煎服

少陽膽經腰痛

痛時如針刺皮不可以俯仰○服小柴胡湯加酒炒黄芩

太陰脾經腰痛

痛時發熱熱甚腰內如有横木居其中再熱甚遺尿○用蒼术當歸各五錢水煎服

少陰腎經腰痛

腰痛引脊內廉○服如神方合附子理中湯

厥陰肝經腰痛

痛時如弓張弩絃善言嘿嘿然不慧○服小柴胡湯加酒炒黄芩

解脉腰痛（是膀胱經別脉）

腰痛引肩䀮䀮然時遺尿○服

絡脉腰痛（胆經別絡）

痛時如引帶常若折腰狀善恐○服

陽維脉腰痛

痛時如小鍾居其中怫然腫○服獨活湯

太衝脉腰痛

痛處怫然腫○服

會陰脉腰痛（是膀胱經中絡）

因舉重傷腰惡血歸脉痛時不可俯仰○服如神方加蘇木紅花

陰維脉腰痛

痛時漯漯然汗出汗乾欲飲○服如神方

陰蹻脉腰痛

痛時拂拂然悲恐○服如神方

肉裡脉腰痛（是少陽生別脉）

腰痛引膺目䀮䀮然如反折舌捲不能言○服如神方

從高墮下腰痛

服桃仁承氣湯

寢卧濕地腰痛

服麻黄蒼术湯

脾滯胃閉腰痛

用雞心檳榔磨老酒食後服

房勞腰痛

腰與脊痛不能舉○治宜補陰助陽

血滯腰痛

血氣不行則沉痛不能轉側○服如神方

氣滯腰痛

氣欝氣滞自覺氣不舒悵○服如神方

老弱人腰痛

痛時不可屈伸○服二至丸

閃挫腰痛

痛時不能轉側○服神麯酒

欝怒憂思腰痛

自覺為四者作痛○服七香丸

冬月露卧感寒腰痛

服川芎肉桂湯

風涂腰痛

攻刺痛○服獨活散

風濕腰痛

生苗茶擂入香油十滴煎数沸入川芎升麻末吐之

寒濕腰痛

身體沉重面色痿黄不澤○服麻黄蒼朮湯又用摩腰膏法

濕熱腰痛

肢節煩疼有背沉重胸膈不利及遍身疼注足脛腫○服蒼朮湯加黄栢

停痰腰痛

用二陳湯加天麻

劳役腰痛

因劳碌痛如折沉重如山○服獨活湯

腰軟

因腎肝伏熱○用黄栢盐水炒防已

腎着湯

茯苓　白朮（炒各四兩）　乾姜　甘草（炙各一兩）　右分作十服每服用水二鍾煎至一鍾空心冷服

川芎肉桂湯

羌活（半錢）　柴胡　桃仁　當歸尾　肉桂　蒼朮（泔浸）　甘草（炙各一兩）　獨活　神麯（炒各五錢）　防風　漢防已（酒製各二分）　右好酒三鍾煎至一鍾食前煖處温服

麻黄蒼朮湯

麻黄　澤瀉　白茯苓　陳皮（各一錢）　桂枝　半夏　猪苓（各五分）　杏仁（十箇）　蒼朮（泔浸炒二錢）　黄芪　甘草（炙各二分）　神麯（炒一錢）　右水二鍾煎一鍾食前服

独活湯

羌活　独活　防風　大黄（煨）　桂

澤瀉（炒各三錢）甘草（炙二錢）當歸　連翹（各半兩）黃柏

防己（各一兩）桃仁（酒泡去皮三十箇）右分作五服每服用

酒水各一鍾煎至一鍾空心熱服

蒼朮湯

蒼朮（米泔拌炒）柴胡（各二錢）黃柏（炒一錢）防風（一錢）右用水

一鍾半煎至七分空心溫服

七香丸

丁皮　香附子（炒）甘草（各兩二錢）松香（八錢）鹽（六錢）

蓬朮（炒）砂仁（各二錢）右為末水浸蒸餅為丸如

菉豆大每服三十丸米湯送下

[illegible]

地龍散

桂（四分）桃仁（六箇）羌活（二錢）獨活　當歸

黃柏（炒各一錢）升麻（五分）地龍（四分）蘇木（六分）甘草

（一錢）右用水二鍾煎至八分食遠服

摩腰膏法

附尖　烏頭尖　南星（各二錢）雄黃　樟腦

丁香（各半錢）朱砂　乾姜（各一錢）射香（少許）右為細

末煉蜜為膏姜汁化放掌中炙上烘熱擦痛處

摩之

二至丸

附子（炮去皮臍）桂心（不見火）杜仲（炒去絲）補骨脂（炒各一兩）

鹿角（鎊）麋角（鎊各一兩）鹿茸（酒炙）青研（另研各五錢）右

為末酒煮糊和丸如桐子大每服七十丸空心

溫酒送下

神麯酒

右用陳久神麯一大塊燒通紅淬老酒去神麯

通口吞青娥丸兩服頓愈一方不用青娥丸只

服酒後仰卧片時未効再服

牛膝丸

牛膝　訶黎勒　附子　當歸（各一兩）乾姜

芎藭（各半兩）桂心　白芍藥　白朮（各三分）厚朴

（去皮生姜汁炙茴香炒一兩五錢）羌活（三分）右為末酒煮糊為

丸如桐子大每服三十丸食前溫酒送下

[illegible]

如神方

杜仲（炒去絲）木香（各四兩）官桂（一兩）右為末每服二錢

空心用溫酒調服此藥活血化氣

附子理中湯（見寒門）小柴胡湯（見瘧疾門）

桃仁承氣湯（見血門）四君子湯（見諸氣門）

摩腎膏（見卷末）二陳湯（見痰門）

腹痛門

有二十五名

頭與背輕清象天屬陽主氣司熱故言頭圓象天諸陽之氣皆會於首風熱所傷上先受之足與腹重濁象地屬陰主血司寒故言足方象地諸陰之血走五臟濁陰歸六腑寒濕所傷下先受之臟腑藏於腹惟夏令能受病也夏月陽氣發散在外陰氣在內譬井中之水夏月冷而冬月温也所以腹痛之因多於寒也經云寒氣入經而稽遲泣而不行客於脉外則血少客於脉中則氣不通故卒然而痛卒然而止或痛甚不可按或按之痛止或不止或喘動應手或脇肋與小腹痛引陰股或痛死少間復生或嘔或瀉或小便不禁者皆寒氣之為病又曰綿綿而痛無增減者寒也熏之以熱痛痰痛食積痛蓄血痛虫痛未必不由腹之衰薄寒濕之氣相熏鬱積致生諸病而成痛也鬱積之久遂生熱耳雖有熱痛十之一二也

○生脉

細、小、遲

○死脉

堅大、疾　浮大長　數緊

○辯驗腹痛法

在中痛食積痛甚欲大便利後痛減

在左痛死血痛有常處而不走移

在右痛是痰或得辛辣熱物暫止

在下痛蓄血小便清利手不可近痛處

在下痛蓄尿小便不行手不可近痛處

在下痛亦有屬食積必少食利後痛減

痛甚不可按者是實邪　熱痛時作時止

痛時按之痛止是虛邪　寒痛無增無減

痛死復生是寒氣入經　虫痛唇紅顴白

心至小腹硬滿痛實邪　肥人腹痛是氣虛

脇至小腹引痛痰死血　瘦人腹痛是火邪

○不治症

臍下大痛人中黑死　腹痛發喘兼脉滑死

○治法

凡卒腹痛先用食塩一把調水送下以鷄羽探吐有痰即吐無痰其痛即止

凡治腹痛須分三陰部分○中脘太陰○臍腹少陰○小腹厥陰

凡人壯實初發腹痛元氣未虛宜推蕩之

凡人虛弱經久腹痛元氣已虛宜消導之

凡雜症腹痛者用酒煑當歸丸主之

凡四時腹痛者用芍藥甘草湯主之

凡夏月腹痛肌熱惡寒脉洪黃芩芍藥湯主之

凡秋冬腹痛肌寒惡寒脉沉桂枝芍藥湯主之

凡腹痛不宜用參术

凡肥白人腹痛是濕痰用半夏人參二术

凡瘦黑人腹痛是實熱以大黃朴硝下之

凡氣滯腹痛用木香檳榔枳殼香附

凡血阻腹痛用川芎當歸桃仁紅花

凡腹痛久病實熱大便燥秘者用潤腸丸

凡臍至小腹痛多屬食用山楂神麯蒼术青皮

凡腹痛因飲食過傷用木香檳榔丸下之

凡腹痛因跌蹼損打或蓄血用承氣湯加桃仁當歸紅花蘇木下之

凡氣虛人傷飲食腹痛宜調補胃氣并消導之

凡腹痛因痰而作者用滚痰丸

凡腹痛因虫而作者用川楝樹根皮檳榔鶴虱

凡腹痛因中氣虛而作者用理中湯

凡腹痛因熱用二陳湯加黃芩黃連梔子甚者加乾姜

凡腹大痛脉沉細實用附子理中湯合大承氣湯下之

老人腹痛

因年老元氣虛初痛不經下者○服芎术湯

傷食腹痛

因飲食太過而作痛者○服木香檳榔丸

虛人腹痛

因稟氣弱又因飲食過傷○用人參白术木香

神麯枳實檳榔用水二鍾煎服

損傷腹痛

或用力舉重墻屋壓髒從高跌下打傷○服桃仁承氣湯加當歸蘇木量傷輕重加減

傷暑腹痛

見暑門

陰毒腹痛

見痼冷門

疝氣腹痛

見疝門

泄瀉腹痛
見泄瀉門
積聚腹痛
見積聚門
腸癰腹痛
見外科門
痰飲腹痛
見痰飲門
傷寒腹痛
見傷寒門

傷熱腹痛
見積熱門
痢疾腹痛
見痢疾門
酒積腹痛
見內傷門
死血腹痛
見諸血門
蓄溺腹痛
見小便門

諸虫腹痛
見諸虫門
肥人腹痛
用半夏蒼白朮為主
瘦人腹痛
用酒蒸大黃為主藥
心至小腹痛
心至小腹滿悶而痛未經服吐藥瀉藥用塩五合水一鍾煎令塩消頓服即吐不吐再服或用布裹花椒薄鋪痛處以火熨之令椒汗出妙

脇至小腹痛
用木香檳榔丸煎青皮湯送下
七情腹痛
自知為七情氣不舒作痛。服七氣湯
遶臍腹痛
脉實腹滿大便閉。服太承氣湯
腹中鳴痛
是火擊動其水也水欲上火欲上相觸而然用二陳湯加梔子大黃黃芩黃連
見晛丸

巴豆霜（五分）　三稜（一兩煨）　神麴（一兩炒）　木香（二錢）　香附
草豆蔻（麪裹煨各五錢）　升麻（三錢）　柴胡（二錢）右為末
蒸餅丸如菉豆大每服二十丸白滚湯送下亦
須量所傷多少服之

七氣湯

益智　陳皮　蓬朮（煨）　三稜　青皮
桔梗　薄桂　香附（炒）　藿香葉　甘草
（各等分）右用水煎服

酒煑當歸丸

當歸（一兩）　茴香（五錢）　附子（炮）　良薑（各七錢）　右四

味酒煑乾炒黃鹽　丁香（各五錢）　全蝎（三錢）　柴胡（二錢）　升
麻　木香（各一錢）　苦楝（五分）　甘草（五分）　玄胡索（四錢炒）　右為
末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心白
滚湯送下

芍藥甘草湯

芍藥　甘草（各等分）右用水煎服

黄芩芍藥湯

黄芩　芍藥　甘草（各等分）右用水煎服

桂枝芍藥湯

桂枝　芍藥　甘草（各等分）右用水煎服

桃仁承氣湯　　理中湯
見血門　　見寒門
木香檳榔丸　　滚痰丸
見氣門　　見痰飲門
附子理中湯　　潤腸丸
見寒門　　見秘結門
大承氣湯　　承氣湯
見脾胃門　　見積聚門
二陳湯　　芎朮湯
見痰飲門　　開末卷

一〇二〇 册 續修四庫全書 第 4 版又内

諸虫門（有十七名）

諸虫皆由臟腑不實脾胃俱虛停積濕熱雜食生冷甘肥油膩等物節食不時腐敗留滯所以發生又有神志不舒精魂失守及五臟勞熱久病餘毒氣血積鬱而生或食瓜菓禽獸內藏遺留諸虫之類而生惟蟯虫寸白虫蛔虫人多有之五臟生虫皆能殺人但心肺之虫居肺葉之內治之為難虫之名病固多追取虫法則一虫去何憂病不痊也故選二方揔治諸虫虫盡則當大補脾胃而無復生之患矣

○生脉（道二）

虛　小

○死脉（道二）

緊　急

○死症

癆虫食肺喉啞聲嘶

○辯驗虫痛法

虫作痛口唇紅額上白色如銅錢大以此為驗令人清朝吐沫平時嘔水作痛作止聚腫無定處或虫食臟上唇內生瘡狐虫食肛門下唇內生瘡小兒肚大青筋起者內有蛔虫

○治法

凡上半月虫頭向上易治五更先以糖一二匙或肉汁五六匙後服丸虫散或化虫丸

凡初一起至初七日止每日五更將白沙糖伴榧子七枚食之七日食七七四十九個揔治諸虫

凡治瘋虫必用花蛇為主

凡治癆虫必用白色鰻魚

凡治瘚虫必用鷄醴酒

凡治瘑虫必用驢尿

凡治後開丸虫條下各有湯藥總不如先服丸虫丸一次隔數日候至初一起食榧子法除丸虫之外其他之虫為病照依各虫條下湯丸散服去

伏虫（長四分）

群虫之主

蛕虫（長一尺又名長虫又名蠱虫此五臟亂發人心又名二虫九虫數中之一）

貫心殺人○服雷丸

白虫（長一寸相生子孫轉大長至四五尺殺人）

生於脾令人胸中咳嘔而不出○服白蘞二虫

酒

寸白虫（形扁）

食牛肉白酒所生相連一尺則殺人損人精氣

力乏腰疼○服南木香檳榔各一錢五分末飲

下五更先嚼猪肉二三塊去肉粗嚥汁後服藥

辰巳時下虫

肉虫（狀如爛杏）

生於肝令人煩滿○

肺虫（狀如蚕形）

生於肺葉內蝕人肺系成瘵咯血聲嘶藥不到

令人咳嗽氣喘或氣膈寒膈熱膈名曰骨肓○

服乔虫丸

胃虫（狀如蝦蟆）

生於胃令人嘔吐噦○服白蘞二虫酒

弱虫（狀如瓜瓣又名膈虫）

令人多唾○服白蘞二虫酒

赤虫（狀如生肉）

令人腸鳴○服三虫湯

蟯虫（狀如菜虫其形甚惡）

令人心痛清朝口吐沫煩燥生於腎居胴腸多

則為痔劇則為癩因人瘡痍即生諸癰疽癖瘻

癇疥婦人常多其虫凶惡人之極患也常以白

蓮草煎湯浴根葉皆可用屍虫所畏○服屍蟯

虫散

惑虫

食臟上唇內生瘡○服瀉心湯

狐虫

食肛下唇內生瘡○煎苦參湯浸洗大便○又

方用長股蝦蟆青背者一枚雞骨燒灰一分和

勻吹入肛門內

疳虫

兒童多有令人昏睡煩燥鼻爛汁臭齒斷生瘡

惟傷寒天行熱病腹內有熱虫行求食須頻頻

看驗唇內有瘡○服安虫散

蛔虫（長一尺或五六寸貫心死此虫是九虫之一也）

令人腹中痛發作腫聚行來上下痛有休止腹

中熱口吐清水○服集効丸

陰虫

多淫婦人因陰户内有黑頭小虫〇用軟鷄肝一枚熱湯暖之入於陰户良久取出其虫鑽入肝内則不淫矣

小兒肚大青筋

因腹内有虫〇用取虫丸

濕虫

用青黛一两黄連黄栢丁香各五錢麝香少許脂為丸如棗大入下部一日換二次

九虫散

狼牙　貫衆　鶴虱（紙上微炒）蕪荑（各一两）右為末每服一錢粥飲調下良久取服虫出為度

三虫湯

檳榔（三枚）以灰火煨搗為末用水三盞煎一盞半緑綿利去柤分三服空心午間臨夜各一服其虫盡下未盡再服

雷丸（去心虫）

雷丸（灰火煨）陳皮（去白）杏仁（湯泡浄炒）貫衆（大者去鬚）蕪荑　青箱子（炒）乾漆（炒令烟出）狼牙（各一两）亂髪（如鷄子大一團燒灰）右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心好酒送下

殺蛲虫散（治腎虫）

貫衆（大者三枚）白蕪荑（炒）胡粉（炒各一两）杏仁（去皮尖炒五錢）右為末每服二錢空心井水調下日晚再服

白弱二虫酒（去脾虫）

麻子（八合炒）陳皮（二两）呉茱萸（根一尺搗碎）右搗陳皮麻子如泥後拌茱萸根酒一斗浸一宿慢火上微煎攪去查分作五服每服空心飲虫下為度合下時不要說話

蚕虫方（去肺虫）

桑白皮（一升）狼牙（洗淨二两）呉茱萸（根皮二两）右用酒七升煎至二升去柤每日空心一服虫下為度

瀉心湯

大黄　黄連　黄芩（各一两）右為末白沸湯調服二錢

苦參湯

苦參（十两）搥碎煎濃湯洗大便

取虫丸

牽牛（三錢）檳榔　錫灰（各五錢）大黄（六錢）右為末滴水丸如梧桐子大每服十五丸用史君子煎湯送下虫下為度

化虫丸

鶴虱（炒去土）　梹榔　練根　胡粉（各一兩炒）　白枯礬（二錢半）　右為末糊丸蔴子大每一歲服五丸論歲數加去服之下虫為度

安虫散

胡粉（炒黃）　梹榔　川練（去核）　鶴虱（去土炒各一兩）　枯白礬（一錢）　右為末滴水丸如粟米大每服五分白滚湯送下

集効丸

木香　鶴虱（炒去土）　梹榔　訶子（煨）　蕪荑

附子（煨）　乾姜（各五錢）　大黄（一兩）　右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前白滚湯送下

鵝醴酒（闕木卷）

識病捷法卷之七

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

又病門（有八名）

此門古來無載余摽立之盖為宇宙之民請此條目可以知戒遷善無求自没醫者虚心不可妄投藥耳

譴責病

橫惡陰謀尅薄寺人天神譴責痾疾綿綿雖仙丹不治欲求自愈即當遷善

悞醫病

假如人患肝經之症醫者認病欠明以別經治之別經無病受藥以致戕賊變症牵延反被藥傷人夫延醫之家不可不擇

藥傷病

凡病服藥睡去或因胃虚藥不輸化遂成藥傷病醫所不識遝投本病之劑終不取効將生黄豆與患人食不惡心是也先服甘草飲不愈再服藍根散醫者須先囑病人服藥後不可睡去

富病

富者患病惟求速愈殊不知病有淺深服幾劑不効又去更醫名曰藥劑亂投變病不一何異於求榮而反辱也

貧病

貧者患病雖欲求醫為口體不充只得因循歲久而致醫無施治之心豈為仁術也

諱疾病

痴愚等人患病在己竟自隱瞞名曰諱疾忌醫經久元氣耗散終不得治

鬱病

寡婦尼姑室女僧道情慾熾甚不遂遂生鬱矣鬱則正氣留而不行其氣凝結終日懨懨病加煩劇豈藥可治欲求自活須返邪歸正

榮枯病

前富貴後貧困鬱而成疾余每見醫者與藥治之百無一痊須是勸令其聽命榮枯自然獲安矣

甘草飲

甘草（一兩生用）白礬（半兩生用）延胡索（一兩）右為末每服三錢水一盞煎至六分待藥冷細細呷之

藍根散

藍根（一把）蘆根（一把）菉豆（一合）右先將二根已水一碗煎至七分去滓次微炒豆為末和勻分三服先服一二服利下惡物不用第三服如不利下再服之

鬱病門　有十五名

經云五鬱發之乃治之之法以平五臟也五臟有五行配合金木水火土之氣一有鬱積則當發之是從其本然之性而治之更有六淫邪氣入而不出七情之氣結而不散痰與血食結而不消皆謂之鬱也且有久病多鬱者凡病久之人情緒不舒致使脾氣不和新病方增舊病亦甚治療之時無分新舊無別邪正日遠病深愈為難治是誰之愆醫者寧人之責而不用心於審察乎

○總脉

沉澀為氣　沉遲為寒　沉細為濕
沉微為血　沉數為熱　沉滑為痰
氣口緊盛為食

○治法

凡用諸鬱藥中春加防風夏加苦參秋冬加吳茱萸

凡鬱皆在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之
假如食在氣上氣升則食自下餘倣此

凡用蒼朮米泔拌炒撫芎總解諸鬱貝母解痰鬱香附童便浸炒解氣鬱

凡冬病惡寒亦用解鬱則愈

五鬱

心火鬱發之當看何經謂汗之也
肝木鬱達之謂吐之令其條達也
脾土鬱奪之謂下之令無壅滯也
肺金鬱泄之謂滲泄解表利小便
腎水鬱折之謂抑之制其衝逆也

六鬱

氣鬱
胸脇痛脉沉澀○用香附蒼朮撫芎

濕鬱
周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細○用蒼朮白芷川芎茯苓

熱鬱
目瞀小便赤脉沉數○用山梔青黛香附蒼朮撫芎

痰鬱
動則喘寸口脉沉滑○用海石香附南星瓜蔞

血鬱

四肢無力能食便紅脉沉○用桃仁紅花青皮

川芎香附

食鬱

噯氣惡食飽滿不能食左寸脉平右寸脉緊盛

○用香附蒼朮神麯麥芽山查草菓之類

久病多鬱

久病之人情緒不舒分外有鬱鬱皆須先勸令病人放開懷抱舊病可治必以內經治法諭告之以其易行之以其難繼是不死之症語之以其死病者畏死始肯聽言而不生鬱切不可投

鬱藥而反傷其真也

久病陰虛氣鬱發熱

用芍藥炒一兩二錢香附童便浸一兩炒蒼朮米泔拌炒三錢片芩三錢炒甘草生錢半右為末水丸食遠服

婦人憂鬱傷脾不思食

用酒炒芍藥黄連童便拌炒各等分為末姜汁糊丸服

手足心發熱屬火鬱

火輕宜降火盛宜發汗

耳門（有二十一名　外附十五條）

耳為腎之竅交會於肝胆小腸三焦之經其他臟腑之脉皆絡於耳若水虛則熱甚上客經絡衝於耳中隨脉氣微甚邪氣淺深而作耳鳴耳聾諸症也至老人多病頭目昏眩耳鳴耳聾皆陽實陰虛所致俗言老弱為虛寒用之以熱劑此乃舉世受悞經言陽氣上甚而躍故耳鳴也又云心本熱也虛則寒矣腎本寒也虛則熱矣據理推之非熱而何耳鳴者其聲不一耳聾者所感不一腫痛膿汁

各各不同所以治之則異凡患此科善調養者則精氣神足不藥漸愈弗能謹守者雖藥對症難以取效也

○虛脉（道二）

左尺脉大無力　右尺脉微細無力

○風脉（道二）

左關脉絃　緊

○熱脉（道四）

左寸脉浮小　右尺脉浮小

○勞脉（道二）

右關脉洪大

○不治症（三名）

虛聾　久聾　乾耵鳴

○治法

凡耳聾大病後與陰虛火動耳聾者宜降火以四物湯為主

凡耳聾用流氣飲加菖蒲生姜治聾皆當調氣

凡耳聾用萆麻子四十九粒棗肉十枚入人乳搗膏石上曬乾丸如梧桐子大綿裹塞耳中

凡耳鳴用草烏石菖蒲等分為末綿裹塞耳中一日三次即止

凡耳鳴證或鳴其如蟬或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不效是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣清痰降火治之

凡耳鳴若腎虛而鳴者甚鳴不甚人必多慾當見勞怯等症

凡耳痛以吳茱萸烏頭尖大黃為末塗湧泉穴以布裹之

凡聤耳膿出用桑白皮一片炙麝香二分為細末乾摻之

凡耳熱出汁用石膏防風天花粉為末摻之

凡虫入耳用香油灌入耳中或用雞冠刺血灌入耳猶妙

耳久聾

勞傷精氣神三者又為風邪停滯鳴久後聾名曰久聾○不治

耳虛聾

腎經原稟虛憊不由三因之邪所干以漸而聾名曰虛聾○不治

耳勞聾

勞役傷其氣血淫慾耗其精元始其証瘦瘁力疲昏昏憒憒名曰勞聾○服補中益氣湯

耳風聾

宗脉所附脉虛則風邪乘之風入於耳使經氣否塞不聞聲音名曰風聾○治宜疎風益氣

耳厥聾

諸經適有交併則臟氣逆而為厥厥者寒也厥氣搏入於耳致聾者名厥聾○治宜順氣温經

耳氣聾

有因氣塞致聾名曰氣聾○治宜順氣

耳虛鳴

耳中作風水聲或鍾聲眼或見諸光名虛鳴○服滋陰固本丸○用透耳筒法或用通耳丸

耳勞鳴

勞碌傷脾勞則火起於筋血脉受傷風熱相乘氣與之搏故為耳鳴名曰勞鳴○先服芎藭飲加枳殼紫蘇生姜一貼踈風下氣續以滋陰補中丸服之

耳風鳴

耳觸風邪與氣相搏其聲嘈嘈名曰風鳴○服

芷芎散

耳腦鳴

風邪入於腦久而不散經絡凝寒耳中怦怦然鳴或作旋運名曰腦鳴○服磁石浸酒藥

耳內障鳴

因飲食不節勞役形瘦中氣不足得受內障先鳴不已則後聾名曰內障鳴○服益氣聰明湯

病後耳鳴

大病後或傷寒或產後或失血過多致五鳴不已則聾名曰病後鳴○服滋陰固本丸

耳瘡鳴

因發瘡毒後腎氣則熱其症心中不寧亦致耳鳴或疼名曰瘡鳴○服地黃湯

耳蟬鳴

因腎氣不足熱毒之氣乘虛攻耳其聲如蟬名曰蟬鳴○服龍蔭散

上焦耳鳴

上焦之氣為風熱所干其病四肢滿急昏悶不利先鳴不已致聾○服茯神散

痰熱耳鳴

胷中痰滯風熱相兼其病頭重目眩先鳴不已

致聾○服犀角散

乾耵耳聾

耳中生乾耵致鳴致聾○服柴胡聰耳湯○用附子丸法

耳夜鳴

夜間睡着如打鼓之聲耳內風吹名曰夜鳴○服黃芪丸

耳沸鬧

耳中如湯沸聲或噪鬧聲○用穩膏法

聤耳

因洗面沐浴湯水入耳膿汁並出不止名曰聤

耳○用白就散

治耳出血水

○用麝香佛手散吹耳內○服犀角地黃湯加

枳殼

耳卒痛

卒得風疾耳覔恍恍卒痛者○用白塩方

治𤵸耳

耳內外主𤵸瘡○用馬騌方

治大病後耳聾方

右用生菖蒲裂汁滴耳中即効

治蜒蚰入耳方

雄黃綠礬石半夏各一兩右為末以醋調一字

灌入耳中即出

治百虫入耳

桃葉心（二十枚）胡麻（一升炒令香）右先以桃葉心塞耳

中其虫必死未出將胡麻以葛袋盛枕耳邊虫

自出○又方雞冠血滴入耳中即出

治蚤虱入耳

治兩耳虛鳴

白茯苓（二兩）乾山藥（三兩）杏仁（去皮尖炒兩半）右為末黃蠟

二兩熔化和丸如彈子大每服一丸食後細嚼

塩湯送下

治一切耳聾

石菖蒲（一寸）巴豆（一粒去殼）全蠍（一个去毒）右為末葱汁丸

如棗核大綿裹塞耳內

治耳出血

射香（少許）人牙（煅存性出火毒）為末每用少許吹入耳內

即乾○又治小兒痘瘡出復聾酒調一字即出

治凍耳成瘡

柏葉（三兩微炙為末）杏仁（四十九个泡去皮尖）亂髮（如雞子大）食塩（少許）

黃蠟（一兩半）乳香（五錢）清油一斤先煎油入亂髮消

盡為度次下諸藥末煎黃色去滓後下乳香黃

蠟攪令如稠糊磁器盛鵝羽塗之

治耳內疼

草烏削如棗核大塞耳孔疼立止

治耳汁耳膿耳痛

杏仁炒令赤黑研成膏綿裹塞耳孔中一日換

三四次

治卒耳聾耳内作風水鍾聲
穿山甲（蛤粉炒赤去粉）蠍稍（七个）麝香（少許）為末以蠟入麻
油一滴為丸綿裹塞耳内
治多年耳聾十日見効除根
川烏頭一（一个炮去皮臍一方用草烏尖）細辛（各一錢）膽礬（五分）活鼠
一（箇熱湯浸死破開取膽真紅色是）右為末用鼠膽調和勻再焙
令乾研細末却入麝香半字用鵝翎吹入耳中
吹時含茶清待少時
治耳卒腫出膿并底耳及治耳聾不瘥有虫
右用礬石燒令汁枯研細每以箒筒吹少許入

耳中日三四度或以綿裹如棗核大塞耳中亦
得一方先以乾鹽摻之次入礬末猶妙一方先
以紙纏去耳中汁次以礬末粉耳中次以食鹽
粉其上食久乃起不過再度永瘥一方不用鹽
益氣聰明湯
黃蘗（酒製炒）芍藥（各半錢）蔓荊子（一錢）升麻（錢五分）人參
黃芪　甘草（各二錢半）葛根（錢半）右作一服水二鍾
煎至一鍾臨卧服
透耳筒
椒目　巴豆　菖蒲　松脂（各一錢）右為

末攤令薄捲作筒子塞耳内一日一易一方同
川椒以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無松脂
白就散
白礬（枯）　黃丹　龍骨（各五錢）麝香（一錢）右研極
細末以綿杖子展盡耳中水用藥一字分摻兩
耳一日摻二次勿令風入
磁石浸酒方
木通　遠志（去心）　防風　著蕷　菖蒲
芎藭　蔓荊子　白茯苓　甘菊花　細辛
乾姜（炮）　肉桂（各一兩）地黃（三兩）右為末和勻以生

絹袋盛以酒二斗浸藥七日後每日任量飲之
以瘥為度
白鹽方
右用鹽五升甑上蒸熱以耳枕之冷即換亦治
耳疼一方用軟布裹熨患耳或青布裹之亦可
芎藭飲
川芎　當歸　細辛（各半兩）官桂（去粗皮）菖蒲
白芷（各三錢）右每服三錢水二盞入紫蘇姜棗煎
至一盞去滓不拘時服
犀角散

犀角屑　石菖蒲　麦門冬（去心）　前胡　菊花

枳殻　生地黄　澤瀉　木通　羌活

甘草（各等分）右每服一两水二鍾煎至一鍾服

茯神散

茯神（去木一两）　蔓荊子　石菖蒲　薏苡仁　羌活

防風（五味子）　黄芪（各五錢）　甘草（二錢）　麦門

冬（去心一两）（右作五服）每服水二鍾煎至一鍾服

龍齒散

白茯苓　龍齒　麦門冬（去心）　遠志（去心）　人参

（各五錢）　丹砂（研）　鐵粉（研）　龍腦（研）　麝香

牛黄（研各一分）右為末研匀每服半錢食後用白沸

湯調服日進三服

柴胡聰耳湯

柴胡（三錢）　連翹（四錢）　水蛭（半錢炒研）　虻虫（二个去翅足另研）

麝香（少許）　當歸身　炙甘草　人参（各一錢）右除

虻蛭外以水二盞入生姜三片煎至一盞去滓

稍熱下水蛭虻末再煎一二沸食遠稍熱服

黄芪丸

黄芪（一两）　大黒附（一个）　羌活（五錢）　白蒺藜（尾焙去刺五錢）

羯羊腎（一个焙乾）右為末酒糊丸如梧桐子大每服

三四十九空心煨葱塩湯送下一方有破故紙

無白蒺藜

補中益氣湯（見脾胃門）　犀角地黄湯（見諸血門）

滋陰補中丸（見虚損門）　滋陰固本丸（見虚損門）

四物湯（見諸血門）　附子丸法（開卷末）

地黄湯（開卷末）　蔓荊子散（開卷末）

鵝膏法（開卷末）　草烏削法（開前耳内疼條下）

亂髮方（開卷末）　馬騌方（開卷末）

舌口門（有三十四名）

口乃脾之竅五味之所入也舌乃心之苗舌和則知五味五味之氣歸於五臟五味過爽則五臟之氣偏勝諸疾生焉且醎味能助火為寒淡味能收歛能為停滯辛味能發散能為燥甘味能中滿能為緩苦味能泄能為熱惟淡味則為五行之本也其病口臭者脾熱也口瘡者脾氣凝滞風熱加之治法各隨後開病之形狀方藥取用之

○不治症

風寒所中舌捲　舌捲葸囊縮肝絕

小兒口瘡不下食以狐惑治死　脾熱舌強

○辯驗舌口法

心脉系舌本　脾脉絡舌旁　肝脉絡舌本

肝氣壅舌上血溢　心氣熱舌裂口瘡

肝氣閉舌胎如雪　腎氣熱舌上黑胎

脾氣熱口臭舌硬　七情氣欝舌上脛

○治法

凡舌口病服凉藥不愈此酒色過度

凡勞碌不睡舌上光滑無皮

凡舌口因憂思損傷中氣虛火泛上無制用理中湯甚者加附子或官桂飲之

凡實熱口生瘡用凉膈散又方用細辛黃栢炒為末摻口內取涎

凡滿口生瘡或腫毒重舌用薄荷荊芥甘草各五錢青黛百藥煎玄明粉硼砂各三錢五分點患處

凡口噤牙関難開用霜梅白礬姜蠶為末擦牙根上○又方雄黃食塩川椒各一錢皂莢子一枚燒灰擦牙根上

赤口瘡

用枯白礬乳香沒藥銅綠共研末摻之不愈再用口瘡方

白口瘡

用雄黃乳香沒藥各一錢輕粉五分巴豆一粒去油共為末摻之不愈再用口瘡方

小兒口瘡

不下食以狐惑治之必死○用礬湯浸脚半日又用黃栢為末蜜丸服之再用姜蠶炒為末摻瘡口上立効

口糜爛
　用野薔薇煎湯漱口
口乾燥瘡
　服杏仁散外用口瘡方
口臭
　用含香丸
口內疳瘡
　服走馬散不愈再用口瘡方
口舌生瘡爛痛
　用蟾酥方不愈再用口瘡方
口舌生瘡時時出血咽腫痛
　服加味龍石散
口舌乾煩渴
　服牛黃丸
口舌乾神不清頭目不利
　用含化丸
肺熱口臭發渴小便多
　服地骨皮丸
心氣不足口瘡
　服益智甘草為末沸湯調服

脾熱唇焦枯無潤澤
　服地黃煎
胆痺熱口苦
　服龍胆湯
膀胱熱不已口舌生瘡咽喉腫
　服升麻煎
多食肉口臭不欲聞穢惡
　服升麻黃連丸
冬月唇乾拆血出
　用桃仁搗爛以猪脂調塗
飛絲入口舌間生泡此最可畏
　用紫蘇葉方
唇上生惡核腫起
　服獨活散不愈再用松脂方
唇上腫破
　服五福化毒丹
唇吻惡瘡
　服黃連散
緊唇燥裂
　服橄欖散

舌腫硬
服百子霜
舌腫出血
用海螵硝方
舌生白瘡語聲不真
服薄荷蜜煎
舌腫懸尺許傷寒舌出數寸
用縮舌膏
舌出血不止名舌衄
服槐花散

舌腫起猪胞忽然碎破逡巡殺人
服百子霜
木舌滿口不急治殺人
服飛礬散
木舌舌腫
服玄參升麻湯
木舌
用半夏醋灌方
重舌
用角刺朴硝　等分　少許　研摻之

傷寒後不能轉攝舌出不收
用巴豆方
杏仁散
杏仁（湯泡去皮尖及雙仁麩炒黃色）麥門冬（去心）赤茯苓　黃連
地骨皮　山梔子仁　黃芩（各等分）右為末每服一
錢五分白滚湯調服
瓜蔞根散
瓜蔞根　胡黃連　黃芩（各三兩）白殭蠶（炒）大黃
白蘚皮　牛膝（研）　滑石（各二兩）右為細末研勻
每服二錢用竹葉煎湯調服

噙化丸
石膏（細研水飛）寒水石（細研）白蜜（各半斤）右用水四大盞
煎取一大盞半綿濾過入蜜同煎令稠丸如雞
頭實大常含一丸津嚥
含香丸
雞舌香　芎藭（各一兩）　藿香　甘松　當歸
香白芷　桂心　桂花（各半兩）零陵香（三分）丁香
麝香（研各一分）木香（三分）　肉豆蔻　白檳榔（各五枚）右
為末煉蜜丸如芡實大常含化一丸嚥津
地骨皮丸

地骨皮　桑白皮　山梔子　馬兜　黃芪（各等分）右為細末甘草膏和丸如芡實大每服一丸食後噙化

升麻黃連丸

升麻　青皮（各五錢）黃芩（酒洗）黃連（各二兩）生姜　生甘草　檀香（各二錢）右為末水浸蒸餅為丸如彈子大每服一二丸不拘時細嚼白湯送下

地黃煎

生地（搗汁半升）麥門（冬生去心）萎蕤（各二兩）生天門冬（搗汁半升）黃芪　升麻（各一兩半）生甘草　細辛　川芎　白朮（各一兩）右剉綿裹酒浸一宿以猪脂二片煎至藥令焦綿濾去滓納鍋中後下地黃門冬汁熬令調磁器盛每服半匙不拘時噙嚥下

走馬散

山梔子（不拘多少）右為細末吹入口中

龍膽湯

龍膽草　黃連（各四錢）人參　天門冬　知母　黃芩（各七分）柴胡（一錢）山梔子　麥門冬　五味　甘草（各五分）右為細末每服五錢水一鍾半煎至七分不拘時服

蘆薈湯

蘆薈　青蒿（研）蟾酥　羊蹄花　白礬　麝香（研）牛黃（各等分）蝸牛　瓜蒂（二十枚）丁香　細辛（去苗）丹砂（研各一分）馬牙硝（三分）熊膽（研一錢）右為細末研勻先以頭髮裹脂於溫水內蘸脂之軟帛挹却膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈看病大小以意加減用之

升麻煎

升麻　玄參　射干（各四兩）薔薇根白皮（四兩）大青　黃檗（各三兩）右水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎一二沸

蟾酥方

蟾酥（溫用）以線惹日曝乾剪半寸含之有涎即吐出如牙疼即咬之立瘥

定齋洗足法

右以白礬為末湯化洗足愈為度

加味龍石散

龍腦（半二錢）寒水石（四兩）硃砂（飛研二錢）馬牙硝（風化一錢）鉛白霜　蓬砂（各半錢）甘草（五分）右研細末用少許摻患處吐津[illegible]嚥不妨

紫蘇葉方

用紫蘇葉細嚼白湯嚥下即愈

黃連散

黃連　朴硝　白礬（各半兩）　薄荷（一兩）右為末用臘月黃牛膽將藥入内風頭掛兩月取下如有口瘡將藥研細少許摻瘡上去其熱涎即愈

口瘡方

生半夏為細末醋調貼脚心中神効

海螵蛸方

海螵蛸　蒲黃（各等分）右為末以井花水調敷

玄參升麻湯

玄參　升麻　赤芍藥　犀角　桔梗　貫仲　黃芩　甘草（各等分）右每服四錢水一鍾半煎七分去滓不拘時服

黃連散

黃連（一分）　乾姜（炮半分）右為細末每用少許敷瘡口上不過三次愈一方有膩粉

橄欖散

右用橄欖不拘多少燒灰為細末以猪脂和塗患處一方用核中仁細研敷之

五福化毒丹

玄參（洗焙）　桔梗（各二兩）　人參（五錢）　茯苓（一兩半）　麝（一字）　馬牙硝（風化）　青黛（各一兩）　甘草（七錢半炒）右為末研勻煉蜜為丸如皂角子大以金銀箔各四十片為衣每服一二丸薄荷湯化下如口臭生地黃汁化下食後服

重舌方

皂角刺（燒）　朴硝（少許）右研勻先以手蘸水擦口内并舌上下將藥摻舌上下涎出自消

獨活散

獨活　桑寄生　犀角屑　漢防已　升麻　沉香　大黃（炒）　連翹（各三錢）　甘草（五錢炙）右剉每服三錢水一鍾煎六分去滓不拘時温服

半夏醋灌之

用半夏醋煎灌至嗽吐出涎即瘥如不愈再用

飛礬散

飛礬散

白礬（枯過）　百草霜（各等分）右為細末撚糟茄自然汁調若口噤挑開灌之妙

薄荷蜜煎

薄荷（取汁熬）白蜜（各等分）右以生姜片先蘸水揩洗後用二味煎服之一方用生姜揩洗後竟用硃砂蓬砂雄黃腦麝為末敷之良久未効更加玄明粉

百草霜散

右用釜下墨末以醋調厚傳舌上下脫去更傳須臾即消若先决去血汁更傳之尤佳凡此患人皆不識或醋治益困殺人甚急但看其舌下自有噤垂形狀如螻蛄或如卧蠶子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自消

縮舌膏

右用片腦成片頓於舌上三四次合就無事

巴豆方

右用巴豆一枚去油取霜用紙撚捲之納入鼻中舌自收

槐花散

槐花（不拘多少）右曬乾研末傳舌上或人炒出火毒為末傳如舌腫用蒲黃末乾摻之

松脂方

松脂（半兩）赤小豆　大黃　白歛（各錢）一　右為細末鷄子白調塗唇上

柴胡湯（見傷寒門）

理中湯（見傷寒門）

瀉黃散（見火熱門）

涼膈散（見火熱門）

桔梗湯（見火熱門）

鼻門（有十五名外附三條）

鼻乃肺之竅清氣出入之道路若氣和平陰陽升降則呼吸通利鼻知香臭矣心肺有病而為不利也或六淫七情內外所干則鼻氣不得宣通清道壅塞而為病也凡此症全要驗其內外結邪之微甚宜以辛温辛凉之藥可也

鼻塞聲重

傷則為二病○服細辛散

鼻淵

胆熱移於腦辛頞則為濁涕不止○用腦漏方

鼻疳䘌

氣壅熱留日久則為鼻疳腐潰汁臭○服椿根湯又用藍綻

鼻嚏

心火邪熱或風干肺胃鼻中痒而發噴之聲不因風熱而作嚏者乃胃中志和而氣達

酒齄鼻

因酒熱毒積久於上為酒齄鼻○用生硫黃方

鼻痛

服白芷散

鼻衄

服小薊湯

鼻流不通

服辛黄散

鼻清涕

服川椒散

鼻內生息肉

用鼻痔方

鼻瘡

服辛夷膏

鼻中䐜脹

服[illegible]

鼻癰

服黄白散

鼻痔

用鼻痔方

鼻從鼻中縮入腦中介介痛不止

服脂膏方

治鼻塞不聞香臭

服麗澤通氣湯

治鼻口急痱餌数日欲死

右用藍靛傳之令遍日十度夜四度立瘥

治卒食物欲從鼻中縮入腦中介介痛不出

用牛脂如指頭大入鼻中吸取脂入裡須臾飲食隨脂出

防風散

防風（去芦两半） 麦門冬（去心） 甘草（炙） 川芎 黄芩 人参（各一两） 右為末每服二錢食後葱茶調服

小薊湯

小薊一把水三升煑取一升去滓温服曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫满恐死夜疼痛不能眠煑大薊根汁服之立瘥一方為末酒調服

蒺藜汁方（治鼻塞多年不聞香臭清水出不止）

右取當道經過蒺藜汁一把搗以水三升煎取熟先仰卧使人满口含飯取一合汁灌鼻中使入不過再度大嚏必出一两箇息肉以赤蛹虫

一方有黄連等分同煎

鼻痔方

明礬（一两） 萆麻（七箇） 塩梅（五箇去核） 麝香（少許） 右搗為丸綿褁塞鼻内令著息肉候化清水出四邉自然玲瓏其息肉自下

地龍散（治鼻中息肉）

地龍（去土炒一分） 猪牙皂莢（一挺煆存性） 右為末先洗鼻内令净以蜜塗之數藥少許在内出清水盡其息肉自除

生硫黄方

生硫黄（半两） 杏仁（二錢半） 輕粉（一錢） 右為細末用酒餅藥調卧時塗上早則洗去数次絶根

華澄茄丸（治鼻不通）

華澄茄（五錢） 薄荷葉（三錢） 荊芥穗（三錢半） 右為細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時噙化一二丸

通草膏

通草 附子（炮） 細辛（各等分） 右為細末煉蜜和丸如棗核大綿裹塞鼻内

腦漏方

生附子為末煨葱汁調塗足心褁脚布裹之

白芷散

白芷為細末葱搗為丸如小豆大每服二十丸茶清送下

辛荑膏

辛荑　川芎　細辛（洗去泥）　木通　防風

藁本　羌活　升麻　白芷　甘草

（各等分）右為末每服二錢茶調下

川椒散　灑澤通氣散

開末卷　開末卷

細辛散　辛荑散

開末卷　開末卷

黄白散　樁根湯

開末卷　開末卷

牙齒門（有十五名）

齒乃骨之餘腎經總司腎衰則齒豁精固則齒堅其上牙分與胃胃凡有疾是胃家之實熱下齒本經自屬凡有疾是腎之虛寒但其疾名狀雖多而病情不出虛实六淫之邪故病有惡寒作痛者有惡熱作痛者有惡寒惡熱作痛者有惡寒飲少熱飲多作痛者有惡熱飲少寒飲多作痛者有牙齒動搖作痛者有牙齒袒為痛者有齒斷為疳蝕缺少血出為痛者有断腫為痛者有脾胃中風邪[illegible]惡風作痛有胃中氣少不能任寒袒露其齒作痛者有牙齒疼痛穢氣不可近者其痛既各不同其藥亦各有異耳

○不治症（名）

走馬牙疳

○治法

凡齒痛先用立効散

走馬牙疳一時腐爛即死

用婦人溺桶中白垢火煆一錢銅緑三分氷片一分再研敷之不愈再用走馬牙疳方

一多一一、 册 續修四庫全書 參 2 版反夕

牙縫出血

用槐樹嫩葉杵爛敷牙閒上

風蛀牙疼

服三因玉地散〇又方用天仙子燒烟以竹筒

抵牙引烟薰之其虫即死

風寒濕牙疼

服羗活湯

風毒牙疼

服獨活散

寒熱牙疼

服當歸龍胆散

大寒犯腦牙疼

服白芷散

熱多寒少牙疼

服麝香散

胃虚風熱牙疼

服梧桐淚散

因服熱藥牙疼

服甘草飲加黃連

虫蛀牙疼

服竹堂方

齒痛血出不止

服調胃湯

腎虚牙疼

服八味丸

打動牙齒

服蒺藜散

牙根腫

須用刺出血如血汚難刺烙鐵物烙其齒

取牙不犯手

用本事方

常日牢牙法

用香鹽散

取牙落不犯手方

草烏　蓽撥（各七錢半）川椒　細辛（各一兩半）右為

末每用少許揩在患處其牙自落

八味丸

即六味地黃丸加

調胃湯

即調胃承氣湯為末蜜丸服之

三因玉地散

地骨皮　白芷　升麻　防風　細辛

藁本　川芎　當歸　槐花　甘草

（各半分）右為末用少許揩痛處取二錢水半鍾加

黑豆半合姜三片煎湯漱

獨活散

獨活　羌活　川芎　防風（各五錢）細辛

荊芥　薄荷　生地黃（各二錢）右為末每服

三錢水半鍾煎漱口嚥之

蓽撥散搐藥

蓽撥　良姜　胡椒　細辛（各等分）右為

末每少許含溫水隨通處鼻內搐按此（足少陰太陰藥）

白芷散

草豆蔻　麻黃（各半錢）黃芪　升麻（各一錢）熟地

當歸（各五分）吳茱萸　白芷（各四分）藁本（三分）桂枝

（二分半）羌活（八分）右為末溫水漱淨以藥擦之

胡桐淚散

胡桐淚　石膽礬　黃礬　蘆薈（各五錢）朱砂

細辛　當歸　川芎　牛膝（各二錢半）麝香

亂髮（灰各一錢）升麻（五錢）右為末先以甘草湯漱口後

用藥少許敷之以常用少許擦牙去風熱消腫

化毒牢固永無牙宣疳血之病

當歸龍胆散

草豆蔻　草龍膽　升麻　黃連（各二錢）白芷

骨灰　當歸尾　生地（各五分）麻黃（一錢）右為末

每用少許擦之

立效散

小椒露　蜂蜜　青鹽（各等分）右為細末煎數

沸熱嗽口即止

羌活湯

麻黃（去節三兩）羌活（一錢半）草豆蔻（一錢）柴胡（五錢）升麻

蒼朮（各五分）防風（三分半）當歸身（六分）細辛（少許）白芷

官桂（各三分）藁本（三分）羊脛骨（燒灰二錢五分）右為末先

以溫水嗽過擦之

蒺藜散

蒺藜根（燒灰）研細末敷痛處

香鹽散

大香附子（炒令極黑三兩）青鹽（半斤另研）右為細末如常

法擦用

麝香散

麻黄根（一分）草豆蔻　黄連（各一錢）益智（二分半）當歸
生地黄　漢防巳（酒製）人参（各三分）骨灰（二錢）升麻
熟地（各二分）麝（少許）右為末擦之

清胃散

升麻（一錢）牡丹皮（五分）生地黄（酒製）當歸（各三分）黄連
（三分）右為末作一服水煎冷服

神功丸

黄連（酒製）砂仁（各半兩）生地黄　甘草（各三錢）木香
藿香葉　歸身（各一錢）升麻（二錢）蘭香葉（如無藿香代之）
（一錢）右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服百丸

至二百丸白滚湯送下

走馬牙疳方

鮮明銅綠不拘多少入乾鍋內炭火燒令赤傾
出好酒伴勾冉入鍋內熬數次待色紅為細末
入麝少許研勻先水漱口以藥些少敷牙患處
涎即吐出

甘草飲（見火熱門）

竹堂方（[illegible]）

痓門（有六名）

諸痓項强筋勁强直而不柔和屬濕諸暴强直搐搦其筋勁强有力不柔和屬風然燥金主於緊歛短縮勁急且人之筋各隨經絡結束於身因內氣血兩虛外為風濕及寒熱所中而成痓也風能散氣故有汗不惡寒名曰柔痓又名陰痓寒能泣血故無汗而惡寒名曰剛痓又曰陽痓傷寒汗下過多病瘡之人產婦及吐血失血溫病熱入腎中小兒癇病熱盛或因七情怒氣或因濕熱內盛痰涎壅滯經絡悉可以成痓隨症而治不可不察也

○總脉

脉浮緩無汗寒　　脉浮緊有汗風

脉來沉細是濕

○不治脉

脉來滄滄如蛇（是無胃氣）

○不治症

產後痓汗出如雨

○治法

凡外邪作痓用風濕藥

凡內症作痓補血實脾平肝清痰去濕

凡痓氣血內氣四氣外襲不可作風治

凡痓大率與癇相似比癇更甚為虛帶補

凡痓氣虛有火熏痰用人参竹瀝之類可用風藥黑瘦人去参用白术

凡諸痓項強皆屬濕亦有痰者

剛痓

寒邪流血故無汗惡寒○服神术湯

柔痓

風邪散氣故有汗不惡寒○服白术湯

胸滿口噤脚攣急咬齒

服大承氣湯

産後成痓

用輕擧敗毒散

汗後中風成痓

用輕擧敗毒散

因發汗過多成痓

用防風當歸湯

神术湯

羗活　獨活　麻黄　白术（各等分）右用水二鍾煎至八分熱服

白术湯

白术　黄芪　桂心（各等分）右用水煎服

輕擧敗毒散

荊芥穗不拘多少微炒為末大豆卷栢熱酒浸去卷栢取汁調荊芥末四錢飲之其効如神

防風當歸散

防風　當歸　地黄　川芎（各一兩）右分作四服每服水二鍾煎至一鍾服

大承氣湯（見脾門）

痿門（有七名）

濕熱傷筋筋不能束骨謂之痿若喜怒勞役寒濕之氣致內精血虛耗榮衛失調發為寒熱使皮肉筋骨痿弱無力以運動而成痿狀似柔風脚氣相類以脉症并所因別之柔風脚氣乃外因也凡痿躄內臟不足之氣所為大抵痿弱之由多因肺熱脾虛肺經不虛何熱之有脾氣不虛則宗筋潤而能束骨何痿之有哉

○總脉

脉大為熱　脉澁為濕

脉滑為痰　脉緩為虛

○治法

濕熱成痿

腰以下軟弱癱瘓不能動履○服清燥湯

脾胃虛成痿

四肢軟弱不能行履○服藿香養胃湯

皮痿

肺熱其症色白毛髮落○服鹿角丸

脉痿

心熱其症膝樞紐如折不相提挈脛筋縱緩不能任地色赤或悲哀陽氣內傷尿血大筋空虛發為肌痺傳為脉痿○服鹿角丸

筋痿

肝熱其症口苦筋膜乾筋急攣兩手無力色蒼爪枯或思慮無窮所願不得房勞太甚宗筋弛縱為白濁傳為筋痿○服鹿角丸

肉痿

脾熱其症口渴肌肉不仁色黃肉蠕動○服鹿角丸

骨痿

腎熱其症腰脊不能舉骨枯髓減色黑齒槁○服鹿角丸

鹿角丸

熟地黃（四兩）麋角（鎊一片重用酒浸一兩）大附子（生去皮臍兩半）

右用大麦米二升以一半鋪底以一半盖上以三布巾隔覆炊一日取出藥與麦別焙乾為末浸藥酒添清酒煮麦粉為糊搜和杵三千下丸

如桐子大每服五十丸食前温酒或米湯送下

健步丸

漢防巳（一兩）川烏（炮去皮）苦參（酒各一錢）瓜蔞根（酒洗）羌活
滑石（炒）柴胡　甘草（炙）肉桂（各五分）防風
澤瀉（各三錢）右為末酒糊和丸如桐子大每服七
十丸空心食前酒送下

藿香養胃湯

藿香　白术　白茯苓　神麯（炒）烏藥
縮砂　半夏麯　薏苡仁　人參（各半錢）甘草
蓽澄茄（各一錢）右水二鍾姜五片棗一枚煎一鍾

補肝湯

黄芪（去芦錢半）白茯苓（去皮）人參（去芦）乾葛　猪苓
升麻（各一錢）柴胡（去苗）當歸身　羌活　連翹
黄蘗（炒）澤瀉　蒼术　神麯　知母
防風　甘草（炙）陳皮（各五分）右作一服水二
鍾煎至一鍾空心熱服忌酒濕麪

五痺門（有三十名）

風寒濕三氣合而為之痺風勝為行痺又名風痺寒勝為痛痺又名寒痺濕勝為著痺又名濕痺其名有五由三氣客於五臟而成痺也痺之為病或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕凡痛者寒多也不痛不仁病久邪深榮衛凝塞經絡不通皮膚不營因而不痛不仁也治法當明其三氣入於何經或表裏虗實偏勝推其因詳其症果因三氣為病隨經而治不因三氣為痺而為他病當從他病而治切不可一槩施之

○總脉

右寸沉遲澁為氣痺　浮為風痺
左寸脉来結為血痺　濡為濕痺
右関脉澁舉按無力為肉痺　遲為寒痺
左関絃緊數浮沉有力為筋痺　數為熱痺
右関脉来滑為痰痺為虗痺

○辯分痺症法

麻木　麻是氣虗木是濕痰死血
痒　痒是血不能營於肌腠也

痛　痛是四肢走痛風熱血虛

節痛　肢節腫痛是火濕兼風寒

臂痛　肩臂冷痛上焦濕熱橫行

攣急　因感濕氣右手疼痛攣拳

項強　脛項強直微痛是痰熱也（痰熱入於膀胱）

轉筋　筋轉微痛是熱氣爍於筋

〇治法

凡痺症發陰兩三九月麻木或不仁或痛或不痛或筋縮或不縮寒即重行熱則縱緩皮痺不已成肉痺肉痺不已成脉痺脉痺不已成筋痺筋痺不已成骨痺人而不已則難治

凡痺切不可用過山龍劫藥如用反虛病深

凡治痺蒼朮南星川芎當歸酒炒為主藥在上加羌活桂枝桔梗葳靈仙在下加牛膝防己木通黃栢

凡痺痛有常處赤腫灼熱或壯熱此欲成風毒宜用敗毒散

凡痺痰帶濕熱者先用舟車丸下後以二陳湯五苓散加黃芩

凡痺氣血兩虛有痰渴陰火痛風用人參山藥海石南星各一兩白朮熟地黃栢龜板酒炙各二兩乾姜炒黑瑣陽各三錢右為末酒糊丸服

凡痰痺用二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮（亦治臂痛）

凡濕痺用蒼朮白朮薏苡仁佐以竹瀝及降氣之藥

凡風痺用小續命湯極驗

凡寒痺用　附子炒乾姜之類

凡血虛痺用川芎當歸佐以桃仁紅花

凡氣虛痺用人參白朮之類

凡瘦人痺是血虛與熱脉必澁宜用當歸紅花桃仁牛膝檳榔

凡肥人痺是濕痰流注經絡脉必滑

凡痺症須分腫與不腫

凡痺症不可食肉厚味不遵守禁戒變小便不通痞悶之症雞魚腥豉麪酒醋皆可斷之

凡十指麻木胃中有痰如濕熱下陷血分目閉渾身麻木痰在血分亦如是

麻痺

皮膚麻木用四君子湯隨症加減

閉目麻木四肢無力瘦弱醋心目昏頭眩〇用

衝和補氣湯

痒痺

四肢或體膚痒〇用四物湯加黄芩煎調浮萍

末送下或用防風通聖散

痛痺

四肢走痛関節浮腫〇服茯苓川芎湯

下部有濕腫痛

用防巳龍胆草酒炒黄栢知母水煎空心服如

肥人加蒼术白术南星滑石茯苓之類

上中下部

用黄栢炒蒼术米泔炒南星神麯炒川芎防巳

白芷桃仁葳靈仙酒洗桂枝（橫行手臂）羌活龍胆草

紅花各等分為末糊丸食前下一百丸

一身兩脇盡痛

服控涎丹

氣血兩虚痛

有濕痰陰火乘氣血虚作痛〇用人参山藥海

石南星各一兩白术炒熟地黄栢炒黒龜板酒

炙各二兩乾姜燒灰瑣陽各五錢為末酒送下

筋骨痛

用黄栢炒蒼术炒表實加酒少許肥白人加白

木血虚加當歸痛甚加姜汁煎服

肢節痛

用麻黄去節芍藥各一錢防風荆芥羌活獨活

黄芩枳實川芎煎服

脚跟痛

用四物湯加知母黄栢炒牛膝肉煎服

肩臂痛

用薄桂少許半夏白术南星香附甘草羌活各

一錢陳皮茯苓葳靈仙蒼术各五分姜三片水

煎食後服

傷筋痛

因人提挈傷筋作痛〇用人参黄芪甘草川芎

芍藥熟地黄阿膠各等分白姜黄些少為引用

烏藥姜棗煎服

轉筋

用四物湯加酒炒黄芩紅花

攣急

用二陳湯加金毛狗脊[illegible]芎升麻如脚攣

拳用當歸拈痛湯加杜仲黃栢川芎白术枳殼

項強

用二陳湯加黃芩羌活紅花煎服

風痺（又名行痺風勝故也）

游走上下無所留止弛縱筋脉不收○服循絡丸

寒痺（又名痛痺寒勝故也）

汗多四肢緩弱皮膚不仁神昏○服觧痺湯

濕痺（又名着痺濕勝故也）

用蒼术白木澤瀉羌活枳實甘草

熱痺（又名脉痺）

其症熻然而悶肌肉熱極體上如鼠走之狀唇口反壞皮膚色變○服升麻湯

氣痺

因憂愁喜怒過則傷氣結成胸腹痺不能注下腰脚重不能行或不言或溺塞則痛流則麻右寸脉沉遲澁

血痺

遇夏得其症煩心心下鼓氣暴氣上逆喘嗌乾喜噫厥脹○服枳實散

皮痺

遇秋得其症皮無所知煩滿時嘔氣奔痛○服當歸湯

肌痺

仲夏得其症四肢怠惰發咳嘔汁○服黃芪丸

筋痺

遇春得其症筋攣夜卧驚恐飲多小便數小腹痛如懷胎○服人參散

骨痺

遇冬得其症骨重不可舉善脹尻以代踵脊以代頭○服白附子丸

胞痺

其症小腹膀胱按之內痛而滿水道不化上為清涕○服腎瀝湯

腸痺

其症数飲中氣喘息時作飱瀉小便不通○服吳茱萸散

胸痺

喘息不通心下堅痞急痛徹背短氣煩滿自汗○服利膈散

支飲亦能令人痺

其症手足痲多睡眩冒○服茯苓湯

三氣合病

其症皮膚頑厚肌肉酸疼積年不巳成癮疹風瘡搔之不痛頭髮脫落○服黄芪酒

枳實散

枳實（炒）　肉桂　細辛　桔梗（各三錢）　青皮（炒一兩）右作三服每服水二鍾姜一片煎八分服

黄芪丸

石斛（去根）　附子（炮去皮臍）　肉蓯蓉（酒洗）　益智（去皮炒）　黄芪（[illegible]四）

白朮（炒）　人參（各兩）　厚朴（姜汁炒）　[illegible]子　當歸

白豆蔻　枳實（炒）　良薑（製）　[illegible]（各三錢）　丁香

吳茱萸（湯泡[illegible]炒乾各五錢）　訶黎勒（炮[illegible]）　右為末蒸棗肉搗丸梧桐子大每服二十丸食前酒送下

黄芪酒

黄芪　附子（炮去皮臍）　獨活　防風　細辛

牛膝　川芎　甘草（各三兩）　川椒（去目閉口炒汗三兩）

秦艽　川烏（炮去皮臍）　山茱萸（去核）　葛根（各二兩）　肉桂

大黄（各一兩）　當歸（二兩半）　白朮（炒）　乾姜（炮各一兩半）　石斛

片以絹袋盛貯以酒二斗浸之春夏浸十日秋冬浸十四日初服一合日服二次夜進一次虛弱者加肉蓯蓉（二兩）下利者加女萎蕤（三兩）

白附子丸

白附子（煨）　乾蝎　肉蓯蓉（酒浸）　海銅皮　防風

威靈仙　獨活　補骨脂　萆薢（酥炙）　天麻

天雄（炮去皮臍）　當歸　丹參　黄芪（各三錢[illegible]五分）

肉桂（二錢）　雄黄（五錢）　安息香　白花蛇（酒洗去皮骨）

牛膝（酒洗炒各一兩）　右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸白滾湯送下

當歸湯

當歸　防風　黄芪（各二錢）　黄芩　細辛

人參　麻黄（去根節煎二三沸去沫各一錢）　杏仁（炒去皮尖五粒）

肉桂（三分）　柴胡（八分）　半夏（五分）　右作二服每服水二鍾姜三片煎至七分不拘時日服三次

萆薢丸

萆薢（酥炙）　牛膝（酒洗）　熟地黄　山茱萸（去核）　山芋

澤瀉（各一兩）　狗脊（去毛）　地膚子（炒）　白朮（各五錢）　蠐螬

乾漆（燒烟尽）　天雄（炮去皮臍）　車前（各三錢）　茵芋（去皮一錢）　右

除蠐螬生研外搗為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸至十五丸空心酒送下一日服三次

循絡丸

五靈脂　敗龜板（酥炙）沒藥（另研）　乳香（另研）　虎骨
當歸（各二兩）　白附子（炮）天麻（酒浸焙）　全蝎（去毒炒）南星
附子（炮去皮臍）川烏（炮去皮尖）杜仲（去粗皮炒）　地龍（去土炒）續斷
牛膝（酒浸一宿）葳靈仙（去苗）烏蛇（酒浸肉焙）肉蓯蓉（酒炙）硃砂（另研各一兩）

右為末酒煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前酒送下

吳茱萸散

肉豆蔻　乾姜（炮）　甘草（炙）　吳茱萸（湯泡焙各五錢）
宿砂仁　陳麴（炒）　白术（各一兩）陳皮（去白焙）　良姜
厚朴（去皮姜汁炙各二兩）

右為末每服一錢食前用米湯調服

腎瀝湯

麦門冬（去心）五加皮　犀角（鎊各一兩半）桑螵蛸（十枚切炙）

右每服五錢水盞半入羊腎一箇去脂膜切細竹瀝少許同煎至一盞去滓空心頓服日二服之

一方用桑白皮無桑螵蛸

利膈散

人參（去芦）　赤茯苓　前胡（各一兩）乾姜（炮）　桂心
甘草（炙各五錢）陳皮（去白焙）　訶梨勒（去核）白术（各三分）

右[illegible]

末每服五錢水一大盞姜三片煎至三分去滓不拘時頻頻溫服

人參散

人參（二兩）　杜仲（去粗皮炒）酸棗仁（微炒）黃芪（各兩）　五味
細辛（去苗）　熟地黃　秦艽（去苗土）羌活（去芦）　丹砂
芎藭（各五錢）茯神（去木一兩）

右除丹砂另研細末入前藥末再研令勻每服一錢不拘時用溫酒調服

舟車丸

大黃（二兩）　甘遂　大戟　芫花　青皮
陳皮（各一兩）牵牛　木香（各半兩）

右為末水和丸如梧桐子大每服七十丸空心白滚湯送下隨症加減服

蠲痺湯

當歸（去芦酒浸）赤芍藥　黃芪（去芦）　片姜黃　羌活
甘草（炙各二錢）

右作一服用水二鍾生姜五片紅棗一枚煎至一鍾去滓不拘時服一方加防風二錢

茯苓川芎湯

赤茯苓　川芎　桑白皮　防風　官桂
麻黃　芍藥　當歸　甘草（炙各等分）

右用

水二鍾紅棗二枚煎至一鍾空心熱服欲汗以姜粥投之汗出為度

升麻湯

升麻（二錢）　茯神（去皮）　羚羊角（鎊）　犀角（鎊）　防風　人參　羌活（各錢半）　官桂（一錢）　右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓入竹瀝少許不拘時

二陳湯（見痰飲門）　衝和補氣湯（開卷末）

四物湯（見諸血門）　防風通聖散（開卷末）

五苓散（見泄瀉門）　小續命湯（見中風門）

控涎丹（見中風門）　敗毒散（開卷末）

茯苓散（開卷末）

脚氣門（有十三名）

此門與濕門互相查考治病

脚氣者即是脚腫有南北之分四時之中或久坐久立濕地或因酒醉汗出脫衣洗足當風取涼皆可以成脚氣南方地土卑濕霧露所聚由血氣衰弱則腠理踈清濕襲虛病起於下自外而入也江東嶺南大率如此北方地高居大寒風處啗飲湩酪肉食凡飲者以飲多飲速為勝乳酪醇酒濕熱之物其濕之性潤下氣不能呴故下注於足積久

而成腫滿疼痛軟弱自內而出也脚氣不專於一氣或兼表虛而得或兼氣血虛而得或兼風寒暑濕而得或因七情之氣鬱積而得醫者診視果決而治之

○總脉

浮緊為風　遲濇為寒　濡細為濕

洪數為熱　微滑為虛　牢堅為實

○不治脉

左寸乍大乍小乍無　左尺脉絕

○不治症

脚氣攻心則恍惚謬忘嘔吐食不下眠不安左寸脉乍大乍小死

脚氣入腎則腰脚軟小便不通呻吟喘目額黑胸煩左尺脉絶死

○辯驗脚氣法

初得脚氣不覺因他病始發發時一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔或奄奄然大悶經兩三日方覺之先從脚起或緩弱或痺或行起忽倒或兩脛腫滿或足膝枯細或心中驚悸或小腹不仁或擧體轉筋或見食吐逆惡聞食氣或胸膈氣急或遍體疼疼凢其候也諸脚氣令人脚脛大脚趺腫重悶甚則上衝心腹滿悶短氣

○禁戒

嗔怒　猪肉　生菜　桃子　戒色慾

多語　雀肉　生葱　李子　遠濕地

露足當風　夏月閉護　酒酪少飲

冷水洗足　遠濕衣被　用藥淋洗

○脚氣止痛法

用草麻子七粒去殼研如泥同蘇合香丸和勻成膏敷貼足心其痛立止

○治法

凡脚氣量人盛衰少加滋補藥不然氣血日衰必使年年遇蒸熱之氣復發不論南北男婦先服鷄鳴酒不愈隔半月再服神授方

凡脚氣濕從下須提起其濕在下之藥隨氣血用

凡脚氣東南二方之人自外而感

凡脚氣西北二方之人自內而起

凡脚氣壯人用凉膈散老人用八味丸虛人用枳實羗活當歸

凡脚氣煎洗用葳靈仙防風荊芥地骨皮川芎升麻䒭分煎湯浸洗

凡脚氣用藥末襯鞋底內用防風細辛草烏䒭分為末

乾脚氣

脚不腫漸覺枯燥皮膚甲錯○服神烏丸

濕脚氣

脚腫○服神烏丸

脚氣攻心

是血虛而受濕○用四物湯加黃栢又方以附子為末自己津調貼足心湧泉穴

脚氣轉筋而痛

是血受濕熱○用四物湯加桃仁黃芩黃連

脚氣有因痰積流注

用姜汁竹瀝南星蒼朮防己黃栢川芎白芷犀角檳榔牛膝

脚氣筋動於足大指上至大腿近腰結縮

是奉養太厚因風寒而作○用蒼朮南星如當腰者專主乎濕

太陽膀胱經脚氣

頭項腰脊皆痛○用麻黃湯

陽明胃經脚氣

寒熱伸欠鼻乾腹脹膝中循外皆痛○用大黃湯

少陽膽經脚氣

口苦脇痛面垢體無膏澤頭項痛○用半夏湯

已上膀胱胃胆三腑齊病明曰三陽合病寒熱關節重痛手足拘攣冷痺緩縱氣上嘔吐脉必浮緊弦數合前三方治之如二陽合病合前二方治之

太陰脾經脚氣

腹滿咽連舌急胸膈滿骨節煩疼四肢拘急浮腫○用六物附子湯

少陰腎經脚氣

上氣喘急小腹不仁腹脊足骨皆痛○服八味丸三十五粒

厥陰肝經脚氣

脇腰偏疼陰囊小腹夾髀各處脹痛○服神應養真丹

已上三陰經不合病臟腑不同故也

脚氣煩疼背沉重胸膈不利及偏疼下注於足脛腫痛○服當歸拈痛湯

神驗方

木鱉子每箇作两瓣麸炒切碎再炒用皮硝去盡油為度厚桂各廿分同為末用熱酒調服以醉為度盖覆得汗即愈一方名夢中神授方

木瓜丹

右用宣木瓜一箇杜大者亦可用去穰隔切去盖用好艾填在木瓜内須滿實却用盖覆竹簽

定飯甑蒸爛次下入羌活一两獨活二两附子炮半两同為末先搗木瓜令爛次下藥末搗為丸如梧桐子大每服三五十丸食前用温酒或塩湯送下

烏藥丸

草烏（不去皮）　白芍藥　威靈仙　北細辛　沒藥　木鱉子（去殻紙追去油各等分）　右為末薄糊丸如梧桐子大每服七丸至十丸食後臨卧木瓜湯下酒下亦可以身上覺麻痺即是効或未効加至十五丸量虛實不可妄增丸数亦不可於食前服之有草烏在內最忌服藥後食熱物衝動烏頭之毒則昏不知人矣

鷄鳴散

檳榔（七枚）　陳皮（一两）　木瓜（一两）　吳茱萸（二錢）　生姜　桔梗（各半两）　紫蘇莖葉（三錢）　右為末分作八服隔宿用水三大椀慢火煎至椀半去滓再用水二椀煎取一小椀两次以煎汁相和安頓床頭次日五更分二三服只是冷服冬月畧温亦得服了用餅餌壓下如服不盡留次日漸〻喫亦冷服藥天明大便當下一椀許黑糞水即是

神烏丸

金毛狗脊（炒去毛五錢）　牛膝肉（酒浸）　肉蓯蓉（酒浸各一两半）　虎脛骨（酥炙）　海桐皮　川萆薢　川烏（炮去皮臍切片炒令色变各一两）　右為末用木瓜膏子和丸如梧桐子大每服七十丸空心用温酒送下

神應養真丹

當歸（酒浸）　白芍藥　熟地黄　天麻　川芎　羌活（各等分）　右為末煉蜜丸如鷄子黄大每服一丸木瓜兎絲子浸酒下脚痺薏苡仁浸酒下中風温酒米湯下一方無羌活有木瓜炒阿膠

八味丸（見牙門）　六物附子湯（開末卷）

京膈散（見火熱門）　當歸拈痛湯（見中風門）

麻黄湯（見傷寒門）　蘇合香丸（開末卷）

四物湯（見血門）　神授方（即神験方）

半夏湯（開末卷）

識病捷法卷之八

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

急救門（有二十二名）

人之卒暴死於非命有可矜而不可憫之分如積德過厚之人或縱情嗜慾精血虧少神思昏迷以致困死魘死喜死笑死邪氣乘虛客於小腸卒死邪鬼襲着失志或有屈無伸投河自刎自縊情有可矜而急救之術可施若人之陰謀尅簿官府加

刑天神譴責以致失風落水自縊自刎縱於口福食盡天祿饑寒無柰至於凍死魘死驚死哭死情不可憫法不可宥而廻生之策固有而不可與之治此門雖立人多忽之所以列於卷之前也

卒死

邪氣客於小腸經絡善令人卒死○用菖蒲灌

法

縊死

凡自縊死從早至晚雖已冷必可活從夜至早稍難若心下溫一日已上猶可救抱其身緩緩四肢直口噤冷氣入臟陽氣暴絕以大器中多熬灰煖囊盛煖灰縛置其心冷則更易心煖氣通目則得轉口亦能開可與溫酒飲之漸清少少粥之若不先溫其心便將火炙其身冷氣與火相搏恐難治耳如甦服生姜陳皮各一兩水三鍾煎鍾半分三次溫飲不可熱亦不可冷

凍死

用氈或草薦裹之以索縛定放在平穩處令兩人對面輕輕袞轉往來如趕氈四肢溫即活仍灸臍中三五壯凡冬月凍倒人抬在煖處不得

就於熱湯及向火與熱湯必死雪泥中行便近火脚指隨落隨服生姜陳皮煎服法同前

淘井開塚傷人

五六七月井中極深塚中皆有伏毒之氣入則令人悶冒殺人先以鷄毛放井中試之如旋動不肯便下是有毒氣不可入古塚亦然若不得已而入用酒數升先洒井塚中四邊停少時然後可入若覺有些氣鬱悶奄奄欲死者取其中水洒人面亦令人飲之又以灌其頭及身軀即活若無水取其中土浸水用之服雄黃末一二

解繩切不可割斷放卧令人踏其肩以手提其髮常令一人緊以手揉胷脇散動之一人摩臂足屈伸之若已僵但漸漸足屈之及按其腹更以兩人筆管吹其兩耳又以手掩其口勿令透氣煎官桂湯少與飲及粥飲潤喉一飯時即氣口中出呼吸眼開勿苦勞動皂角細辛為細末吹兩鼻中刺鷄冠血滴看口中男用雌鷄女用雄鷄如救之不活用車載法用綿緊絞身體令堅以車載竹三十里許使人車上踏肩引髮如前

落水死

已經半日者取大甕覆地以死人腹伏甕上用微火于甕中燃之正射死人心下須臾死人心下覺覺煖水出盡即甦勿令過熱用不蛀皂角為細末以葱白絞汁或棗穰為丸如棗大內下部中其水自出皂末吹鼻中艾灸臍中百壯已經一宿救法先尿死人兩脚着生人肩上以死人背貼生人背擔足吐出水即活又方解開死人衣灸臍中即活

冬月落水死

錢如轉筋入腹欲死者用生姜一兩劈破酒五六盞煎令頓服又醋煮衣絮令微溫裹轉筋濃煎鹽湯洗手足胸脇間即甦

火燒傷人

被賊燒熏或火發煙熏燒壞欲死迷悶搗爛蘿蔔自然汁灌下咽即甦

困死

切勿以火照照之殺人但痛咬其足拇指甲際及多唾其面即活用菖蒲末吹兩鼻中桂末吹舌下

壓中魘死

用復生散即活

墻壁或重物壓傷人

用半夏泡去滑每用一粒為末吹入鼻中即活心頭溫者可治

蛇毒傷人

用青黛雄黃各等分研細末每服二錢新汲水調下

竹木刺傷人

見損傷門

湯火傷人
見損傷門

驚死
心下温者刺手少陽之源即是兌骨穴也乃是真心之源在手掌後兌骨之端陷中是穴用長針口中温暖刺入三分徐徐出針以手捫其穴

暴驚欲死
針下臁二穴在三里下二寸針入五分

憂死
無氣手足冷心腹口鼻温目中神彩不轉口中

無延舌外不縮可刺冷骨穴針入三分徐徐出針以手捫其穴人復活也

憂懼成疾
服人參半夏玄胡索炒各君肉桂甘草各臣乳香佐用水二鍾姜三片煎至一鍾食後服

喜死
四肢冷氣絶色不變者刺陽池穴用口温針勿冷針入三分徐徐出針以手捫其穴即復甦也

喜笑欲死
針列缺穴在手大指後背上三寸及大陵二穴

在掌後横紋中針入三分

笑死
凡口中有微氣心下温者用蒼鹽成塊者二兩火燒令通赤候冷研細以河水一大碗同煎至三五沸放温分三次服之後以鵝翎探其喉中吐去熱痰三五升後服黄連解毒湯三貼則笑自定人可保矣

笑脱下頦
用線纏綿毬二箇塞於左右牙床後用手托上

悲哭欲死

四肢冷身口温者可針人中穴三分徐徐出針
灸百會穴三壯可治

黄連解毒湯（見火門）　菖蒲灌法（見神鬼病門）
復生散（見卷末）

異症門（有二十九名）

怪異之症皆痰所為蓋緣氣血精元虧欠以致經絡空虛津液濁敗成痰壅滯或因熱甚生痰悉為異症總治之法必當豁痰為先次理其氣則為穩當矣

肉毬

口內生肉毬臭惡有根線長五六寸如釵股吐毬出得飲食食罷却吞其線以手輕捏痛徹於心○用麝香一錢研細食後水調服三日驗

腹上麻痺不仁

多煮葱白食之自愈

氣奔

遍身皮裡忽混混如波浪聲痒不可忍抓之血出亦不能解○服苦杖湯

血餘

手十指節斷惟有筋連肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠色○服胡黃連湯

手足甲忽然長倒出刺肉如錐痛不可忍○食葵菜自愈

肝脹

眼睛垂出至鼻痛不可忍或時時大便血出○用獨活濃煎數盞服之自愈

下痢熱毒病

眼赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮盡起○服磬散

應聲虫

腹中有物作聲隨人言語○服雷丸自愈

真假人

自覺自形作兩人並臥不別真假不語問亦無對○服長沙人參茯苓濃煎服之真者氣爽假者化矣

異虫上行

頭面發熱有光色佗人手近之如火燒○服

羊血生毛

食羊血過多遂生毛晝夜可長一二尺漸漸麤圓如繩痛不可忍摘去復生○服乳香硇砂各一兩為末飯和丸梧桐子大每服十丸空心臨臥各一服水送下

腸破腸出臭穢

急以油摸腸用手送入煎人參枸杞湯淋之皮自合吃羊腎粥十日即愈

傷寒併熱霍亂

忽然氣上喘不能言語口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉大則悶絶蘇復如是○服參黃湯

渾身生燎泡如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡破復生抽盡肌肉則不可治○服三稜散

大腸頭寸餘

用芝麻油浸臀腸又飲大麻子汁數升愈

肉壞

口鼻中腥臭水流以碗盛之有鐵色鰕魚如米大走躍手捉之即化水○任意食鷄肉月餘愈

腎肝熱病

兩脚心凸如腫上面生黑色豆瘡硬似釘頭履地不得脛骨碎髓流出身發寒惟思飲酒○用炮川烏末傳之煎韭子湯服之愈

筋解

四肢節脫但有皮連不能舉動○服黃蘆三兩酒浸取焙乾為末每二錢酒調下服盡即安

腹上麻痺

腹脹如石臍中出水變作虫行之狀繞身匝啄痒痛難忍撥掃不盡○濃煎蒼朮湯浴之及以蒼朮末入麝香少許水調服

血潰

眼白瞳仁渾黑見物如舊毛直如鐵線雖能飲食不語如醉○用五靈脂為末每服二錢食前酒調下

血注

遍身忽然肉出如錐痒痛不能飲食不速潰而膿出○用赤皮葱數莖燒灰淋洗喫豉湯三盞自安

脉溢

毛竅節次出血若血不出皮脹如鼓須臾眼鼻口被氣脹合矣○用生姜自然汁水合半鍾服之而安

眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不効○用蒜三兩擣取汁酒調下即愈

血自皮膚濺出○用煮酒甁上紙碎揉如楊花以手捏在血出處立止

因擲穿断舌心血出不止諸藥不能收者
用米醋以鷄翎掃所断舌處其血即止仍用真
蒲黄杏仁研末蓬砂少許蜜調稀稠含化而安

身上及頭面浮腫如蛇状者
用滴磚街上苔痕一錢水化開塗患處消之

肝胆病
眼前常見禽虫或飛或走以手捉之則無用羌
活玄明粉酸棗仁青箱子花各一两為末每服
二錢水一盞煎至一分和滓飲之服三次

有虫如蟹走皮下作聲如小兒啼為筋食之化

用雷丸雄黄各一两為末以豬肉一片掺藥在
上蒸熟喫盡其病自安

寒瘡
面上遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛
痒飲食减少久則透脛○多食鷄肉葱韭自愈

苦杖湯
苦杖　人参　青塩　白术　細辛
（各等分）右水二鍾煎至一鍾不拘時服

胡黄連湯
胡黄連（一錢）茯苓（四錢）右用水一鍾煎至七分不拘
時服

礬散
白礬　滑石（各一两研）右用水三鍾煎至一鍾分
作二服服盡乃安

参黄湯
人参　大黄（各五錢）右用水三鍾煎至一鍾熱
服

三稜散
三稜　蓬术（各五錢）右為細末每服二錢食前
温酒調下

癇病門（有十一名）

夫癲癇之病皆由驚駭使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成癲病屬之於心癇病歸於五臟令以風癇另立一門又以癲狂合為一門癇與痓其病狀相類而實不相同也癇病發身軟時醒其症隨痰而作故有時而醒痓病身強直反張如弓不時醒痓病挾虛故昏冒遂致亡者多矣小兒之癇有三風癇驚癇食癇也或在母胎中受驚或幼小感風寒暑濕或飲食不節更有陽癇陰癇六畜

癇重者死病後甚者亦死輕者用五色丸主之

○絕脉

洪長伏三脉服妙香丸

絃細緩三脉服五生丸

○不治脉

絃　虛　急

○不治症

神亂　目瞪如愚　病後甚者

尋衣　五癇重者

○治法

凡五癇屬痰火驚不必分治行痰為主用黃連南星瓜蔞仁痰與火要分多少如痰多必用吐法後用安神丸隨服涼藥清其心

凡癇病發不先目瞪如愚者用三聖散更用火盆於暖室中令汗吐下三法並行次用通聖散百日愈如若目瞪似愚者不可治

凡治癇前人用清心鎮墜之藥雖治熱清痰若有頑痰膠固此藥難除病在上必先用嘔吐後方宜服此劑如痰實在裡亦須下之

風癇

緣衣暖汗出風入初時先屈指如數乃　是外因○服猪心湯

驚癇

起於驚怖夜啼乃作是內因○按圖灸之

食癇

先不哺乳吐而變熱後發熱凡先寒後熱者皆食癇也○服紫霜丸

已上三癇是小兒症

五癇（發則旋暈顛倒口張相引目睛上搐手足搐搦背脊強直食頃乃甦）

馬癇

作馬嘶鳴是心病

羊癎

作羊叫聲目瞪吐舌是心病

鷄癎

作鷄叫聲反折手縱是肺病

猪癎

作猪叫聲如尸吐沫是腎病

牛癎

作牛吼聲目直視腹滿是脾病

犬癎

作犬吠聲反折上竄是肝病

陰癎

先身冷不驚掣不啼呼病發時脉沉病在五臟在骨髓為難治〇用温平補胃燥痰之藥治之

陽癎

先身熱掣後驚啼呼與而後發癎脉浮病在六腑在肌膚易治〇用寒藥攻治之

安神丸

茯神（三兩）　人參　地骨皮　麦門冬　桑皮
甘草（各二兩）　馬牙硝（二錢）　硃砂（二錢）　牛黄（五錢）　麝香

龍腦（各三錢）　烏犀（一兩）　金箔（三十五片）　右為極細末煉蜜丸如圓眼大金箔為衣冬月温水化下夏月凉水化下二三歲者日進二服小兒一丸分二服虛痨發熱咳嗽新汲水化下半丸

五色丸

硃砂（五錢研）　真珠末（一兩）　鉛（三分同水銀研）　水銀（一錢乳鉢內茶匙研）
雄黄（一兩）　右為末煉蜜丸如麻子大每服三四丸薄荷湯送下

五生丸

南星　半夏（各姜汁炒）　大豆（炒去殼）　白附子（炮去皮臍）
川烏（炮去皮臍各一兩）　右為末水丸綠豆大每服三丸至五丸不過七丸以姜湯送下

礬丹（五癲五癎無分陰陽冷熱）

黄丹　白礬（各一兩）　用磚鑿一窠可容二三兩許先安丹在下次安礬在上以炭五斤假人炭盡取出細研不經水猪心血為丸如菉豆大每服十丸至二十丸陳皮湯送下

三癎丸（治小兒一百二十種驚癎）

荊芥（二兩）　白礬（一兩半生半枯）　右為末麵糊丸黍米大硃砂為衣姜湯送下二十丸

三聖散

没藥（研）琥珀（研各一分）乾全蝎（七枚炒）右為末每服

三錢用鵝梨汁半盞皂角末一錢濃煎湯一盆

與梨汁相和勻調下須臾吐出涎毒而愈

通聖散（開卷末）妙香丸（見卷末）

猪心湯（開卷末）紫霜丸（開卷末）

癲狂門

有四名

原病式論重陰為癲重陽為狂素問云多病為癲

多怒為狂

○可治脉

脉來虚細

○難治脉

脉來實大

○治法

凡癲狂皆是熱多因痰結心胷治宜豁痰鎮心

凡癲狂有中邪者以邪治之

凡癲狂宜大下則愈

凡癲狂宜用吐法

凡癲狂宜用滚痰丸或三聖散吐之

治風癲狂亂走

用秦艽二两竹瀝一升石膏三两白茯苓两半

龍齒一两半玄参一两防風一两生鉄二十觔

用水二斗煮[illegible]一斗去鉄右藥入鉄水中再煎

至五升去滓入竹瀝和勻不拘時候温服二合

治邪癲狂大叫[illegible]走

用蝦蟆一枚大者去腸中滓洗净將腸胃却入腹中入瓶中鹽泥固濟以火燒通赤取出以上罨定隔一日取出入麝香一錢同研細末新汲水調服

治癲狂可畏數年不愈

用豬肚欝金真蜀地来者七兩明礬三兩為末薄糊丸如梧桐子大每服五十丸湯水任下初服覺心胸間有物脫去神氣洒拌再服少甦多服此藥能去痰

治諸癲風

用鯉魚一片製淨切成塊用明礬四兩為末醃一兩日煎食其疾必愈

三聖散

見癇病門

滚痰丸

見中風門

怔忡門（有三名）

怔忡者心胸不安跳動如人捕捉謂之怔忡此心血不足所致也

○總脉

寸口脉動弱為驚為悸　浮脉為胃氣虚

寸口脉緊浮滑是氣虚　微脉為陰血虚

○治法

凡怔忡屬血虚有痰

凡怔忡時作時止者痰因火動

凡怔忡瘦人是血少肥人多是痰循常人亦是痰時覺心跳是血少

怔忡

或因喜冨貴怕貧賤思所愛不遂漸成怔忡其症舌强恍惚喜憂悲少顏色○治宜專補心血四物湯安神丸之類加痰藥

勞役心跳

用硃砂（研）白芍藥（炒）當歸身（酒洗）栢葉（各三錢）川芎陳皮甘草（各一錢）黃連（炒錢半）右為細末豬心血為丸菉豆大溫湯送下

有六淫閉塞亦令人怔忡

服朱雀丸

朱雀丸

白茯苓（二兩）沉香（五錢）右為末蜜丸赤小豆大參湯送下三十丸

四物湯

見諸血門

安神丸

見癇病門

驚悸門（有三名）

驚悸者惕然恐怖謂之驚心下築然而動怯怯如人所捕謂之悸此因心虛胆怯精神短少或因痰所致耳

驚悸

或因事驚或聞虛響或見異怪登高涉險心神氣與痰鬱其症短氣氣體倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安〇用養心湯寧志丸

心虛膽怯易驚

用二陳湯加竹茹枳實水姜煎服

心氣鬱滯多驚

用菖蒲（一寸）半夏（一兩五錢）白朮　厚朴（各五錢）茯苓　紫蘇（各一兩）甘草（炙）　遠志（各四錢）右分為四服每服水二鍾姜三片煎九分食後服

養心湯

黃芪（蜜炙）　白茯苓　茯神（去木）　半夏麯　當歸　川芎（各五錢）　遠志（炒）　栢子仁　酸棗仁（炒）五味　人參（各錢半）　甘草（炒二錢）右分作四服每服水二鍾姜三片棗一枚煎九分服停水驚悸加檳榔

寧志丸

白茯苓　茯神（去木）　人參　栢子仁　當歸

遠志肉　琥珀　酸棗仁（熟酒拌隔紙炒各五錢）乳香

石菖蒲　朱砂（各二錢半）右煉蜜丸如梧桐子大每

服三十丸食後棗湯送下

二陳湯

見痰飲門

健忘門

有三名

健忘者陡然而忘其事謂之健忘此心血耗脾氣

衰之所致也

健忘

服加減一日萬言丸

思慮過度勞傷心脾健忘

服歸脾湯

心氣不足恍惚多忘

服定志丸

歸脾湯

甘草（炙二錢半）白朮　茯苓　酸棗仁（炒）　圓眼

黃芪（各一兩）人參　木香（各五錢）右分作七服每

服水二鍾姜一片棗一枚煎九分食後服

加減日記萬言丸

天門冬（去木）麥門冬（去心）生地黃　丹參（各一兩半）茯苓

白芍藥　五味子　當歸　甘草（各一兩）遠志

圓眼肉　石菖蒲　酸棗仁（酒蒸）栢子仁　人參

（各五錢）熟地黃（二兩）右為末用蜜一觔煉滴水

成珠為度入前藥末杵千下為丸如菉豆大每

服二錢食後白滚湯或酒送下

定生丸

石菖蒲　人參（各一兩）　白茯苓（一兩五錢）　煉蜜丸如梧桐子大朱砂二錢研極細末為衣每服二十丸米飲送下

治健忘烏鬚延壽方

白菊花（溫者三斤）　白茯苓（去白半斤）　白牽牛（四兩微炒）　人參（八兩）　甘州枸杞子（四兩）　右共為細末用蜜二觔煉成珠為度杵一下分作三百六十丸每日子時細嚼一丸華池水送下或酒或塩湯亦可服六箇月見効

不寐門　有六名

有病後虛弱者有年老血虛者有痰在膽經神不歸舍者病各有因治亦從其所因也

病後不寐

用八珍湯加酸棗仁

年高不寐

用補中益氣湯加酸棗仁

有痰不寐

用二陳湯加竹茹枳實酸棗仁

傷寒不寐

見傷寒門

驚駭不寐

用二陳湯加竹茹枳實酸棗仁

八珍湯

即是四君子湯四物湯並見氣血二門

補中益氣湯

見注夏門

二陳湯

見痰飲門

腋臭門（有五名）

口臭身臭

丁香藿香青木香荳蔻子白芷當歸桂心零陵香甘松香附各五錢梹榔一枚右為末蜜丸如鷄豆大日三次夜時含之咽津五日内口香十日内身香禁五辛臭氣之物

腋臭如狐狸

白礬燒令汁盡黃丹各五錢鉄粉雄黃膩粉各五錢為末每夜先以皂莢水洗過用唾津調藥塗擦之

腋臭

田螺大者一箇巴頭去殼一粒胆礬一豆許麝香一字将田螺以水養三日去泥土揭起靨入前藥在螺内以線拴住放磁器内次日化成水凡用須五更時将藥水以手自擦在兩腋下不住手擦藥直待腹内欲行方住手先要揀深遠無人到處生地内去大便黑黃極臭是具症以土蓋之不可令人知之如不盡再以藥水抹之又去大便次日以枯礬擦之可去病根

陰汗鷄臭兩腋臭不可與人同行

白礬蜜佗僧黃丹各等分麝香少許研如飛塵以醋於手心内調藥擦兩腋下經二時辰却以香白芷煎湯洗之一日用一次

体氣

枯礬輕粉蛤粉蜜陀僧麝香各等為極細末每用少許擦之

疝門有二十八名

經云任脉為病男子内結為七疝女子為白芷癥瘕任脉疝之本源各臟疝之支流也任脉即陰血在臍下三寸與督脉相並邪入小腸睪丸即病睪丸即陰予也係腎貫肝絡肺系起于寒濕者多凡内外之氣聚於胞囊小腹兩陰相併二氣相搏則為疝為痛矣查考諸疝雖有三十四名其中有名無症無形不録外有名有症有形有脉者當臨期審察若因七情得者治宜調氣安五臟或外邪相干宜散温袪寒先去邪之實後補肝之虛則治之不謬矣

○總脉

肺脉来沉為肺疝　心脉急滑為心疝

脾脉来絃為脾疝　肝脉緊滑為肝疝

腎脉滑沉為腎疝　寸口緊絃為寒疝

○辯驗疝氣来歷法

疝病睪丸連小腹痛是也睪丸俗名卵子其症或無形有聲或有形有聲或痛或不痛或上或下其形大者如瓜狀小者如圭狀因寒濕入於諸經積久復得寒邪外束所以成諸疝而成痛各邪皆聚於陰器非腎經獨主但腎受邪名曰木腎又名腎氣邪入膀胱名曰膀胱氣邪入小腸名曰小腸氣因三經相連相會受疝之病多也

○熨疝氣痛法

用塩一二觔炒極熱舊布裙包塩熨痛處捏冷再炒再熨痛减為度○又法用艾置臍中以熨斗盛炭火熨之如無熨斗銅杓代之

○治法

凡疝痛宜通利不宜補宜温劑不宜凉藥

凡疝病用茴香丸隨症加減服次用敷藥

凡正氣虛極先温補而後通利用吳茱萸丸

凡邪氣盛極宜先通利而後温補用海藻丸

凡疝痛不宜用瀉藥

凡諸疝用枳實山梔吳茱萸各炒山查肉桃仁

川烏荔枝核青皮

凡治虛疝脉大者是也用人參白朮梔子香附

黑瘦人去人參

凡疝氣因虛寒而成者便不可驟補必先滌其

邪而後補之

凡疝氣極甚上衝如有物築心胸欲死手足冷者用硫黃瓦器中溶化即投水中一二時去毒研細陳皮荔枝核炒焦黃色各等分為末飯丸如梧桐子大每服三四丸酒送下痛立止甚者用六丸不可多二三服除根

凡治癩疝要藥用蒼朮南星半夏白芷川芎枳實山柤

厥疝

厥逆心痛足寒諸飲食吐不下

瘕疝

腹中氣乍滿心下盡痛氣積如堅

寒疝

因濕地雨水風凉處侵內過多其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或睪丸痛宜溫劑下之久則無子　或寒飲食即脇下腹中盡痛

氣疝

因號哭忿怒氣鬱之而脹哭怒止即發其壯上連腎區下吸陰囊宜疝氣藥下之小兒有此症因父精怯故不治

或腹中乍滿乍減而痛

盤疝

腹中痛連臍旁

附疝

腹中臍下有積聚

狼疝

小腹與陰器相引而痛大便難

癩疝（名四）

因地氣卑濕江淮所生其狀腫如升斗不痒不痛宜去濕之藥下之

腸癩因房勞過度原臟虛冷腸追[illegible][illegible]不收墜出腸外難治

氣癩因七情疝氣下墜陰癩腫脹

水癩濕氣得之陰器腫脹

卵癩因勞役坐馬致卵核腫脹或偏大小難治

婦人陰癩陰門挺出

已上諸癩非斷房事厚味不可用藥癩疝不痛者用蒼朮神麯白芷山柤川芎枳實半夏

狐疝

與氣疝大同小異狀如仰瓦臥則入小腹行立

則出入囊中宜逐風順氣

水疝

因醉過內汗出遇風濕之氣聚於囊中其狀腎囊腫痛如水晶或痒極出黃水小腹或按之作水聲陰汗出治宜逐水

筋疝

因房事服久戰藥致陰莖腫或潰膿或痛而裏魚筋縮或挺不收或白物如精或莖痛痛極則痒宜滋陰降火

血疝

因氣血流注滲入脬囊留而不去結成癰腫多

血狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨際云便癰治宜和血

心疝

其症心與小腹冷痛悶不已腸鳴氣走身寒自汗

木腎

因腎虛寒冷凝滯其間腫大作痛或頑痺結硬

用雄黃楮葉為末酒糊丸空心酒下五六十丸

小腸氣

服苦練散

膀胱氣

服群李散

奔豚氣

痛不可忍即腎之積見積聚門

蟠腸氣

即絞腸沙痛見腹痛門

敗精

因慾事精不得出○用阿魏二兩醋煮蕎麥麵炒熟梹榔各二兩為末赤芍藥煎湯丸如梧桐

子大鹽酒空心或食前送下百丸

因瘀血結在肝經成疝痛

用桃仁承氣湯作丸藥酒送下百丸

因痰飲食積流入肝經聚成核痛

用二陳湯加神麴麥芽山柤

脾受濕熱傳大腸惡寒發熱小腹連陰毛際結核悶痛用山梔炒桃仁去皮尖橘核炒山柤蒼朮澤瀉俱炒等分姜三片水煎空心服

寒濕熱三氣鬱而成疝痛

用梔子烏頭水煎服

吳茱萸丸

吳茱萸（炒）　乾姜（炮）　赤茯苓　甘草（炙各半兩）　桂心

白术（炒）　半夏（姜炒）　赤芍藥　當歸（微炒）　前胡

陳皮　人參　附子（炮去皮臍）　木香　川椒

（去目炒出汗各一兩）右為末蜜丸如梧桐子大每服二十

丸白湯送下一日服四次

芫花丸（治寒疝積聚動搖大者形如鱉小者如盃乍來乍去）

芫花（醋炒）　川椒（炒）　川大黃（炒）　川烏頭（炮）　細辛

赤芍藥　肉桂　赤茯苓　木香（各一兩）　桔梗

吳茱萸　半夏（姜製各五錢）　右為末蜜丸如梧桐子大每服七丸溫酒送下一日三次當下如泥

香湯

木香（三分）　赤茯苓　芍藥（炒）　當歸（焙）　檳榔

細辛　人參　青皮（炒）　前胡（各一兩）　共為

末每服五錢水鍾半煎八分利去滓溫服

鈴子散

金鈴子（去皮核取肉一兩用巴豆七粒去殼同炒黃色減去巴豆）　右為末每

服二錢空心酒調服

狠毒丸

狠毒（炒）　川烏（炮）　芫花（各一兩）　川椒（炒）　乾姜

乾漆（炒烟盡）　三稜　鱉甲（醋炙）　末藥（各五錢）　全蝎

（九箇去毒）右為末醋糊丸如梧桐子大每服四十丸

空心酒送下孕婦不可服

木香散

木香　乾姜（炮）　良姜　訶子（去核）　陳皮

枳實（炒各錢半）　草豆蔻　川芎　黑牽牛（各一錢）　右

水二鍾煎至一鍾食前服

昆布丸

昆布（洗鹽炙）　海藻（洗鹽炙）　薏苡仁（炒）　蒺藜子（炒去刺）

檳榔（各半兩）　枳殼（二兩）　黃芪　訶藜勒（炮去核）

木香（各三錢）　桃仁（炒去皮尖）　絲子（酒炒）　陳皮（各一兩）　右為

末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心酒下

雄黃洗方

雄黃（研）　甘草（各一兩）　白礬（二兩）　右為末每用藥一

兩煎湯五升洗腫處良久再將前湯熱洗候汗

出瘥

海藻丸

海藻（洗焙）　川椒（炒去汗）　木香　檳榔（各半兩）　川烏

（炒小兒不用大人用）甘遂（各五錢）　吳茱萸（四錢）　茴香（炒）　楮苓

澤瀉（炒各三錢）　白牽牛（炒取頭末二兩）　黑牽牛（炒取頭末五錢）

右為末水丸如梧桐子大每服五十丸至百丸空心酒送下利下黄涎是驗十五歲以下者服二十五丸至五十丸忌甘草相友

補腎湯

沈香（五分）　附子（炮去皮）　白术（炒）　黄芪　木瓜

人參　茯苓（各錢半）　羌活　芎藭　紫蘇

甘草（各一錢）　右用水二鍾煎至一鍾食前服嘔吐加半夏一錢生姜七片

木香導氣丸

木香　八角茴香　丁香　川練子　乳香

香附（童便拌炒）　破故帋　葫芦巴　京三稜　甘草（各一兩）　杜仲（炒無系五錢）　右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸空心酒送下日進二服

敷藥法（治腎囊痛腫）

牡蠣（煅）　良姜（各一兩）　右為末津唾調敷大便處須臾如火熱着痛即安

葫芦巴丸

葫芦巴（八兩）　茴香（炒六兩）　大巴戟（去心）　川烏（炮去皮臍各三兩）

吳茱萸（五兩）　川練子（去核炒九兩）　右為末酒糊丸如梧

桐子大每服十五丸空心酒送下小兒五丸

一捻金散（治奔豚小腸諸氣痛不可忍）

玄胡索（炒）　川練子（炒）　全蝎（炒）　茴香（炒各一兩）　附子（炮去皮臍半兩）　右為末每服二錢痛時熱湯調下甚者再服

喝起丸

杜仲　葫蘆巴（炒）　破故帋（炒）　小茴香（鹽水炒各一兩）

萆薢（酥炙）　胡桃肉（去皮研如泥各一兩）　右為末入胡桃肉和勻為丸如梧桐子每服四十丸空心酒送下

苦練散

川練子（一兩用巴豆肉十五粒同炒黃色揀去巴豆用）　茴香（鹽炒）　木香（各一兩）　右為末空心酒調下一錢

群李散

山梔（五十枚燒一半）　附子（一枚炮或烏頭代[illegible]）　每服二錢酒煎服

桃仁承氣湯（見傷寒門）　二陳湯（見痰飲門）

茴香丸（開末卷）

消渴門 有十五名

消渴本乎熱有內外虛實之分三焦受病三焦乃是右腎命門元氣之所使有名無形而有氤氳之氣耳上焦在肺主納不出中焦在胃主腐爛水穀下焦在腎主出而不納故有三消之名上消多飲水而少食小便清利中渴頻食易飢而飲水少小便黃赤下消小便頻頻初發為膏淋如油狀至病成面色薰黑形瘦耳焦小便濁而有脂膏除此三消之外更有內消臟腑所感不同病皆出於燥熱

消渴疾愈須預防發癰疽必要服忍冬花五六兩其病愈後尚且為害不輕況病在於不愈之際乎

○吉脉

數　大　沉　小

○凶脉

浮細短　實堅大

○不治症

下消能食及不能食（如飲食如常無妨）

○死症

內消

○治法

凡消渴宜養肺降火生血為主

凡上消中消用藥太急成中滿臌脹正謂上消不除中寒復生

凡諸虛不足胸中煩悶時常消渴或先渴而後發瘡腫或發癰疽而後渴者並用黃芪六兩去蘆蜜炙甘草一兩蜜炙每服三錢水一鍾半棗一枚煎七分不拘時服

凡消渴胃氣不行多飲水是血病服辛甘藥益之

凡消渴不可服膏粱芳草石藥反助燥熱

凡用秘方總治三消用黃連炒天花粉二味為末藕汁人乳生地黃汁少加姜汁蜜為膏二味和勻徐徐噙舌上少頃白湯下

凡治消渴天花粉蘆根麥門冬知母竹葉牛乳此六味是要藥也滑石禁用如天令濕氣太過者可暫用耳

上消（肺病）

多飲水少食舌上裂大小便如常是心熱移於脉○服人參白虎湯

中消（胃病）
多食少飲水肌瘦小便黃赤是胃中有熱飲食
入傳送太急不生津液○服調胃承氣湯

下消（腎病）
煩噪耳輪焦乾小便多初發為淋如油是肺腎
引火水易虧也能食變癰疽不能食变中滿服
脹皆為不治之疾○服加減地黃丸

內消
腎虛兼服丹石藥不渴小便多唇乾咽燥精
泄漏名曰內消其症不治○服桑白皮湯

食肥甘藥石渴
服加減三黃丸

中暑熱渴
用酒煮黃連丸○假如小便不利或渴或不渴
知內有濕宜滲利小便自利而渴知內有燥症
治宜潤之

醉飽後房勞渴
服黃連丸煎知母天花粉湯送下

胃虛不能食大渴
服七味白朮散

消渴
飲水石斗病極○服梅花聚湯

三消日夜無度
用神仙減水法

久渴旬日見効
服胜脛散

消渴後成癰疽
服玄參散

消渴後成虛乏
服填骸煎

消渴後成癥脹
服赤茯苓湯

消渴後成浮腫
服葶藶丸

人參白虎湯
人參（三錢）　石膏（四錢）　知母（二錢炒）　黃芩（炒）　甘草
杏仁（各一錢炒）　右水二鍾黃米一撮煎至一鍾服

赤茯苓湯
赤茯苓　赤芍藥　枳殼（炒）　人參（各五錢）　白朮
前胡　檳榔　桂心（各三錢）　厚朴（姜汁炒）　甘草

（各五錢）右分作五服每用水二鍾棗一枚煎至一鍾食前溫服

桑白皮湯

桑白皮　麥門冬　白茯苓　乾葛　山藥　人參（各一兩）桂心　甘草（各五錢）右分八服每水二鍾煎至一鍾不拘時服

梅花聚香湯

天花粉　烏梅肉　枇杷葉　麥門冬　黄芪　五味子　瓜蔞仁　人參　乾葛（各二兩）檀香（二錢）右為末水調隨意服之

七味白术散

白术（炒）　白茯苓　白芍藥　人參　前胡　枳殼　北五味　藿香葉　乾葛粉　木香　甘草（各一錢）右分作二服每服水二鍾煎至一鍾食遠溫服

玄參散

玄參　大黄（微炒）　羚羊角（剉）　犀角屑　沉香　木香　黄芪（各一錢）甘草（三分）右為細末每服一錢五分溫井水調下不拘時服

忍冬丸

忍冬花（即金銀花）不拘多少用酒拌入瓶內浸糖火煨一宿取出晒乾入甘草少許為末丸如梧桐子大每服百丸酒送下

神仙減水法

天花粉　麥門冬　白匾豆（炒）黄連（炒）浮萍　苦參（炒）人參　知母（炒）黄芪（各二兩）黄丹（少許炒）右為細末每服藥末一錢新汲水調下

胜腔散

桑螵蛸　牡蠣（煅）　黄連（炒）　苦參（炒各二兩五錢）　土瓜根（二兩）鹿角膠（炙燥）白石脂（各一兩）右為細末加

入鷄胜腔鷄腸（各五具炙）白龍骨漏蘆俱為末和勻每服一錢半米湯調下日進三服

加減三黄丸

黄芩（春四兩秋六兩夏六兩冬三兩）黄連（春四兩夏七兩秋三兩冬二兩）大黄（春三兩夏一兩秋二兩冬四兩）右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心白滾湯送下

填髓煎

白茯苓　山茱萸（去核）麥門冬（去心）附子（炮去皮臍）巴戟　石斛（去根）牛膝（酒洗焙）當歸（酒洗焙）兎絲子（酒洗搗各二兩）（半）桂心　黑豆（炒三合）石蒂（淨冬一兩）五味子　遠志

人参（各三兩半）天門冬（去木三兩）右為細末生地黄汁三觔以瓦器內隔湯漫火煎一日後入諸藥末蜜二兩牛髓五兩再煮一日丸如彈大米飲送下一丸

葶藶丸

葶藶（隔紙炒）瓜蔞仁　杏仁（炮去皮尖）漢防已（各一兩）右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前白滚湯送下一日服三次

黄連丸

黄連（火五兩）麥門冬（去心）天花粉（各五錢）右為末乳汁和勻杵千下丸如梧桐子大每服五十丸食前米湯送下

調胃承氣湯（見脾胃門）　加減地黄丸（見血門）

酒煮黄連丸（開末卷）

損傷門（有七十名）

古謂正骨金瘡科今名損傷門前人不兼中風論治至楊徐劉三公增益余玩此科再加驚駭為主治始尽善矣凡從高墜下責撲閃肭牛撞馬踢木石墻屋倒壓必先驚而後傷須辯上下輕重浅深之異經絡氣血多少之殊又分瘀血停積亡血過多如停瘀者峻逐瘀血兼以驚治如老弱之人宜補而疎之或峻下或補不以驚駭破傷風同治未為切當且如服行藥過多其脉愈見堅大醫者不察又以為瘀血未尽而再行之是速其死也因老弱不禁下而孤衃不行者亦速其死也先逐瘀血驚涎通經絡和血止痛然後調氣養血補益胃氣無不効矣

○生脉

金瘡出血脉来沉小者生

內有瘀血腹脹滿脉来堅強實者生

○死脉

金瘡出血脉来浮大者死

金瘡瘀血腹脹滿脉来虚小弱者死

論手有四折骨六出臼凡手臂出臼此骨上段骨是杵四邊筋脉鎖定或出臼亦剉損筋所以出臼此骨須拽手直一人拽須用手把定此間骨搦教歸窠看骨出那邊用竹一片夾定一邊一邊不用夾須在屈直處夾纔服藥後不可放定或時又用拽屈拽直此處筋多喫藥後若不屈直則恐成疾日後曲直不得

有胛上出臼只是手骨出臼歸下身骨出臼歸上或出左或出右須用舂杵一枚矮凳一箇令患者立凳上用舂杵撑在於出臼之處或低用物墊起

杵長則墊凳起令一人把住手拽去凳一人把住舂杵令一人助患人放身從上坐落骨節已歸窠矣神効若不用小凳則兩小梯相對木棒穿從兩梯股中過用水把住水棒正稜在出臼腋下骨節蹉跌之處放身從上墜下骨節自然歸臼矣

脚六出臼四折骨或脚板上交胯處出臼須用一人拽去自用手拔其骨節或骨突出在內用手正從此骨頭拽歸外或骨突向外須用力拽歸內則歸窠若只拽不用手整入窠內誤人成疾脚膝出臼與手臂肘出臼同或出內出外亦用一邊夾定此處筋脉最多服藥後時時用屈直不可定放又恐再出窠時時看顧不可疎慢

正骨金瘡須看脉候如傷臟腑致命處一觀其脉虛促危矣傷虛浅命脉虛促亦為後慮傷至重命脉和緩亦無慮也脉有虛有實有去来有疎密或被傷藏脉不死者必關脉實重則無慮或傷至死處其關脉無別脉洪大則難醫如用兩件藥後脉不轉動急急住藥若脉漸漸隨藥轉此則可治無慮或血出甚者脉不要洪大不要踈密亦不要進退来去恐其變凶看傷脉勇與內科脉不同或傷

內或致命或難醫處被傷者命脉便已去矣此等切勿治之

中不治證

顱撲損傷或被傷入於肺者縱未即死二七難過　左脇下傷透內者　腸傷断一半可醫全断者不可治　小腹下傷內者證候繁多者　脉不實重者　老人左股壓碎者　傷破陰子者　血出盡者　肩內耳後傷透於內者皆不必用藥

腸肚傷治法

肚上被傷肚皮俱破腸出在外只腸全断難醫傷

破而不斷者皆可治療[illegible]腸及肚皮破者用花乳石散傳線上輕用手從上纏之莫待糞出清油撚活於入肚內[illegible]肚皮裂開者用麻縷為線或搥桑白為線亦用花乳石散傳線上須用從裏重縫肚皮不可縫外重皮留外皮開用藥摻待生肉

用藥加減法

凡損若不折骨不碎則不可用自然銅於藥內除去無痰涎不用半夏　老人有傷骨者脉冷無用加當歸川芎川烏木香丁香人參各半兩白芍藥生地黃此亦是二十五味藥內加減老人服此

或傷臟腑者不問老少如有血并痰從口中出者用清心藥加丁皮川芎半夏入二十五味同服

或皮膚熱者加黃檗皮皂角半兩入二十五味藥內同煎服

用麻藥法

攧撲損傷骨肉疼痛整頓不得先用麻藥服待其不知痛處方可下手或服後麻不倒可加曼陀羅花及草烏五錢用好酒調些少與服若其人如酒醉即不可加藥

被傷有老有幼無力有血出甚者此藥逐時相度入用不可過多亦有重者若見麻不倒又旋添藥些須更未到又添些須酒調服少許已倒便住藥切不可過多

用摻藥法

瘡口血出不止則用方中止血藥傳如洗開後瘡孔大先用真降香龍骨沒藥摻之肉即生瘡孔上須用油單紙貼瘡孔待膿血汁出覓要蔽塞如夏月用藥以薄荷葉貼瘡孔一日一度湯洗又用藥摻如肉上滿瘡口用手搦不痛如好向一般即用收瘡口藥敷上若未生齊肉切不可先收瘡口裏

面恐為患也

傷破肚皮用藥法

如傷孔大肚腸與脂膏俱出放入內則縫如孔小只有膏出者先用清心藥與服用手擘去膏不用縫此膏出者已無用了不可復入肚中反成禍只須擘去不放此是閑肉但放心去之肚內破傷者專用退利大小腸不可待秘恐成重患

打攧及樹木壓徧身痛者

打攧樹木壓或有高處攧下者此等傷皆驚動四肢五臟必有惡血在內專怕惡心先用清心藥打

血藥次第先服臨服加童子小便入藥內立効專用大小腸洗利恐作隘塞利害之甚清心藥加前方通利大小腸藥服之自然俱通無悶煩無惡血汚心次後用止痛藥服之即止

去惡血法

攧撲傷刀石傷諸般傷損至重者皆先服清心藥次服清小便藥三服去血藥或被傷者血未結打從瘡口出或結在內用藥打入大腸時即泄或被打被攧被木壓惡血未積者用藥打散四肢或歸臟腑者或歸上膈者打後口中吐出或歸中膈打

入大腸泄出先用此急救次服止痛藥即二十五味藥中加減用

用藥湯使法

凡藥皆憑湯使所使方先但用清心藥煎後入童便一盞同服或止痛重傷者則用姜湯燈心湯調二十五味藥服之薄荷湯亦可

凡刀傷及損內臟腑恐作煩悶崩血大患如折骨者用姜酒服接骨藥傅之如骨碎被重打重攧重木及石壓者皆用先服湯使法並不用酒服如輕攧撲損傷則用姜湯調下二十五味藥立効

治攧撲傷骨碎骨折筋斷刺痛不問輕重並治之

香白芷（醋炒）　紫金皮（醋炒）　川當歸（鹽刂）　劉寄奴　川芎
赤芍（米泔浸炒）　木賊草　黑牽牛（微炒）　川牛膝（茶浸）　乳香
破故紙（醋炒）　骨碎補　生地（鹽水拌炒）　自然銅　羌活
川烏（煨孕不用）　藿香葉　沒藥　木通　官桂
草烏（醋炒孕）　獨活（各一兩）　熟地（鹽水拌炒）　杜牛膝（茶炒）　木香（各五錢）

右金刀傷剉臼者去自然銅骨碎補骨折者用之然須於此方內去自然銅臨好時却入用之如早服以成他疾同研為末用蜜為丸如彈子大用黃丹為衣或被攧撲損傷金刀剪鏃

不問輕重每服一丸溫酒磨化服或細嚼酒送下如被刀傷全斷內損重者以薄荷湯或木瓜湯姜湯燈心湯皆可服病在上食後病在下食前在中者不拘時服

治從高墜下惡血流於腸下疼痛不可忍

大黃（酒炒五錢）　桃仁（五十研泥）　柴胡　當歸（各二錢）　甘草
天花（粉各一錢）　紅花（五分）　右用水一鍾酒半鍾煎至六分食前服

治墜馬落車及損折傷

附子（炮去皮臍）　澤蘭（炒各一兩）　甘草（炙五錢）　桂心（四錢）　當歸

芎藭（各七錢）蜀椒（三錢）右為末每服一錢食前溫酒調服日進三服忌食海藻菘菜生葱冷水

治打撲損痛不可忍者

沒藥（另研）乳香（另研）肉桂（去皮）當歸（焙）白芷甘草（炙各一兩）白术（炒五兩）右為末研勻每服二錢不拘時溫酒調服

治撲傷損筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及拘急身體倦急四肢少力

沒藥（另研）當歸（酒洗焙）骨碎補（煨）白芍藥　川芎生地黃　川烏（生去皮臍）自然銅（火煅醋淬十二次為末水飛焙各等

分）右為細末以生姜自然汁與煉蜜和丸每丸一兩分作四丸每服一丸搥碎用水酒各半鍾入蘇木少許煎至八分去蘇木空心服

治一切金刀折傷打撲身體血出急於傷處摻藥如有內損血入臟腑熱煎童便入酒少許調二錢服之立效若牛觝腸出不損者急送腸入用細絲或桑白皮線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無桑白皮線用麻線縫之亦可並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後摻藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死胎衣不下並用童便調服

花蕊石（一兩搗為粗末）硫黃（上明者四兩搗為末）右二味和勻先用紙筋和鹽泥固濟罐子一個候乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝於巳午時從下著火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研瓷瓶內盛依前法

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血如豆汁

百合（水浸一日）芎藭　白芍藥　當歸　荊芥（各二錢）右水鍾半酒半鍾煎至八分不拘時服

治重物壓傷或從高墜下或吐血不能禁止或瘀血在內胸腹脹滿喘促氣短

當歸（二兩）大黃（一兩）右為末每服三錢酒調溫服

治打撲傷折內損肺肝

紫金皮　補骨脂　降真香　無名異（火燒酒淬七次）牛膝（酒浸一宿）桃仁（去皮尖）當歸（酒洗焙）琥珀（另研）川續斷蒲黃（各一兩）大黃（濕紙裹煨）朴硝（另研各一兩半）右為末每服二錢食前濃煎蘇木當歸酒調服

治打撲內損筋骨疼痛

自然銅（一錢五分火煅醋淬七次）沒藥　乳香　川芎

芍藥　當歸　川椒（去目合口者各半兩）右為末用黃蠟二兩熔開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一丸用好酒一鍾化開煎至五分乘熱服之隨痛處卧連服二三丸立効

治打撲傷折手足

右用菉豆粉新鐵銚内炒令紫色用熱酒同熱醋調令成膏傅貼損處用紙花盖貼用杉木一片或二片縛定其効如神

治癰疽發背諸般瘡癤從高墜下打撲傷損脚膝生瘡遠年臁瘡五般痔漏一切悪瘡並治之

龍骨　鱉甲　苦參　烏賊魚（用骨）　黃栢　黃芩　黃連　猪牙皂角　白芨　白歛　厚朴　當歸（酒洗）　香白芷　木鱉子（仁）　草烏　川芎（各一兩）　沒藥（另研）　乳香（研各五錢）　黃丹（斤半炒過）　槐枝　柳枝（各四寸長一十一条）　清油（四斤）右除乳沒丹外將諸藥於油内慢火煎紫色去滓秤淨油三斤放鍋内下丹不住手攪令黑色滴入水不散及不粘手下乳沒再攪如硬入油些少不粘手為度

治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結聚疼痛

荊芥（一兩）　細辛（大[illegible]）　蔓荊子　香白芷　桂心

川芎　丁皮　防風（去芦）　羌活（各半兩）右作一服入塩半匙連根葱五莖將水五升煎取二升去滓通手淋洗痛處令即再易避風處洗之

治諸瘡口入風為破傷風項強牙関緊急欲死者

防風　南星（各二兩）右為細末每服三錢童便一大鍾煎熱調不拘時服

治新舊諸瘡破傷中風強項背直腰反折口噤不語手足抽掣眼目上視猴中鋸聲並皆治之

麝香（另研五分）　硃砂（一兩）　草烏（三兩半）　生黑豆（三錢半）右為末研勻破傷風以酒調一錢不拘時服如出

箭頭先用酒調一錢就將此藥貼上箭瘡上

治破傷風止血定痛

蒼朮（六兩）　川烏（炮去皮）　兩頭尖（炮各一兩）　白朮　草烏（炮去皮）　防風　細辛（各二兩半）　蝎稍（微炒）　川芎　雄黃（各五錢）右為末每服一錢不拘時酒調送下如損骨折加乳香五錢

治破傷風

草烏　天麻（各半兩）　金頭蜈蚣（一條去頭足炙五錢）　全蝎（一錢）　香白芷（二錢）右為細末每服五分如發熱茶清調下不拘時服

治打撲傷損金刀箭鏃傷處浮腫用此

紫金皮（醋炒）　川烏（炮）　草烏（炮）　黃柏（鹽水炒）　南星

川當歸　杜當歸　破故紙　川白芷（鹽炒）　川芎

川牛膝　刘寄奴　桑白皮　半夏（各等分）　烏藥

（各等分）右為細末生姜薄荷汁兼水調傅腫處或傷處皮熱甚加黃柏皮生地黃半兩有瘡口者勿封瘡口四邊傅之

治傷骨節不歸窠者用此麻之然後下手整頓

木鱉子　杜當歸　紫金皮　猪牙皂角　川芎

白芷　烏藥　半夏　川烏（各二兩）　草烏

舶上茴香（各一兩）　木香（五錢）　右為細末諸骨碎骨折出臼者每服一錢好酒調下麻倒不知疼處或用刀割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨筋歸元端正用夾板夾定然後醫治或箭鏃入骨不出亦可用此藥麻之或鐵鉗拔出或用鑿開取出若人昏沉後用鹽湯或鹽水與服立醒

治皮破筋斷

右用白膠香為末傅之又方用金沸草根擂汁塗筋上封口便可相續止痛

治折傷後為四氣所侵手足疼者

川山甲（去膜桑柴灰炒泡熟為度）　茴香（炒各六兩）　破故紙　草烏

骨碎補（去毛）　蒼術（去毛各半斤）　右除草烏用生姜一觔搗爛同草烏淹兩宿曬乾為末酒煮麪糊為丸梧桐子大每服五十丸用酒或米飲下忌熱物

治打傷損手足疼痛不可忍者

白芷（一錢）　白朮（炒五錢）　乳香（另研）　沒藥（另各一錢）　肉桂

當歸（炒）　粉草（各五錢）　右為末每服二錢酒調下

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下晋在太陽經令人腰脊或脛腨臂腰中痛不可忍

地龍　官桂　蘇木（各九分）　麻黃（七分）　黃柏

當歸稍　甘草（各半錢）　桃仁（九箇）　右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

治跌撲損傷踈利後用此藥調理

川芎　當歸　芍藥　黃芪（各一錢半）　青皮

烏藥　陳皮　熟地黃　乳香（另研）　茴香

（各一錢）　右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

治金瘡白藥

赤芍藥　牡丹皮　生地黃　木鱉子（去殼）　當歸

地骨皮　桑白皮　黃柏　黃芩　黃芪

甘草　黃連（各半錢）　白芷　馬蓼稍葉（各一錢人）

右用桐油二兩煎黄色濾去滓再煎油稍熱入細白板松香一片慢火煎頃頻頻用柳枝攪勻却入沒藥乳香滓布上濾過先用瓦鉢滿盛清水八分却濾藥於鉢水中將去清水中如綳紙伏綳三二百度愈綳愈白故名白藥常以清水度傾於冷地上用物遮蓋勿令塵入五七日一換水刀斧二三應傷量傷孔大小取一塊填於傷孔中以白紙護之隨手不疼一日一換五日生肉筋断加杜仲續断各二錢同煎收瘡口加龍骨五分研碎煎入藥內打損只敷油紙上貼之即愈却不須入接筋龍骨等劑之妙

治金瘡砕一切風冷續筋骨

芎藭　艾葉（各五錢）　石灰（二升搗生地黄清蒿汁和作團火煅赤研）

麒麟竭（細研）　地松（各三分）　狗頭灰（細研）　蜜陀僧（各五錢）

黄丹（一兩）　右為末和勻密封之每遇金瘡傳之

治金瘡箭鏃不問輕重并癰疽瘻痔用此傳之

白膠香　乳香　石膏（醋炒）　白芷　蒼术

沒藥　黄丹（各五錢）　右為末用真麻油四兩桐油亦可以黄蠟一兩先煎油柳枝攪次入白芷等藥煎少頃却入白膠香石膏得同煎試欲成珠却入蠟同煎片時用生布濾過瓦器收蔵用油单紙攤之損傷傳瘡口自然內不痛速愈

治金瘡

右五月五日平旦使四人出四方各於五里內採一方草本莖葉每種各半把勿令漏脫一事日正午時細切碓搗并石灰極令爛熟一石草断一斗石灰先鑿大實中桑樹令可受藥取藥納孔中實築令堅仍以桑樹皮蔽之用酥油搗石灰極粘密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使堅牢至九月九日午時取出陰乾百日藥成搗

之日曬令乾更搗細篩貯放凡一切金瘡出血傷折即時以藥封裹治使牢勿令動轉不過十日即瘥不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥須暖水洗令血出然後傳此藥大驗平時無事宜多合以備倉卒之要無出於此一方云採時不得回顧任意摘取方回入杵臼內爛搗如泥量藥多少以意入石灰和勻取出拍成膏日中曝乾遇用旋取撚碎若刀斧傷乾傳取血止為度湯火冷水調開塗數蛇蝎犬鼠咬傷先以溫水洗後以津液調傳疥瘡先孫損以藥末乾傳

濕癬以醋調傳其効如神

凡殺傷不透膜者可治

右用乳香没藥各一皂子大研爛以童便半盞好酒半盞同藥通口服然後用花蕋石散或烏賊魚骨或龍骨為末傳瘡口上立止

殺傷氣偶未絕

右取葱白熱鍋炒熱遍傳瘡傷處須臾即再易其痛自止但青葉亦可

治刀斧傷磕擦及破傷風浮腫者

右用平胃散以姜汁調傳若急卒只以生姜和皮爛搗罨患處止痛截血且無疤痕

治金瘡肉爛生蛆者

右以皂礬飛過乾貼其虫即死

治刀斧所傷肉損大腸及兩脇肋并腹肚傷破大便從口中出并中大箭遠射傷損腸胃及治產後傷損小腸并尿囊破小便出無節止此方神効餌至一服其藥直至損處補定傷痕滿日開瘡口看之只有宿舊物出即無新惡物出瘡口內用長肉散子作盡子引散藥入瘡內面候長肉出外其痕即有合

地榆（八兩洗净搗為細末）績（一疋小薄者）右用洗净績糊以炭灰淋清汁二斗煮絹灰汁盡為度絹以爛熟擘成片段五寸至三寸即取出壓盡灰汁於清水內洗三五度令去灰力盡重入鍋內以水二斗入地榆末煎煮熟爛以手撚看不作絹片取入砂盆研之如麪糊得所分為二服用白粳米飲調空心服之服後仰卧不得驚動轉側言語忌一切毒食熟爛黄雌雞白米軟飯餘物不可食之其餘一服至來日空心亦用粥飲調服其將養一月內切須慎護如是產後所傷服一疋分作四服每服粥飲一鍾調服日進一服

治木竹刺出血及刀傷

右急以自己小便淋洗二三次立止不妨入水

治金瘡

右以牛蒡葉貼之亦不畏風亦不潰膿搗傳之

治刀箭傷筋断骨止痛定血避風

麒麟竭　白芨（各五錢）　密佗僧　黄栢　白芷

白歛　當歸（焙）　甘草（炙各一兩）右為細末每用少許乾摻瘡上立効

治金刀弓弩所中筋急不得屈伸

敗弩筋（燒灰）秦艽（去苗土）熟地（焙各半兩）附子（炮去皮臍）當歸
杜皮（去皮炙各一兩）大棗（三枚取肉焙）右為細末每服二錢
七溫酒調空心日午夜臥各一服一方（有續斷無大棗）

治傷斷筋骨續筋方

右取旋覆根擣汁滴瘡中仍用滓傅瘡上封固

治金瘡腸出宜用之

磁石（煅研）滑石（研）鐵精（各三兩）右為細末每服
錢七溫酒調空心日午晚間各一服仍以針砂
塗腸上其腸自入一方無鐵精一方白米飲調

治破傷腸出不斷腸出欲燥而草土着腸者

右作大麥粥取汁洗腸推內常研米粥飲之計
日稍稍作強糜百日後乃瘥草土當取在皮外

治金瘡中腸出不能入者

右以小麥三升用水九升煮取五升綿濾過候
冷含噀瘡上漸入以冷水噀其背不宜多令人
見亦不要傍人語不可令病人知或尚未入取
病人臥席四角令病舉身搖須臾腸自入十日
內食不可飽頻食而少勿使病人驚驚則殺人

治金瘡腸出者

右以桑白皮作線縫之更以熱鷄血塗上立愈

治毒藥箭頭在身未出

雄黃（細研一分）粉霜（細研五錢）蜣蜋（四枚細研）巴豆（三粒去殼研泥生用）
右同研勻以銅筯頭取乳汁塗點瘡上頻頻用
之七日後瘡熟箭頭自出

治毒箭所中

右擣藍汁一升飲之滓傅瘡上若無藍取青布
漬絞汁服之并淋瘡中鏃不出擣鼠肝塗之鼠
腦亦得用之即出

治箭頭自出瘡口上

草烏尖　麒麟竭　茄子花　蓖麻子（去殼細研如泥）

蓖吔羅子（各五錢）右為細末好酒調如膏瘡口上
塗摩之箭頭自出

治箭頭在骨遠年不出

牡丹皮　白斂（各一兩）桑白皮（二兩）藿香葉　丁香
麝香（研各一分）右為細末每服二錢七溫酒調下日
進三服淺者十日深者二十日箭頭自出

治箭鏃入骨取不出疼痛用此

巴豆（二枚）蜣蜋（三枚）右研塗傷處俟痛定微痒忍
之極痒不可忍即撼動拔出以黃連貫衆湯洗
畢以牛膽製風化石灰傅之兼治惡瘡

治箭頭在咽喉中或胷膈中及諸處不出者

右搗牛膝不拘多少為末以热水調塗箭頭即出若火瘡灸瘡不瘥者塗之亦效

治箭頭在肉不出

右以白項蚯蚓十四條納銅器中次入塩一兩於日中曬並化作汁塗有傷處湏臾痒則出

治取針悞入皮膚

車脂（不拘多少）右成膏子好攤在紙上如錢許二日一換三五次其針自出大有神効

治金瘡去血多虛竭用此藥內補

當歸（焙）　桑白皮　白芍藥　吳茱萸（酒浸）　桂心

乾姜（炮）　川芎　人參　川椒（去目并合口炒出汗）

黄芩　黄芪　厚朴（去皮姜汁炙令熟各二兩）　肉蓯蓉（四兩酒浸去皮炒乾）　甘草（炙半兩）　右為末每服二錢食前温酒調下日三四服一方有白芨無黄芩桑白皮

治金瘡血出腹脹欲死

蒲黄　生地（各兩半）　當歸　芎藭　白芷　續斷（各一兩）　甘草（炙三分）　右為末每服三錢七空心酒調下日三四服血化為水而下若口噤斡開與之服仍加大黄一兩半

治金瘡血出不止亦治痔瘡

右以五倍子生研為末乾傅瘡上血立止

治金瘡出血內漏

右用蝙蝠二枚燒煙盡為末以水調服方寸七令一日服盡當下如水血自消也

治諸傷瘀血不散

右於五六月收野苧葉擂爛塗金瘡上如瘀血在腹用順流水擂爛服即通血皆化水以死猪血試之可驗秋月恐無葉可早收之

治金瘡煩悶

乾生地　當歸（炒）　桃仁（去皮尖炒）　羚羊角（屑）　白芷　赤芍藥　桂心（各三分）　甘草（炙）　黄芩　續斷　芎藭（各一兩）　右為末每服二錢食前温酒調下日三四服

治金瘡中風角弓反張

生鷄子（一枚）　烏麻油（三兩）　右先將鷄子打破與麻油相和煎之稍稠待冷塗封瘡上

治金瘡中風痓欲死者及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺人

右用生葛根一斤剉碎以水五升煑取三升去

滓每熱飲一小盞日三四服若乾搗為末每二錢温酒調服若口噤不開但多服竹瀝即愈

治金刀傷見骨中風口噤

右用大豆炒去腥半熟勿使太熟五升粗搗篩蒸一餉頃傾出金中以酒一斗五升淋之絞去滓每温服五合至七合日二夜一衣盖覆微汗出別研生杏仁膏傅於瘡上若腦髓出者難救

治金瘡因風水腫

右取臘不以多少熔化入塩少許滴在瘡上或先以塩罨瘡上後熔蠟令熱得所灌中亦可

治金瘡中風掣痛并手足不仁

用艾葉生熟者令揉爛得所納瓦甑中塞諸孔獨留一目通氣熏患處良久身体自知愈

治金刀箭傷生肌長肉定痛止血諸瘡歛口

龍骨　滑石　寒水石　枯礬　乳香
黄丹（炒）　没藥（各五錢）　輕粉（錢）右為細末每用少許乾摻瘡上外用膏藥貼之

治刀斧傷碎風生肌止痛

桑白皮　黄丹（炒）　陳石灰（風化）　白芨（各二兩）　龍骨
白附子　南星（各一兩）右為細末每用貼之

治竹草刺瘡發腫作疼傷時不曾出血盡被惡毒注痛不止夜不安初破時其瘡紫赤黑色較時起三五重皮是也

丹參（二錢半）　麝香（一字）　緑礬（半兩童便燒熱放在於內候冷取出日乾）
馬兜苓根（半錢）右為末將水洗淨瘡口敷貼藥上

治手足卒中刺中水毒方

藍青　韮（半分）右搗置瘡上以火炙熱徹即愈

治刺入、肉疼煩悶百藥不効

右以松脂傅瘡上以帛裹三五日當有根不痛不痒不覺自落甚良

治針入肉方

右刮指甲末同酸棗仁搗爛唾調塗上次日定出一方用酸棗核燒為末服之

治金瘡杖瘡神効

川牛膝　劉寄奴　黒牵牛　黄栢皮　孔香
破故紙　白繆香　生地黄　熟地黄　没藥
赤芍藥　白芍藥　紫金皮　當歸（焙）　川芎
石膏（煅）　黄丹（炒）　羌活（各五錢）　黄蠟（兩）　獨活
白芷（各五錢）　清油（四兩）右除繆香丹蠟餘為末入油内煎以柳枝不住手攪將成膏却入三味又煎

成膏以生布濾净以瓦器盛水傾在水中用蓮攤開貼瘡孔深者撚成條穿入孔中不問浅深放瘡上如作熱加輕粉片腦朴硝入膏内貼之

生肌桃花散

乾胭脂　密陀僧　輕粉　血竭（各一錢）　乳香（一錢）右研細末勿用乾摻仍以膏藥貼之

治腫未破用此消腫定痛

無名異（炒）　木耳（炒去土）　大黄（炒各等分）右為極細末毎用蜜水調圍四邊腫處

治金刃箭鏃傷用此生肌

老松皮（一兩）　石灰（二兩煉者以瓦盛之用火四兩上下煉一夜至曉）右為細末和勻敷之止血收瘡口立効

識病捷法卷之九

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

下蠱門（有二名）

此門與諸毒門互相查考治病

民被陰謀下蠱者百無一生人反忽之余恐士庶經商遭不良之輩起謀財報恨之心所以開示卷之前也下蠱毒藥無非投於飲食凡遇飲食即以犀角攪試毒之有無則免受其毒矣

〇試下蠱毒法

使病人唾涎水中沉者是不沉者非也〇又試法以犀角攪飲食有白沫竦起者即為有毒無沫起者非也士庶經商須帶犀角毎遇飲食即試之

下蠱初病

其症心腹切痛如有物齧或吐血下血如爛肉狀不即治之食人五臟則死〇服槲皮散

下蠱病

吐血下血如爛肝之狀下數斗（合一滿口謂之厄合惟積篓者）四臟悉壞唯心未毀或鼻破待死者〇服岩瓠湯

水毒溪毒（凡往商出遠須常𢹂五茄皮在行李中）

頭疼發熱等病如傷寒相似○用五茄皮為末毎服二錢酒調下日服二次夜服一次

苦瓠湯（即苦葫芦）

用苦瓠一枚切碎以水二碗煎至一碗分二服空心服吐下虫即愈

槲皮散

槲皮（北陰白皮）桃根白皮各四两並切碎蝟皮灰亂髮灰各二两火麻子油五升先以水五碗煎槲皮桃取濃汁二碗和麻子油毎服温一盞調蝟皮髮灰各一錢令患人少食旦服須史用水一盆以鵞羽在喉中攪而引虫水中如牛涎諸虫並出

諸毒門

有二十二名

凡人入山川遠行不服水土或殺畜菜菓産之有毒食之多致於危然而大聖久設救治之法正為民之枉扎如忽而不習其方或一朝逢遇其毒抑如之何今述解毒方法於左少留意焉

溪江水毒

不服水土者病患如傷寒狀先服五加皮末二錢酒調下不愈再服葱白七根豈豉一撮葛根升麻各一錢水一鍾半煎至七分不拘時服少時再服一劑

誤飲虵交水毒

或虵交遺精在水誤飲之成形在腹食其心則用雄黄末二錢水調下

山嵐瘴氣毒

凡入山川見瘴氣雖不病亦可解毒丹一丸於水入薄荷一葉同研下

百虫毒

南方有虫毒之鄉或於他家飲食即以犀角攪之有白沫竦起即為有毒不可食或無犀角試

驗在深山及南方住久必積惡毒並服解毒一
丸

誤食水蛭毒

水蛭入腹日久必成小蛭食人肝血腹痛不可
忍面目黃瘦全不進食不早治必死）用田中
泥一塊以小死魚三五箇同猪膏熔油攪勻用
巴豆十粒去皮膜油入泥內研爛和丸如菉豆
大用田中冷水吞下十丸小兒三丸至五丸須
臾瀉下小蛭却以四物湯加人參煎服

百草毒

用白扁豆晒乾為末每服三錢新汲水調下或
服解毒丹一粒

一切藥毒

用石蟹以熟水磨服或服解毒丹一粒

砒霜毒

其症煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐面色
青黑四肢厥冷命在須臾不救○用菉豆半升
擂去查汲水調通口服或用靛花二錢分二服
井花水調下又方治悶絕心頭溫者汲水調真
粉服之神効

附子毒

服附子多而覺頭重如斗唇裂血流或身發黃
急用黑豆菉豆各數合嚼之及濃煎黑菉豆湯
飲之或悶亂不省醋灌煎甘草湯同生姜自然
汁飲之又方螺青細研新汲水調下

芭豆毒

其症口乾兩臉赤五心熱利不止諸藥不効用
芭蕉根葉研取自然汁服利止而安

班猫芫青毒

用大小黑豆煎濃汁服之並瘥或服解毒丹一

粒

金石毒（即五金五石）

用黑鉛一觔以乾鍋內作汁投酒一升如此數
遍候酒煎至半升去鉛頓服之効或服解毒丹
一粒

一切穀肉菓菜毒

用菉豆一升濃煮汁並豆飲食之凡大小人家
合醬以菉豆為之尤妙

麵毒

食蘿蔔解之

疫死禽獸毒

凡食自死肉疫死肉即服解毒丹一粒

禽獸肝毒

凡物肝臟不可輕食食之中毒用荳豉以水浸
絞取汁旋服之

犬肉毒

凡犬有毒食之不消心下堅或腹脹口乾大渴
心急發熱狂言或洞下服杏仁一升去皮尖研
以百沸湯三升和絞汁作三服犬肉原片皆出

河豚毒

用五倍子白礬各等分為細末水調下不愈再
服解毒丹一粒

鉤吻毒

面青口禁逆冷身痺欲死者有云鉤吻葉與食
芹相似而所生之傍無他草其莖有毛誤食之
殺人用薄桂煮汁飲之不愈再服解毒丹一粒

蛇傷毒

用青黛雄黃等分為末水調服磨解毒丹涂驗

犬咬毒

方見急救門更服解毒丹一粒冷水磨塗患處

湯火毒

方見急救門更用解毒丹一粒流水磨塗傷處

解毒丹

凡人居家出入不可無此藥真濟世衛家之寶
除解已上之毒更治十五門病症〇五倍子三
兩淡紅黃色者搥碎洗淨山茨菰二兩續隨子
一兩去殼研細以紙裹壓去油紅牙大戟一兩
半淨洗麝香三分右研為細末糯米粥為劑每
料分作四十粒端午重陽七夕俱合用辰日杵
千下勿令婦人雞犬孝子見

治外科癰疽發背魚臍瘡未破之時用一粒水磨
塗痛處并磨服之覺痒立消

治傷寒科陰陽二毒心悶狂言胸膈壅滯邪毒未
發及瘟疫用一粒薄荷一葉同研水送下

治咽喉科纏喉風用一粒服法同前

治牙齒科牙疼用一粒酒磨塗患處及含藥少許
吞下

治小兒科急慢驚風五疳八痢用一粒蜜水薄荷
一葉同研下牙關緊急水磨一粒塗於牙關

治女科鬼胎鬼氣並用無灰酒磨下一粒

治眼科赤眼水磨一粒服之

治中風門諸般癎症口眼喎斜目掣眨夜多膈涎言語蹇澁卒中風口禁牙関緊急縱縮骨節風腫手足疼痛行步艱難一應風氣痛並用酒磨下孕婦不服

治急救門縊死落水死心頭煖者驚死未隔宿者並用冷水磨灌藥一粒

治神鬼病門急中顛邪喝叫狂走用無灰酒磨下一粒

治頭疼門年深日近頭痛太陽疼用酒入薄荷葉磨濕紙花貼太陽穴

治瘧疾門諸般瘧疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯磨下一粒

治損傷門從高墮下跌蹼打傷墻屋倒壓炒松節煎無灰酒磨服一粒并塗傷處

治黄疸門諸疸並用酒磨服一粒

治痨瘵門磨一粒服下二時痨吐下

四物湯見虛損門

咽喉門有十七名附骨鯁

此門與舌口門互相查考治病

喉之腫脹古名喉痺痺者不仁也君火相火主之嗌乾嗌痛咽腫頷腫舌強皆心火為病惟喉痺急速二焦相火所為也咽喉舌病同於火故不分耳熱上行傳於喉之兩傍近外腫作以其形狀似乳蛾故名曰蛾初發一邊腫為单乳蛾兩邊腫為雙乳蛾比蛾差小者為单閉喉雙閉喉熱結於舌下生一小舌名子舌腫熱結於舌中其舌腫大名木舌腫熱結於咽喉腫透於外且麻且痒腫而大者名纏喉風走馬喉痺其症生死在於反掌用針出血最為上策也

〇治法

凡喉症用藥吹喉間凉藥灌鼻中拔毒藥敷外腫處藥水灑患處百餘遍服牛蒡子散

凡喉症不用刀針法用小口瓶内燒蛇床子煙張口受煙一薰即破

凡喉症用止痛法生薄荷研蜜調成膏送入喉立効如涎多未退再用之即以葱頭兩箇搥

碎安牙牀頭處立開

凡一切喉症服牛旁子玄參升麻桔梗犀角木通黃芩甘草各等分水煎服

凡一切喉症吹喉藥用枯礬叁錢銅綠五分為細末以蘆管吹入少許喉中即將筯咬齒上垂頭放出痰涎一日吹數次在無風處吹之吹時以筯壓舌〇又方用烏梅肉包肥礬稀薄布裹含之

凡喉症用陽起石伏龍肝各等分新汲水調灑患處百次

單乳蛾

用如聖金錠子

雙乳蛾

用神仙奪命丹

纏喉風

用拔毒雄黃散

走馬喉痺

勢如奔馬腫痛煩滿数々出氣〇服橘皮湯

單喉閉

用七保散

雙喉閉

用紫苑方

重舌

用皂角刺煅朴硝少許研勻先醮藥水擦口內并舌上下隨將藥末摻舌上下　出即消

木舌

半夏醋煎漱口吐出藥不時嗽之以瘥為度

傷寒邪熱為喉痺

用半夏湯

時毒為纏喉風

服普濟消毒散

氣逆為喉痺

服射干湯

痰飲為喉痺

服射干湯

冬月咽喉不利語声不出

用玉粉丸

壯實人咽喉疼痛

服防風散虛人少用

喉症牙關緊閉

术膏

益母草　人參　白术　桃仁　陳皮
黄芪　茯苓　甘草　猪羊胞入藥共
煎服之

天門冬飲子

天門冬　知母　茺蔚子　五味　防風
茯苓　羌活　人参（各等分）水二碗薑三片
煎八分食後服

生熟飲子

草　肉豆蔻　草果　厚朴　半夏

甘草　大棗　生姜（各等分）水二
鍾煎八分食前服

草果飲子

草果　半夏　川芎　赤茯苓　陳皮
白芷　水煎服

全生方

白术　姜皮　大腹皮　茯苓皮　陳皮
為末每服二錢米飲調下

探吐法

此法治胞轉服參术飲以指探喉中吐出藥汁

及腫處然後以温水灌漱如咽喉間毒已破瘡
口痛者用猪膽髓蒸熱淡薑醋蘸喫之立効

七保散（治咽喉及纏喉風）

殭蚕（十箇）　蓬砂（一錢）　雄黄（一錢）　全蠍（十箇）　明礬
膽礬（五分）　皂角（小者一錢）右為細末每服一字吹入
喉中即愈

清心利膈湯

防風　荊芥　薄苛　桔梗　黄芩
黄連（各一錢半）　山梔　連翹（各一錢）　玄参　大黄
朴硝　牛旁子　甘草（各七分）右作一服用水

二鍾煎至一鍾食遠服

用巴荳法

以巴荳去殼以紙包巴荳內用竹管壓出巴荳
油在紙上將油紙作撚點燈吹滅以烟熏左右
鼻孔中口鼻涎流牙關開矣

甘桔湯（治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有碍）

桔梗（一兩）　甘草（半兩）　右作一服水一鍾煎至一
鍾食遠服

橘皮湯（治馬喉熱如奔馬喉痛脉滑數吐氣）

橘紅　竹茹　生地　山梔　白术

第一一〇 册 續修四庫全書 第 2 版反白

黃芩（各二兩） 官桂（一兩） 赤茯苓（二兩） 右剉碎每服三錢水一鍾生薑一片紅棗二枚煎五分去查下芒硝末一錢食後温服一日三次

神仙奪命丹（治纏喉風木舌脹乳鵝喉閉或誤吞雞魚骨刺竹木刺一切咽喉急症）

烏賊骨（二錢半） 射香（一字） 白茯苓 蜜陀僧（炒）
白殭蚕 貫衆 縮砂仁 紫河車
甘草節（各一兩） 右為末研勻用蒸餅包白麪蒸熟四兩和藥汲井水丸如豌豆大蛤粉為衣放乾處十年不壞每服一丸以瓦器研碎水半盞浸一茶時化開用匙挑藥滴入喉中

射干湯（治喉痺腫塞不通疼痛不下飲食并諸毒發動）

射干 白芷 當歸（各一兩） 杏仁 升麻
犀角 甘草（各半兩） 每服三錢水一盞煎七分去滓不拘時温服日三次

如聖金錠子

硼黃 川芎 川烏 薄荷 硝石
茅朮 生地（各等分） 右為末以生葱汁捜和為錠每服先將新汲水灌漱吐出次嚼薄荷五七葉微爛用一錠同嚼極爛以井水嚥下甚者連進三服即愈重舌腮腫先服一錠次以一錠安患處便消冒暑伏熱不省人事用薄荷水調研一錠灌下即甦行路常噙一錠即無暑熱之患

金鎖匙

鬱金 大黃 草烏 猪牙皂角（去皮弦）
南星（各四錢） 巴豆（五箇去油） 右為末用生薑自然汁調五分許以鷄翎拂入喉中已死者用竹管吹入須臾醒然後用藥半錢以調食之其吐瀉為驗

一字散

雄黃（一分） 蝎稍（七枚） 猪牙皂角（七箇） 白礬（二錢） 藜蘆（二錢）
右為末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎即愈一方無蝎稍亦治時氣纏喉風累用救人萬無一失

一捻金散

地龍（入錢） 射香（少許） 全蝎（炒） 殭蚕（炒） 鬱金
甘草 右為細末每用一匙吹入喉內舌根不數次愈

雄黃散

雄黃 乾桑 黃茹（二片） 巴豆（去殼七粒） 鬱金
研勻用半匙清茶下如口禁咽塞用小管納藥吹入喉中須臾吐利即愈一方無乾桑黃茹

奪命散（治急喉風等症）

白礬　蓬砂　皂角（各等分）右為末每用少許吹喉中痰出即愈

治咽喉不得針者

用蛇床子入在小口瓶內燒烟患者張口受烟一熏即破

潤閑佳痛方

以生薄荷研蜜調成膏送入咽喉下立効如涎多不退再服一方用葱頭兩箇搗研空牙牀頭處立開

紫苑方（治纏喉風閉飲食不通欲死者）

用返魂草根一莖即紫苑納入喉中待取惡涎出即可如患乳鵝刺破後更以紫苑濃煎湯嗽下更以馬牙硝末挑一錢入咽間即愈一名紫苑又南中呼為夜牽牛是也

治一切咽頷腫毒

右以蟬殼為末猪膽汁和蜜調傅腫處

拔毒藥　普濟消毒散　半夏湯

牛旁子散　拔毒雄黃散　防風湯

不用刀針法　巴豆法　已上湯開末卷

咳逆門（有十名）

咳逆之聲連續不絕有數声起至四五十聲而止者氣自臍下衝上出於口而作聲之鳴也俗名吃忒咳逆不順之義吃忒差錯之義二者皆氣不得下為火熱托之而使上至咽喉中噎而止也古人悉以胃弱言之而不言火熱况人之陰氣依胃為养胃土損傷木氣則侮此土敗木賊也陰為火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上為之咳逆言胃弱者即陰弱乃虛之甚也大抵傷寒後大病後老人虛人產婦多有此症皆病深之候

○不治脉

肺部脉散

○難治症

病後咳逆

○治法

凡咳逆有餘并痰者吐之用人參蘆之類不足者人參白朮下大補丸

凡咳逆以撚紙條入鼻作嚏而止或詐究賊盜因恐而止或鼻聞香食熱而止此三法謂抑

之駁之使氣下而愈

凡治咳逆服藥無効用硫黄嗅法不愈再用雄

黄嗅法

凡咳逆氣虗用人参白术

凡咳逆寒熱或因汗吐下誤服凉藥宜温補之

凡咳逆挾熱者宜凉之

凡咳逆脾胃虗火逆上宜平補之

凡咳逆如傷寒失下宜下之

凡咳逆痰蓄暴怒別無他病宜吐下之

凡咳逆陰火炎上用黄連黄柏滑石

寒咳逆

或胃中有寒為咳逆○服

寒熱咳逆

傷寒熱症咳逆嘔噦○服小柴胡湯加柿蒂

傷寒咳逆

傷寒咳逆日夜不止○服華澄茄散

飲咳逆

或嚥飲錯喉而氣搶為咳逆○服五苓散加橘

皮枳殼

食咳逆

或急食乾物而氣塞為咳逆○服五苓散加枳

枳桔梗

笑咳逆

或喜笑多而氣噎為咳逆○服橘皮枳殼

水咳逆

或水漬於肺心下痞連續不已○服五苓散加

枳實桔梗蒼术白术

吐利後咳逆

或吐利後胃虗為咳逆○服橘皮竹茹湯

大病後咳逆

大病後脾胃虗寒咳逆七八聲相連收氣不回

難治○服丁香柿蒂散

咳逆大便閉

服大承氣湯

橘皮竹茹湯

橘皮（二錢）　竹茹（二錢）　人参（二錢）　甘草　作一服

水二鍾薑五片紅棗三枚煎八分不拘時服

半夏生薑湯

半夏（六錢）生薑（五錢）　作一服水二鍾薑五片煎

一鍾不拘時服

丁香柿蒂散

丁香　柿蒂　人参　茯苓　橘皮　良薑（炒）

半夏　生薑（各等分）為末每服三錢水一盞煎服

治寒氣攻胃咳噫

用黑豆二合炒熱入於瓶中以熱醋沃之紙封固上開一小孔令患人以口吸其氣入咽喉中其咳即定

蓽澄茄散

蓽澄茄　良薑（各二兩）右為末每服二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出呷之

硫黃嗅法

硫黃　乳香（各等分）為末用酒煎急令患人嗅之

又方嗅法

雄黃二錢為末用酒一盞煎七分急令患人嗅其熱氣即止

大承氣湯　　小柴胡湯

見脾胃門　　見傷寒門

大補丸　　五苓散

見虛損門　　見濕門

厥逆門（有十二名）

厥逆兩說而手足冷者謂之厥四肢不溫者謂之逆由臟氣相刑或與外邪相忤則氣不行氣不行閉於經絡諸脈伏匿昏不知人陽氣衰於下為寒厥陰氣衰於下為熱厥陰氣盛於上為尸厥氣血相搏血氣入於臟腑為卒厥又曰氣厥

○總脈

沉微為寒厥　沉數為熱厥　脈細為氣厥

脈虛為血厥　浮滑為痰厥

○死症

唇口青死　身冷者死

○治法

凡治厥逆降心火益腎水通血脈調氣

凡治厥逆先用瓜蒂散吐之

凡治厥逆遇口噤用搐鼻法

凡形氣稍實者先用瓜蒂散

凡治厥形氣虛者兼用調理

凡治不問何厥先灌蘇合香丸醒後隨證用藥

寒厥

手足冷初得之時四肢冷脉沉微不數多悪寒引衣自覆下利清穀外多惺惺○服四逆湯

熱厥

手足熱初得之時必發熱頭疼脉沉伏數畏熱喜冷揚手擲足煩躁不眠大小便閉赤外症多昏冒○服白虎湯

尸厥

其症暴不知人或至半日遠一日復又識人○服追魂湯

卒厥

卒厥為形實七情痰飲內欝而厥必半日一二時悶愈形虛而氣逆甚者多不救○服追魂湯

氣血為厥

雜病吐衂血而厥不知人者一二日或兩三日則愈陰氣上實身不熱熱則不厥厥則為血温身熱○氣虛用四君子湯血虛用四物湯

卒暴厥

不知人未辯風痰氣寒熱○用蘇合香丸治之醒後辯症服藥

風厥

手足搐搦○治宜解散藥加薑汁

痰厥

涎潮如拽鋸聲在咽中○用竹瀝白术為主

氣厥

暴氣而厥○用八味順氣散

酒厥

因酒而得○治宜發汗利小便補胃氣

胃厥

喘而強直○用馬兜苓枳殼半夏陳皮姜汁竹

瀝黃栢橘紅甘草

骨厥

骨枯爪痛○用黃栢熟地玄參地骨皮當歸枳殼花粉貝母

四君子湯　　四物湯

見脾胃門　　見諸血門

瓜蔕散　　搐鼻法　　蘇合香丸

四逆湯　　白虎湯　　八味順氣散

追魂湯　　已上湯名見九卷

破傷風門（有八名）

外科金瘡科必與此門並用

破傷風病與傷寒症同治須分虛實陰陽表裏半表半裏宜汗宜下宜和解及分傷輕傷重因諸瘡出膿血過多外入風邪或瘡口早閉瘀血疑內或灸毒瘡火熱欝內即生熱也熱則生風傳播經絡寒熱更作身體反張口噤不開甚者邪氣入臟與中風相似但中風之人尚可淹延歲月破傷風病治之少緩不救也亦有瘡口袒露不避風寒而成

破傷風症或瘡口十分安妥而忽患破傷風病皆由內之氣血兩虛而在欝熱未散所以遲發之也內氣壯實而無欝熱者雖破傷之無是患也

○總脉

表脉浮而無力膀胱主之用發汗藥

裏脉長而有力胃家主之用利下藥

半表裏脉浮弦小膽主之用和解藥

○治法

凡破傷風宜除風散結氣如爽藥下後以退風熱開結滯藥調之熱退結氣散風自愈矣

凡治破傷風宜按摩導引及以物幹開勿令口噤使粥藥可進也

凡破傷風大便不通小便赤或汗不止承氣湯速下之

凡破傷風脉沉在裡用承氣湯下之

凡背後搐者用羌活獨活防風甘草

凡胸前搐者升麻白芷獨活防風甘草

凡兩邊搐者柴胡防風甘草右搐加滑石

凡治破傷風如治傷寒發熱用麻黃桂枝加黃芩石膏知母之類是也

發表藥

用羌活防風湯

攻裏藥

用大芎黃湯

半表半裏藥

用地榆防風散

風入瘡口

項背強牙關緊急欲死○服防〔風〕散又方用蜈蚣為末擦牙吐出涎沫立愈

破傷風

驚搐臟腑閉澁病在裏可用此藥下之○服江鰾丸

治發表藥過有自汗

服白术防黃湯

治破傷風大汗不止筋攣搐

服白术湯

治病日久氣血漸虛邪氣入胃養血

服養血當歸地黃散

白术防黃湯

白术　黃芪（各一兩）　防風（二兩）　分作三服每服用水二鍾煎至一鍾溫服

大芎黃湯

川芎　羌活　黃芩　大黃（各一兩）　分四服每服用水二鍾煎至一鍾溫服

白术湯

白术（一兩）　葛根（一兩）　升麻　黃芩（各五錢）　芍藥　甘草（各三錢）　分作四服每服用水二鍾

羌活防風湯

羌活　防風　川芎　藁本　當歸　芍藥　甘草（各二錢）　地榆　細辛（各一錢）　分作二服每服水二鍾煎八分熱服若大便閉加大黃

防風散

防風　天南星（炮）　各等分為末每服童便一大盞煎七分熱服

地榆防風散

地榆　防風　燈草　馬齒莧　各等分為末每服三錢溫米湯調服

養血當歸地黃散

當歸（酒洗）　地黃　芍藥　川芎（各一兩）　藁本　防風　白芷（各五錢）　細辛（半錢）　分作六服水二鍾煎至八分服

江鰾丸

江鰾（燒半兩）　野鴿糞（炒半兩）　雄黃（一錢）　白殭蚕（四錢）　蜈蚣　天麻（一兩）　右為細末飯研為丸如梧桐子大朱砂為衣巴豆霜一錢入前藥內每服十九空心白湯下以利為度如不利仍前藥服如利則止

遺精門（有十名）

精者人身之本生氣之源隨之化也腎受五臟六腑之精而藏之故曰腎藏精心為主宰其病雖在腎責本在乎心心主神神有所思動則神馳不返由是君火失令相火失守下焦不能制藏真精真精自漏不待交感而夢中遺泄也豈非心腎不交之致乎又有不因夢中遺泄而出者名曰精滑精滑當固其真遺精當治其心此則謂治其本也

○總脉

脉弦大男遺精女漏下

○治法

凡遺精用青黛龍骨黃栢為主藥

遺精

服百補交精丸

精滑不禁

服鎖精丸或固真散

臨去即遺精

服固真散

陰虛火動遺精

服十味地黃丸（方見注夏門）

情滿遺精

不須服藥

晝所思見夜即遺精

不須服藥全要正心誠意

內傷遺精

內傷氣血不能固守精遺者○用八珍湯加牡蠣火煆存性

用心過度心不能攝腎遺精

用十味地黃丸（方見注夏門）

大便閉結夢遺者

用鎖陽煮粥食之

大便溏而夢遺者

用牡蠣醋煆醋丸服之

固真散

白龍骨（一兩）韭菜子（一合）為細末每服二錢空心酒調服

鎖精丸

獨活　續斷　穀精草　石蓮肉　菱米

金櫻子　白茯苓　川練子（醋炒）　小茴香　藕節

一多一一 冊 續修四庫全書 第 2 版反夕

生芡實　蓮蕊　龍骨（各半分）右為末雞子清丸如梧桐子大每服四十五丸空心鹽湯送下以乾物壓之

百補交精丸

熟地（四兩）　山藥（二兩）　五味子（一兩）　杜仲（三兩）　牛膝（二兩）
肉蓯蓉（二兩）　澤瀉（炒）　山茱萸　茯神　遠志
巴戟（去心）　石膏　栢子仁　赤石脂（各二）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸空心用酒送下

八珍湯（四君子湯合四物湯見諸血虛氣門）

白濁門（有八名）

白濁又名白淫由腎水不足不能升運膀胱之火凝結自敗故小便澁而成濁又曰胃中痰積流下滲入膀胱而有赤白之分赤濁為心腎有熱思慮而得之白濁為腎虛有寒嗜慾而得之其狀如油或如膏或有五色光彩或多或久不愈令人虛損成癆也

○易治脉

遲

○難治脉

尺部脉虛浮急

○治法

凡白濁宜燥濕降火甚者上用吐法以提其氣下用二陳湯加蒼朮白朮赤濁濕傷血加白芍藥黃栢青黛滑石蛤粉神麴糊丸服

赤濁

服遠志丸　小陸二仙丹

白濁

服鹿茸益精丸

一六〇八冊　續修四庫全書　第17

白濁出如骨髓

服大茴香丸

肥人白濁

用半夏神麯共（炒）白伏苓各等分為末姜汁糊為

丸服

瘦人白濁

用黃栢滑石椿（皮）川芎黃連滑加龍骨石脂血

虛加四物湯

虛劳人白濁

用補陰藥大槩不宜寒凉胃虛弱者加白术

小便不清

服便濁方

精氣不固白濁

用茯苓一觔去皮切作塊用水二碗煎乾取出晒乾為末争篩四兩黃蠟四兩將蠟溶化入茯苓末丸如彈子大空心細嚼一丸滿口生津慢慢嚥下服之小便清為度忌食醋

四物湯

川芎　當歸　芍藥　熟地

二陳湯

半夏　廣陳皮　水二鍾薑三片煎服

大茴香丸

大茴香　酸棗仁（炒）　破故紙（炒）　白术　杜蠣

益智　人參（各等分）為末用青塩酒糊丸如梧桐子大每服二十丸食前米湯送下

遠志丸

遠志（半斤）　茯神　益智（各二兩）為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸白滚湯送下

鹿茸益精丸

鹿茸　桑螵蛸　肉蓯蓉　杜仲　巴戟

兎絲子　益智仁　川練子　禹餘粮　當歸

（已上各二兩）　韭子（炒）　破故紙　山茱萸　龍骨

赤石脂（各五錢）　乳香（二錢）為末糯米糊丸如梧桐子大每服四十丸食前白滚湯送下病愈即止藥

小六二仙丹

龍骨（一兩）　砂仁（錢半）　訶藜勒（皮五）　丹砂（五分）　為末煮糯米糊丸如綠豆大以硃砂為衣每服十九空心酒送下臨卧五丸冷水送下倘大便不通用葱煎湯濃茶各半服之

便濁方

（生礬三錢研細用偕油熬熟入童便小盞煎一沸入礬在內調勻食前服）

汗門　有七名

汗者心之液陽熱入陰血散於外而為汗也盜汗睡中而出自汗亦非睡去又不因發汗行坐之間而汗自出也盜汗自汗其出雖異其液一也又曰陽蒸陽分而液出為自汗陽蒸陰分而液出為盜汗內分陰陽之偏勝外分腠理之竅審內緣心腎俱虛外為肺氣不足明此理而治之其効甚速也

○死症

傷濕額上汗因下微喘者死

○禁食

梔子　李子　杏子　雀肉　辛辣　麩麪

止一切汗法

麻黃根藁本白芷牡蠣煆龍骨腦子各五錢米粉二兩右為細末以細紗包藥汗處撲敷之汗止為度

○治法

凡自汗用人參黃芪少佐桂枝虛者少加附子以行參芪之功

凡汗熱用痰熱藥少許

凡火氣上蒸胃中之濕作汗者用涼膈散

盜汗

用當歸六黃湯外用止汗法（見治法前）

自汗

用牡蠣散外用撲法（見治法前）

傷風傷寒有汗

見傷寒門

濕勝自汗

用調衛湯

飲食汗出

用調衛湯

別處無汗獨心孔一片有汗

用艾煎湯調茯苓末服之

頭額汗

陰陽俱虛枯燥亡津液○熱入血室頭汗○胃上蒸熱額汗○發黃頭汗○服大補黃芪湯

當歸六黃湯

當歸黃連黃栢黃芩生熟地各等分黃芪倍加

水二鍾浮麥一撮煎服

牡蠣散

麻黄根　牡蠣（各二錢）黄芪（三錢）浮麥（三錢）水煎服

大補黄芪湯

黄芪　黄芩　防風　山茱萸　當歸

白术　甘草　茯苓　熟地　浮麥

各一錢水二鍾半煎一鍾服過一貼去防風再煎一二貼汗止為度

調衛湯

麻黄根　黄芪（各一錢）羗活（七分）甘草　當歸

黄芩　半夏（各五分）蘇木　紅花（各一錢）五味

麥門冬　生地（各三分）猪苓（二分）水煎服

涼膈散

連翹　梔子　黄芩　薄荷　甘草

大黄　朴硝（半分）水二鍾薑三片燈心煎服

班疹門有十二名

班疹皆毒氣并血熱蘊畜於命門遇相火合起則發隱隱發於皮膚之間故言隱疹發則或痒或不仁班屬三焦相火疹屬心火班亦有屬風熱而作者疹亦有屬肺熱而作者但陰陽不同有傷寒不當下而反下之熱邪乘虛而入發班者有傷寒當下反不與下之胃熱不得泄而成班者有陰症傷寒發班有時氣發班有熱病發班有溫毒發班有內傷發班其班如錦紋或發面部或發胸背或發四肢治斯疾者全要服到心到庶無差矣

○驗看班疹法

用紅紙撚条淬油點火照面部至四肢胸背皮裡肉外有色點無頭粒者名曰班有頭粒浮皮上隨起即沒沒而又出有小紅壘行皮膚之中名曰疹○班色赤者胃熱班色紫黑胃爛○陰症班發在胸背并手足但稀少微紅如蚊蚤虱咬狀而非錦紋

○不治症（二名）

發班兼身熱　陽毒發班如錦舌捲狂（七日不治）

○死症

班色紫黑死　陰症發班作热治者死

○治法

凡班疹用通聖散中消息當微汗以散之不（可下）

凡班疹有胃热助心火傷肺故紅點如班生皮毛間白虎湯瀉心湯從長用之

凡班疹因外感热症用玄參升麻湯白虎湯類

凡發班疹若自吐自瀉者謂邪氣上下皆出主多吉切不可妄治

凡班疹首尾俱不可大下大抵宜用安表藥六分發散藥四分

凡班疹病大便閉者微々踈利之不可大下

陰症發班

班出胸背并手足稀少微紅如蚊蚤虱咬狀非若錦紋○服大建中湯

內傷外感陰班

先有內傷症後又有外感病故發陰班○服調中湯

傷寒發班

詳見傷寒門或以玄參升麻湯白虎湯治亦効

疹

熱與痰在肺治服清肺火降痰解[illegible]微汗之

內傷發班

因胃氣虛極一身之火遊於外以致發班治宜補以降之

班疹

有胃熱助心火傷肺見紅點如班生皮毛間○白虎湯瀉心湯從長用之

外感熱症發班

用玄參升麻湯白虎湯等藥

時毒發班

脉絃洪在半表裏者○服中和湯

時毒瘡疹

發於頭面胸膈之際脉浮洪○服升麻牛蒡散

四時癮疹

四季時氣傳肌膚發癮疹增寒壯熱○羌活散

陽毒發班

狂妄言面赤咽痛下利吐膿血陽毒者內外結熱舌捲黑如烟煤班如錦○服陽毒升麻湯

治班癮疹

服消毒犀角飲以犀角磨五分入藥中

陽毒升麻湯

升麻（酥）　犀角　射香　黄芩　人參

甘草（各二錢半）右水二鍾半煎至八分先飲半鍾刻許再進半鍾溫覆手足出汗得解

調中湯

蒼术（一錢半）　陳皮（一錢）　砂仁（炒）　藿香　芍藥

甘草（炙）　桔梗　半夏　白芷　羌活

枳殼　川芎　麻黄　桂枝（各五分）　薑三片水煎服

玄參升麻湯

玄參　升麻　甘草　水煎服

消毒犀角飲

牛旁子（六錢）　荆芥（三錢）　防風（三錢）　甘草（一錢）水煎服

羌活散

羌活　前胡（各半兩）　人參　桔梗　甘草

枳殼　川芎　天麻　茯苓（各二錢半）　蟬蛻

薄荷（各一錢半）右為粗末每服五錢薑三片水煎服

升麻牛旁湯

升麻　牛旁子　甘草　桔梗　葛根

玄參　麻黄　連翹　各一錢水煎服

中和湯

荆草　菖蒲　牛旁子　羌活　川芎

防風　甘草　麥門冬　前胡　水煎服

白虎湯

知母（一錢半）　石膏（五錢）　甘草（七分）　粳米（一撮）水二鍾

薑一片煎八分溫服

大建中湯

見九卷

瀉心湯

見九卷

眩運門（有一十入名）

眩運分之為二雖曰痰與火未嘗不由腎虛兼風邪所得痰本流動之物又因火動兩動相搏則為旋轉如頭旋目眩卒然惡心欲吐眼花視物不的如屋旋轉起則運倒皆由勞傷精血腎氣不能歸元而諸氣逆上是為頭目眩運也醫者審察內傷外感分別標本盛衰用藥治之

○總脉

脉浮為風　脉緊為寒　脉数為熱

脉細為濕　脉實為痰　脉大為虛

脉濇為死血

○治法

凡眩運屬痰多無痰不能作運雖風者亦必有痰

凡眩運火動其痰用二陳湯加黃芩蒼术羗活

凡眩運挾氣虛亦治痰為主兼補氣降火藥白术半夏黃芩天麻之類

凡眩運因失血多者用芎歸湯

凡眩運壯實氣實人用大[illegible]為末茶下

凡眩運用滚痰丸治痰火

凡眩運用瓜蒂散治痰厥

風寒入腦眩運

用三五七散

風痰氣散眩運

用去風飲子

風痰攻[illegible]心神煩亂眩運

用漢防己散

傷風眩運

先服吐藥後服愈風餅子

惡風自汗眩運

用川芎散

感寒湿頭重眩運

用芎术除眩湯

冒雨閉湿眩運

用芎术湯

陰陽不升病篤眩運

用增損黑錫丹

邪氣鼓作時或旋轉眩運

用天麻羗活丸

耳鳴耳聾眩運
用沉香磁石丸
目昏面浮腫眩運
用菊花散
血崩産後眩運
用芎歸湯
腦皮腫痺眩運
用紅花浸酒方
金瘡吐衄眩運
用芎歸湯

七情内傷眩運
用半夏湯
舉頭似星轉眩運
用大芎辛湯
覺屋俱轉目閉不開
用人參湯
酒醉行房眩運

川芎散
山茱萸（一兩）　甘菊花　人參　川芎（一）　山藥

茯神（各一兩）　右為末每服二錢酒調下
三五七散
天雄（炮去皮）　細辛（各三兩）　乾姜（炮）　山茱萸（各五兩）
右為末每服二錢酒調下
芎朮湯
川芎　半夏　白朮（各一兩）　甘草（五錢）
右作七服每服水一鍾半薑七片煎至七分服
半夏湯
大半夏（湯泡七次）　右每服四錢水一鍾半薑十片煎
至七分磨入沉香水一呷温服

芎歸湯（治一切失血眩運不甦）
芎藭　當歸（酒洗各二錢半）　右水一鍾半煎七分服
芎朮除眩湯
方見温門
漢防已散
漢防已　麥門冬　前胡（各一兩）　半夏　旋覆花
防風　細辛　甘草（各五錢）　人參　赤茯苓
芎藭　枳實　羚羊角　荊芥（各三錢）　右每
服三錢水一鍾生薑三片煎至六分不拘時服
去風飲子

防風　人參　橘紅（各二兩）　白朮　茯神（各三兩）　生薑（四兩）　以水十升煮取二升去查分四服一日服盡

增損黑錫丹

胡蘆巴　官桂　茴香（各一兩）　青皮　川練　陽起石　木香　沉香（各五錢）　烏藥　磁石（各二錢）　右為末酒煮糊和丸如桐子大每服七十丸湯送下

菊花散

菊花　旋覆花　牛旁子　羌活　獨活

甘草（各半分）　右每服五錢水二鍾生薑三片煎八分食遠服

人參湯

人參　白朮　當歸　麥門冬　防風　官桂（各一兩）　獨活　黃芪　芍藥（各一兩半）　右每服五錢水一盞半煎至八分食前温服

[illegible][illegible]神妙散

瓜蒂　焰硝　雄黃　蒼耳　川芎　薄苛　藜蘆　天竹黃　右為細末口含水鼻中搐一（匙神驗）

愈風餅子

川芎　白芷　防風　甘菊　細辛　羌活　天麻　荆芥穗　薄苛　甘草（各一兩）　川烏（半兩）　右為末湯浸蒸餅和作餅子每服五餅食後嚼碎茶清送下

天麻羌活丸

天麻　羌活　白芷　藁本　芎藭　芍藥　細辛　麻黃（各二兩）　牛黃　射香（各一分）　右為末煉蜜和丸如皂角子大每服一二丸不拘時服薄苛湯下

二陳湯　沉香磁石丸

大芎辛湯　紅花浸酒方

炮製藥品便覽

○草木花卉部

人參（如人形色黃閏照見通明結實去芦蒸用）
甘草（瀉火熱生用和補宜炒用）
茯苓（去皮紅筋不損目）
陳皮（廣東皮薄者陳久良）
白扁豆（微炒）
蒼朮（米泔浸炒出茅山佳）
玄參（用蒲草重重相隔蒸熟如犯鉄器害喉目）
丹參
知母（散炒勿犯鉄器酒炒行於補胃）
黃連（酒炒上行頭目姜汁炒辛散中熱有功）
片黃芩（心中枯者名片芩上部用宜酒炒）
天門冬（水洗去心衣）
生地黃（酒洗不犯鉄器）
當歸（酒先）
川芎（形塊重〻結實微大而黃色不油者良實大堅重內外俱白切之成片者乃西芎不入藥）
芎藭（形小者名芎藭）
白芍藥（或生用或平炒或酒拌炒）
烏藥（去土刮去皮）

黃芪（皮黃肉白味甘佳外科生用內科蜜水炙）
乾山藥（生用刮去黑皮形如小指潔白者佳）
茯神（去皮去心中間木去紅筋不損目）
白朮（煖胃炒用其餘皆可生用）
芡實（去殼生用有力）
沙參（去芦須要真者）
苦參（酒拌炒）
貝母（灰中炮黃如用独顆不分瓣擷筋秋）
黃柏（上用酒炒中用蜜水炒下用塩水炒）
胡黃連（形以枯楊枝外黃裏黑折之塵如烟）
條芩（堅實細者名條芩凡用宜水煮）
麥門冬（水洗去心如不去心令人煩心）
熟地黃（酒洗不犯鉄器）
白芷（水洗不焙見火）
藁本（去芦不見火）
桔梗（去芦及兩傍窮拔米泔拌浸乾）
厚朴（色紫形實姜汁拌炒）

山梔（去殼姜汁拌炒形大者名伏尸不用）
枳殼（凡用去穰麩皮同炒）
半夏（滾湯洗六七次令滑淨姜汁制）
前胡（去芦去土用甜竹瀝潤曬乾味甘氣香是真胡味澀酸是野蒿根誤食令人反胃不受食）
柴胡（形長軟皮赤黃有鬚勿見火似竹葉勿用）
升麻（形輕堅實青綠色者佳去腐爛黑皮用）
麻黃（青色陳久者良凡用摘去節根先煑一二沸掠去沫則不令人煩悶）
肉桂（凡用刮去粗皮形厚味濃名肉桂）
紫蘇（東[illegible]紅者佳）
胡蘆巴（即是番蘿蔔子春生苗夏結子）
骨碎補（一名猴孫姜凡用刮去毛）
菟絲子（酒拌蒸熟杵爛作餅曬乾研末入藥）
大麻子（入土者損人用布包滾湯浸之冬取出垂井勿令着水次日取起放瓦上炒去殼用之）
金櫻子（有刺搗汁去粗熬膏取用）
鎖陽（即蓯蓉根酒浸洗去鱗甲腰脚酥炙）
杜仲（去皮塩水拌炒去絲）
白薇（形如葱管者佳）
白附（形似天雄新羅出者佳凡用炮過入藥）
附子（頂負方正重一兩或七八錢足附子童便煮炮令裂內外俱黃去皮臍用）
天雄（即附子之長者麪包煨黃去皮臍用）

青皮（凡用去穰夫皮同炒）
枳實（同麩皮炒）
南星（制法与半夏同）
葛根（去皮切片乾末白者佳）
薄桂（凡用刮去粗皮形薄味淡名薄桂）
玄胡索（形如半夏色黃如端丸用塩水拌炒）
蘇子（色紅者佳炒研入藥）
補骨脂（即破故帋酒浸洗蒸半日曬乾入藥）
狗脊（一名金毛狗脊去毛酒拌蒸一二時）
胡麻（三角胡麻四角者佳）
肉蓯蓉（酒浸刷去浮甲劈破去白膜脚酥炙）
牛膝（形長大柔潤者佳去芦酒洗曬）
訶子（用六稜者色黃帶黑肉厚佳煨熟去核）
白芨（川廣出者佳）
川烏（炮）
石斛（去根酒洗蒸用）

細辛（揀去双葉不宜人須去頭土以水浸一宿濾出曬不見火凡用只三分若止多用塞死）
側子（即附子旁出者如棗核大治風疹炒去臍子是[illegible]象附烏側中跳總者各大驚損眼目）
續斷（節上生皮皺者為真酒浸取出焙去梗心）
砂仁（去殼微炒熟研細）
草豆蔻（麵裹煨熟研碎）
肉果（麵裹煨黃熟草紙包打出油）
水薑（去皮熱留皮涼其微性寒）
川椒（揀去目及閉口者炒出汗用）
蓽澄茄（酒拌蒸）
山茱萸（去核如不去核泄精）
蘿蔔子（微炒研碎）
木瓜（忌犯鐵器）
地骨皮（去骨洗去土）
北五味（去梗打碎）
石蓮子（去殼用）
罌粟殼（去膈膜頂蒂蜜水拌炒用此藥急澀殼人不宜輕用服此藥諸藥難獲効）
何首烏（忌犯鐵器用刀切作片子曬乾木杵搗之有雌雄二種雄者赤色雌白色須雌雄相合用）
蒲黃（生用破血隔紙炒用止血忌犯鐵器）
艾（州出者佳生用性寒炒用性溫）
香薷（江西出生石上者佳）

遠志（用甘草湯煮一時去心用不令人煩）
白豆蔻（去殼研碎）
草果（去殼研碎）
香附（用童便醋鹽米泔浸炒）
乾薑（生用性熱炒用性溫）
秦椒（去目及閉口者）
吳茱萸（用滾湯泡去苦汁二三次鹽水炒）
大蒜（獨囊者尤佳）
山查（去核用）
瓜蔞仁（去殼草紙包打去油）
南五味（去根打碎炒）
薏苡仁（去殼微炒）
蓮葉蓮房（蓮葉取蒂如錢錢大晒末數次）
菖蒲（一寸九節者佳去根毛）
荊芥（陳久者佳）
神麯（陳久者佳炒令香用）

麥芽（炒熟搗去殼）
醋陳久者佳米造者入藥
綠豆（去殼入藥）
防風（新實脂潤者佳丫頭丫尾勿用）
獨活（黃色作塊而氣香者泔浸去土）
赤箭（莖以箭幹赤色花葉如箭羽其子以苦楝子五六月中肉如麵定風草赤箭共一物根是天麻）
萆薢（川薢形休壯大切開白帶粉眼者多以荊崗謹充賁形虫似其色紅味苦鹹切開白色者是真）
桑寄生（惟桑樹上生者佳）
淫羊藿（先去土得酒良）
山牛（即冷飯團又名土萆薢湖廣出者其形貝如胡桃大者佳忌犯鐵器禁羊牛肉茶）
佛耳草（過食損目）
益母草（有二種花白者入切火花紫者入藥忌鐵器○茺蔚子即益母草子多入眼科）
萆麻子（去殼）
白蒺藜（不入湯止入丸散炒微研去刺）
密蒙花（背白色有細毛酒拌陰乾蜜拌蒸）
菊花（去青蒂）
過東籐（不入丸散但可煎湯熬洗）
芙蓉葉（其花同功為末入敷藥不入湯丸）
白蘚皮（去骨用根皮）
紫荊皮（乃牛頭籐蔓生者非用氏紫荊）

酒（麴造者入藥）
淡豆豉（出江西無鹽者佳）
葳靈仙（去蘆洗鐵脚者佳）
羌活（紫色節密者為羌活去土）
天麻（濕草紙包煨熟切）
楓寄生（其子及空菓不可食令人笑不止地漿解之）
牛蒡子（結實者佳炒香微研）
蒼耳子（酒浸去風燒灰敷疔腫炒香忌猪肉）
蔓荊子（微炒）
木賊草（川地者佳去節水潤晒烘乾）
旋覆花（又名滴滴金其花如錢色黃）
款冬花（去毛蒂未開花者佳）
石楠葉（即丁公藤如枇杷葉有刺紫點）
尤美葉（葉尖長背白為末入敷藥不入湯丸）
白楊皮（葉員如大杏葉）
牡丹皮（去心水洗淨忌鐵器）

桑白皮（細皮佳外面皮殺人忌鉄器蜜拌炒）

桃仁（湯泡去皮尖研碎雙仁者不用）

郁李仁（去殼）

蘇木（炒黑酒淬）

京三稜（味苦色黃体重形如小鯽係火炮用頭沽廣得真者生精署府人口去乃是真二陵）

阿魏（凡用去枯者鉢中研細入毛器肉煮二三沸莊得真者所五六分安在熱銅器中一宿不乾治沾銀處白如銀無赤色者乃是真也）

鬱金（只十二葉爲百草之英其花狀如紅藍揀大花即香古人用鬱金醸酒以降神即凶并也）

蓬朮（酒醋拌炒）

巴豆（若欲急治爲水穀道路之劑去殼皮心換紙帚包打去油若欲緩治爲消堅磨積之劑去殼炒烟盡色黃微黑則具皆又甚微）

大腹皮（先用酒洗後黑豆汁洗用）

皂莢（有數種有長尺餘者有如豬牙短小者良去皮子系筋酥炙爲末入味藥取其剃羽形角剃也）

牽牛（有黑白二種每斤沙非頭末四兩）

秦艽（錦紋者佳先去土用）

澤瀉（去毛土下油不蛀者佳）

昆布（形如卷麻水洗去沙土蟲姜汁拌蒸用之）

芫花

甘遂（去莖用甘草水浸二日其水如墨汁漉出晒乾又用水流六七次令水清爲度方用）

大戟（凡用勿用附生者誤服令冷氣不禁即煎薺苨子湯解之採來切片海芋葉拌蒸一時晒乾）

杏仁（湯泡去皮尖炒黃色雙仁不用）

桃梟（即樹上小桃冬自乾不落中實者止用炒）

柏子仁（入藥微炒）

乾漆（炒令烟盡入藥忌鷄子蟹化爲水忌油服）

大黃（酒拌蒸熟不傷陰血川大黃錦紋者佳）

雷丸（色白者佳赤黑土殺人以男受晒熱甲之）

大腹子（尖長小者名檳榔大而匾者名腹子）

梹榔（形如雞心尖長心不虛不油者佳）

商陸（又各梓細白類人孔有赤白根如者入藥）

防巳（去皮用紋車輻者佳）

車前子（炒研入藥）

海藻（水洗沙土用黑豆汁拌蒸一時）

黃精（[illegible]）

巴戟（小洗去上去心酒拌用根紫如連珠肉厚）

蕤仁（去殼以紙纏系紋末油者佳）

冬瓜（霜降後皮上白如粉名白冬瓜久病可）

茄子（能炭燒年之存）

橘子仁（炒去殼研用）

大棗（入藥去核生則令人煩）

白梅（去核用）

石榴皮（忌鉄器漿水浸一特大酸者爲佳）

梨木皮（爲末入敷藥不入湯中）

川楝子（酒拌蒸一剌去皮肌肉去核只單用其核抛剔水煮一時皮肉不使核使核不使肉）

萎蕤（葉似黃精即黃精也誤用蜜炒餘誤人）

女萎（凡采揀不實兼非白頭翁亦非萎蕤）

冬苽（去蒂二町）

芸薹菜（引氣生腹中動目疵發瘡）

酸棗仁（去殼州）

烏梅（安西安亜散中必用之藥去核）

椿白皮（有花木中實名[illegible]無花木中實名楮白皮用蒸炙之然後入藥爲甘）

梨實（多食成冷痢產後金瘡并禁食）

楝根白皮（根白有子者入藥根赤無子者令人吐瀉不止有至死者）

柿乾（即柿餅青州出者佳）

椰子（即黃束茄瓢用船糖潤佳）

青蒿（即蒿草根莖子葉皆可入藥以童便浸凡用子不用葉用根勿用枝昔同用反致病）

石韋（微炒去毛不盡則射肺令欬不治）

百合（有紅白二種葉細花紅者不入藥葉大莖長粗花白者宜入藥內）

百部（其根數相連以天門冬而小火炙酒浸佳）

松香（用黃白色者佳黑色不可入敷峰膏藥中）

沉香（入水沉堅實色黑者佳）

乳香（用箬葉研炒出油）

枇杷葉（火炙去毛如不去毛成嗽不止）

大小茴香（小茴香炒用大茴香不必炒）

地楡（洗去土）

紫菀（去蘆蜜水拌一時焙乾）

零陵香（濕拌甘）

丁香（雄丁香形小力少雌者形大力大名母丁香）

沒藥（生波斯國似安息色黑炒出油用之）

蘇合香（天竺出此香是諸香汁煎成非一物也惟堅實芬芳如石燒之灰白者佳）

安息香（似松脂黃黑色）　血竭（真者味甘醎似梔子氣爵不臭如嚼者生）

冰片（粗壯瑩白大片如梅花瓣者名梅花片佳）　蛇床子（去皮殼取仁微炒如煎湯洗病生用）

木香（形如枯骨苦口粘牙斤入藥不見火形類犀涯但筆涯大苦不入藥又與番白芷形捐以能殺）

（人番白足成片似魚皮有點起如包釘然）　牛李子（實似五味子色皆黑味苦唇非九衣）

馬兜苓（即青木香生蜀中又萬處麝軟狀如徇肺咩之紫壁蕒出用敷諸瘡良）

木鱉子（其形以鱉故以為名）　鶴虱（敷惡書殺虫辭此毒蜜湯下虫心痛肉汁下）

狼毒（形以商陸而沉水者佳）　木蘭（即佳[illegible]也其氣香美）

羊躑躅（取根剉去粘泥薄皮取內皮猪伴炒伏地出火毒入藥量大人小兒用不可多那能殺人）

羊蹄根（即禿菜根以醋伴炒）　蕪荑（葉員學如榆莖小）

馬鞭草（俗呼為鐵掃帚苗少依牙又數莖方節員花紫葉微似蓬蒿）

辛夷（去心及鬚皮拭去毛其毛射肺令欬取其蕊未開者佳凡用微炒入藥）

蘆薈（即波斯國木脂）　藜芦（去芦頭微炒）

草龍膽（去芦洗酒伴晒）　紫葳花（生籬蔓依大木至頂始開花黃赤色）

夜合花（似梧枝柔弱細葉而繁其葉兩〻相對至暮而合五月開紅花如系茸至秋結莢子薄細）

剪金花（花紅白色子以松子如黍粟具東大如小匙頭亦有如槐葉者亦有黃紫者）

黃蜀葵子（凡用炒研入藥）　鷄冠花（炒研入藥宜用白者）

青箱子（即野鷄冠子花紫白實角子黑扁小）　槐花（炒去梗用）

槐實（以銅鎚打碎將牛乳伴蒸）　槐枝（春采嫩枝燒存性為末揩齒去虫）

側栢葉（凡服食用酒伴一宿炒）　卷栢（生用破血炒用止血）

茅根（即茅笋也）　白茅花（即茅花也）

仙茅（忌鐵器牛肉凡用米泔浸去赤汁出毒其葉青如茅而軟稍闊面有紋理又以棕闊至冬枯春）

（生三月有花如梔子黃不結子根獨莖而直傍有細根附生肉黃白皮褐色）

常山（形如鷄骨者佳）　葶藶（酒伴炒）

荊瀝（取大荊莖[illegible]）

竹瀝（用筆竹或截二尺架火燒之碗盛）　竹青（用苦竹刮取皮炒用）

苦竹（與淡竹同功）　淡竹葉（[illegible]）

竺黃（出天竺國有黃白）　桑黃（[illegible]）

華木皮（山桑皮也）　棕皮（燒存性用）

沒石子（出西番有窠者佳）　夏枯草（有紫白二種白者不入藥）

莨菪子（即浪蕩子多食令人見鬼發狂患用童便[illegible]）

旱蓮草（[illegible]）　金星草（生石上者佳[illegible]）

敗醬（[illegible]）　蘆葉根（[illegible]）

剪草（[illegible]）　山慈菇（即金灯花[illegible]）

浮萍（[illegible]）　鬼臼（有毒不入湯[illegible]）

射干（陰乾其花黃出紫者是用）　鬼臼

芭蕉（根可生用[illegible]）　芭蕉油（取油法用竹筒削尖插入皮中受油）

屋遊（即屋上青苔[illegible]）　垣衣（即古墻上苔[illegible]）

胡桐淚（[illegible]）　伏龍肝（即竈心土也）

白石灰（治金瘡[illegible]）　陳壁土（東壁朝日者佳）

無名異（生大食国磨滴雞血化為水者真）

雌黄（不入湯藥）

硇砂（凡用飛澄去上石入磁器中重湯煮極熟入藥如上用飲人填之其形如牙硝光淨者佳）

雄黄（透明者佳人佩之辟邪解山川虵蝎毒物不敢傷孕婦佩生男）

鉄粉（即鉄秀）

硫黄（以砂鍋溶化傾入水中出火毒用）

輕粉（即水銀升鍊成者畏磁石忌一切血）

黄丹（炒令紫色研細用如有砂水飛過後沙用）

水銀（用唾研如泥入砦科）

銅青（不入湯丸但煎膏用之）

辰砂（出辰州者佳若用細研入藥須以礦石引去鉄屑次以水淘去細白砂石方用）

赤銅屑（出武昌打之不裂佳熟銅不可明）

秤錘（凡用燒紅淬酒熱服）

自然銅（出信州鉛山縣銀場銅坑中似馬尿動色紫重味滷凡入藥切勿悞用方金牙若悞餌吐殺人火煆醋淬七次）

石燕（凡用須去泥沙石細研水飛過入藥）

珍珠（用無孔者自肉汁煮過洗淨研細入藥）

瑪瑙（色紅黄以之研木不熱者真熱者非具也）

琥珀（以手摩熱琥珀可拾芥者為真）

膽礬（出信州其形色如鴉觜能化鉄為銅是真）

白礬（入藥有宜生用者有宜煆熟用者）

玄明粉（即朴硝煉成入藥無佐使裝人其速）

空青（出信州形如荔枝中空有漿色青翠可愛款取其汁得成箇全壳者埋地中一二夜即有汁）

曾青（形如黄連外黄土色而鬆內紫內南堅內頭或大小中大或直如黄連皆有一孔通貫省真也）

鍾乳粉（出道州明白光潤輕鬆色如煉硝石者佳輕薄如鵞翎管碎之如爪甲疑是鵞管石也）

朴硝（色青白佳黄色者傷人赤色者殺人）

芒硝（取朴硝淋汁煎煉傾盆中結芒刺有稜者）

滑石（白如凝脂軟活佳須甘草和之青黑条八）

石膏（[illegible]紋[illegible]白潤生[illegible][illegible]火服之）

白石英（大如指長二三寸六面削白有光佳）

紫石英（明如水精紫色達頭如樗蒲者佳）

代赭石（染甲不渝皮）

玄精石（出山西解州縣其色青白如亀背佳）

青礞石（合硇硝煅成金色研細用）

鵞管石（色白形如鵞翎管者佳）

代赭（染指甲不污皮上青滑中紫如雞肝者佳用入煅醋淬七次研細水飛過然後用之）

蛇黄石（形如彈丸外黄內黑醋淬煆七次）

磁石（引針石也以綿裹之能引針跳起佳）

烏古瓦（取塔上年深之瓦）

信石（不宜多用醋炙杀其毒此石即砒霜也）

寒水石（即鹽之精燒過用其本投水中成水）

水花（即水沫也）

陽起石（形如浪牙雲頭雨脚鷺鷥毛者佳凡用研水飛用號盛以片蜜覆上[illegible]日下其石自起停係匕首為真陽起石也沸下聽用）

石決明（七九孔佳十孔不用去粗皮塩水煮）

井泉石（北石如土色形方員不一但重匕相叠出𨢾要即佳研細為粉用否則令人淋）

花蕊石（出陝州灵鄉縣其色止黄石中有淡白點火煆用性堅如琉黄方治金磨不及煆為末用）

禹餘粮（火煆醋淬七次研細水飛過入藥出路片形如鵞鴨卵有壳重叠中有黄細末如蒲黄無砂石者佳其石中之黄味甘可服不甘者勿用）

塚井中水（有毒人中之立死欲入冢井先以鷄毛投入試之毛直下者無毒如回旋似丁不丁者為水有毒也以醋數斗投之則祇解其毒矣）

天靈蓋（此死人項骨十字解者陽人用陰匕人用陽頂煉久者佳洗去泥上童便煮灸黄為末）

天生柴（即孩兒骨此藥残恐傷神以別藥代）

人牙齒（火煅存性）

人脫（即手足指甲燒黄為末用）

經餘（即室女經水未拭血有血布也）

交餘（即男女交接時拭布也）

血餘（取頭髮用男子二十左右者佳以苦參水浸一宿取入瓶內燒濕盡研末）

紫河車（即胞衣先水洗以針挑破青筋批去其血次用蠟黄后加水煮燗去筋膜研細入藥末方）

裩襠褲襠（即男女布褌凡用取當陰之處剪取方員六七寸許燒存性為末用之）

人中白（即尿桶內垢結成火煅用多年者佳）人中黃（即人糞燒存性為末）

人糞清（臘月截竹為筒去青皮兩頭留節鑿開細小孔入甘草在內仍將藥塞用石同縛投坑厠中待年[redacted]取破筒內汁甘草洒乾為末用之）

童便（即童子尿須用無病肥壯童子小便清淨者佳多服令人血反虛無熱之人甚勿多服）

秋石（即小便成者極能破血耗血不宜多服）淋石（即人患石淋尿中出者收取洗淨水磨服）

桑螵蛸（桑尌上螳蜋子也惟桑尌上者入藥用二三月收鹽水浸蒸之火炙用否則令人瀉）

牡蠣（鹽泥固濟入火煅通紅取出去[redacted]毒研末）海螵蛸（即烏賊魚骨）

蚯蚓（一名土龍用白頸者佳）蝸牛（即負殼蜒蚰入藥炒用）

蛤蚧（形[redacted]守宮守宮即蜥蜴也凡取存其尾去頭足洗去鱗鬣酥炙用男用雌蚧女用雄蚧）

蝦蟇（或炙或乾為末入藥）蟾酥（即老蝦蟇眉間脂汁取出用輕粉收日晒）

螻蛄（一名土狗自出者佳凡入藥炒用治水腫用妻姻下半身甚利小便用）

斑猫（去[redacted]足以米同炒至米黃色去米不用研末入藥若生用之即令人吐瀉不止也）

僵蚕（蚕藍蚕山上自死取下佳去系嘴炒用）蜈蚣（入藥炙用）

天仙子（即推糞黑殼虫去翅足火炙用）全蝎（形緊小者佳去夜中土并刺用稍力尤其）

水蛭（即馬蝗火炙經年得水尤活不可輕用）海馬（大小如守宮其形似馬無足黃褐色者）

蜚蝱（取腹中有血者佳[redacted]翅足炒用）白蠟（即蜜蠟也）

土蜂（即大蜂凡別在蜂房中取頭足未成者佳以鹽炒蒸乾用之）

蜂蜜（凡煉蜜必須火化開以紙覆經宿取上去蠟盡再熬色變不可過度）

露蜂房（火炙用）蟬脫（其脫殼頭上有一角如冠狀者名蟬花佳）

蛇脫（但入膏藥如入藥炒焦黃色研末用）烏蛇（酒浸去頭尾炙熟去皮骨入藥迎攻亦好）

白花蛇（酒浸去頭尾皮骨去藥出蘄州頭有角口有齒尾有甲身有鉾者真）

龜板（卜過者名敗龜大者佳凡用酒亦可）鼈甲（七九肋者真凡用醋炙黃）

川山甲（凡用火燒存性去火毒）刺蝟（皮酒佳）

蝙蝠（燒存性為末大者佳白者可服未白勿用）夜明沙（即蝙蝠糞也）

白丁香（直立者為男丁香佳即雄雀糞也）猪胆汁（與人糞同功）

五靈脂（生用行血炒用止血以酒研碎淘去沙石方可用即寒[redacted]糞也）猪齒（作灰治小兒驚疾）

猪腎（久食令人腎虛少子）犬肉（純黃黑為上）

野猪黃（其黃在胆中治金瘡止血生肌）狗頭骨（治金瘡久痢）

牛肉（自死者有大毒）牡牛尿（治九竅出血）

黃牛角䚡（燒存性為末服止血治赤白帶）

牛黃（今市中多是殺出在肝胆中員黃成塊者此是嫩黃功力薄○凡牛有黃者其毛光澤眼如血色特優鳴引又好照水浴水于群行爭先善舐有力好汪人欲取其黃將牛於夏日繫於椿上晒之令其熱渴以水一盆放在口邊與飲令牛渴甚欲飲而不得又即吐黃出晒影如日令一人急以濕布蔽牛口鼻一人急捉取黃其牛見取其黃即時自跌死其黃如雞子黃大重疊芬芳而輕鬆生時色黃赤乾久外如烏金色此其老黃也多產晉地）

牛膽（臘月取肥入天南星末連胆汁置當風處踰月用治風痰）

牛乳（生食令人痢熱食令人口乾勿多食患冷人亦勿多食患熱風人宜多食）

阿膠（切開有紅綠五色者真凡用蛤粉炒成珠）馬肉（食馬不飲酒能殺人馬肝忌食）

龍骨（其白青白粘舌者佳五色皆用黑色不用）獺肝（治熱病下治令病不可一樂司）

虎睛（凡用先浸羊血中一宿烘乾用）虎脛骨（骨中絲底系起者真雄者將酥炙用）

羚羊角（或燒存性調酒或判入湯凡或磨服此角有神夜宿以角掛樹而眠身不有他似此角彎中深銳有掛痕者是真又云置耳边聞之氣有嚮上之声者乃是真羚角也）

犀角（紙包置懷中良久取出則搗易碎忌塩若磨服取角尖佳又云惡雀菌此山犀也有二角以額上者為勝又一種角上有一白綫如線直上至端名通天犀角有神妙此水犀也）

牯犀角（紋理細膩斑白分明一名班犀一名文犀其角甚長不入藥）

鹿茸（長四五寸茸端如瑪瑙紅者良又要不破損未出却血者佳其力全在血中也陰乾不可鼻嗅有細虫入鼻為害用酥油塗上以炭火炙之令黃為佳）

鹿角膠（切寸段煎汁熬成膏）　鹿角霜

麝香（凡用子日開妙又蒜）　灵貓埊（非家猫即狸類人謂狐狸射香）

兎肝（治目暗和決明子佳）　兎肉（多食損人陽女食生子缺唇）

之雞頭（擣爛汁良）　諸畜筋

諸畜血

神鬼病門（有八名）

古云譴責又曰中惡因名隱晦今直述其名神鬼病也凡犯譴責條病者自宜內省悔過遷善祀神鬼病者不須用藥或從俗或符呪治之如神氣不足鬼邪着而為病者宜靜養氣血為先隨經用藥為次

〇鬼脉

六部無脉在寸口之上大指之下有脉動者

名曰鬼脉

神鬼病

其症卒然心腹刺痛即發譫語狂亂欲死沉沉默默謗罵詈人事人起心已知其聲哭吟不欲見人須從俗送鬼祟亡靈羹飯不必祀神或符呪治之是正理也用硃砂書字法或葱刺法

譴責病（見鬼門）

寡婦尼姑室女邪祟交感病（見婦人門）

鬼箭病

忽然一點痛不可忍〇用桃樹皮一片將裡面湿處貼痛上取艾一團如胡椒大安在桃皮上

灸之須臾痛止

鬼擊病

夢中被刺或杖打卒然吐血衄血下血甚者九竅出血○服升獨湯

鬼疰病（疰者住也）

男婦氣血皆虛鬼邪相干留住身中為病名曰鬼疰病○服八毒赤丸

卒中惡氣

腹大而滿或吐血數升脉數細死浮緩生○用書字法葱刺法

中忤鬼氣

暮夜或登廁或野步或入空屋忽然眼見鬼物或口鼻吸著惡氣其症驀然昳倒四肢冷兩手拳口鼻出清血與尸厥相同但腹不鳴心腹俱暖切勿移動即令人圍繞打鼓燒安息香或蘇木候醒可移○服犀角散硃砂射香研各一分犀角判各四錢共為細末每服二錢井華水調服如無前件藥用葱刺法

犀角散（前闕）

葱刺法

用葱心黃刺鼻孔中[illegible]出無血入内七八寸使目中出血佳男刺左女刺右

吹鼻法

令病人仰卧㠯物塞兩耳將蘆管納病人鼻中使兩人吹氣入内塞口無令氣出半日病人醒勿復吹

書字法

用硃砂書鬼字在舌上額上

菖蒲灌法

菖蒲根搗汁灌之立瘥尸厥并卒死脉尚動聽

其耳中如微語聲股間暖者是也以此法治之

八毒赤丸

雄黃（研）　礬（研）　硃砂（研）　牡丹皮　附子（炮）　藜蘆　巴豆酪一　蜈蚣一條

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服五七丸至十丸冷水送下病不愈再服

升獨湯

升麻　獨活　續斷　地黃（各五錢）　官桂一錢

右為細末每服二錢食前白滾湯送下一日服三次

識病捷法第九卷終

識病捷法卷十

○女科目錄

難成胎脉（二道）　易成胎脉（二道）
已成胎脉（三道）　產後生脉（四道）
產後死脉（六道）　經漏赤白帶生脉（四道）
經漏赤白帶死脉（四道）　經漏赤白帶難治脉（一道）
胎前探胎法（規治法內）　驗子死腹中法（隔治法內）
胎前死症（一名）　臨產死症（三名）
產後難治症（一名）　治法四十四条
胎前症（二十九名）　護胎法
墮胎（五名）　胎婦禁忌藥三十七味
墮胎方（一道）　難產（十名）
產後（七十二名）　胎前產後乳症（八名）
經水不行（十七名）　經漏不止（十一名）
經水不調（十二名）　赤白帶下（十七名）
癥瘕（十二名）　寡婦尼姑室女（四症）
成胎（一条）　五臟養胎（十名）
不受胎（十八名）　斷胎法
種子法

目錄終

識病捷法卷之十

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

女科（有二百三十六名）

雜症與男子同不重出矣惟女流耆慾多於丈夫生病倍於男子兇性偏執更有胎前產後經水行閉不調赤白帶下癥瘕寡婦尼姑室女成胎不受胎各各之異忌用應用之藥與男子之劑不同及女人在床幃之中望聞問切四者之要但得切脉之一故云寧醫十男子莫醫一婦人斯言甚善治療是科倍加意焉

○難成胎脉（二道）

沉　細

○易成胎脉（二道）

滑　大

○已成胎脉

尺部脉不絕　左疾男　右疾女

○產後生脉（四道）

緩　滑　沉重　沉細　跗骨不絕

○産後死脉（道六）

實　大　絃　急　寸口濇緊　堅牢

○胎前死症（名乙）

乳哭（未生育之前有乳汁出者名曰乳哭）

○臨産死症（三名辨驗子死腹中法開治法內）

唇口俱青口兩邊沫出身重寒熱舌下青黒

舌上冷主母子皆死

面青舌赤口出沫主母死

面赤舌青色主子死

○産後難治症（名乙）

房勞

○産後死症（名二）

氣急猶聲　面生黒黶

○經漏并赤白帶生脉（道四）

虛　滑　遲　小

○經漏并赤白帶死脉（道四）

大　緊　數　急疾

○經漏并赤白難治脉（道乙）

浮脉

○治法

凡胎前用驗胎法如胎前三箇月經水不來用探胎飲以川芎一兩蘄艾八分水二鍾煎八分夜半服五更或平明腹內微動者是胎不動者非也如小腹內動者又非是胎乃血（瘕也）

凡暑月臨産有二○一暑入産户大發熱其脉虛疾而大悪露不行敗血攻心狂言呌呼奔走拿捉不住用乾荷葉生地牡丹皮濃煎湯調下生蒲黄二錢一服立定悪露即下不愈再服○二夏月宜在房外燒紅磚取進房以醋潑之以防血暈不可在房內燒火

凡冬月臨産有二○一寒入産門臍下脹滿手不可近此寒疝也若謂有瘀血非其治也用當歸二錢生薑一兩精羊肉四兩陳皮五錢水三碗酒少許煎二碗分二次服○二淋洗法用吳茱萸紫蘇煎湯淋洗臍腹産户即下

凡臨産或不産俱有血暈之症壞人甚速常令抱産婦腰兒即順生

凡難産如平日胎漏當時胞水放竭難産（用油蜜）以清油好蜜各半碗同煎數沸温服胎滑即下加血即効

凡難産用藥六七日不下垂死及交骨不開

川芎　當歸（各兩）一　自死龜板（一酥炙）　婦人髮（一把）燒灰共為粗末每服五錢水鍾半煎服約人行五里不問生死胎立下〇又用雲母石細研澄過取團如鷄子臨時取四錢酒下（即到産口）

凡難産用法以皂角末少許吹鼻中令嚏即産〇二難産灸法藥不能驗急於産母右脚小指尖頭上艾灸如麥粒大灸三壯立産

凡子死腹中驗法須驗腹間冷痛身体寒熱小便沫出胎上冷舌上冷指甲與舌皆青黑色

腹脹悶甚者口中作屎臭其用法有一用藥有一〇一以牯牛糞炒大熱入醋半盞將青布裹包於臍上下熨之立下〇二雖數日子死腹内毋氣欲絶者杜牛膝三兩紫金藤七錢肉桂二錢當歸四錢葵子七錢射五分為末米飲丸如梧桐子大朱砂為衣每服七十丸乳香煎湯呑下屢驗

凡催生用法有二〇一有貼臍法雄黄硃砂各錢半蓖麻四十粒去皮蛇脫一尺為末漿水飯和丸如彈子大臨産時先以椒湯淋洗臍下次以藥安臍中用紙數重盖藥以布繫之須臾急生速取去臍中藥不可遲〇二臨産催生蓖麻子去殼研細塗兩足心産下即洗去若去遲或不耴則腸出腸出又将此藥貼頭頂心用百粒亦不妨

凡催生用藥有三用法有三〇一催生多用滑利迅速之藥如兎腦筆頭灰努牙蛇皮等藥〇二催生若水血先下子道乾澁不能下者如猪脂蜜油酒葱白葵子牛乳榆白皮滑石是也〇三催生若稽停努動已久風冷乘虗

入於胞胎使氣血凝滯而不下者如牛膝葱桂是也

凡産時未急不可強服催生藥其欲産時先待胞漿水破腰腹疼痛作陣眼中火生此是胎已離經兒逼産門始進催生藥葵子研半合當歸三錢煎服屢効如神

催生丹治生理不順産育艱難或横生或逆生大有神効射香研一匙通明乳香一錢右以臘月兎腦和丸如芡實大陰乾用紙蜜封每服一丸温湯下立産男左女右手中握藥丸

湯布熨胞間自然便下如用冷水噴灌激住敗血必死

凡產畢有五〇一不可就上牀卧閉目勿令側卧〇二令兩人扶住用手從心下輕々摩按至小腹一日間六七次惡血皆下三日乃止醋炭舊漆器要燒七日〇三不問腹疼不疼有無疾病用童子小便一盞酒少許溫煖服一日內服五六次〇四就與溫軟白粥一味不可大飽漸々增加〇五七日內不可洗手面一月內不可梳頭一百二十日不可勞力

過度

凡產後病大率有三症血虛火動敗血妄行飲食停傷

凡產後血暈之症有三宜仔細辯症用藥〇一下血少而暈者乃惡露不搶於心々下滿急神昏口噤不知人事宜破血行血用異神散〇二下血多而暈者但神昏煩亂而已宜補血清心川芎當歸各六錢煎服〇三有用心用力過多而暈者宜補氣加香附

凡產後血暈又兼他症而暈者有六〇一素多風疾因產損血乘而暈者用四物湯加防風羗活〇二若暈悶熱多者加獨活柴胡〇三下血多氣虛極暈不知人事不止者則殺人如作暗風治誤矣宜服清魂散

人參（乙錢）澤蘭葉（乙錢）荊芥（四錢）川芎（二錢）甘草（八分）為末每用二錢酒白滾湯各半急灌之醒黑龍丹亦妙〇四氣血俱虛不能制痰與火々與痰皆泛上頭眩之狀而暈者用二陳湯隨加補氣血藥〇五眩暈須量虛實若宿有痰飲不除產後多致眩暈又兼血氣虛弱而使血

逆上攻此又非清魂散可治〇六先取醋塗口鼻仍置醋於面前使聞其氣兼細々灌飲之此為上法

〇胎前症（有二十八名）

惡阻（有孕惡心阻其飲食是也多從痰治瘦人是熱）

心悶吐逆頭眩四肢怠惰煩疼惡寒自汗發黃

服茯苓半夏湯

胎動

或因頓仆不安或搶心或腰腹疼或去血服膠艾湯

胎傷
房勞或自高墜下或重物所壓腹疼下血或胃
虛嘔逆○服佛手散安胎散各半

胎熱
心脾壅熱咽乾口苦渴煩悶多驚○服知母飲

胎冷
腹脹痛引兩脇小便頻數大便虛滑○服安胎
和氣散

胎漏
或因房事下血○服枳殼湯二黃散各半或服

桑寄生散

胎虛
肝經血少風熱上攻眼目帶吊失明○服天門
冬飲子

胎痛
胎寒腹痛○服地黃當歸湯

胎肥
妊娠胎氣壅盛常服枳殼散滑胎易産八月常
服滑胎益血安和子臟易産

胎瘦
宿有風冷胎氣不長或失調理動傷胎氣○服
安胎白术散

子煩
心驚胆怯終日煩悶○服竹葉湯

子腫
面目虛浮肢體重如水氣○服全生方

子氣
成胎三月後兩脚面漸腫至腿膝及喘悶飲食
不美狀似水氣或脚指有黃水出○服天仙藤
散

子懸
胎氣不和凑上心腹脹滿疼痛○服紫蘇飲

子淋
小便澁少遂成淋澁○服安榮散

子癎
中風頭項強直筋脉攣急言語蹇澁痰涎不利
或時發搐不省人事○服羊角散

子遺
小便不禁○服桑螵蛸散或白薇散

子哭

兒在腹中哭○用空房鼠穴中土一塊令妊婦噙之即止又方用黄連濃煎毋哈之一云臍帶上疙瘩乃兒口中含者因妊婦登高取物脫出兒口以此作声令曲腰在地拾物使兒復得吞入口中即止

轉胞

小便不通○服四物湯參术飲各半探吐法出玉義不愈又服獨勝散

吉胎（附病見凶變吉）

平日無病交第三箇月服安胎飲第八箇月服

束胎丸第九箇月服束胎散第十箇月服枳殼散分娩後服佛手散（胎前第九箇月不語者不須服藥交十箇月則自愈）

鬼胎

癥瘕癖塊有似孕婦○服枳殼梹榔散

又鬼胎孕婦如抱一甕○服斬鬼丹

妊娠五七箇月宜服安胎飲數服可保全產若日月未至而痛如欲產者用知母為末蜜丸如芡實大酒化下

妊婦傷風咳嗽不已○用華盖散如嗽痰中見紅者用款花膏不可服犯胎氣藥加阿膠五六分

亦通

妊娠傷寒

汗下後飲食減少血虛者○服四物湯四君子湯

妊娠傷寒

中風表虛自汗頭疼項強身熱惡寒脉浮弱○服四物湯加桂枝地骨皮各一錢

妊娠傷寒

頭疼身熱無汗脉浮緊○服四物湯加麻黄一錢細辛三分

妊娠傷寒

中風濕之氣肢節煩疼面熱頭疼脉浮○服四物湯加防風蒼术各一錢

妊娠傷寒

下後過經不愈温毒發班如錦紋○服四物湯加升麻連翹

妊娠傷寒

胸脇滿痛脉弦少陽頭昏項強○服四物湯加柴胡黄芩各一錢

妊娠傷寒

大便硬小便赤氣滿脉沉数急下之○服四物湯加大黄三錢桃仁十粒炒

妊娠傷寒

汗下後咳嗽不止○服四物湯加人參一錢五味子七粒炒

妊娠傷寒

汗下後虚痞脹滿○服四物湯加厚朴枳實

妊娠傷寒

汗下後不得眠者○服四物湯加梔子黄芩

妊娠傷寒

身熱大渴蒸〻而煩脉長大○服四物湯加石膏知母

妊娠傷寒

小便不利○服四物湯加茯苓澤瀉各三錢

妊娠傷寒

小便赤如血狀○服四物湯加琥珀茯苓各三錢

妊娠傷寒

四肢拘急身凉微汗腹中痛脉沉遲○服四物湯加桂附子炮去皮臍

妊娠傷寒

汗下後血漏不止胎氣損者○服四物湯加阿膠蛤粉炒艾

妊娠傷寒

畜血症不宜用墮胎藥止宜四物湯加生地大黄

○妊娠傷寒護胎法

用井底泥青黛伏龍肝各為末調匀塗於孕婦臍中二寸厚如乾再塗上以保胎孕也

○妊娠傷寒禁忌藥三十七味

蚖班　水蛭　蝱虫　烏頭　附子　天雄　桂
野葛　水銀　巴豆　牛膝　薏以　吴蚣
三稜　代赭　芫花　大戟　蛇脫　雌雄黄
礞硝　芒硝　冊皮　槐花　牽牛　皂角
半夏　南星　通草　瞿麥　乾薑　桃仁
硇砂　乾漆　蟹爪　地膽　茅根　射香

○墮胎（有四條）

三箇月墮胎

三月男女分相火養胎屬熱易墮輪此月宜服安胎飲

血氣虛墮胎

血氣虛乏不能養胎譬如枝枯菓落○服安胎飲倍加人參當歸

勞恐等墮胎

勞傷脾血無化源恐傷腎胎無資固譬如風撼木人折枝○服安胎飲堅孕惟免勞喜自調攝則吉

半墮胎（又名半產　亦在墮列）

血氣虛弱不足月墮○服芎藭補中湯

墮胎方

有孕二三月欲去胎者服肉桂牛膝各一兩瞿麥五錢花粉一兩二錢善而去之

毒藥墮胎症

婦人有孕而故服毒藥攻胎致藥毒中心牙關緊急兩手強直握拳頭低自汗身微熱与中風相似脉浮數醫者不識作風治必損宜用白匾豆一味生研末以新汲水灌之

○難產（九条凡生產用藥另開方在後臨時預用）

胎肥壅盛難產

平日有痰積胞門○服枳殼散

瘦人血少難產

平日火多血不足○服無憂散

橫生難產

兒頭向上脚垂下○服催生丹　針刺法

塩塗法

胎乾難產

或血暴下以致胎乾○服半夏湯

肥人勤勞難產

肥胖人因勞後動傷胎氣○服紫蘇飲加補氣藥

鬱悶難產

因七情氣鬱○服達生散加撫芎香附

安逸難產

平日使孕婦舉動則吉（如安逸太過則難產）○服達生散

惡阻難產

餘血結成塊俗名為兒枕敗血累其子宮○服益母丸童便酒各七分化下又用當歸桂玄胡索等分為末每服二錢酒送下

附盤腸產

臨產腸先出後兒下腸不收用醋半盞水七分

調噴婦面噴一口縮腸一分再噴二口腸縮尽為度○又方用半夏為末吹入鼻中亦即收也

坐産

此言兒欲生時當從高處牢擊手巾一条令産母以手攀之輕〻屈足如坐令兒生下非是産母臨生兒時坐着一物若如此反抵兒路不能生矣

附胞衣不下取法

餘血流入胎衣則難出其症面垢頰赤寒熱有（六十七）盜汗連臍堅脹痛甚易殺人○服牛膝湯胞即

爛下不下再服半夏湯

○産後（有七十名）

産後煩悶虗熱

血傷為風邪所乘氣不宣而痞塞生熱煩悶口乾多飲○服生地黃湯

産後虗煩

去血多則陰虗生熱其症心胸躁滿短氣骨節痛晡時輒作用蒲黃隔紙炒赤冷熟湯調下

産後虗羸喘促寒熱如瘧名曰蓐劳

用猪腎（切去筋膜）淡豉人參當歸糯米葱白水煎服

産後虛煩頭痛欲死悶亂不解

用麥門冬石膏淡竹茹水煎服

産後敗血腹中時〻刺痛

用四物湯去熟地加人參乾薑（炒黑）甘草

産後下血不盡

腹痛不可忍○服桃仁散

産後血上衝心

血上衝心血刺血暈血氣腹痛○服卷荷散

産後血暈

血暈不知人事○服清魂散用床前燻法

産後瀉血

下血或紫或紅或黑○益母丸棗湯下

産後血傷肺嗽

敗血上攻流於肺經咳嗽○二母散

産後面黑發喘欲死

血入於肺以致面黑發喘欲死者○服參蘇飲

産後暗風

産後三日起卧不得眼前花黑因血氣未定走運五臟入肝目昏或口乾煩渴悶亂如見鬼狂言不省人事○服益母丸童便酒薄荷湯各半

化下或服清魂散用怵前燻法

産後中風

牙關緊急半身不遂失音不語○服益毋丸童便酒各半化下

産後中寒

遍體手足俱冷強直口噤不識人事○用白术四兩酒二升煎一升頓服之

産後感冐咳嗽

感風寒咳嗽喘滿痰涎壅塞○服旋覆湯

産後暮發熱

日間平安暮則發熱增寒○用四物湯去芍藥加軟柴胡三分

産後諸風

痿攣無力○服血風湯

産後遍体疼痛

産後百脉開張血脉流走氣弱則經絡肌膝之間血滯致骨節不利筋急腰難轉側手足難動身熱頭痛不可誤作傷寒治○服趂痛散

産後太陽痛

兩太陽痛呵欠心忡氣短肌瘦不思飲食身熱

手足頑麻百節疼○服益毋丸米飲湯下

産後面垢

面垢顏赤五心煩熱或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱或冷汗○服益毋丸童便酒各半

産後二便不通

大小便不通煩熱口苦○服益毋丸薄荷湯

産後小便數及遺尿

用桑螵蛸（一兩）龍骨（一兩）為末米飲調下二錢

産後帶下

不論赤白帶○服益毋丸膠艾湯下

産後經水

月水不調○服益毋丸溫酒下

産後口乾心悶

血氣未定食麪太早積滯在內口乾心悶煩渴熱燥或兩太陽穴痛呵欠怔忡氣短肌瘦不思飲食血風手足頑麻百節疼○服益毋丸米飲童便各半下

産後浮腫

四肢浮腫疼咳嗽敗血滲入四肢化為膿狀或喘或小便澁或咳嗽胸膈不利惡心口吐酸水

兩目浮兩脇痛舉動乏力○服益母丸溫酒下

產後寒熱往來

寒熱往來敗血入心則熱入脾則寒狀如瘧狀臍腹作疼或作聲○服益母丸溫米飲下

產後虛煩不得眠

用熟地當歸梔子香豉水煎服

產後吃噫

用白豆蔻丁香伏龍肝為末以桃仁吳茱萸煎湯調下一錢如人行五里又再服

產後咳逆三日不止欲死者

以桂心酐薑汁合三煎取二合先以火炙背摩令熱塗藥盡為妙

產後霍亂

氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風冷致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下利○渴飲水者五苓散寒多不飲水者用理中丸

產後霍亂

吐利腹疼煩渴手足逆冷○用白朮散

產後嘔吐

脾胃受血氣所傷脇滿悶嘔吐惡心○服如聖湯

產後陰陽不和

乍寒乍熱惡露停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異○服

產後痢疾

未經月滿或誤食物與血相攻擊前所積因而成痢○服化積丸棗湯下

產後便澁痢

下痢腹痛小便澁○服良方

產後膿痢

下膿多血與粟少○服宣明白朮湯

產後血痢

下血不止○服宣明三聖散

產後大便閉

大便閉口苦煩渴不語因敗血衝心○服益母丸加紅花枳實末各七分童便酒各半送下

產後崩中

惡血崩漏狀如泉水○服瑞蓮散

產後吐逆不止

吐逆胸膈虛脹因敗血停於脾胃○服益母丸
加三七末一錢溫酒化下

産後鼻衄口乾
鼻衄口乾舌黑因心臟熱○服益母丸加三七
末一錢童便酒各半化下

産後不語
不語因虛弱停積敗血閉於心竅○服八珎散

産後虛勞
去血過多血虛生內熱其症心虛煩滿呼吸短
氣頭疼悶亂喘時轉甚與大病虛煩相類○服

参歸散

産後虛煩不止
虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味○服熟地
黃湯

産後瘧痢多寒
寒熱相半或寒偏多者○服生熟飲子

産後瘧痢多熱
寒熱相半熱偏多者○服草果飲子

産後頭疼
頭疼不止○服川芎散

産後怔忡
怔忡不定言語錯亂○服茯苓散

産後發熱盗汗
因陰虛所致氣血不足○服人参湯

産後肉冷汗不止
下血多虛極生風唇青肉冷汗不止○服濟危
丹

産後汗不止
服黃芪湯外用撲法

産後蓐勞發熱汗出不止

用参芪术各五錢茯苓牡蠣麻黃根各四錢用
童子雞一隻以水同藥煎服

産後汗出太甚
血虛為風邪所搏若兩手拭不及者不可治

産後氣急猫聲
氣急猫聲因敗血衝心入喉中萬無一生矣

産後面黑生黑壓
面黑及遍身生黑壓因敗血入皮膚萬無一生

産後房勞
百日內勞動或傷房事如中風初病之狀服濟

腰強筋急角張牙閉緊急皆自傷犯耳
產後心腹痛
心腹絞痛欲絕○服失笑散
產後喉痛
四物湯加人參蜜炙黃栢竹瀝荊芥
產後因氣腹大如抱甕
四物湯加丹皮枳殼烏藥香附木通滑石紅花
蓬朮玄胡索桂
產後年見鬼神
心主血脉汚血妄行觸心〻無所主故恍惚如

見鬼神○用調經散
產後三月後惡露不止腹疼
用芎歸香附青皮芍藥阿膠艾地榆蒲黃
產後四五十日怒氣惡露不止如米粒塊淡紅色
用四物湯加丹皮紅花青皮蒲黃黃芩
小產後血下久不止
用芎歸參芪白朮香附砂仁青皮阿膠艾
小產後心腹疼痛
四物湯加紅花香附丹皮玄胡索青皮
產後胞損

胞損成淋瀝○服參朮膏　煎猪羊胞湯極飢
時服之
產後子宮不閉
用補中益氣湯加醋附半夏酒芩身熱加酒栢
或用荊芥臭椿皮藿香煎湯熏洗
產後生腸不收
用萆麻子去皮搗爛付頭頂立上腸上速即取
下萆麻
產後子宮痛不可忍
用五倍白礬為末溫湯泡洗乾摻亦可

產後陰戶脫出
四物湯加龍骨末少許煎服如不愈加白朮黃
芪升麻再煎服
產後陰戶垂出肉線
先服失笑散數貼仍用生薑（三斤）去皮搗爛以油
同煎乾炒焦為度絹褁薑熏肉線兩日夜肉線
屈曲作團納入陰戶熏○此緣服催生藥太早
驚動未離經而用力太過致膂膜有傷見此疾
兒枕痛
此由胎中宿有血塊產時血破與兒俱下則絲

患若腹有風冷則血滯而不能流通足以結聚疼痛病名兒枕〇用五靈脂末謾火熬溫酒調下二錢又方蒲黃（炒隔紙研）服二錢米飲調下又方陳蟹殼燒灰酒調服

〇胎前產後乳症（六名）　〇（無子食乳成病一名失開附後）

胎前乳哭

開前死症條下

產後乳脉不行

乳脉不行身壯熱頭疼目昏大便澁〇服玉露散〇下乳汁用木通半斤猪蹄一隻同煮食之

產後吹乳

吹乳腫痛頭疼發熱〇皂蛤散

產後妬乳

妬乳并癰〇服連翹湯

產後乳懸

兩乳伸長細小直至小腹痛不可忍存亡須臾間〇用芎歸二味尾器內水濃煎不拘時頻服之再以芎歸燒烟令病人鼻吸烟氣〇萆麻子一粒用冷水磨塗頭頂心片時即洗去

乳頭破裂

以苧麻根搗傳之愈又方鹿角燒灰酒塗或石上磨濃汁塗之

乳母但覺小便短少即是病到須服調理藥

〇經水不行（十六名月水不來胞脉閉也因脾胃氣血俱虛以致經水不行）

脂滿經閉

因軀肥滿閉胞門〇服導痰湯加黃連川芎不可服地黃

血渴經閉（宜瀉胃中燥熱補氣血經自行）

肌肉消瘦時見渴燥〇服四物湯加紅花

血枯經閉（調血脉除胞中火邪經自行矣）

燥渴時見大便閉澁小便雖清不利〇服加味四物湯瘦人加桃仁紅花

癥瘕經閉

小腸移熱與大腸則經水沉滯不行〇服良方通經丸

經月經閉

或三四月不行或一月再至〇服當歸散

勞心經閉

心火炎上月水不來〇治宜安心補血瀉火經自行

經作經閉（因血氣寒積結胞門經絡凝堅）
唾涎久則成肺癰形瘦或盤結遶臍或兩脇下
小腹寒疝痛引腰脊〇服
數年經閉
發寒熱或喘〇治宜涼血和血經自行矣
胎產經閉（失血太過血雖成易虧又故經不行）
或經墮胎或多生育〇服滋陰丸
潮熱經閉
久患潮熱因熱爍血故經不行〇服清熱滋榮
調經丸

盜汗經閉（汗乃心之液[illegible]耗則血少經不行矣）
久發盜汗〇服滋陰丸
食少經閉（血乃飲食所化食少則血少故經不行矣）
胃氣不和飲食減少〇服和胃健脾進食丸
七情經閉
因七情傷心心氣停結故血閉不行〇治宜調
心氣通心經使血生經自行矣
寒邪經閉（由寒氣客於血室故血凝不行）
繞臍綿綿痛其脈沉緊〇服桂枝桃仁湯
結積經閉

經不行結積在臍下如覆[illegible]〇服地黃通經丸
搵痛經閉
血氣搵痛月水不行豫先嘔吐疼痛〇服瑞金
散
經水不行用法立通
用皂角末紅棗肉等分為丸如芡實大葱白一
段破作四界裹藥入陰戶中立通三四箇月胎
孕亦用此藥立應
〇經漏不止又名崩中（有十一名）
熱則流通虛則下漏故血忽然而來急治其標用

白芷湯調服百草霜甚者棕灰或猪頭骨灰或五
靈脂半生半炒俱用酒調服後以四物湯加炒黑
乾姜少許調補之緩則四物湯芩連人參香附四
物湯加荊芥止血神効
動濕經漏
或飲食勞倦或素有心氣不足是火乘肝動濕
脈弦急[illegible]大〇服東垣升陽除濕湯
陰虛經漏
腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血漏下〇服
涼血地黃湯

労傷經漏

氣血労傷非時崩下食少臍腹疼痛脉遲弱○服伏龍肝散

經漏過多

下氣太過或氣逆心悶○服茯苓補心湯四物湯合參蘇飲

經漏鮮紅

下血鮮紅不止或因労役脾胃虛損氣短氣逆自汗不止身熱食懶大便或溏体倦無力○服當歸芍藥湯

經漏紫黑

下血紫黑或夏月如腐肉臭脉虛洪數腰痛臍下痛臨行先是寒熱往來兩脇急縮兼四肢困倦心煩不得眠○服小薊湯不愈再服一呋散

經漏沸溢

陰虛陽乘天暑地熱故血溢沸○服黃芩湯

經漏暴下不止

暴下片血不止不限年月遠近○服牡蛎散

經漏經年

服香附二兩炒赤蓮殼五箇燒存性為末每服二錢空心陳米飲調下不愈再服奇効四物湯

經漏五色

崩漏不止或五色或如荳汁或如豬肝或瘀血臍腹張痛頭暈眼花久不止令人黃瘦口乾胸煩不食○服地榆三兩醋一升煮十餘沸食前稍熱服一合不愈再服鎮宮丸

經漏逆行

或血腥氣或吐血或唾○服韭菜自然汁

○經水不調（二有名十）

先期過期或閉不行皆可以成病也凡論月水俱言風冷乘之經云亢則害承乃制熱甚則兼水化凡婦人性偏慾倍厥陽之火無日不起非熱而何

經水先期來

是血熱也○四物湯加黃連

經水過期來

是血不足也○服滋榮調經丸

經水將行作痛

是血滯也○四物湯去地黃加青皮桃仁黃連香附

經水行後作痛

是氣血俱虛也○服四物湯合四君子湯

經水成塊

是氣之凝亦有熱也○四物湯加丹皮青皮香附黄連柴胡

經水色淡

是虛也有水混者亦有痰[illegible]者○四物湯去地黄加二陳湯

經水紫色

是氣之熱也○四物湯加黄連柴胡

經水黑色

是熱之甚也○四物湯加香附黄連

經水錯經妄行

是氣之[illegible]也○服緋珠正氣天香湯去乾姜加羊角地黄

經水適斷適来

或有往来寒熱○服先小柴胡湯以四物湯和之若腹中堅痛不能行動躰倦不食服桃仁散

經水過多

肥人痰多阻滞血海因而下多目必漸昏○服南星蒼术川芎香附黄連白术等分即愈[illegible]服

經水淋瀝不斷

労傷血氣衝任脉虛月水過多○膠艾湯

○赤白帶下（十七名）

臍之下三寸有任督二脉任脉是血督脉是氣任脉走胞上過腰間帯脉故名曰帯林瀝如精之状男子從上莖而下女子從玉戶綿綿而出且不痛間或有痛者經塞也患病之本有十七名標病之状止於五色傷心赤如津傷肺白如涕傷脾黄如爛瓜傷肝青如泥傷腎黒如衃血此症赤白皆属血出大小腸之分須用四物為主春加防風倍川

芎夏加黄芩倍芍藥秋加天門冬倍地黄冬加桂倍當歸隨得病之因同用藥耳

○實脉（三道）

兩手脉滑大数有力為有餘之症

○虛脉（五道）

兩手脉微細沉緊澁或洪大無力為不足之症

胞脉帯下

實熱結於任脉津液湧溢其症頭目昏眩口苦舌乾咽嗌不利小便赤澁大便閉滞○服十棗湯下之後服玄胡散調下

產後帶下

產後起早不避風邪或寒或熱入於胞門○服四物湯去芍藥地黃薑炒加防風升麻柴胡羗活天花粉

陰虛陽竭帶下

陰虛陽竭榮氣不升經脉凝泣衛氣下陷精氣累滯於下焦奇經之分蘊積而成○服衛生湯加升麻柴胡橘紅

酒色帶下

醉飽房勞或服燥藥食物○服四物湯加天花粉門冬白朮黃栢知母

思想帶下

思想無窮所願不得意淫於外入房太甚發為筋痿及為白淫謂白涇積如精之狀此症服藥不效須先告之以其死使其心灰不去思想方用胡藥○服就肝散

驚恐帶下

或因驚恐而水乘脾土濁液下流○服扁連湯

濕熱帶下

各經濕熱流寄於小腹之下而為帶○服宣明導水丸

血虛帶下

崩中血少復亡其陽故白滑之物下流不止○服固真湯

痰積帶下

胃中痰積流下滲入膀胱○服二陳湯加苓白朮升麻柴胡不愈用升提吐法

腎肝帶下

陰溺之濕勝○服固腸湯

陰痛帶下

白帶下陰戶痛心急疼身黃皮緩身重陰中如水○服升陽燥濕湯

五色帶（又名五色少林）

或三四色或四五色○服歸艾湯

癩疝帶下

癩疝白帶下注脚氣腰已下冰冷厚衣火烘尤寒面白如枯魚肌瘦心便與白帶常流不禁○服酒煮當歸丸

悲寒帶下

白帶腥臭多悲不樂大寒○服桂附湯

年高帶下

年高婦人帶下○以四物湯為末蜜丸桐子大空心米飲下四十九丸

寒濕帶下

白帶久下不止臍腹冷痛陰戸亦然目中溜火視物恍然無見牙齒悪熱飲痛須用黄連末擦之乃止○服固真丸

○癥瘕（六各）

癥者堅也瘕者假也假物以成形故有七癥八瘕之名經論並無十五名但有蛟蛇血肉鱉虱米等

七症初非定名偶因食物相感而致患耳婦人由三因動傷五臟氣血氣血不流而停滞故為癥瘕古人謂為痼疾肝經揔司又任脉為病其内苦結男子為七疝女子為癥瘕非大辛之劑不能已名雖異而病則同前人施治亦未見有分其異同者故選三曰倶備經治丸用之相同多矣

癥

腹中堅硬按之應手謂之癥也○服見晛丸揔治諸癥

瘕

腹雖硬而忽聚忽散腹内堅痛未及癥○服見晛丸揔治諸瘕

肉瘕

或食獸血肉髮虱等有形之物過食停滞假血而成不必泥此屬血病○服積氣丹

血瘕

飡飲食間　中留聚假血而成不必泥此屬血病○服積氣丹

瘀瘕

血澁不利月事沉滞不行○服良方通經丸

繫瘕

寒氣客於大腸故衛氣不榮有所繫正而結瘕在内悪氣乃起息肉乃生漸大腹懐子按之則堅推之則移久不已是名腸覃先氣病血不病故月事不斷以時而下○服晞露丸

石瘕

生於胞中寒氣客子門悪氣不散衃血漸大状如懐子月事不以時下此氣先病而血後病○服見晛丸

食瘕

嘔吐辛酸○服感應丸

肝瘕

積心腹間小如拳大如柸椀不消漸上搶心及心脇脹滿繞臍痛不可忍○服保安丸

熱瘕

或有陽氣鬱結怫熱壅滞而堅硬不消者非是寒癥瘕也

○寡婦尼姑室女（四名）

思慕

思男子不得聚合獨陰無陽以致陰陽交争乍寒乍熱狀似瘧類久則成癆黃腫無藥可治要自散鬱成服○白聖丹

夜夢鬼交

時常怕見人不時若與人争忤狀或時獨笑或時悲泣者是也久作癥瘕或成鬼胎○用松脂三兩炒乾另研雄黃一兩另研熔化入安息香末虎爪末各五錢水和丸彈子大患人裸身坐焙籠上四圍以衣遮蓋下用火炉燒藥一丸熏之甚者不過五丸其脉伏遲或鳥啄皆鬼邪爲病顔色不変亦此候也

慈恋愛憎妬恚鬱

鬱不能釋熏肝脉絃多因血盛得白濁痰逆頭風瘋氣痞悶面黙瘠瘦等症○服白聖丹

室女帶下（更有三名）

有因經水初下陰中有熱當風寢者

二有大衝脉氣盛則内熱以寒水■之者

三有乍見經行一時驚悸者○已上三帶各隨得病因治之

○成胎（余一）（誠恐後人空耗精去故附録之）

經事五日後陰戸微痒子門已開一日二日三日間陽精施去胞中陰血隨後裹精■道成男四日五日六日七日間陰血先在胞中陽精後施去裹血坤道成女過此日期血雖足精雖厚並不成胎矣

○胎漸成形臟腑輪次養胎（恐用藥干犯輪然[illegible][illegible]故附之）

一月精血凝於子宮肝經養之

二月胎形成胚胆經養之

三月成形男女分陽神爲魂木生火包絡經養之

四月形像具陰靈爲魄三焦經養之

五月筋骨成五行分五臟火生土脾經養之

六月毛髮生六律定六腑足胃經養之
七月七情開七竅通光明兒能左手土生金（肺經養之）
八月八景神具濟真靈兒能右手大腸經養之
九月在胎中三轉身宮室羅布以定精腎經養之
十月受氣足萬象成膀胱經養之
自肝為始臟腑相滋各養三十日心與小腸二經不在十月養胎之列為平居之日在下為月水有胎之時在上為乳汁故不養於胎也
〇不受胎（十八条恐後人難于求子故附錄之）
一白帶

二赤帶
三經水不利
四陰蝕
五子臟堅
六子門癖即石瘕
七陰陽患痛
八小腹寒痛
九子門閉
十子宮冷
十一子臟酸疼

十二夢與魂交〇已上並服龍骨散
十三女血不足〇服四製香附丸加四物湯
十四男子精寒〇服補腎丸加肉蓯蓉
十五男子精薄〇服補腎丸
十六瘦人子宮乾澁〇服四物湯加香附黄芩（為丸）
十七肥人軀脂滿溢子宮〇導痰湯加川芎滑石
十八經事後十三日子宮閉雖不犯前条亦不受胎也

〇斷孕法一条
婦人生育不順怕產者〇服九龍丹　枸杞子

金櫻子　山查肉　佛座鬚　熟地黄　芡實
白茯苓　當歸（各等分）為末酒糊丸如梧子大每服五十丸淡淡塩湯空心送下
附無子食乳（原該開載乳症条下）
乳不消散令人惡寒發熱〇用麥芽（炒二兩）為末作四服湯送下如乳硬加滑石瓜蔞甘草
〇種子法
上症無子欲求嗣者男服五子衍宗丸女服百子建中丸
種子第一方

五子衍宗丸（男服）

枸杞子（九兩）兎絲子（十兩）覆盆子（酒拌晒乾）車前子（三兩微炒）

五味子（三兩炮搗晒乾）右為末蜜丸如桐子大每服九十丸空心塩湯下冬月酒下脩合日春丙丁巳午夏戊己辰戌秋壬癸亥子冬甲乙寅卯須上旬晴霽之日忌鷄犬見有人也七服此子孫蕃衍遂成村落之説嘉靖丁亥廣信鄭中丞宅得之張神仙四世孫寻及数人用之殊驗

百子建中丸（女服）

真阿膠（二兩蛤粉炒成珠）蘄艾葉（二兩去筋梗醋煮乾）當歸（二兩）

川芎（一兩）熟地（二兩）芍藥（二兩）香附（十二兩水醋各半浸）

每服八十丸空心少醋點沸湯服如内寒酒下

大僕吏鮑妻久無子服此五月受胎生男（因附録之）

歸艾湯

當歸（一錢半）熟地（一錢半）芍藥（一錢半）阿膠（炒一）条芩（一錢）

川芎（一錢）黄芪（一錢蜜炙）艾葉（一錢炒）水二鍾生薑五片煎一鍾空心食前服

安胎飲

白术（蒸）黄芩（炒）水二鍾煎八分不拘時服

氣飲

蘇葉　大腹皮　陳皮　芍藥　當歸

川芎（君）人參　甘草（臣）益母草水二碗姜五片葱白七寸煎八分不拘時服

安胎白术散

白术　川芎（君）吴茱萸　甘草（臣）

右為末每服二錢温酒調下

束胎散

益母草　大腹皮　人参　陳皮　白术

甘草　紫蘇　當歸　枳殻　黄芩

川芎（加春）水二鍾煎八分不拘時服交八九箇

月服数貼甚得力

束胎丸

黄芩　白术　茯苓　陳皮　右為末和粥為丸如桐子大每服四五十丸空心白滚湯下

安胎和氣散

訶子　白术　陳皮　良姜　芍藥

陳米　甘草　水二鍾生姜五片煎八分不拘時服忌食生冷

黄芪湯

黃芪（三錢）　白术　防風　熟地　牡蛎

白茯苓　麥門冬　甘草（炙）　水煎服

血風湯

秦艽　羌活　防風　白芷　川芎

芍藥　白术　當歸　地黃　茯苓

半夏　黃芪　水煎服

茯苓半夏湯

橘紅　細辛　人參　芍藥　紫蘇

川芎　桔梗　甘葛　用水二鍾煎至

八分空心服

膠艾湯

阿膠　艾葉　益母草　水煎服

枳殼湯

枳殼　黃芩　白术　用益母草煎湯

二碗入藥再煎至八分食前服

地黃當歸湯

當歸　地黃　用益母草煎湯二碗入藥

再煎至八分食遠服

竹葉湯

白茯苓　防風　麥門冬　黃芩　用益母

草煎湯二碗入藥再煎至八分臨服加竹瀝半

酒盞食遠服

四物湯

當歸　川芎　白芍　地黃　用益母

草水二碗煎八分不拘時服

芎歸補中湯

芎藭　五味子　阿膠（炒）　黃芪（蜜炙）當歸

赤芍　白术　木香（忌火）　人參　杜仲

甘草　水二鍾煎八分不拘時服

半夏湯

半夏　肉桂　桃仁　大黃　右為末

先服四物湯次服此

牛膝湯

牛膝　瞿麥　當歸　通草　葵子

各等分水煎服

旋覆湯

益母草　旋覆花　麻黃　前胡　杏仁

五味子　荊芥　半夏　赤芍　茯苓

水二鍾煎八分不拘時服

白术湯

益母草　白朮　白茯苓　橘紅　半夏

五味子　水二鍾姜五片煎八分不拘時服

如聖湯

益母草　半夏　赤芍藥　陳皮　人參

澤蘭葉　生姜（各等分）水二鍾煎八分服

生地黃湯

生地汁（一升）酒清（一）姜汁（三合）當歸（一兩為末）童便

共和煎三四沸分四服

熟地黃湯

熟地　益母草　人參　花粉　麥門冬

水二鍾糯米一撮姜三片紅棗三枚煎八分服

連翹湯

升麻　芒硝　玄參　芍藥　白歛

防風　射子　大黃　杏仁（各等分）

水二鍾煎八分食後服

人參湯

益母草　人參　當歸　右為末以猪腰子一隻去膜切作片水二鍾糯米半合葱白二根煎取汁一鍾入藥又水一鍾再煎至八分不拘時服

八珍散

人參　菖蒲　生地黃　川芎（各一）防風

辰砂（各五錢）細辛（一錢）甘草（五分）為末薄荷湯下

白朮散

白朮（一兩）橘紅（一兩）麥門冬（一兩）人參（一兩）乾姜（一兩）

甘草（五錢）為末每服四錢溫白湯下

調經散

當歸　赤芍藥　琥珀　沒藥　桂心

細辛　射香　加生龍腦一捻姜汁半小盞溫酒調勻服得睡即安

桃仁散

桃仁（六十箇）厚桂（一兩）當歸（一兩）芍藥（一兩）右分作二服白水煎未愈加大黃服之

斬鬼丹

吳茱萸　川烏　秦艽　柴胡　姜蚕

巴戟　巴豆　芫花（一兩醋煑各）右為末煉蜜丸如桐子大每服七丸蜜酒吞下

超痛散

牛膝　甘草　韮白　當歸　桂心

白朮　黃芪　獨活　[illegible]煎空心服

加減四物湯

生地　芍藥　柴胡　秦艽　黃芩

為末如梧子大每服三十丸烏豆湯吞下

桂枝桃仁湯

桂枝　赤芍　生地　桃仁　水二鍾

入薑棗食後服

升陽除湿湯

柴胡　羌活　蒼术　黃芪　防風

甘草　升麻　藁本　蔓荊子　獨活

當歸　水二鍾煎八分食前服

涼血地黃湯

生地黃　當歸　黃連　羌活　柴胡

防風　黃柏　知母　升麻　藁本

細辛　川芎　甘草　蔓荊子　荊芥

黃芩　紅花　水二鍾煎八分食前服

當歸芍藥湯

黃芪　白术　蒼术　白芍　歸身

熟地　甘草　生地　陳皮　柴胡

水二鍾煎八分食前服

小薊湯

小薊葉（取汁一[illegible]）生地　白术（一兩）　水二鍾煎八分

溫服

黃芩湯

黃芩（不拘多少）為末每服二錢燒秤錘淬酒調下

二陳湯

陳皮（炒）　半夏（薑汁炒）各等分

四君子湯

人參　白术　茯苓　甘草　水煎服

十棗湯

芫花　甘遂　大戟　水煎服性有毒

不可輕用

膠艾湯

艾葉　阿膠（炒）各等　水煎服

衛生湯

芍藥　當歸　黃芪　甘草　水二鍾

煎八分空心服

補經固真湯

人參　橘紅　乾薑　葵花　柴胡

甘草　郁李仁　黃芩　水二鍾煎一鍾

半再入黃芩煎至八分空心熱服少頃以早粥

壓之

升陽燥濕湯

防風　良薑　乾薑　郁李仁　甘草

柴胡　陳皮　黃芩　白葵花　水二

鍾煎八分空心服

桂附湯

肉桂　附子　黃栢　知母　甘草

升麻　黃芪　人參　水煎食前服

佛手散

當歸　川芎　用益母草煎湯二碗煎至

八分食前服

二黃散

生地　熟地　為煎白朮枳殼湯調二錢

桑寄生散

桑寄生　當歸　川芎　續斷　阿膠

香附　茯神　白朮　人參　甘草

水二碗生薑五片煎一碗不拘時服

天仙藤散

天仙藤　香附　陳皮　烏藥（各等分）　甘草

生薑（三片）　木瓜（三片）　紫蘇　用益母草煎湯

二碗入藥再煎至八分食前服

安榮散

益母草　麥門冬　通草　滑石　人參

細辛　當歸　燈心　甘草　右為末

每服二錢不拘時白湯下

犀角散

益母草　犀角　山梔　羗活　黃連

青黛　川芎　茯苓　甘草（各等分）　白芷

水二碗竹葉七片煎八分食遠服

桑螵蛸散

益母草・桑螵蛸　為末每二錢米飲下

白薇散

益母草　白薇　白芍（各等分）　右為末每服二

錢溫酒調下

羚羊角散

益母草　羚羊角　獨活　棗仁　薏苡

五加皮（君）　防風　當歸　茯神　川芎

杏仁（臣）　甘草（佐）　水煎磨入木香三錢食遠

溫服

徹聖散

蔓荊子　為末每服二錢空心煎葱白湯[illegible]下

枳殼散

枳殼（炒）　粉草　為末每服二錢空心百（沸湯）調下日三服

無憂散

當歸　川芎　木香　白芍　枳殼

甘草　乳香（另研）　水二鍾煎八分臨服入乳香血余灰服之

黑神散

黑豆（炒去）　當歸　肉桂　乾薑　熟地

蒲黃　白芍　甘草（各等分）為末每用二錢酒童便各半調下

平胃散

蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　水酒各一鍾煎至九分投朴硝五錢再煎數沸溫服胎化血水而下

黑効散

百草霜　白芷（各等分）每服二錢童便調稀百沸湯送下

香桂散（下死胎萬不得已用此方）

麝香　桂心　為末和勻[illegible]服溫酒下

三聖散

益母草　當歸　玄胡索（各等分）右為末每服二錢酒或童便調下

連散

益母草　瑞蓮　棕櫚（灰）　肉桂　當歸

梹郎　鯉魚鱗（燒）　川芎　為末每服二錢食前生姜湯并酒送下

七珍散

人參　菖蒲　生地　川芎　細辛

防風　辰砂　為末每服二錢不拘時薄荷湯調下

玉露散

川芎　桔梗　白芷　白芍　當歸

人參　茯苓　甘草（各等分）水二鍾煎一鍾食後服如頭熱甚大便閉加大黃三錢

參歸散

益母草　人參　當歸　肉桂　熟地

麥門冬　白芍　生地　水二鍾糯米一合竹葉十片煎一鍾食遠服

失笑散

益母草　蒲黃　五靈脂[illegible]石（各等分）為末

每服二錢米醋調白湯送下

定痛散

益母草　當歸　官桂　獨活　牛膝

白术　黃芪　生姜　韮白　甘草

桑寄生水煎服

卷荷散

益母草　紅花　當歸　蒲黃（炒）　丹皮

各等分為末每服二錢食前酒調下

孤鳯散

白礬（研細）百沸湯調服二錢

催生如聖散

黄葵子（不拘多少）為細末每服二錢熱酒調下

二母散

益母草　知母　貝母　人參　桃仁

杏仁　水煎食後服

蛤粉散

蛤粉　皂角（燒存性）　為末每服二錢酒調下

肌汗為度

川芎散

益母草　川芎　烏藥（各等分）為末每服三錢

不拘時服燒紅秤錘淬酒飲之

清魂散

澤蘭葉　人參　川芎　荊芥　甘草

為末每服二錢不拘時白湯和酒調匀服下

茯苓散

益母草　白茯苓　木香　熟地　栢仁

訶勒皮　杜仲　青橘皮　烏賊骨　秦艽

赤石脂　兎絲子　當歸（各等分）為末每服二錢

酒調下

瑞金散

玄胡索　丹皮　紅花　姜黄　赤芍

蓬术　川芎　當歸（各等分）官桂（少加）

水酒各半煎食前服

伏龍肝散

棕灰　伏龍肝　射香（少許）每用二錢淡醋

調下

一笑散

牡蛎　川芎　白茯苓　龍骨　熟地

續斷　當歸　五味　艾葉　人參
地榆　甘草　為末水二鍾薑三片棗三
枚煎八分食前服

牡丹散
丹皮　大黃　赤[illegible]苓　生地　赤芍
當歸　白朮（各君）　桃仁　官桂　石帚
木香（臣）　水二鍾薑三片煎八分食前服

龍骨散
龍骨（三兩）　黃栢夏　乾薑　伏龍肝（各二錢）
桂心　石帚　滑石（各三兩）　烏賊骨　代赭
（各五錢）　殭蚕（五枚）　右為末每服二錢酒下

知母飲
赤茯苓　黃芩　黃耆　知母　甘草
麥門冬　用益母草湯二碗入藥再煎至八分
臨服加竹瀝半盞食後服

參蘇飲
人參（一兩為末）　蘇木（二兩搥碎）　水二鍾煎蘇木汁一鍾
調參二錢服之

參朮飲
益母草　人參　白朮　半夏　陳皮
甘草　加入四物湯生姜三片水煎服

枳實檳郎丸
枳實　檳郎　黃連　黃栢　黃芩
當歸　木香　阿膠　蛤粉（各五錢）
為末水為丸如小豆大每服三四十丸不拘時
溫米飲送下

益母丸
益母草（五月陰乾不犯鐵器石臼中搗）為末蜜丸彈子大或桐
子大或化童便酒各半送下臨產氣不順木香
湯送下

通經丸
川椒（炒）　蓬朮（炒）乾漆　當歸（各半兩）　青皮　乾姜
大黃　桃仁（炒）　川烏　桂心（各一兩）為末
以一半醋熬成膏和余藥杵千下丸如桐子大
陰乾每服五十丸湯下

地黃通經丸
熟地（三兩）　虻虫　水蛭（火炙）　糯米　桃仁
為末蜜丸如桐子大空心服五丸加至七丸酒
送下

固真丸

當歸　柴胡　白石脂　白芍　黃栢
乾姜（炒）　龍骨（煅）　為末水煮稀麵為丸芡實
大每服五丸百沸湯下少時以粥壓之

固腸丸
椿根白皮（炒用）加佐使藥為末糊丸

酒煮當歸丸
當歸（一両）　茴香（五錢）　良姜　附子（各七錢）
以酒二鍾煎至乾再焙黃塩炒全蝎一錢酒煮
粥為丸桐子大

消塊丸

硝石（六両）　大黃（八両）　人參　甘草（三両）右為末
酒三升入器中取竹片作準每入一升作一刻
先入大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥
又盡一刻微火熬便丸如桐子大服之

濟危丹
益母草　五靈脂　卷栢　玄精石　陳皮
桑寄生（研另）　阿膠　將前四味研勻石器內微
火炒勿令焦再研細却入後四味藥末以生地
黃汁和丸如桐子大每服五十丸食遠當歸煎
酒送下

參术膏
益母草　人參　白术　桃仁　陳皮
黃芪　茯苓　甘草　豬羊胞（入藥共）
煎服之

天門冬飲子
天門冬　知母　茺蔚子　五味　防風
茯苓　羌活　人參（各等分）水二碗薑三片
煎八分食後服

生熟飲子
益母草　肉豆蔻　草果　厚朴　半夏

陳皮　甘草　大棗　生姜（各等分）水二
鍾煎八分食前服

草果飲子
草果　半夏　川芎　赤茯苓　陳皮
白芷　水煎服

全生方
白术　姜皮　大腹皮　茯苓皮　陳皮
為末每服二錢米飲調下

探吐法
此法治胞轉服參术飲以指探喉中吐出藥汁

出是驗

凡胞衣不下用法有四用藥有二婦人百病莫甚於生產臨產莫甚於催生既產莫甚於胞衣不下所以不下者母生訖血流入胞衣中為血所脹治之稍緩脹滿腹中漸衝上心胸疼痛喘急多死必將衣中血散脹消胞衣自下停待稍久急斷臍帶以少物擊墜繫時切宜用心先繫然後截斷不爾則胞上掩心而死繫墜則使其子血脉不朝入胞中則胞衣當自痿縮而下縱淹延數日亦不害人只要叮

嚀產婦心安終自下矣下法有四〇一取夫單衣蓋井上立出〇二產婦自銜髮尾在口嘔噦即下〇三取夫鞋底炙熨小腹上下五六次立効〇四可掇千年運蘗以左足先進房門放在門內即下〇用藥有二〇一皂角煨去皮絃用淨肉焙乾為末每服一錢沸湯泡水半碗溫服〇二以土牛膝（酒浸）瞿麥（各四錢）滑石（五錢冬月燬用）當歸（酒洗）木通（各六錢）葵子（五錢）為粗末每服五錢水一鍾煎七分服

凡產後胎衣不下敗血冲心胸血悶者須用熱

少頃氣定又與之次早亦然

塩塗法

治橫生倒產手足出者用塩塗兒足底又以針刺兒足并以塩磨產婦腹上即產

針刺法

治同前用粗針刺兒手足二分許兒得痛驚轉即縮自當回順而生

草鞋法

街路上尋側一邊草鞋燒灰酒調下

牀前薰法

治產後血昏不知人事乾漆燒烟鼻中熏之[illegible]預備醋炭次服還魂散

見睍丸

巴豆霜（五分）三稜（煨一兩）神麯（炒一兩）木香（二錢）香附（炒五錢）升麻（三錢）柴胡（一錢）草豆蔻（麪裹煨五錢）為末蒸餅丸如綠豆大每服二十丸白湯送下量所傷多少服之

醫燈續焰序

武林城之東偏曩有賢者出於其間曰紹隆王先生其爲人也樸遬遲重人莫知之僘冠穿履絫紹覺師師心知其賢已而得道遂發靈蘭金匱之藏盡其術皆解驗之其治病也劃然

無疑難矣先生沒而道大行潘翁鄧林乃其大弟子也以故城東有潘氏之學數年以來翁道日隆望日重而翁必嗛然曰嘻此吾王先生之教也著脈及證數萬言嚶吁者衆而翁必退然曰嘻此吾王先生之教也人以此賢潘氏求爲弟子者惟恐後僕觀自古師弟之間葢難言之自馬融大儒不能不疑其弟子康成而呂步舒或不知其師書況夫士無賢不肖入朝見嫉女無美惡入宮見妬美好者不祥之器秦太醫李醯之事豈必不

見於門下哉而翁終身不忘其師諸弟子事翁益謹取黃帝扁鵲脉書及近世來諸名家條分縷析講習不倦翁之所以教弟子如王先生之於翁而弟子之事翁一如翁之所以事王先生可不謂難耶夫翁生平誠長者

其神術若長桑陽慶。固不待言。乃諸子以魁傑之才。丘園之秀。厭棄章句。敝屣功名。而心切嚮往。如七十子之事孔子。此非翁之道德殊妙。能致是哉。僕於是尤有感焉。士處斯世而全性命。亦極難耳。以譙玄之術數而難

免。以李業之志節而難免。以左慈之幻術而難免。以霍原之教授而難免。翁與弟子。治其方書。與物無害。與人無爭。亦可謂高蹈君子。質有其文矣。此尤僕所慨嘆以爲不可及者。歲在執徐。翁春秋六十。適醫燈一書告竣。僕樂得而讀之。其綱羅羣有。剖析毫芒至矣。而猶不敢自名一家。比於詮註。翁學之富。技之精。志之謙。此豈末學淺術所能測其堂奧哉。間者蔣子介眉屬予言。因遂述其師弟源流之義。以爲翁壽。卽以爲此書之序。然則

翁之所以壽世者。其又在是也夫。

四明陳朝輔夔五氏謹序於西泠之不繫舟

醫燈續焰敘原

紹龍王先生者。楫之受業師也。楫童年卽知之。萬曆壬子夏。有同盟朱仲修相引。乃負笈先生之門。先生與楫同里。相去僅百武。以故朝暮隨從。風雨無阻。先生蓋未嘗暇豫倦教也。先生初命楫讀

靈素。次本經。次難經。次傷寒論。次金匱。次脉經。隨讀隨講。不升座。不據席。不作學究態。及其與到理融。口言心應。開闔也。升降也。方圓也。動靜也。上下之感應也。左右之往來也。拆之則千。熔之則一。卷舒六合。搏弄五行。眞令花落空中。風

生座上。恩如楫者。亦隱隱躍躍。有瞻前忽後景象。先生豈常人也哉。先生少孤。早棄學。於經書義理漠不相入。傳家醫業。坐此而廢。雖常以此爲悒悒。然亦相安于無可奈何。已弱冠。聽講於土橋紹覺師。師憫其鈍樸。指令求慧。先生乃發

願拜清淨。三年如一日。忽心中若初燃之燈。乍明乍暗。久之。覺燈光漸大。燈焰漸高。試一開卷。便能解。非復疇昔之茫然矣。自此日明一日。卽大乘中秘。義理幽玄之書。皆若焚山照渚。水陸現形。一無逃遁者。先生道業因之尊崇。家聲藉

以振起。益信先生之非常人也。先生西歸。僊五十有九。時爲天啓甲子之二月。迄今三十年所。及門者亦復凋謝殆盡。楫老矣。欲述其指授。愧非游夏之才。不述。又無以畢先生之志。會庚寅夏日。偶及門有以崔氏脉訣索講者。讀之良備。因用爲張本。下以先生平日所教者詮解之。而後附以方。命曰醫燈續焰。意謂挑燈而續其焰耳。若曰卽此是燈。則吾豈敢。

先生於楫。名則師生。情同父子。受恩罔極。圖報無從。嘗欲作一傳。以表先生之才異。矣苦無因。今本編詮成。先後綴屬。皆本先生胸臆。故不敢僭爲已有。敘表於首。以充作傳之意。

不肖潘楫敘

醫燈續焰序

予素不諳醫。嘗從二三知己後。講論切磋。麤聞大義。乃知其道與易通。最精微。亦冣易簡也。近世業醫家。

源流弗徹。好為奇說之說以欺人。而其惝怳支離。誤人滋甚。宗人鄧林子。沉心此道。慱綜深思。寐宗東城水竹間者。數十年。不籍人知而知籍甚。申酉後。文人墨士。跡筆硯。棄制舉。皆負笈鄧林之門。鄧林初與抉素問陰陽生化之奥。晰靈樞經脈俞節之微。泝辯越

人之難經。探倉公之斷案。闡仲景。論叔和。以及河間。潔古。東垣。丹溪等。諸家異同之說。皆有以究其本而析其衷。座下數十輩。率一

時名流。慮無不洞開心胷者。最後。乃取紫虛真人所纂四言舉要而節解焉。因脈及證。由證及方。舉從前所闡靈素諸家之要。盡融

會於平實切近之中。使讀者見如指掌。此所謂最精微。最易簡也。以為菽粟即菽粟。以為珍奇即珍奇。彼偏僻詭誕。欺人誤人者。視之。竟何如耶。書成。叓名醫燈續熖。藉此一續。而後得以普焰十方。其功德於後世者。又何可紀極。鄧林意蕭淡。不屑屑逐觳利。視診

之餘。即閉戶垂簾。觴詠以自樂。其高致如此。吾友張卿子。玄湛淵微。覃精易理。與鄧林隔水而居。兩家門人。無少別異。問難和衷。相

長相益。一時相傳為萟林盛事。而予亦得數過從。聆閎論焉。嗚呼。若鄧林者。進於道矣。技云乎哉。

壬辰初夏宗末之洪謹序

醫燈續焰凡例

一正文崔刻李刪。渾然合一。本註節而解之。門類雖辨以分。行句實因之斷。恐讀者小礙。是刻全文一帙于首。以便統閱焉。

一註中辯證論脉。理與義微。非引據經書。未為明確。自靈素而下。非秦越長沙。即王劉朱李。不由別徑。盡屬當家。庶有志於斯者。得以從一門入也。

一醫書關人軀命。唯貴義理精詳。原不取文章鬬艷也。故註中俗句俚言。淺而易見者。槩不修飾。在讀者無探索之難。而不佞亦免鈎致之苦。洵稱兩便。

一方者方也。如四方之不可移易也。湯丸膏散。佐使君臣。寒熱温凉。重輕多寡。各有義意。若不釋評。了難窺測。今最要最切者。業先評定。餘多未及。尚俟補之。

一所選方。皆係古今經驗。製出名家。間有冗雜無緒。及藥難覔而炮製怪誕者。俱置不錄。

一第998冊 續修四庫全書 第32 版正内

一癰疽。胎產。小兒等書。各有專刻。此但撮論其要。至若非常之證。必效之方。則又毫無挂漏也。珠玉具存。瓦礫棄之。何礙哉。

一補遺者。補其遺漏也。正文論脉。可謂詳矣。如經云四診者。則缺其三。論病。可謂盡矣。若周於一身者。尚遺其幾。如六淫有名而無病。証中既衍其病。何可不選其方。今并方論而悉補之。以成全璧。

一附餘者。附其餘事也。是編曰正文。曰証。曰評。則脉證治方之局全矣。後復拾其遺而補之。可謂全而又全。何餘之有。殊不知診治籍於醫者。脉證見於病人。醫而無品。則醫不行。病不善調。則病不愈。故又以醫範病則繫于後。名曰附餘。實非餘于局外也。醫家病家。當識此爲第一義。乃可。

參閱人姓氏

吳[illegible][illegible]開之　李附鳳瑞生
汪之琦奇玉　支希璋玉森
吳之琦季良　陳繼新濬持
張文啓開之　沈晋垣亮宸
朱之棟華斯　徐　提子先
王元禨樞伯　蔣式金子如
陳　潛子含　顧　濬章之
李　彣珥臣　徐鳴鶴子和
余正巳君求　李國璋彥卿
魯應遴兆青　蕭明俊公溥
張履星大章　余頤章漢持
朱行陛鄰侯　張其旋上有
俞其恒子占　陳梅售曾詠
余　禧亦祉　梁州儁士望
仇琦御汝霖　孫　標振宜

葉　乘彝周　胡靖策我屏
王嘉綬青羽　宋　輝飛卿
陳如玖德卿　高鴻奎君錫
曹毓貞元起　張光蘭畹如
陳潘杲中旋　馮子異西平
楊象乾元如　屠可師令長
林　潤俊生　吳之杰天生
沈文萃涵公　施　璜洵美

陳家模範公　沈　穆喆先
徐　楨闇生　周文裔月仙
何　燈徵明　姚宗亮亮公
沈[illegible]振寰　邢朝漣賢庵
壻
施安祖孔安　戴士彪師臣
姪　世韶夔司　世韺子咸
男　枸燦象承　蒼與序承

醫燈續焰

正文

（本文計二千六百四十言凡六百六十句原名四言脈訣乃宋南康紫虛隱君崔嘉彥希範所撰明蘄州月池子李言聞子郁刪補之更名四言舉要其間脈證病因始備但無註釋則讀者不知其所從來反增繁蔓庚寅春因及門之請乃數志為釋不敢旁引外書惟首遵靈素次仲景傷寒金匱下及張朱劉李諸賢論有精純明確者採之亦不敢以辭害意并妄入臆說如意與理欲則設喻形容翻覆錯辯務令恍然在目豁然開心至若文之措字之俚在所勿論也因借更名醫燈續焰尚俟高明者鑒教之潘楫識）

脈乃血派、氣血之先、血之隧道、氣息應焉、其象法地、血之府也、心之合也、皮之部也、資始于腎、資生于胃、陽中之陰、本乎營衛、營者陰血、衛者陽氣、營行脈中、衛行脈外、脈不自行、隨氣而至、氣動脈應、陰陽之誼、氣如橐籥、血如波瀾、血脈氣息、上下循環、十二經中、皆有動脈、惟手太陰、寸口取決、此經屬肺、上系吭嗌、脈之大會、息之出入、一呼一吸、四至為息、日夜一萬、三千五百、一呼一吸、脈行六寸、日夜八百、十丈為準、初持脈時、令仰其掌、掌後高骨、是謂關上、關前為陽、

關後爲陰、陽寸陰尺、先後推尋、心肝居左、肺脾居右、腎與命門居兩尺部、魂魄穀神、皆見寸口、左主司官、右主司府、左大順男、右大順女、本命扶命、男左女右、關前一分、人命之主、左爲人迎、右爲氣口、神門决斷、兩在關後、人無二脉、病死不愈、男女脉同、唯尺則異、陽弱陰盛、反此病至、脉有七診、曰浮中沉、上下左右、消息求尋、又有九候、舉按輕重、三部浮沉、各候五動、寸候胸上、關候膈下、尺候于臍、下至跟踝、左脉候左、右脉候右、病隨所在、不病者否、浮爲心肺、沉爲腎肝、脾爲中州、浮沉之間、心脉之浮、浮大而散、肺脉之浮、浮濇而短、肝脉之沉、沉而弦長、腎脉之沉、沉實而濡、脾胃屬土、脉宜和緩、命爲相火、左寸同斷、春弦夏洪、秋毛冬石、四季和緩、是謂平脉、太過實强、病生于外、不及虛微、病生于內、春得秋脉、死在金日、五臟准此、推之不失、四時百病、胃氣爲本、脉貴有神、不可不審、調停自氣、呼吸定息、四至五至、平和之則、三至爲遲、遲則爲冷、六至爲數、數即熱證、轉遲轉冷、轉數轉熱、遲數既明、浮沉當別、浮沉遲數、辨內外因、外因于天、內因于人、天有陰陽、風雨晦明、人喜怒憂、思悲恐驚、外因之浮、則爲表證、沉裏遲陰、數則陽盛、內因之浮、虛風所爲、沉氣遲冷、數熱何疑、浮數表熱、沉數裏熱、浮遲表虛、沉遲冷結、表裏陰陽、風氣冷熱、辨內外因、脉證參別、脉理浩繁、總括于四、既得提綱、引伸觸類、浮脉法天、輕手可得、汎汎在上、如水漂木、有力洪大、來盛去悠、無力虛大、遲而且柔、虛甚則散、渙漫不收、有邊無中、其名曰芤、浮小爲濡、綿浮水面、濡甚則微、不任尋按、沉脉法地、近于筋骨、深深在下、沉極爲伏、有力爲牢、實大弦長、牢甚則實、愊愊而强、無力爲弱、柔小如綿、弱甚則細、如蛛絲然、遲脉屬陰、一息三至、小駃于遲、緩不及四、二損一敗、病不可治、兩息奪精、脉已無氣、浮大虛散、或見芤革、浮小濡微、沉小細弱、遲細爲濇、往來極難、易散一止、止而復還、結則來緩、

止而復來代則來緩止不能回數脉屬陽六至一息七疾八極、九至爲脫、浮大者洪沉大牢實、往來流利、是謂之滑、有力爲緊、彈如轉索、數見寸口有止爲促、數見關中、動脉可候、厥厥動搖、狀如小豆、長則氣治、過于本位、長而端直、弦脉應指、短則氣病、不能滿部、不見于關、惟尺寸候、一脉一形各有主病、數脉相兼、則見諸症、浮脉主表、裏必不足、有力風熱、無力血弱、浮遲風虛、浮數風熱、浮緊風寒、浮緩風濕、浮虛傷暑、

浮芤失血、浮洪虛火、浮微勞極、浮濡陰虛、浮散虛劇、浮弦痰飲、浮滑痰熱、沉脉主裏、主寒主積、有力痰食、無力氣鬱、沉遲虛寒、沉數熱伏、沉緊冷痛、沉緩水畜、沉牢痼冷、沉實熱極、沉弱陰虛、沉細痺濕、沉弦飲痛、沉滑宿食、沉伏吐利、陰毒聚積、遲脉主臟、陽氣伏潛有力爲痛、無力虛寒、數脉主腑、主吐主狂、有力爲熱、無力爲瘡、滑脉主痰、或傷于食、下爲畜血、上爲吐逆、濇脉少血、或中寒濕、反胃結腸、自汗厥逆、弦脉主飲、

病屬膽肝、弦數多熱、弦遲多寒、浮弦支飲、沉弦懸痛、陽弦頭痛、陰弦腹痛、緊脉主寒、又主諸痛、浮緊表寒、沉緊裏痛、長脉氣平、短脉氣病、細則氣少、大則病進、浮長風癇、沉短宿食、血虛脉虛、氣實脉實、洪脉爲熱、其陰則虛、細脉爲濕、其血則虛、緩大者風、緩細者濕緩濇血少、緩滑內熱、濡小陰虛、弱小陽竭、陽竭惡寒、陰虛發熱、陽微惡寒、陰微發熱、男微虛損、女微瀉血、陽動汗出、陰動發熱、爲痛與驚、崩中失血、虛寒相搏、

其名爲革、男子失精、女子失血、陽盛則促、肺癰陽毒、陰盛則結、疝瘕積鬱、代則氣衰、或泄膿血、傷寒心悸、女胎三月、脉之主病、有宜不宜、陰陽順逆、凶吉可推、中風浮緩、急實則忌、浮滑中痰、沉遲中氣、尸厥沉滑、卒不知人、入臟身冷、入腑身溫、風傷于衛、浮緩有汗、寒傷于營、浮緊無汗、暑傷于氣、脉虛身熱、濕傷于血、脉緩細濇、傷寒熱病、脉喜浮洪、沉微濇小、證反必凶汗後脉靜、身凉則安、汗後脉躁、熱甚必難、陽病見陰、

病必危殆、陰病見陽、雖困無害、上不至關、陰氣已絶、下不至關、陽氣已竭、代脉止歇、藏絶傾危、散脉無根、形損難醫、飲食内傷、氣口急滑、勞倦内傷、脾脉大弱、欲知是氣、下手脉沉、沉極則伏、濇弱久深、六鬱多沉、滑痰緊食、氣濇血芤、數火細濕、滑主多痰、弦主留飲、熱則滑數、寒則弦緊、浮滑兼風、沉滑兼氣、食傷短疾、濕留濡細、瘧脉自弦、弦數者熱、弦遲者寒、代散者折、泄瀉下利、沉小滑弱、實大浮洪、發熱則惡、嘔吐反胃、

浮滑者昌、弦數緊濇、結腸者亡、霍亂之候、脉代勿訝、厥逆遲微、是則可怕、咳嗽多浮、聚胃關肺、沉緊小危、浮濡易治、喘急息肩、浮滑者順、沉濇肢寒、散脉逆證、病熱有火、洪數可醫、沉微無火、無根者危、骨蒸發熱、脉數而虚、熱而濇小、必殞其軀、勞極諸虚、浮耎微弱、土敗雙弦、火炎急數、諸病失血、脉必見芤、緩小可喜、數大可憂、瘀血内畜、却宜牢大、沉小濇微、反成其害、遺精白濁、微濇而弱、火盛陰虚、芤濡洪數、三消之脉、

浮大者生、細小微濇、形脱可驚、小便淋閟、鼻頭色黄、濇小無血、數大何妨、大便燥結、須分氣血、陽數而實、陰遲而濇、癲乃重陰、狂乃重陽、浮洪吉兆、沉急凶殃、癇脉宜虚、實急者惡、浮陽沉陰、滑痰數熱、喉痺之脉、數熱遲寒、纏喉走馬、微伏則難、諸風眩運、有火有痰、左濇死血、右大虚看、頭痛多弦、浮風緊寒、熱洪濕細、緩滑厥痰、氣虚弦耎、血虚微濇、腎厥弦堅、真痛短澁、心腹之痛、其類有九、細遲從吉、浮大延久、疝氣弦急、

積聚在裏、牢急者生、弱急者死、腰痛之脉、多沉而弦、兼浮者風、兼緊者寒、弦滑痰飲、濡細腎著、大乃腎虚、沉實閃朒、脚氣有四、遲寒數熱、浮滑者風、濡細者濕、痿病肺虚、脉多微緩、或濇或緊、或細或濡、風寒濕氣、合而爲痺、浮濇而緊、三脉乃備、五疸實熱、脉必洪數、濇微屬虚、切忌發渴、脉得諸沉、責其有水、浮氣與風、沉石或裏、沉數爲陽、沉遲爲陰、浮大出厄、虚小可驚、脹滿脉弦、土制於木、濕熱數洪、陰寒遲弱、浮爲虚滿、

緊則中實、浮大可治、虛小危極、五臟爲積、六腑爲聚、實强者生、沉細者死、中惡腹脹、緊細者生、脉若浮大、邪氣已深、癰疽浮數、惡寒發熱、若有痛處、癰疽所發、脉數發熱、而痛者陽、不數不熱、不痛陰瘡、未潰癰疽、不怕洪大、已潰癰疽、洪大可怕、肺癰已成、寸數而實、肺痿之形、數而無力、肺癰色白、脉宜短濇、不宜浮大、唾糊嘔血、腸癰實熱、滑數可知、數而不熱、關脉芤虛、微濇而緊、未膿當下、緊數膿成、切不可下、婦人之脉、

以血爲本、血旺易胎、氣旺難孕、少陰動甚、謂之有子、尺脉滑利、妊娠可喜、滑疾不散、胎必三月、但疾不散、五月可別、左疾爲難、右疾爲女、女腹如箕、男腹如釜、欲産之脉、其至離經、水下乃産、未下勿驚、新産之脉、緩滑爲吉、實大弦牢、有證則逆、小兒之脉、七至爲平、更察色證、與虎口文、奇經八脉、其診又別、直上直下、浮則爲督、牢則爲衝、緊則任脉、寸左右彈、陽蹻可決、尺左右彈、陰蹻可別、關左右彈、帶脉當訣、尺外斜上、

至寸陰維、尺內斜上、至寸陽維、督脉爲病、脊强癲癇、任脉爲病、七疝瘕堅、衝脉爲病、逆氣裏急、帶主帶下、臍痛精失、陽維寒熱、目眩僵仆、陰維心痛、胸脇刺築、陽蹻爲病、陰緩陽急、陰蹻爲病、陽緩陰急、癲癇瘈瘲、寒熱恍惚、八脉脉證、各有所屬、平人無脉、移于外絡、兄位弟乘、陽溪列缺、病脉既明、吉凶當別、經脉之外、又有真脉、肝絶之脉、循刀責責、心絶之脉、轉豆躁疾、脾則雀啄、如屋之漏、如水之流、如盃之覆、肺絶如毛、

無根蕭索、麻子動搖、浮波之合、腎脉將絶、至如省客、來如彈石、去如解索、命脉將絶、鰕遊魚翔、至如湧泉、絶在膀胱、真脉既形、胃氣已無、參察色證、斷之以臆、

醫燈續焰總目

凡例（八條）
校正姓氏
正文
卷之一
血脉隧道第一
法地合心第二
始生榮衛第三
氣動脉應第四
寸口大會男女定位第五
七診九候第六
四時胃氣第七
平和遲數第八
內外因第九
浮脉第十
沉脉第十一

遲脉第十二
數脉第十三
長脉第十四
短脉第十五
卷之二
浮脉主病第十六
沉脉主病第十七
卷之三
遲脉主病第十八
數脉主病第十九
滑脉主病第二十
澁脉主病第二十一
弦脉主病第二十二
緊脉主病第二十三
長短細大主病第二十四
浮沉主病第二十五

洪細主病第二十六
緩類主病第二十七
濡弱小主病第二十八
微脉主病第二十九
動脉主病第三十
革脉主病第三十一

卷之四

促結主病第三十二

代脉主病第三十三
脉病順逆第三十四
中風脉證第三十五
風寒脉證第三十六
暑濕脉證第三十七
傷寒脉證第三十八
飲食勞倦脉證第三十九
氣病脉證第四十
六鬱脉證第四十一

卷之五

痰病脉證第四十二
瘧疾脉證第四十三
泄瀉脉證第四十四
嘔吐反胃脉證第四十五
霍亂脉證第四十六
欬嗽脉證第四十七

喘急脉證第四十八
火病脉證第四十九
骨蒸脉證第五十

卷之六

勞極脉證第五十一
失血脉證第五十二
瘀血脉證第五十三
精濁脉證第五十四

三消脈證第五十五
小便淋閟脈證第五十六
卷之七
大便燥結脈證第五十七
癲狂脈證第五十八
癇病脈證第五十九
喉痺脈證第六十
卷之八

眩暈脈證第六十一
頭痛脈證第六十二
心痛脈證第六十三
卷之九
疝氣脈證第六十四
腰痛脈證第六十五
脚氣脈證第六十六
卷之十
痿病脈證第六十七
痺病脈證第六十八
五疸脈證第六十九
卷之十一
水病脈證第七十
卷之十二
脹滿脈證第七十一
積聚脈證第七十二

中惡脈證第七十三
卷之十三
癰疽脈證第七十四
卷之十四
肺癰脈證第七十五
腸癰脈證第七十六
卷之十五
胎産脈證第七十七

卷之十六
小兒脉證第七十八
卷之十七
奇經八脉脉證第七十九
反關脉第八十
真藏脉第八十一
卷之十八（補遺）
嘈雜

吞酸吐酸
噎膈
自汗
盜汗
悸怔忡
健忘
不寐
呃

面
目
耳
鼻
口脣
舌
齒
鬚髮

附六淫方（補前第十九　內外因）
筆峰雜興方之內即有六淫方
卷之十九（補遺）
望診
聞診
問診
附辯舌
卷之二十（附餘）
醫範

卷之二十一　附
病則

醫燈續焰目錄

卷之一
血脉隧道第一
法地合心第二
始生榮衛第三
氣動脉應第四
寸口大會男女定位第五
七診九候第六

四時胃氣第七
平和遲數第八
内外因第九（十九方附補遺十八卷）
浮脉第十
沉脉第十一
遲脉第十二
數脉第十三
長脉第十四

短脉第十五

卷之二

浮脉主病第十六

參耆四物湯　四君子湯

九味羌活湯　仲景麻黃湯

東垣清暑益氣湯　百一十味香薷飲

當歸補血湯　瓊玉膏

六味地黃丸　八味地黃丸（即金匱腎氣丸）

十全大補湯　生脉散

補天大造丸　八珍湯

金匱苓桂术甘湯　仲景小青龍湯

二陳湯

沉脉主病第十七

王隱君滾痰丸　仲景大承氣湯（附小承氣湯）

和劑大七氣湯（即四七湯）　河間正氣天香散

仲景理中圓（附附子理中湯）　寶鑑既濟解毒湯

錢氏導赤散　仲景黃連解毒湯

金匱烏頭煎　和劑來復丹

仲景五苓散　和劑大七香丸

和劑小七香丸　河間神芎丸

金匱腎氣丸（見第十六）　六味地黃丸（見第十六）

金匱桂枝附子湯　和劑滲濕湯

胃苓湯　仲景小青龍湯（見第十六）

絜古枳术丸　丹溪保和丸

藿香正氣散　枳實理中丸

醫燈續焰卷一

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖翼評
門人　吳之疆開之
　　　李附鳳瑞生　校

血脉隧道第一

人身十二經脉。隧地中十二水道。分合起伏。無不相符。

脉乃血派。氣血之先。血之隧道。氣息應焉。

水自源而分流曰派。合分起伏。道各井然。人身之血。猶夫水也。血中之脉。猶夫派也。派通則水源活。脉通則氣血行。氣也。血也。其在於人身。渾淪條析。非一非二。設經脉不先爲流轉。則潛行默運之機凝矣。呴濡守使。又安望其各盡乃職耶。（難經二十二難曰。氣主呴之。血主濡之。素問陰陽應象論曰。陰在內。陽之守。陽在外。陰之使。）隧道。即經脉也。言其在血中。精容隱隧。自成一道。靈樞營氣篇云。營氣之道。內穀爲寶。穀入於胃。乃傳之肺。流溢於中。布散於外。精專者。行於經隧。（營出中焦。靈樞決氣篇云。中焦取汁。變化而赤。是謂血。壅遏營氣。令無所避。是謂脉。壅遏。猶言擁遏。使入隧道。而無別道可避也。靈樞衛氣篇云。其精氣之行於經者。爲營氣。靈樞營衛生會篇云。中焦亦並胃中。出上焦之後。此所受氣者。泌糟粕。蒸津液。化其精微。上注于肺脉。乃化而爲血。以奉生身。莫貴于此。故獨得行于經隧。合諸篇論觀之。乃知血爲總名。而脉則指營氣流行不息之道耳。若與血二。實無有二。然非呼吸。不能流行。故曰氣息應焉。（仲景平脉篇云。呼吸者。脉之頭也。又靈樞動輸篇云。其行也。以息往來。）

經隧猶血管

[illegible]應水道理

法地合心第二

其象法地。血之府也。心之合也。皮之部也。

天陽地陰。氣陽血陰。人之脉。以血爲體。固當配地。然觀其上下周匝。出入臟腑。聯絡貫通。起伏交會。一如大氣之行于地中。故地有脉。而山川秀麗。人有脉而形體安全。象之脗合。莫有肖于此者。故曰

其象法地。能再因其象而取法焉。則吾醫之謂脈與堪輿之尋龍。無二義也。府者。藏也。聚也。隧道乃精專所注。故爲血之府。充徧人身。應夏大之氣。中焦變赤。得正南之色。故爲心之合。肺主皮毛而朝百脈。如部落然。故爲皮之部。（素問五藏生成篇云。心之合脈也。其榮色也。又六節藏象篇云。心者生之本。其充在[illegible]。肺者氣之本。其充在皮。又五藏生成篇云。諸血者皆屬于心。諸氣者皆屬于肺。又平人氣象論云。藏真高于肺。以行營衛陰陽。又經脈別論云。脈氣流經。經氣歸于肺。肺朝百脈。輸精于皮毛。毛脈合精。行氣于府。）

始生營衛第三

資始于腎。資生于胃。陽中之陰。本乎營衛。營者陰血。衛者陽氣。營行脈中。衛行脈外。

腎爲十二經脈之根。故曰資始。胃乃生化之源。故曰資生。腎之與胃。蓋有先後天之分焉。靈樞經脈篇云。人始生。先成精。精成而腦髓生。骨爲幹。脈爲營。筋爲剛。肉爲墻。皮膚堅而毛髮長。穀入于胃。脈道以通。血氣乃行。此卽資始資生之註脚也。所謂

氣血以水[illegible]之血猶水[illegible]氣猶水用[illegible]用不可分更[illegible]者甚言互[illegible]營衛用更妙[illegible]云陽在[illegible]陰之使陰[illegible]陽之守

陽中之陰者。蓋本乎營衛耳。營者。營運于中。衛者。護衛于外。營爲陰血。行脈之中。入隧道也。衛爲陽氣。行脈之外。不入隧道也。

氣動脈應第四

脈不自行。隨氣而至。氣動脈應。陰陽之誼。氣如橐籥。血如波瀾。血脈氣息。上下循環。

氣。陽也。血。陰也。陽主動。陰主靜。脈之行也。必氣爲之先。氣行則血行。氣動則脈動。陰陽相應而不相失。如交誼然。橐。囹橐也。無底之器。籥。管籥也。有孔之物。夫陽氣之自頂至踵也。雖固護于外。無間隔於中。其遊行出入。谿谷募膜。又各有竅穴。故如橐如籥。波。微浪也。湧疊而前。瀾。廻瀾也。旋渦而返。血之在氣中也。隨湧流行。亦復廻環灌溉。故如波如瀾。若合若分。互爲體用。周流上下。無始無終。此則循環之義矣。

寸口大會男女定位第五

十二經中。皆有動脉。惟手太陰寸口。取決。此經屬肺。上系吭嗌。脉之大會。息之出入。一呼一吸。四至爲息。日夜一萬三千五百。一呼一吸。脉行六寸。日夜八百十丈爲準。初持脉時。令仰其掌。掌後高骨。是謂關上。關前爲陽。關後爲陰。陽寸陰尺。先後推尋。心肝居左。肺脾居右。腎與命門。居兩尺部。魂魄穀神。皆見寸口。左主司官。右主司府。左大順男。右大順女。本命扶命。男左女右。關前一分。人命之主。左爲人迎。右爲氣口。

神門決、斷。兩在關後。人無二脉。病死不愈。男女脉同。唯尺則異。陽弱陰盛。反此病至。

十二經者。即手足三陰三陽之經脉也。其始從中焦。注手太陰肺。手太陰肺。注手陽明大腸。手陽明大腸。注足陽明胃。足陽明胃。注足太陰脾。足太陰脾。注手少陰心。手少陰心。注手太陽小腸。手太陽小腸。注足太陽膀胱。足太陽膀胱。注足少陰腎。足少陰腎。注手厥陰心包。手厥陰心包。注手少陽三焦。手少陽三焦。注足少陽膽。足少陽膽。注足厥陰肝。足厥陰肝。還復注手太陰。是謂一周。其脉數。十二經共長十六丈二尺。各有長短。亦逐經各有動脉。如手太陰脉。動中府。雲門。天府。俠白。手陽明脉。動合谷。陽谿。足陽明脉。動衝陽。大迎。人迎。氣衝。足太陰脉。動箕門。衝門。手少陰脉。動極泉。手太陽脉。動天窓。足太陽脉。動委中。足少陰脉。動太谿。陰谷。手厥陰脉。動勞宮。手少陽脉。動禾窌。足少陽脉。動下關。聽會。足厥陰脉。動太冲。五里。陰廉之類。既皆有動脉。是皆可即其脉以診病。今惟取手太陰寸口動脉。决諸病之死生吉凶者。何耶。蓋手太陰一經。内屬肺藏。其經起于中府。終于少商。其肺系。上連喉嚨吭嗌以通呼吸。肺主一身之氣。氣非呼吸不行。脉非肺氣不布。故仲景云。呼吸者。脉之頭也。又寅初方升之氣。出于中焦。中焦。指胃也。蓋胃爲水穀之海。屬土居中。灌溉四臟。以及百骸。所謂灌

[illegible]人身一[illegible]動一吸[illegible]伏行於[illegible]系其顯[illegible]而可以[illegible]侵之者[illegible]數處以[illegible]至不休[illegible]謂之動

四藏中有土人皆知之土中具有四藏人所不曉試觀升降出入不離乎中則弦鉤毛石不外乎土矣夫土便含萬藏舍胃故也

溉者，無非一水穀之氣。四臟中固有土，而土中亦具四臟。（即胃氣中要有弦鉤毛石，弦鉤毛石中要有胃氣）蓋脈之晝夜五十環周，始于此，亦終于此，始終循環，原無少間。但以一日夜分四時論之，必以寅初爲更始也。故素問脈要精微論云：診法常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，經脈未盛，絡脈調勻，氣血未亂，故乃可診有過之脈。蓋以此時諸脈更始于胃，其大小虛實躁靜疾徐種種畢露，出于胃，即注于肺，最爲

診脈舊術不始乎呼吸以平旦氣清病無不審

切近。又必由肺之呼吸以行，此所謂肺朝百脈也。呼出于陽，吸入于陰。一呼脈二至，一吸脈二至，總四至爲一息。一日一夜，約一萬三千五百息，即此一呼一吸，脈氣行去六寸。以一萬三千五百息算來，共得八百一十丈，以脈數之十六丈二尺折算，應得周行于身五十度，此晝夜脈行度數之準則也。（據越人二十三難云：脈數綠長十六丈二尺，任督二蹻在內，以一呼一吸行六寸算之，晝夜云萬三千五百息，共行八百一十丈，周于身者得五十度。後又云：其始從中焦注手太陰，終于足厥陰，

陰陽互交于寸分處關係非小

厥陰復還注手太陰，所謂如環無端者。不知二蹻任督從何處接入，豈附行於足少陰太陽耶？附則不能在循環注接之內，當俟知者。）凡初持人之脈，先令仰手，以腕之高骨對平處，謂之關上。關前爲陽，後爲陰。陽曰寸，陰曰尺。尺至寸長一寸九分，即此一寸九分，三部分之，爲寸關尺也。關居中，若爲陰陽界限，而陰陽實互交于此，能先後細爲推究，未有不得其病情者。三部中又各有定位，木火居左，金土居右，水居其下。若以相生論之，則左關肝木，生左寸心火，

左寄官主出右司府主納即天道左旋地道右轉義

左寸心火，生右關脾土；右關脾土，生右寸肺金；右寸肺金，生兩尺腎水。魂爲肝神，魄爲肺神，穀不可言脾神，然其變化資生，生死以之，更神乎神矣。穀神一魂魄也，魂魄一穀神也，而又總攝于心君，遊行出入，雖無處不到，而盛衰逆順，未有不從寸口驗焉。左肝心，爲木火，爲陽，主升，主生長，職多發施，故曰司官。右肺脾，爲金土，爲陰，主降，主收受，職多聚納，故曰司府。男子生于寅，以陽爲體，左，陽也。左

尚居閉神在來故曰得是以死

既有長…更

大。則氣鐘於陽。故在男爲順。女子生于申。以陰爲體。右。陰也。右大。則氣鐘于陰。故在女爲順。由是男女之本命。分係于左右。順則雖病。而本命猶可扶持。關前一分。人命之主者。指魂魄穀神也。左爲人迎。右爲氣口者。指司官司府也。決斷神門。關後有兩者。指兩腎也。卽應腎間動氣也。卽難經八難所謂三焦之原。守邪之神。故曰神門。關前穀神。關後神門。二脈卽生人之先後二天也。無二者。言無此

二脈也。無則根本絕矣。故死。（卽無一亦死）仲景云。寸脈下不至關爲陽絕。尺脈上不至關爲陰絕。殆亦關前關後之謂乎。男女脈同。同于定位。唯尺則異。異于盛衰。男子鍾于陽。故陰弱。女子鍾於陰。故陰盛。獨驗于尺者。天一資生之始。陰陽卽判于此耳。（尺乃生人之根本。如草木之色香華實。皆判定于根荄。）反此。則男得女盛。女得男弱。男女皆失其常。故當病至。

七診九候第六

脈有七診。曰浮中沈。上下左右。消息求尋。又有九候。舉按輕重。三部浮沈。各候五動。寸候胸上。關候膈下。尺候于臍。下至跟踝。左脈候左。右脈候右。病隨所在。不病者否。浮爲心肺。沈爲腎肝。脾胃中州。浮沈之間。心脈之浮。浮大而散。肺脈之浮。浮濇而短。肝脈之沈。沈而弦長。腎脈之沈。沈實而濡。脾胃屬土。脈宜和緩。命爲相火。左寸同斷。

與皮毛相得曰浮。按之至骨曰沈。中則在浮沈之

間。上下。卽寸與尺。此槩兩手六部而言也。左右。左手右手也。是謂七診。言能消息細求。錯綜審別。則上下表裏之病。無遁情矣。一說上下左右。卽脈要精微論所云尺內兩傍。則季脇也。尺外以候腎。尺裏以候腹中。附上。左外以候肝。內以候鬲。右外以候胃。內以候脾。上附上。右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候膻中。前以候前。後以候後。上竟上者。胸喉中事也。下竟下者。少腹腰股膝脛足

[illegible]參看應[illegible]參[illegible]盡

[illegible]効象形[illegible]四字包括[illegible]盡此仲景[illegible]真傳

[illegible]藏位次[illegible]沉以四[illegible]象見形[illegible]爲深得[illegible]脉用此脉法也

中事也。（竟盡也。上竟於魚際。下竟于尺末。）又素問三部九候論云獨小者病。獨大者病。獨疾者病。獨遲者病。獨熱者病。獨寒者病。獨陷下者病。亦謂之七診。但與本文七診之義不同。當參看。九候者。言脉分三部。三部中。各有浮中沉。是謂九候。九候之情形非舉按輕重不能得。其候以五動爲準。寸則候胷上至頭之疾。關候膈下至臍之疾。尺候臍下至足之疾。左脉候身之左。右脉候身之右。病隨脉之所在而見。不

病。則脉不應。與前七診。大同小異。（當參看）七診九候。總不外。仲景所謂効象形容四字而已。心肺居上。脉應浮。腎肝居下。脉應沉。脾胃居心肺腎肝之間。謂之中州。脉亦應在浮沉之間。心肺同一浮也。但浮大而散者。象夏火。故屬心。浮濇而短者。象秋金。故屬肺。肝腎同一沉也。但沉而弦長者。象春木。故屬肝。沉實而濡者。象冬水。故屬腎。脉和而緩。不虛微。不實強。不疾不遲。自有一種舒徐冲融氣象。土之性也。脾胃宜之。命門右腎。固含相火。然終不能離本位。故與左同斷。

[illegible]木火之起[illegible]盛衰形狀

秋脉之弦鈎[illegible]有真如指[illegible]更要看其[illegible]從伏藏出[illegible]自升後散[illegible]從散大收[illegible]因收降實[illegible]有一機[illegible]真相通

四時胃氣第七

春弦夏洪。（洪當作鈎）秋毛冬石。四季和緩。是謂平脉。太過實強。病生于外。不及虛微。病生于內。春得秋脉。死在金日。五藏准此。推之不失。四時百病。胃氣爲本。脉貴有神。不可不審。

天地之氣。東升屬木。位當寅卯。于時爲春。萬物始

生。其氣從伏藏中透出。如一縷之烟。一線之泉。在人。則肝應之而見弦脉。即素問玉機真藏論所謂。其氣來耎弱輕虛而滑。端直以長。素問平人氣象論所謂。耎弱招招。如揭長竿末稍者是也。氣轉而南。屬火。位當巳午。于時爲夏。萬物盛長。其氣從升後散。大于外。如騰涌之波。燎原之火。在人。則心應之而見鈎脉。即玉機真藏論所謂。其氣來盛去衰平人氣象論所謂。脉來累累如連珠。如循琅玕者

一第666冊　續修四庫全書　第34　版反內

[illegible]真藏迴[illegible]同學人[illegible]參也者

是也。氣轉而西屬金。位當申酉。于時爲秋。萬物收成。其氣從散大之極。自表初收。如浪靜波恬。烟清焰熄。在人。則肺應之而見毛脈。卽玉機真藏論所謂。其氣來輕虛以浮。來急去散。平人氣象論所謂脈來厭厭聶聶。如落楡莢者是也。氣轉而北。屬水。位當亥子。于時爲冬。萬物合藏。其氣從收降而歛實。如埋燼之火。溫潛之泉。在人。則腎應之而見石脈。卽玉機真藏論所謂。其氣來沉以搏。平人氣象

形容如畫一[illegible]摘成光景[illegible]然在目

[illegible]中州和[illegible]蓄則[illegible]所偏[illegible]有何

論所謂。脈來喘喘累累如鈎。按之而堅者是也。（玉機真藏作冬脈營。營者營聚于中。中必實。亦石之義。鈎而按之堅。乃有石義。不爾。是夏脈矣。）以上經論所云四時諸脈形狀。雖因時變易。其中總不可少和柔平緩景象。蓋和緩爲土。卽是胃氣。有胃氣而合時。便是平脈。玉機真藏論云。脾脈者土也。孤藏以灌四傍者也。今弦鈎毛石中。有此一種和緩。卽是灌漑四傍。卽是土矣。亦卽是脾脈矣。以其寓于四脈中。故又曰善者不可得見。平人氣象論

[illegible]偏則不[illegible]所見矣

云。長夏屬脾。其脈和柔相離。如雞踐地。察此脈象。亦不過形容其和緩耳。辰戌丑未四季之月。各月土旺一十八日。卽是灌漑四傍之義。故分而爲四。有土而不見土也。若論五行。則析而爲五。土居其中。是屬長夏。況長夏居金火之間。爲相生之遞脈。較他季月不同。故獨得見主時之脈。二說雖殊。其義不悖。當參看所謂太過不及者。言弦鈎毛石之脈。與時相應。俱宜和緩而適中。欲其微似不欲其

[illegible]微似不欲[illegible]顯欲微見[illegible]欲不見四[illegible]摘出和[illegible]適中之神

太顯。欲其微見。不欲其不見。今卽以一弦脈論之。若過于微弦而太弦。是謂太過。太過則氣實強。氣實強。則氣鼓于外。而病生于外。若不及于微弦而不弦。是謂不及。不及則氣虛微。氣虛微則氣餒于內。而病生于內。其鈎毛石之太過不及。病亦猶是。今不但不見春弦之太過不及。而反見毛浮之秋脈。當升而反降。當生而反殺。氣機大逆。神轉不回。是謂尅賊。未有不[illegible]而死者。春木既爲金尅。金且

病證不治得穀者尚可過期可見穀之于人大矣哉

邪旺。正何以堪。故死于此。五藏皆以此理推之。自無差失。四時有四時之脉。四時有四時之病。但土灌四傍。雖病變百出。必以之為本。况胃氣乃水穀之精。諸脉有神。水穀之力也。不聞得穀者昌乎。誠不可不審。

平和遲數第八

調停自氣。呼吸定息。四至五至。平和之則。三至為遲。遲則為冷。六至為數。數即熱證。轉遲轉冷。轉數轉熱。

遲數既明。浮沉當別。

醫至病家。宜默坐片時。先調停自氣。令呼吸均勻。方診其脉。（平人氣象論云。常以不病人調病人。醫不病。故為病人平息以調之。）大約以我呼吸一息。得彼脉四至五至為準則。（呼吸間以太息故在四至五至之間。）此為平和之脉。斷為無病。雖病亦極微淺。以脉不為病變故也。（病邪微。不能變易其脉。）若一息三至。不及四五。是名遲脉。遲則氣寒。而行慢。故病主冷。若一息六至。過于四五。是名數脉。數則氣熱而行

外感之邪屬[illegible]偏于[illegible]為外[illegible]也

快。故病主熱。轉遲則更遲。在三至已下。而冷者愈冷矣。轉數。則更數。在六至已上。而熱者愈熱矣。此遲數脉病之相應也。遲數既明。寒熱乃定。欲知寒熱之所屬。又當別乎浮沉耳。

內外因第九

浮沉遲數。辨內外因。外因于天。內因于人。天有陰陽風雨晦明。人喜怒憂思悲恐驚。外因之浮。則為表證。沉裏遲陰。數則陽盛。內因之浮。虛風所為。沉氣遲冷。

數熱何疑。浮數表熱。沉數裏熱。浮遲表虛。沉遲冷結。表裏陰陽。風氣冷熱。辨內外因。脉證參別。脉理浩繁。總括于四。既得提綱。引申觸類。

在表則浮。在裏則沉。遲則為寒。數則為熱。固一定不易之理。而因則有二焉。此內外之不可不辨也。外感六淫。因之于天。內傷七情。因之于人。六淫者。天之陰陽風雨晦明也。即左傳醫和所云。陰淫寒疾。陽淫熱疾。風淫末疾。雨淫腹疾。晦淫惑疾

（[illegible]症狀。分[illegible]詳。千古[illegible]但要知[illegible]由陽不[illegible]淫陰不[illegible]動搖。從[illegible]水。濕從[illegible]勞。至癖淫[illegible]內鬱。明淫[illegible]飲。此皆[illegible]淫為病之[illegible]由此而推。）

心疾也。淫者。淫泆偏勝。久而不復之謂。故陰淫則過于清冷。而陽氣不治。寒疾從起。如上下厥逆。中外寒慄之類。陽淫則過于炎熱。而陰氣不治。熱疾從起。如[illegible]譫煩渴。血泄浸淫之類。風淫則過于動搖而疾生標末。如肢廢毛落。瘈搐痓瘲之類。雨淫則過於水濕而疾生腸腹。如腹滿腫脹腸鳴濡瀉之類。晦淫則過于昏暗。陽光內鬱而成惑疾。如百合狐惑。熱中臟躁之類。明淫則過于彰露。陽光外

（[illegible]、雖變症[illegible]出。自有統[illegible]矣。）

（[illegible]情之傷。屬[illegible]心之感。却[illegible]病。為內[illegible]因也。）

散而成心疾。如恍惚動悸。錯妄失神之類。七情者。人之喜怒憂思悲恐驚也。即所謂七氣。而巢氏病源論。以勞氣易驚氣。又增寒熱二氣。廣為九氣。若配四時五臟。則又止言五氣。如素問陰陽應象大論云。天有四時五行。以生長收藏。以生寒暑燥濕風。人有五藏。化五氣。以生喜怒悲憂恐。是已。據巢氏言九氣之狀。謂怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收聚。熱則腠理開而氣泄。憂則

（[illegible]子病者[illegible]血為治[illegible]生于情[illegible]神志為[illegible]如此辨[illegible]吉所[illegible]）

氣亂。勞則氣耗。思則氣結。怒氣上者。怒則氣逆。甚則嘔血。及食。故氣上矣。喜氣緩者。喜則氣和。營衛通利。故氣緩矣。悲氣消者。悲則心系急。肺布葉舉。使上焦不通。榮衛不散。熱氣在內。故氣消矣。恐氣下者。恐則精却。精却則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣下矣。寒氣收聚者。寒則經絡凝滯。故氣收聚矣。熱氣泄者。熱則腠理開竅。榮衛通。故汗出而氣泄矣。憂氣亂者。憂則心無所寄。神無所歸。慮

無所定。故氣亂矣。勞氣耗者。勞則喘且汗。內動外泄。故氣耗矣。思氣結者。思則身心有所止。氣留不行。故氣結矣。是謂九氣。而七氣即在其中。雖皆內因而為病。則有二種。一種因感觸情境。氣久不散着而為病者。病生于情也。一種因五行之盛衰。五藏之虛實。互相勝復。病中見情者。情生于病也。病生于情者。如素問陰陽應象大論云。喜怒傷氣。寒暑傷形。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣上行。滿脉去形

[illegible]仲景所[illegible]經絡受邪入藏府爲內所因

喜怒不節寒暑過度。生乃不固。又曰。東方生風。在聲爲呼。在變動爲握。在志爲怒。怒傷肝。悲勝怒。南方生熱。在聲爲笑。在變動爲憂。在志爲喜。喜傷心。恐勝喜。中央生濕。在聲爲歌。在變動爲噦。在志爲思。思傷脾。怒勝思。西方生燥。在聲爲哭。在變動爲欬。在志爲憂。憂傷肺。喜勝憂。北方生寒。在聲爲呻。在變動爲慄。在志爲恐。恐傷腎。思勝恐。又靈樞口問篇云。夫百病之始生也。皆生于風雨寒暑。陰陽喜怒。飲食居處。大驚卒恐。則血氣分離。陰陽破散。經絡厥絶。脈道不通。陰陽相逆。衛氣稽留。經脈虛空。血氣不次。乃失其常。又素問玉機眞藏論云。憂恐悲喜怒。令不得以其次。故令人有大病矣。因而喜大虛。則腎氣乘矣。怒則肝氣乘矣。悲則肺氣乘矣。恐則脾氣乘矣。憂則心氣乘矣。又靈樞本神篇云。怵惕思慮者。則傷神。神傷則恐懼流淫而不止。悲哀動中者。竭絶而失生。喜樂者。神憚散而不藏。

愁憂者。氣閉塞而不行。盛怒者。迷惑而不治。恐懼者。神蕩憚而不收。心。怵惕思慮則傷神。神傷則恐懼自失。破䐃脫肉。脾。憂愁而不解。則傷意。意傷則悗亂。四肢不舉。肝。悲哀動中則傷魂。魂傷則狂忘不精。當人陰縮而筋攣。兩脇骨不舉。肺。喜樂無極則傷魄。魄傷則狂。皮革焦。腎。盛怒而不止。則傷志。志傷則喜忘其前言。腰脊不可以俛仰屈伸。恐懼而不解。則傷精。精傷則骨痠痿厥。精時自下。又素問調經論云。喜怒不節。則陰氣上逆。上逆則下虛。下虛。則陽氣走之。故曰實矣。喜則氣下。悲則氣消。消則脈虛空。因寒飲食。寒氣熏滿。則血泣氣去。故曰虛矣。又素問痿論岐伯曰。悲哀太甚。則胞絡絶。胞絡絶。則陽氣內動。發則心下崩。數溲血也。又曰。思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。又素問遺篇云。人憂愁思慮卽傷心。恚怒氣逆。上而不下卽傷肝。又靈樞邪

氣藏府病形篇云愁憂恐懼則傷心又靈樞口問篇云口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五藏六府皆搖搖則宗脉感宗脉感則液道開液道開故涕泣出焉又壽夭剛柔篇云憂恐忿怒傷氣氣傷藏乃病藏又素問血氣形志篇云形樂志苦病生于脉形樂志樂病生于肉形苦志苦病生于咽嗌形數驚恐經絡不通病生于不仁又素問疏五過論云嘗貴後賤雖不中邪病從內生

名曰脫營嘗富後貧名曰失精五氣流連病有所并又云暴樂暴苦始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮暴怒傷陰暴喜傷陽厥逆上行滿脉去形愚醫治之不知補瀉不知病情精華日脫邪氣乃并又曰故貴脫勢雖不中邪精神內傷身必敗亡始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿躄爲攣又素問生氣通天論云陽氣者大怒則形氣絕而血菀于上使人薄厥又通評虛實論云隔則閉絕上下

不通則暴怒之病也又靈樞刺節眞邪篇曰飲食不節喜怒不時津液內溢乃下留于睾又素問經脉別論曰有所墮恐喘出于肝淫氣害脾有所驚恐喘出于肺淫氣傷心驚而奪精汗出于心疾走恐懼汗出于肝此皆病生于情也情生于病者如素問金匱眞言論曰東方色青入通於肝開竅于目藏精于肝其病發驚駭又素問調經論曰血并于陰氣并于陽故爲驚狂又曰血并于上氣并于

下心煩惋善怒血并于下氣并于上亂而喜忘又宣明五氣篇曰胃爲氣逆爲噦爲恐又云膽爲怒又云精氣并于心則喜并于肺則悲并于肝則憂并于脾則畏并于腎則恐又云陽入之陰則靜陰出之陽則怒又素問調經論曰神有餘則笑不休神不足則悲又曰血有餘則怒不足則恐又靈樞行鍼篇曰多陽者多喜多陰者多怒又素問解精微論曰水之精爲志火之精爲神水火相感神志

俱悲。是以目之水生也。故諺言曰。心悲名曰志悲。又靈樞本神篇曰。肝藏血。血舍魂。肝氣虛則恐。實則怒。又云。心藏脈。脈舍神。心氣虛則悲。實則笑不休。又玉機真藏論曰。春脈太過。則令人善怒。又素問脈解篇云。陽明所謂甚則厥。惡人與火。聞木音。則惕然而驚者。陽氣與陰氣相薄。水火相惡。故惕然而驚也。又曰。少陰所謂恐如人將捕之者。秋氣萬物未有畢去。陰氣少。陽氣入。陰陽相薄。故恐也。

又曰。肝氣當治而未得。故善怒。善怒者。名曰煎厥。又靈樞根結篇曰。厥陰爲闔。闔折。即氣絕而喜悲。又素問謬刺篇曰。邪客于足少陰之絡。令人無故善怒。氣上走賁上。又素問生氣通天論曰。俞氣化薄。傳爲善畏。及爲驚駭。又靈樞五變篇曰。此人薄皮膚而目堅固以深者。長衝直揚。其心剛。剛則多怒。怒則氣上逆。胸中蓄積。血氣逆留。臗皮充肌。血脈不行。轉而爲熱。熱則消肌膚。故爲消癉。此言其

[illegible]病果由乃[illegible]字和議標[illegible]本之法明[illegible]人辨

[illegible]病不雜表[illegible]熱證得[illegible]其執便[illegible]求內

人暴剛而肌肉弱者也。又素問痺論曰。心痺者。脈不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。嗌乾善噫。厥氣上則恐。又曰。肝痺。夜臥則驚。此皆情生于病也。故病生于情者。治其情。如喜勝悲。悲勝怒之類。情生于病者。治其病。如平肝怒解。溫膽悸寧之類。外因之邪。自表而入。當其在表。正氣應之。其脈必浮。若見沉脈。邪已去表而入裏矣。若脈不及四至。名曰遲。遲則邪在陰分。主冷。過于四至。名曰數。數則邪在

陽分。主熱。內因之邪。自內而生。如暴喜。卒驚。暴怒。陽氣浮越。脈應之而浮。其中必虛。如今之暴怒厥仆。卒驚暈倒。大喜傴痛。如中風狀。而非外來之風。此即所謂虛風也。若憂思悲恐。久積沉鬱。脈應之而沉。以無虛浮風象。故直指曰氣耳。遲則爲冷。若脈遲。不論因于何氣。皆主冷也。數則爲熱。若脈數。不論因于何氣。皆主熱也。數皆主熱。若浮而得之。不論何因。其熱在表。沉而得之。其熱在裏。遲既主

[illegible]綱析目乃[illegible]有精此[illegible]家法也

冷。若浮而得之。不論何因。其冷在表而虛。沉而得之。其冷在裏而結。外因之表裏陰陽。內因之風氣冷熱。非參以脈。則不能分別。然而脈理浩繁。能提括其綱。自可條析其目。但以浮沉遲數四者而綱領焉。則引彼可以證此。由此可以例彼。而診家之精義思過半矣。

浮脈第十

浮脈法天。輕手可得。汎汎在上。如水漂木。有力洪大

來盛去悠。無力虛大。遲而且柔。虛甚則散。渙漫不收。有邊無中。其名曰芤。浮小爲濡。綿浮水面。（綿一作帛）濡甚則微。不任尋按。

浮脈法天言[illegible]上也自肌[illegible]發分而上[illegible]皮毛血脈[illegible]也

天覆於上。陽也。浮脈似之。故曰法天。其脈應于皮毛。輕手可得。按之且有。汎汎欲上之勢。如水中漂木。雖按之使沉。亦必隨手而起。脈經所謂舉之有餘。按之不足者是也。若浮脈中加以洪大。來盛去悠。是爲有力之浮脈。謂之浮大之脈亦可。若浮脈

[illegible]沉欲上如[illegible]中漂木曲

[illegible]脈形狀[illegible]表不准[illegible]脈

中加以虛大。遲而且柔。是爲無力之浮脈。謂之虛大之脈亦可。若浮而虛大之甚。則渙散彌漫。不斂不實。名曰散脈。脈經所謂氣實血虛。有表無裏者是也。若四邊有而中則無。名曰芤脈。芤者。中空之艸。其狀如葱。脈經所謂浮大而軟。按之中央空。兩邊實者是也。若浮而小。名曰濡脈。如帛浮于水。按之軟薄。全無力也。若浮濡之甚。則極虛極小。名曰微脈。不勝重爲尋按。脈經所謂若有若無。或欲絕

者是也。

沉脈第十一

沉脈法地。近于筋骨。深深在下。沉極爲伏。有力爲牢。實大弦長。牢甚則實。愊愊而強。無力爲弱。柔小如綿。弱甚則細。如蛛絲然。

地載于下。陰也。沉脈似之。故曰法地。其脈近在筋骨。非重按不可得。覺有深深下沉之勢。脈經所謂舉之不足。按之有餘者是也。若沉之極。似附着于

[illegible]

筋骨。名曰伏脈。脈經所謂極重按之。乃得者是也。若沉而有力。實大弦長。弦則强急。且大且實。堅牢之義。自可想見。脈經有革脈而無牢脈。要知牢卽革也。革脈形如按鼓。亦卽强急堅牢之義。皆有餘於外者。若牢之甚。則內外皆實。愊愊而强。如有根蒂也。沉而無力。旣小且柔。是名爲弱。脈經所謂極軟而沉細。按之欲絕指下者是也。弱之甚。則更柔更小。若有若無。縈縈如蜘蛛之絲。名曰細。與微脈固不相遠也。

遲脈第十二

遲脈屬陰。一息三至。小駃于遲。緩不及四。二損一敗。病不可治。兩息奪精。脈已無氣。浮大虛散。或見芤革。浮小濡微。沉小細弱。遲細爲澁。往來極難。易散一止。止而復還。結則來緩。止而復來。代則來緩。止不能回。

一呼一吸爲一息。脈應四至。爲其常也。遲則一息三至。氣不振發。行不如度。故曰屬陰。緩則小駃于遲。猶未能及于四至。若一息二至。元氣已損。二息一至。元氣已敗。病則必不可治。兩息一至。真精奪去。雖一見脈。正氣已無。不過燼燈之餘焰耳。遲而浮大。或爲虛散。或爲芤革。遲而浮小。不爲濡則爲微。遲而沉小。不爲細則爲弱。遲而細。則力不足于往來。名曰澁。往來艱滯。則易于散。而或有一止。（不足之止）然非絕藏之脈。故止而復還也。結則緩中時或一止。止而復來。蓋氣有結滯。脈爲阻礙。暫一止而復來。（阻塞之止）與澁之易散一止者。不相懸也。代則緩中一止。止不能回。（脫根之止）脈經所云。不能自還。因而復動。正如替代之代。有出無入。有去無來之象。

數脈第十三

數脈屬陽。六至一息。七疾八極。九至爲脫。浮大者洪。沉大牢實。往來流利。是謂之滑。有力爲緊。彈如轉索。數見寸口。有止爲促。數見關中。動脈可候。厥厥動搖。狀如小豆。

[illegible]

脉以四至爲平。問以太息。太約不出五至。若一息六至。是爲數脉。氣行速疾。踰于常度。故曰屬陽。一息七至。氣更速快。故曰疾。一息八至。陽熱已極。一息九至。則元神散脫。而與遲之奪精者。同無異也。數而浮大。其名曰洪。數而沉大。不爲牢。即爲實。數而往來流利。是名曰滑。即脉經所云展轉替替然與數相似者。數而有力。是名曰緊。緊原以形狀言。不以至數言。但緊脉斂實似弦。弦則直急如弦。緊則脉經所云如轉索。如切繩。內有攪動彈搏之勢似乎數也。若數中時見一止。（失倫之止）名曰促脉。脉流數疾。勢如奔逸。偶不相繼。故一止耳。仲景云。陽盛則促。故當于寸口見焉。若數脉見于關上。名曰動脉。蓋關爲陰陽交互之處。陰陽不和。兩相抗激。勢不相下。故迸于上而厥厥動搖也。然上下無頭尾。止在一分之關上。非圓實之小豆。不足以形容其狀也。

[illegible]

長脉第十四

長則氣治。過于本位。長而端直。弦脉應指。

脉位有三。寸關尺也。長則透出本位。唯其透出。乃見長象。非氣之充暢。不能有此。故曰治。若長而端直。應于指下。是爲弦脉。即素問玉機真藏論曰。其氣來耎弱輕虛而滑。端直以長者是也。

短脉第十五

短則氣病。不能滿部。不見于關。唯尺寸候。一脉一形。各有主病。數脉相兼。則見諸證。

脉短。則氣不充暢。無論在寸在尺。俱不能滿足本部。唯其不能滿部。乃見短象。氣不足。非病而何。然此唯尺寸見之。設若在關而不滿本部。則與尺寸不相接矣。理無是脉。蓋脉類多矣。有一脉。自有一脉之形。形有不同。故病亦各異。若脉數形兼見。而病亦數種兼成。仲景所謂。此自經常。不失銖分者也。如下文云云。

[illegible]設浮脉[illegible]脉狀此[illegible]以浮脉[illegible]而以諸

[illegible]自得[illegible]脉之要後[illegible]及遲數[illegible]此

[illegible]以[illegible]遲[illegible]不[illegible]大集[illegible]先不[illegible]故曰

醫燈續焰卷二

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖翼評
門人　汪之漪奇玉
　　　支希璋玉森　校

浮脉主病第十六

浮脉主表。裏必不足。有力風熱。無力血弱。浮遲風虛。浮數風熱。浮緊風寒。浮緩風濕。浮虛傷暑。浮芤失血。浮洪虛火。浮微勞極。浮濡陰虛。浮散虛極。浮弦痰飲。浮滑痰熱。

皮毛曰表。言在外也。浮脉與皮毛相得。亦有勢汎汎外浮者。皆主表。氣應於表。其裏必虛。故裏不足。浮亦主風。浮而有力。風熱所爲。蓋風爲陽邪。其性輕浮動蕩。加之以熱。勢必壅盛。故有力也。（宜荊防羌壳。芩梔石羔之類。）無力。則浮而虛矣。血主裏。氣主表。血弱不能諧氣。故反浮。亦裏不足之義。（宜參耆四物湯之類。）脉浮而遲。乃鼓動之不及也。爲風虛。（宜四君子湯。或防桂參耆之類。）脉浮而數。乃鼓動之太過也。爲風熱。（宜荊防膏薄。梔芩丹皮生地之類。）脉浮而緊。緊則緊斂。寒之性也。風中有寒。（宜九味羌活湯。麻黃湯。或蘇葛羌杏姜葱之類。）脉浮而緩。緩則緩漫。濕之性也。風中有濕。（宜羌防蒼白朮。防已黃耆桂附之類。）浮虛傷暑者。暑傷乎氣。氣主浮外。而暑性張散。故傷暑者多汗。經曰。脉虛身熱。得之傷暑者是也。（宜清暑益氣湯。十味香薷飲之類。）浮芤失血者。血去脉空耳。蓋衛行脉外。榮行脉中。血失則榮損。榮損則脉中空如芤草之狀也。（宜參耆歸芍。或當歸補血湯。瓊玉膏之類。）脉浮而洪。充溢指下。火之象也。但浮則有表無裏。故曰虛火。（宜當歸補血湯。四物湯。六味丸。八味丸之類。）浮微勞極。陽氣欲絕也。素問生氣通天論曰。陽氣者。煩勞則張精絕。辟積於夏。使人煎厥。目盲不可以視。耳閉不可以聽。潰潰乎若壞都。汩汩乎不可止。蓋言陽氣清淨。煩勞則陽精張散而竭絕。積于夏長之時。當振發而反退隱。故變病如上。是名煎厥。煎厥

[illegible]甚

[illegible]數遲[illegible]勢緩[illegible]心會

[illegible]邪故[illegible]情

[illegible]宜布插
[illegible]盡人
[illegible]將運用
[illegible]三

者。氣應振而反糜。應出而反入。如煎迫之自外及裏。煎熬之由多漸火。卽難經十四難所謂自皮毛以及于骨之五損。從上下者是也。今之五勞六極。虛怯損瘵。皆煎厥之類。陽主浮。以其因于耗陽。故脉浮微耳。（宜十全大補湯。生脉散。大造丸。四君子湯。八珍湯之類。）脉浮而濡。衰薄之甚。僅有其上。若無其下。故主陰虛。（宜四物湯。六味丸之類。）若浮而散。則又陰虛之極矣。陽在外。陰之使。陰在內。陽之守。陰虛極而不能為守。則陽無所依。

浮越而散。略無陰凝內斂之象。故陰虛劇。然而孤精於內。氣耗於外。謂之陰陽兩虛亦可。（宜十全大補湯。金匱腎氣丸之類。）脉浮弦者痰飲。痰飲何自而生乎。素問經脉別論曰。飲食入胃。遊溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。又榮衞生會篇曰。上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。二說雖殊。其理則一。方飲之由胃遊溢而上。輸于脾也。腐熟如酒醪之噴發。炊釜之沸騰。卽中

[illegible]布之力
[illegible]則為飲
[illegible]為痰臨
[illegible]而見症
[illegible]變飲為
[illegible]隋𦙶及
[illegible]海開發
[illegible]其[illegible]亦
[illegible]之所謂
[illegible]若能達
[illegible]變[illegible]可
[illegible]者不了
[illegible]雜下手

焦之如漚。由脾散精而上歸于肺也。拔粹升純。氣氳若霧。卽上焦之如霧。由肺之通調而下輸膀胱也。氣化開通。溲便注泄。卽下焦之如瀆。名雖有三。實則一氣。若氣虛寒不運。則飲亦停留不行。隨不運之處停留。則隨停留之處見病矣。大約暴則為飲。久則成痰。清薄則為飲。濁厚則成痰。寒多則為飲。熱多則成痰。熬汁收膏。煑水結鹽之義也。弦乃陰脉。為陽不足。仲景云。弦為陽運。正言陽之不能

運也。又云。沉潛水畜。支飲急弦。俱言陽氣衰弱。不能運行其飲。故見此弦。斂不鼓之脉耳。（宜金匱苓桂术甘湯。小青龍湯之類。）水飲應沉而言浮者。當在上焦。若浮而滑。則非弦斂不鼓之脉。寒當化熱。飲當成痰。此必然之理也。（宜二陳湯。或梔芩花粉玄明粉之類。）

附方

參耆四物湯　治血虛。氣不能與之諧。反上氣喘促。自汗惡寒。面白脉浮。按之空澁。或曾經失血

[illegible]白朮強[illegible]茯苓[illegible]濕燥脾甘草守氣于中[illegible]人參益氣于五臟皆[illegible]脾胃者以人身真氣即水穀之氣也四藥沖和平澹而能補氣雖四誠君子哉

[illegible]旨雖是[illegible]汗劑然亦平正可用

者。

人參（一錢）　黃耆（蜜炙二錢）　當歸（二錢）

熟地黃（二錢）　白芍藥（酒炒一錢半）　芎藭（八分）

右爲粗末水二盞煎七分溫服

四君子湯　治眞氣虛弱。及短氣脈弱。加陳皮名異功散。加陳皮半夏。名六君子湯。

白朮　人參　茯苓

甘草（各等分）

右爲粗末。每服五錢。水一盞。煎至七分。食遠溫服。

九味羌活湯

羌活　防風　蒼朮（各一錢二分半）

甘草　白芷　川芎

生地黃　黃芩（各一錢）　細辛（四分）

加生薑三片。大棗一枚。水二盞。煎八分。熱服取汗。陶節菴云。春夏秋感冒。頭疼發熱惡寒無汗脈浮緊。見太陽表證。宜服此。平正方也。其加減法。在人自變通耳。

仲景麻黃湯　治傷寒太陽脈浮。頭項强痛。腰脊疼。發熱惡寒。身體痛。無汗而喘者。

麻黃（一兩半）　桂枝（一兩）　甘草（五錢）

杏仁（去皮尖五十粒）

爲粗末。每服五錢。水二盞。煎初沸。去上沫。再煎至七分。溫服取汗。汗出不必服盡劑。

清暑益氣湯

黃耆（一錢半汗少減五分）　蒼朮（一錢半）　升麻（一錢）

人參（去蘆）　白朮　陳皮

神麯　澤瀉（各五分）　甘草（炙）

黃蘗（酒浸）　葛根　青皮（去瓤）

當歸身　麥門冬（去心各三分）　五味子（九粒）

水二大盞。煎至一盞。去滓。食遠稍熱服。劑之多少臨時斟酌。　此東垣所製。以治長夏土令濕

勝非獨暑也其論云暑濕蒸爍人感之則四肢困倦精神短少胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩小便黃數大便溏頻或痢如黃糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗或汗少血先病而氣不病也其脉洪緩若血氣相搏必更加遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外而爲固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃耆甘溫補之爲君人參橘皮當歸甘草甘微溫補中益氣爲臣蒼术白术澤瀉滲利而除濕升麻葛根甘苦平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒麴甘辛青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃蘗苦辛寒借甘味瀉熱補水虛者滋其化源以人參五味子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷於庚金爲佐名曰清暑益氣湯

百一十味香薷飲　消暑氣。和脾胃。

香薷（一兩）　人參（去蘆）　陳皮（湯泡去白）

白术　白茯苓　白扁豆（炒去殼）

黃耆（去蘆）　乾木瓜　厚朴（薑汁製炒黑色）

炙甘草（各半兩）

右爲細末。每服二錢。不拘時。熱湯或冷水調下。

當歸補血湯　治氣血俱虛。肌熱惡寒。面目赤色煩渴引飲。脉洪大而虛。重按似無。此脉虛血虛也。此病多有得于饑飽勞役者。

黃耆（一兩炙）　當歸（二錢酒洗）

右㕮咀作一服。水三盞。煎至一盞。去滓溫服食前。

瓊玉膏　治吐血欬嗽。

生地（新鮮者取汁四斤）　白茯苓（十三兩）　人參（六兩）

以參苓爲極細末。以地黃汁和蜜拌入。用瓶貯。紙箬包其口。用桑柴火重湯煮三晝夜。取出水

浸二日。白湯點服。

六味丸　一名地黃丸。治腎經不足。發熱作渴。小便淋閉。氣壅痰嗽。頭目眩暈。眼花耳聾。咽燥舌痛。齒牙不固。腰腿委軟。自汗盜汗。便血。諸血失音。水泛爲痰。血虛發熱等證。其功不能盡述。

熟地黃（八兩酒蒸杵膏）　山茱萸肉　乾山藥（各四兩）

牡丹皮（去骨）　白茯苓（去皮）　澤瀉（去毛各三兩）

右各另爲末。和地黃膏加煉蜜。丸桐子大。每服

七八十丸。空心滾湯下。

八味丸　治命門火衰。不能生土。以致脾胃虛弱。飲食少思。大便不實。臍腹疼痛。夜多漩溺等證。

即六味丸加。肉桂　附子（各一兩）。

十全大補湯　治氣血俱虛發熱惡寒。自汗盜汗。肢體倦怠。或頭痛眩暈。口乾作渴。喉痛舌裂。及久病虛損。口乾食少。欬而下利。驚悸發熱。或寒熱往來。晡熱內熱。遺精白濁。二便見血。小腹作痛。小便短少。大便乾澁。或大便滑泄。肛門下墜。小便頻數。陰莖痒痛。或臍腹陰冷。便溺遺瀝。或心神不寧。寤而不寐。或形容不充。肢體作痛。或鼻吸氣冷。急趨氣促等證。皆是無根虛火。但服此藥。諸病悉除。凡元氣素弱。起居失宜。飲食勞倦。用心太甚。以此爲主。

肉桂　甘草　芍藥

黃耆　當歸　川芎

人參　白朮　茯苓

熟地黃（各等分）

右水煎服

生脉散　治熱傷元氣。肢體倦怠。氣短懶言。口乾作渴。汗出不止。或濕熱大行。金爲火制。絕寒水生化之源。致肢體痿軟。脚欹眼黑。最宜服之。

人參（五錢）　五味子　麥門冬（各三錢）

右水煎服

[illegible]熟地質[illegible]泉[illegible]澤瀉湯[illegible]上。茯苓[illegible]乎下行[illegible]用丹皮瀉[illegible]火而水不[illegible]茱萸[illegible]精[illegible]而水自固。[illegible]山藥者又[illegible]土以防制[illegible]泛濫也。[illegible]皆白[illegible]滋[illegible]化源內。

[illegible]地宜九蒸[illegible]多蒸不[illegible]曬氣溫。[illegible]陽生之[illegible]人以水[illegible]絕不見[illegible]與萬劑。[illegible]生地何與。[illegible]氣血不[illegible]兩補之。[illegible]以四君[illegible]氣。以四[illegible]血參氣[illegible]水穀之[illegible]也。若[illegible][illegible]積脾

胃。[illegible]頤命門。若[illegible]門火衰則[illegible]焦釀醸之[illegible]亦濟氣血又何自而生乎。所以加肉[illegible]者釜底添[illegible]薪耳。釜底[illegible]薪而釜無[illegible]者。則上中[illegible]加涯者。[illegible]屬虛散。[illegible]實際。況又[illegible]有自汗盜汗外泄之證耶。

此黃耆補益[illegible]上之品。斷[illegible]斷不可少者也。

[illegible]曰。此方[illegible]五味子。[illegible]味子入[illegible]能[illegible]氣。今無[illegible]而成脉

[illegible]右。以人
[illegible]人。自有育
[illegible]況根氣所
[illegible]必達元臟
[illegible]沒湯蒸。應
[illegible]有性。令人
[illegible]消者火焙者
[illegible]細也。

大造丸　治諸虛百損、精血兩虧。形體尫羸。筋骨痿弱。或七情傷感、以致成勞。或外感失調。久成虛乏。凡一切不足之疾。服此漸復真元。功難盡述。

紫河車（一具。用米泔水浸。輕輕擺開。換洗令淨白爲度。勿動筋膜。用竹器盛于長流水中浸一刻。取生氣。提回以瓦罐隔湯煮極爛如糊。取出先傾汁入藥內。用石臼木椎。搗極均細爲度。入後藥。）　乾地黃（一兩五錢）　熟地黃（二兩）

麥門冬（去心）　天門冬（去心各一兩半）　當歸（一兩）

枸杞子（七錢）　五味子　牛膝（各七錢）

杜仲（一兩半）　小茴香　黃檗

白术（各二兩）　陳皮（二錢）　乾薑（二錢）

側柏葉（採向東枝隔紙焙二兩）

如氣虛。加人參黃耆各一兩。血虛。倍當歸地黃。腎虛。加覆盆子（炒）巴戟（去心）山茱萸肉各一兩。腰痛。加白术（鹽水炒）草薢瑣陽（酥炙）續斷（酒洗）各一兩。骨蒸。加地骨皮。知母丹皮。各一兩。如婦人。去黃檗加川芎。香附。條芩（俱酒炒）一兩共末同河車爲丸如桐子大。每服三錢。清晨白湯下。

八珍湯　治肝脾傷損。氣血虛弱。惡寒發熱。煩躁作渴。或不時寒熱。眩暈昏憒。或大便不實。小便淋赤。或飲食少思。小腹脹痛等證。

人參　白术　白茯苓（各三錢）

甘草（炙）　芍藥（各一錢）　當歸

熟地黃（各三錢）　川芎（一錢五分）

右水煎服。

仲景苓桂术甘湯　傷寒論云。治傷寒吐下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脉沉緊。發汗則動經。身爲振振搖者。服此湯。又治停痰寒飲。中虛冷渴等證。

茯苓（四兩）　桂枝（三兩去皮）　白术

甘草（各二兩炙）

右水六升。煮取三升。去滓。分溫三服。

若賢曰。此治水寒射肺而欬者。稱曰龍以行水。而潛行于胸脇。故曰小。不似大龍之出汗作霖雨也。

仲景小青龍湯　傷寒論云。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或渴。或利。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。服此湯。又治停飲。久欬肺寒。

麻黃（去節）　芍藥　細辛

乾薑　甘草（炙）　桂枝（去皮各三兩）

五味子（半升）　半夏（半升洗）

右以水一斗。先煑麻黃減二升。去上沫。內諸藥煑取三升。去滓溫服一升。若渴。去半夏。加括蔞

楫曰。痰由飲結。脾胃之運布之力也。甘草助脾胃治本。陳皮宜散氣於上。茯苓滲水飲于下。半夏轉樞機

根三兩。若微利。去麻黃。加蕘花如雞子大。熬令赤色。若噎者。去麻黃。加附子一枚。炮。若小便不利。少腹滿者。去麻黃。加茯苓四兩。若喘者。去麻黃。加杏仁半升。去皮尖。

二陳湯　治脾胃虛弱。中脘停痰。或嘔吐惡心。或頭目不清。飲食少思等證。乃諸痰主藥。

陳皮（一錢五分）　半夏（二錢五分）　白茯苓（去皮二錢）

甘草（八分）

于中。痰散飲行。而諸證自除矣

加薑一錢煎服。

沉脈主病第十七

沉脈主裏。主寒。主積。有力痰食。無力氣鬱。沉遲虛寒。沉數熱伏。沉緊冷痛。沉緩水蓄。沉牢痼冷。沉實熱極。沉弱陰虛。沉細痺濕。沉弦飲痛。沉滑宿食。沉伏吐利。陰毒聚積。

脈按之至骨曰沉。對待浮表。是曰主裏。寒乃水寒。積乃臟積。總屬陰凝。故見沉脈。沉而有力。有物在

裏。非痰即食。（痰宜用王隱君滾痰丸。食宜用仲景大承氣湯之類。）沉而無力。裏原非實。但氣不伸。（宜和劑四七湯。河間正氣天香散之類。）沉爲在裏而復遲。虛寒可必。（宜仲景理中圓。或附子理中湯之類。）沉爲在裏而加數。伏熱何疑。（宜寶鑑既濟解毒湯。導赤散。黃連解毒湯之類。）沉而緊。則寒爲斂實。故冷痛也。（宜金匱烏頭煎。和劑來復丹之類。）沉而緩。則陽不健行。故水蓄焉。（宜仲景五苓散。苓桂朮甘湯之類。）沉而牢。乃陰寒之潛藏。痼疾冷。（宜和劑來復丹。大七香丸。）沉而實。是陽氣之聚積。實于熱深。（宜仲景大承氣湯。子和神芎丸之類。）沉爲陰

弱爲虛。沉弱必主陰虛。（宜金匱腎氣丸。六味丸之類。）沉爲裏。細爲濕。沉細定成痺濕。（宜金匱桂枝附子湯。和劑滲濕湯。或胃苓湯之類。）沉爲陰。弦爲飲。沉弦。則飲停腹陰而時痛。（宜仲景小青龍湯五苓散之類。）沉爲裏。滑爲食。沉滑則食宿腸裏而難推。（宜仲景大承氣湯。潔古枳朮丸。丹溪保和丸之類。）沉已氣沉于骨。伏則至骨如無勢。甚篤危。須分久暴。暴則旣吐且利而暴脫溫補可回。（宜和劑大七香丸。仲景理中湯。或藿香正氣散之類。）久則陰毒聚積之久阻。峻攻莫愈。（宜枳實理中丸之類。）

附方

王隱君滾痰丸（養生主論）痰之爲病。成偏頭風。成雷頭風。成太陽頭痛。眩暈如坐舟車。精神恍惚。或口眼瞤動。或眉稜耳輪俱痒。或頷腮四肢。遊風腫硬。似疼非疼。或渾身燥痒。搔之則癮疹隨生。皮毛烘熱。色如錦斑。或齒頰似痒似痛而疼無定所。滿口牙浮。痛痒不一。或噯氣吞酸。鼻聞焦臭。喉閒豆腥氣。心煩鼻塞。咽嗌不利。咯之不出。嚥之不下。或因噴嚏而出。或因舉動而唾。其痰如墨。又如破絮。或如桃膠。或如蜆肉。或心下如停冰鐵。閉滯妨悶。噯嚏連聲。狀如膈氣。或寢夢刑戮。刀兵劍戟。或夢入人家。四壁圍遶。暫得一竇。百計得出。則不知何所。或夢在燒人地上。四面烟火枯骨。焦氣撲鼻。無路可出。或不因觸發。忿怒悲啼。雨淚而寤。或時郊行。忽見天邊兩月交輝。或見金光數道。回頭無有。或足膝酸軟。或骨節腰腎疼痛。呼吸難任。或四肢肌骨間痛如擊戳。乍起乍止。並無常所。或不時手臂麻疼。狀如風濕。或卧如芒刺不安。或如毛虫所螫。或四肢不舉。或手足重滯。或眼如薑蜇。膠粘痒澀。開闔甚難。或陰晴交變之時。胸痞氣結。閉而不發。則齒痒咽痛。口糜舌爛。及其奮然而發。則噴嚏連聲。初則涕唾稠粘。次則清水如注。或前黑暗。腦後風聲。耳內蟬鳴。眼瞤肉惕。治之者。或曰腠

理不容。風府受邪。或曰上盛下虛。或曰虛。或曰寒。或曰熱邪。唯洞虛子備此疾苦。乃能治療。病勢之來。則胸腹間如有二氣交紐。噎塞煩鬱。有如烟火上衝。頭面烘熱。眼花耳鳴。痰涎涕淚。並從肺胃間涌起。凜然毛竪。噴嚔千百。然後遍身煩躁。則去衣束體。稍止片時。或春秋乍凉之時多加衣衾。亦得暫緩。或頓飲冰水而定。或痛飲一醉而寧。終不能逐去病根。乃得神秘沉香丸

方。屢獲大効。愈人數萬。但不欲輕傳匪人。故以隱語括之。詩曰。甑裏翻身甲帶金。於今頭戴草堂深。相逢二八求斤正。硝煅青礞倍若沉。十七兩中零半兩。水丸梧子意須斟。除驅怪病安心志。水瀉雙身却不任。

大黃（蒸少頃。翻過再蒸少頃。即取出。不可過。）　黃芩（各八兩）

青礞石（硝煅如金色）　沉香　百藥煎（此用百藥煎。乃得之方外秘傳。蓋此丸得此藥。乃能收斂周身頑涎。聚于一處。然後利下。甚有奇功。曰倍若沉者。言五倍子與沉香。非礞倍于沉之謂也。以上各五錢。）

右爲末。水丸如梧子大。白湯食後空心服。

一切新舊失心喪志。或癲或狂等證。每服一百丸。氣盛能食狂甚者。加二十丸。臨時加減消息之。　一切中風癱瘓。痰涎壅塞。大便或通或結者。每服八九十丸。或加至百丸。永無秘結之患。一切陽證風毒脚氣。遍身遊走疼痛。每服八九十丸。未効。加至百丸。　一切無病之人。遍身筋

骨疼痛。不能名者。或頭痛牙疼。或搖或痒。風蛀等證。風寒鼻塞。身體或疼或不疼。非傷寒證者。服八九十丸。痰盛氣實者加之。　一切吞酸噯逆膈氣。及胸中疼悶。腹中氣塊衝上。嘔沫吐涎。狀如反胃。心下恍惚。如畏人捕。怵惕不安。陰陽關格。變生乖證。食饑傷飽。憂思過慮。心下嘈雜。或痛或噦。或晝夜虛飽。或饑不喜食。急慢喉閉。赤眼。每用加減服。　一切新舊痰氣喘嗽。或嘔

愆音牽過也

聵五恠音會

吐。頭運目眩。加減服之。　一切顋頷腫硬若瘰癧者。及口糜舌爛。咽喉生瘡者。每服六七十丸。加蜜少許。一處嚼碎噙化。睡時徐徐嚥之。曾有。口瘡者。服二三十丸。依前法噙之。三二夜即瘥。○一切男婦大小。虛實心疼連腹。身體羸瘦。發時必嘔綠水黑汁冷涎。乃至氣絶。心下溫煖者。量虛實加減服之。若事屬不虞之際。至於百丸。即便回生。未至顛危者。虛弱疑似之間。只服三

十丸或五十丸。立見生意。然後續續進之以瘥爲度。兼服生津化痰。溫中理氣之藥。○一切荏苒疾病。凡男婦患非傷寒內外等證。或酒色過度。或吐血。或月事愆期。心煩志亂。或腹脹脇痛。勞倦痰眩。或暴行日中。因暑伏痰。口眼喎邪。目痛。耳聵。鼻塞。骨節酸疼。乾嘔惡心。諸般內外疼痛。百藥無効。衆醫不識者。依前法加減服之効。大抵服藥。須臨卧在熱。用熟水一口許。嚥下便卧。令藥在喉膈間。徐徐而下。如日間病出不測。疼痛不可忍。必欲急除者。須是一依前卧法服大半日不可服湯水。及不可起身行坐言語。直候藥丸除逐下焦痰滯惡物。過膈入腹。然後動作。方能中病。每夜須連進二次。次日痰物既下三五次者。仍服前數。下五七次。或直下二三次而病勢頓已者。次夜減二十丸。頭夜所服。並不下惡物者。次夜加十丸。人壯病實者。多加至百

丸。惟候虛實消息之。或服過仰睡。咽喉稠粘。壅塞不利者。痰氣泛上。乃藥病相攻之故也。少頃藥力既勝。自然寧帖。往往病久結實于肺胃之間。或則暴病全無泛濫者。服藥下咽。即仰卧。頓然百骸安靜。五藏清寧。次早先去大便一次。其餘遍數。皆是痰涕惡物。看甚麼糞。用水攪之。盡是痰片粘涎。或稍稍腹痛。腰腎拘急者。盍有一種頑痰惡物。閉氣滯腸。裏急後重者。狀如痢疾。

補註曰。地道閉塞。不能順承乎天下之所以承之也。證有輕重。故湯分小大。

片餉即已。若有痰涎易下者、快利不可勝言、頓然滿口生津、百骸爽快。間有片時倦怠者。蓋因連日病苦不安。一時爲藥力所勝。氣體暫和。如醉得醒。如浴方出。如睡方起、此藥並不洞泄刮腸大瀉、但取痰積惡物。自腸胃次第而下。腹中糟粕。並不相傷、其推下腸腹之糞。則藥力所到之處、是故先去其糞。其餘詳悉不能盡述。服者當自知之。

仲景大承氣湯　此仲景以之下邪熱入裏。成痞滿燥實堅者。後人用下腹中一應有餘積聚食物皆效、但寒飲冷積不宜。

大黃（四兩酒洗）　厚朴（半斤炙去皮）　枳實（五枚炙）

芒硝（三合）

右以水一斗。先煑二物取五升。去滓。內大黃煑取二升、去滓。內芒硝、更上微火一兩沸。分溫再服。得下。餘勿服。

附子理中湯

仲景小承氣湯　功力稍次于大承氣、不甚堅鞕燥結者宜之。

大黃（四兩）　厚朴（二兩）　枳實（三枚）

右三味。以水四升、煑取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯。當更衣。不爾者。盡飲之。若更衣。勿再服。

大七氣湯（即和劑四七湯）　治喜怒不節。憂思兼并。多生悲恐。致藏氣不平。心腹脹滿。

半夏　茯苓（各四兩）　厚朴（炒三錢）

紫蘇（二錢）

右剉入薑煎服

河間正氣天香散　治九氣、

烏藥（二兩）　香附末（八兩）　陳皮

蘇葉　乾薑（各一兩）

右爲細末每服一錢匕鹽湯下

仲景理中圓（加附子二錢炒。即名附子理中圓。今人用爲湯。更捷。）

治傷寒霍亂。下利清穀。感冒吐瀉、一切脾胃虛寒。中冷不食等證

乾薑（炮）　白朮（炒）　甘草（炙）

人參（各二錢半）

水二鍾。煎八分、食前温服。

寶鑑既濟解毒湯　治上熱頭目赤腫而痛。胸膈煩悶。不得安卧。身半以下皆寒。足胻尤甚。大便微秘。

大黃（酒煨大便利勿用）　黃連（酒炒）　黃芩（酒炒）

甘草（炙）　桔梗（各二錢）　柴胡

升麻　連翹　當歸身（各一錢）

右㕮咀作一服。水二鍾。煎至一鍾。去滓。食後温服。忌醇酒濕麵。及生冷硬物。

錢氏導赤散　治小腸伏熱。小便赤澀。或痛。或手心熱。或心煩動悸。白濁等證。

生地黃　木通　甘草（各等分）

右同爲末。每服三錢。水一盞。入竹葉七片。同煎至五分。食後温服。一本用黃芩。不用甘草。

仲景黃連解毒湯　治下焦一切伏熱實熱。或小便赤色而痛。大便熱結。腹中熱。或大小便見血。

黃連（七錢半）　黃蘗　梔子（各半兩）

黃芩（一兩）

每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓熱服。未知再服。

金匱烏頭煎　治寒疝繞臍疞痛欲死。及沉寒痼冷。一切温煖藥不能取効者。宜此主之。

烏頭（大者五枚熬去皮不㕮咀）

右以水三升。煑取一升。去滓。内蜜二升。煎令水氣盡。取二升。强人服七合。弱人服五合。不差。明日更服。不可日再服。

和劑來復丹　治上盛下虛。裏寒外熱。伏暑泄瀉嘔吐。心腹疼痛等證

硝石一（兩同硫黃爲末入甆器内以微火炒用柳篦攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末）　太陰玄精石（研飛）　舶上硫黃（透明者各）一（兩）　五靈脂（水澄去砂晒乾）　青皮（去白）

陳皮（去白各二錢）

右用五靈脂二橘皮爲末。次入玄精石末。及前二氣末拌勻。好醋打糊爲丸豌豆大。每服三十丸。空心米飲下。即作錠子。磨服更佳。

仲景五苓散　傷寒論云。太陽病。發汗後。大汗出。

胃中乾。煩躁不得眠。欲得飲水者。少少與飲之。令胃氣和則愈。若脉浮小便不利。微熱消渴者。五苓散主之。此蓋治汗後表不盡解。渴多飲水。水液復停。服此解亦盡之表。一以行停中之水。今人用爲行飲利小便之常藥。亦多効驗。

猪苓（十八銖去皮）　澤瀉（一兩六銖）　白朮（十八銖）

茯苓（十八銖）　桂枝（半兩去皮）

右五味擣爲末。以白飲和服方寸匕。日三服。多

飲煖水汗出愈。

和劑大七香丸　治脾胃虛冷。心膈噎塞。漸成膈氣。脾泄瀉利。反胃嘔吐。

香附子（二兩）　麥蘖（一兩）　丁香皮（三兩半）

縮砂仁　藿香　官桂

甘草　陳皮（各二兩半）　甘松

烏藥（各六錢半）

右十味爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。鹽酒鹽湯

任嚼下。忌生冷肥膩物。

和劑小七香丸　温中快膈。化積和氣。治中酒嘔逆。氣膈食噎。茶酒食積。小兒疳氣。

甘松（八兩）　益智仁（六兩）　香附子（炒）

丁香皮　甘草（炙各十二兩）　蓬朮（煨）

縮砂（各二兩）

右爲末。蒸餅爲丸菉豆大。每服二十丸。温酒薑湯熟水任下。

神芎導水丸

黃芩（一兩）　黃連　川芎

薄荷（各半兩）　大黃（二兩）　滑石

黑牽牛（頭末各四兩）

河間製。治一切熱證。其功不可盡述。設或久病熱鬱。無問瘦瘁老弱。并一切證可下者。始自十丸。以爲度。常服此藥。除腸胃積滯。不傷和氣。推陳致新。得利便快。並無藥燥搔擾。亦不困倦虛損。遂病人心意。或熱甚。必急須下者。使服四五十丸。未効再服。以意消息。常服二三十丸。不動藏府。有益無損。或婦人血病下惡物。加桂半兩。病微者常服。甚者取利。因而結滯開通。惡物自下也。凡老弱虛人。脾胃經虛。風熱所鬱。色黑齒稿。身瘦萎黃。或服甘熱過度。成三消等病。若熱甚於外。則肢體躁擾。病于內。則神志躁動。怫鬱不開。變生諸證。皆令服之。惟藏府滑泄者。或裏寒脉遲者。或婦人經病產後。血下不止。及孕婦等。不宜服。

金匱腎氣丸（見第十六）

六味丸（見第十六）

金匱桂枝附子湯

傷寒論云。太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。此湯主之。蓋亡陽脫液。故見上證。是湯和榮衛以復陽。若風寒濕痺等證。用之亦妙。

桂枝（三兩去皮）　芍藥（三兩）　甘草（二兩炙）

生薑（三兩切）　大棗（十二枚）　附子（三枚）

右㕮咀。以水七升。微火煑取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已。須臾歠熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。半身漐漐微似有汗者益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出病差。後服不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服小促其間。半日許令三服盡。若病重。一日一夜

服。周時覩之。服一劑盡病證猶在者。更作服。若汗不出。乃服至二三劑。禁生冷粘滑。肉麵五辛。酒酪臭惡等物。

和劑滲濕湯　治寒濕所傷。身體重着。如坐水中。小便赤澀。大便溏泄。

蒼术（炒）　白术（炒）　甘草（炙各一兩）

茯苓（去皮）　乾薑（炮各二兩）　橘紅

丁香（各二錢半）

每服四錢。水一盞。棗一枚。薑三片。煎七分。食前去滓溫服。

胃苓湯　治濕鬱小便不利。胸腹脹悶。或四肢沉重。或飲食停中。或濕鬱發黃。或傷食泄瀉。并一切山嵐瘴氣。侵乘而成瘧痢者。皆効。

蒼术（炒）　厚朴（薑汁炒）　陳皮

白术　茯苓（各一錢半）　澤瀉

猪苓（各一錢）　甘草（六分）　官桂（五分）

[illegible]者[illegible]枳术湯治水氣成痞[illegible]変而爲丸治食物成積二般一消湯丸[illegible]

右水加生薑煎服

仲景小青龍湯（見十六）

潔古枳术丸　治痞積。消食強胃。海藏云。本仲景枳术湯也。今易老改爲丸。治老幼虛弱。飲食不化。或藏府軟弱者。

枳實（去瓤麩炒。一兩。）　白术（二兩）

右爲末。荷葉裹燒飯爲丸。如桐子大。每服五十丸。白术湯下。服白术者。本意不取其食速化。但久服令人胃氣強實。不復傷也。

丹溪保和丸　治食積。酒積。

山查肉（二兩）　半夏（薑製）　橘紅

神麯（炒）　麥芽（炒）　白茯苓（各一兩）

連翹　萊菔子（炒）　黃連（各半兩）

右爲末。滴水爲丸。加白术二兩。名大安丸。

藿香正氣散　治外感風寒。內停飲食。頭痛寒熱。或感濕暑。霍亂泄瀉。脚轉筋。或作瘧疾。常服除山嵐瘴氣。

桔梗　大腹皮　紫蘇葉
茯苓　厚朴（製各一錢）　甘草（炙五分）
藿香（一錢五分）　白芷　白术
陳皮（去白）　半夏（各一錢半）
右薑棗水煎熱服。加香薷扁豆黃連名藿香湯。

枳實理中丸　治寒實結胸。
茯苓　人參　白术
乾薑　甘草（各一兩）　枳實（十六片）

右爲細末。煉蜜丸如雞子黃大。每服一丸。熱湯化下。連進二三服。

醫燈續焰卷二終

醫燈續焰目錄

卷之三

遲脈主病第十八
和劑蘇合香丸　和劑四七湯（見第十七）
四君子湯（見第十六）
數脈主病第十九
六君子湯（見第十六）　東垣朱砂安神丸
集驗龍腦安神丸　仲景桂枝湯

仲景麻黃湯（見第十六）　和劑涼膈散
仲景黃連解毒湯（見第十七）
消腫湯　當歸飲子
滑脈主病第二十
二陳湯（見第十六）　丹溪保和丸（見第十七）
潔古枳术丸（見第十七）　麴蘗枳术丸
仲景桃仁承氣湯　準繩代抵當丸
六君子湯（見第十六）　金匱大半夏湯

三因温膽湯　東垣藿香安胃散
澁脉主病第二十一
四物湯　和劑滲濕湯（見第十七）
百一除濕湯　三因腎着湯
六君子湯（見第十六）　實鑑人參利膈丸
統旨滋血潤腸湯　滋陰清膈飲
十全大補湯（見第十六）　濟生香附湯
黄耆建中湯

弦脉主病第二十二
仲景苓桂术甘湯（見第十六）
仲景小青龍湯（見第十六）　和劑倍术丸
破飲丸　六君子湯（見第十六）
金匱澤瀉湯　海藏五飲湯
濟生八神來復丹　三因控涎丹
玄珠茶調散　半夏白术天麻湯
仲景吳茱萸湯　仲景小建中湯（附黄耆建中湯）

香砂理中丸　東垣厚朴湯
仲景四逆湯
緊脉主病第二十三
長短細大主病第二十四
浮沉主病第二十五
河間犀角丸　集驗龍腦安神丸（見第十九）
和劑感應丸　和劑紅丸子
洪細主病第二十六

緩類主病第二十七
濡弱小主病第二十八
四君子湯（見第十六）　六味地黄丸（見第十六）
四物湯（見第二十一）
微脉主病第二十九
動脉主病第三十
革脉主病第三十一

卷之四

促結主病第三十二
仲景桔梗湯　元戎萬病紫苑丸
寶鑑沉香桂附丸
代脉主病第三十三
黄耆建中湯（見第二十一）　小青龍湯（見第十六）
仲景炙甘艸湯
脉病順逆第三十四
中風脉證第三十五

千金小續命湯　仲景桂枝湯（見第十九）
二陳湯（見第十六）　和劑四七湯（見第十七）
易簡星香湯　蘇合香丸（見第十八）
仲景三物備急丸　本事勝金丸
千金返魂湯　葛氏灸法
風寒脉證第三十六
仲景桂枝湯（見第十九）　仲景麻黄湯（見第十六）
暑濕脉證第三十七
東垣清暑益氣湯（見第十六）
十味香薷飲（見第十六）　敗毒散
和劑五積散
傷寒脉證第三十八
飲食勞倦第三十九
東垣枳實導滯丸　丹溪保和丸（見第十七）
潔古枳朮丸（見第十七）　麴蘗枳朮丸（見第二十）
東垣葛花解醒湯　東垣補中益氣湯

氣病脉證第四十
六鬱脉證第四十一
丹溪越鞠丸　濟生導痰湯
滾痰丸（見第十七）　丹溪保和丸（見第十七）
單[illegible]氣鬱湯　血鬱湯
熱鬱湯　濕鬱湯
卷之五
痰病脉證第四十二

和劑倍朮丸（見第二十二）　苓桂朮甘湯（見第十六）
和劑青州白丸子　法製半夏
和劑清心牛黃丸　沉香墮痰丸
清氣化痰丸　丹溪保和丸（見第十七）
仲景澤瀉湯（見第二十二）

瘧疾脉證第四十三

仲景小柴胡湯　仲景白虎湯

泄瀉脉證第四十四

五苓散（見第十七）　平胃散
東垣升陽除濕湯　理中湯（見第十七）
二神丸　五味子散
四神丸　錢氏七味白朮散
芍藥湯　香連丸
益元散（即六一散）　敗毒散（見第三十七）
東垣芍藥黃芩湯　和劑真人養藏湯
金匱桃花湯　仲景白頭翁湯
和劑參苓白朮散

嘔吐反胃脉證第四十五

仲景大半夏湯（見第二十）　生薑半夏湯
二陳湯（見第十六）　四君子湯（見第十六）
六君子湯（見第十六）　理中湯（見第十七）
藿香安胃散（見第二十）

霍亂脉證第四十六

仲景通脉四逆湯　仲景理中圓（見第十七）

仲景四逆加人參湯　附子理中湯（見第十七）

咳嗽脉證第四十七

麻黃湯（見第十六）　參蘇飲
二陳湯（見第十六）　小青龍湯（見第十六）
扳苓半夏溫肺湯

喘急脉證第四十八

麻黃湯（見第十六）　寶鑑香蘇散
枳桔二陳湯（見第十六）　三子養親湯

保和丸（見第十七）　平胃散（見第四十四）

和劑小七香丸（見第十七）　仲景瓜蒂散

火病脉證第四十九

和劑清心蓮子飲　錢氏導赤散（見第十七）

錢氏瀉黄散　瀉青丸

局方八正散　左金丸

河間防風通聖散　升陽散火湯

陽毒升麻湯　清胃湯

千金黑奴丸　錢氏瀉白散

當歸龍薈丸

骨蒸脉證第五十

[illegible]日氣脉陽　[illegible]死陰自起　[illegible]多夏猛明　[illegible]立遠

醫燈續焰卷三

錢塘後學潘　楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖興訂

門人　吳之琦季良
　　　陳綸新澹持　校

遲脉主病第十八

遲脉主藏。陽氣伏潛。有力爲痛。無力虚寒。

遲爲陰脉。五藏爲陰。故主藏。難經九難曰。遲者。藏

也。又曰。遲則爲寒。傷寒論亦曰。遲爲在藏。以陽氣伏潛。不能健行。故至數遲耳。遲而有力。有壅實不通利之意。痛可想見。（宜温而行。和劑蘇合香丸。四七湯之類。）遲云陽伏而又無力焉。虚寒必矣。（宜温而補。四君子湯薑桂附子之類。）

附方

和劑蘇合香丸　療傳屍骨蒸。殗殜肺痿。疰忤鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣鬼魅瘴瘧。赤白暴痢。瘀血月閉。痃癖。疔腫。驚癇。鬼忤中人。小兒吐乳。

大人狐狸等病。又治中風卒仆。九竅閉塞。并百邪暴乘腹痛下利。開關辟邪之藥也。

白术（炒）　青木香　烏犀角（屑）

香附子（炒去毛）　朱砂（研水飛）　訶黎勒（煨取皮）

白檀香　安息香（另末。無灰酒一升熬膏）

沉香　麝香（研）　丁香

蓽撥（各二兩）　龍腦（研）　薰陸香（另研）

蘇合香油（入安息香膏內。各一兩）

右爲細末。入研藥勻。用安息香膏。并煉白蜜和劑。每服旋丸如梧子大。早朝取井華水。溫冷任意化服四丸。老人小兒。化服一丸。溫酒化服亦得。並空心服之。用蠟紙裹一丸。如彈子大。緋絹袋當心帶之。一切邪神不敢近。今則倶用蠟殼可久藏備用。

四七湯（見第十六）

四君子湯（見第十六）

仲景云膈氣虛脈乃數也

虛熱主吐實熱主狂

數脈主病第十九

數脈主腑。主吐主狂。有力爲熱。無力爲瘡。

數脈爲陽。六府亦爲陽。故主府。難經九難曰。數者府也。又曰。數則爲熱。傷寒論亦曰。數爲在府。此以遲數分陰陽。故卽以配藏府。亦不過言其大槩耳。至若錯綜互見。在府有遲。在藏有數。在表有遲。在裏有數。又安可以藏府二字拘定也。數脈主吐者。脈始于中焦。吐則胃氣逆。中焦擾亂。氣逆而動。故

脈數。（宜六君子湯。生薑竹茹茱連之類。）主狂者。狂則神志昏亂。氣無所御。氣無所御。則奔逸于四肢。而四肢實。四肢實。是以能登高行遠。跳躍異常。夫四肢爲諸陽之本。陽邪實之。故力倍也。難經二十難曰。重陽者狂。又病能論曰。狂生于陽也。又曰。陽明者常動。巨陽少陽不動。不動而動大疾。此其候也。蓋言陽明之脈常動。巨陽少陽之脈不動。今無論常動者。卽不動者亦動。動且大疾。是爲狂病之候。觀此。則狂病

之見數脈明矣（宜東垣硃砂安神丸。集驗龍腦安神丸之類。）數而有力。聚熱所鼓（有外感證者宜汗散。仲景有汗者。桂枝湯。無汗者。麻黃湯之類。無外感者。和劑涼膈散。芩連梔蘗之類。）數而無力。雖有熱而虛散。熱散於外。發瘡之候也。（宜仲景黃連解毒湯。消腫湯。當歸飲子之類。）

附方

六君子湯（見第十六）

東垣朱砂安神丸　治心亂煩熱怔忡。心神顛倒。兀兀欲吐。胸中氣亂而熱。有似懊憹之狀。皆膈上血中伏熱。蒸蒸不安。宜用權法以鎮陰火之浮行。以養上焦之元氣。用甘草之甘温補之。當歸生地。又爲長生陰血之聖藥。黃連去心煩。除濕熱。朱砂納浮游之火而安神明。

硃砂（一錢研水飛）　黃連（淨酒炒一錢半）　甘草（炙五分）

生地黃　當歸頭（各一錢）

右爲極細末。蒸餅爲丸如黃米大。每服十丸。津嚥下。

集驗龍腦安神丸　治男婦小兒五積癲癇。無問遠年近日。發作無時。但服此藥。無不痊愈。

龍腦（研）　麝香（研）　牛黃（研各三錢）

犀角屑　茯苓（去木）　人參（去蘆）

麥門冬（去心）　硃砂（水飛各二兩）　金箔（三十五片）

馬牙硝（二錢）　甘草（炙）　地骨皮

桑白皮（各一兩）

右爲細末。煉蜜和丸如彈子大。金箔爲衣。如有風癇病歲久。冬月用温水化下。夏月用涼水化下。不拘時候。如病二三年。日進三服。小兒一丸。分作二服。又治男婦虛勞發熱喘嗽。新汲水一盞化開服。喘滿痰嗽立止。又治男子婦人語澀舌強。食後温涼水化下。日進三服。

仲景桂枝湯　傷寒論云。太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。此仲

景治中風第一方也。雖云取斂汗。實則和榮衛而助中氣。其藥即建中湯小變。近醫以中風自汗。竟認桂芍爲斂汗之藥。冤哉。

桂枝　芍藥（炒）　生薑（各三兩）
甘草（炙二兩）　大棗（擘二十枚）

煎服法。同前第十七桂枝附子湯。

仲景麻黄湯（見第十六）

和劑凉膈散　治大人小兒積熱。煩躁多渴。面熱

唇焦。咽燥舌腫。喉閉目赤。鼻衂。頷頰結硬。口舌生瘡。譫語狂妄。腸胃燥澀。便溺閉結。睡卧不安。一切風壅。

梔子仁　連翹　薄荷
黄芩　甘草（各一兩半）　大黄
芒硝（各半兩）

右爲粗末每一兩水二盞竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得去六經熱

[illegible]結核連綿者名瘰癧生項腋之間形長如蜆蛤者名馬刀[illegible]之處

減大黄芒硝。加桔梗。甘草。人參。防風。治肺經邪熱。咳嗽有痰。加半夏。凉膈與四物各半服。能益血瀉熱。名雙和散。錢氏去連翹。加藿香。石膏。爲瀉黄散。（寶鑑連翹四兩硝黄各二兩餘各一兩）

仲景黄連解毒湯（見第十七）

消腫湯　治馬刀瘡

茈胡（二錢）　連翹（三錢）　當歸尾
甘草（各一錢）　生黄芩　紅花（少許）

黄連　黍粘子（炒各）　瓜蔞根
黄耆（各一錢半）

右件每服五錢或一兩水煎熱服食後

當歸飲子　治瘡疥風癬濕毒燥痒瘡。

當歸　白芍藥　川芎
生地黄　白蒺藜　防風
荆芥（各一兩）　何首烏　黄耆
甘草（各五錢）

右㕮咀。每服一兩、水煎、或為末。每服一二錢。亦得。

滑脉主病第二十

滑脉主痰、或傷于食。下為畜血。上為吐逆。

痰乃水飲所結。薄則稠粘。老則磈磖、滑脉、滑澤近于水象。如數疾而替替然。形相似也、不腐不化之食。象亦如之、皆有物之脉也。（痰宜二陳湯。食宜丹溪保和丸。潔古枳朮丸。麴蘗枳朮丸之類。）在下則見于尺。主畜血者。血亦類痰。瘀凝類痰。以其在尺。故以血斷、（宜仲景桃仁承氣湯、準繩代抵當丸之類）若見于寸、必主吐逆。蓋因滑脉之流利滑動。勢不安定、切近上焦。自當為吐。（宜六君子湯。仲景大半夏湯。溫膽湯。東垣藿香安胃散之類。）然而所吐之物、非痰即食。設無痰食。是為嘔逆。則脉不應見滑而又當見濇矣。

附方

二陳湯（見第十六）

丹溪保和丸（見第十七）

潔古枳朮丸（見第十七）

麴蘗枳朮丸　治強食所致。心胸滿悶不快。

神麴（炒）　麥蘗（炒）　枳實（去瓤麩炒各一兩）

白朮（炒二兩）

右製服如枳朮丸法

仲景桃核承氣湯　傷寒論云。太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂、血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。當先解外。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。宜桃核承氣湯。此下熱與血結成瘀之劑也。今用下瘀血於腸腹脇下者。皆効。

桃仁（五十個去皮尖味甘平）　桂枝（二兩去皮味辛熱）

大黃（四兩）　芒硝（二兩）　甘草（二兩炙）

右五味。以水七升。煮取二升半。去滓。內芒硝。更上火。微沸下火。先食溫服五合。日三服。當微利。

準繩代抵當丸　行瘀血（自製）

大黃（川產如錦紋者。去皮及黑心。四兩）　芒硝（一兩。如欲穩。以玄明

（粉代）桃仁（麩炒黃。去皮尖。另研如泥。六十枚）

當歸尾　生地黃　穿山甲（蛤粉炒。各一兩）

桂（三錢。或五錢）

右爲極細末。煉蜜丸如桐子大。若畜血在上焦。丸如芥子大。臨卧去枕仰卧。以津嚥之。令停留喉下。搜逐膈上。中焦食遠。下焦空心。俱桐子大。以百滾水煎湯下之。　用歸地者。欲下血而不損血耳。且引諸藥至血分也。諸藥皆獷悍而欲

以和濟之也。如血老成積。此藥攻之不動。宜去歸地。加廣茂。（醋浸透焙乾一兩）肉桂（七錢）

六君子湯（見第十六）

仲景大半夏湯　治反胃嘔吐

半夏（二升洗完用）　人參（三兩）　白蜜（一升）

以水一斗三升。和蜜揚之二百四十遍。煮藥取三升。温服一升。餘分再服。

温膽湯（三因）　治心膽虛怯。觸事易驚。或夢寐不祥。

[illegible]爲血府逐　[illegible]少血瘀固　[illegible]若寒瘀　又逆氣分滯

遂致心驚膽懾。氣鬱生涎。涎與氣搏。變生諸證。或短氣悸乏。或復自汗。

半夏（湯洗）　枳實　竹茹（各一兩）

橘皮（一兩半。去白）　甘草（炙四錢）　白茯苓（七錢）

每服四錢。水一盞半。生薑七片。棗一枚。煎七分。食前熱服。

東垣藿香安胃散　治脾胃虛弱。不進飲食。嘔吐不待腐熟。

藿香（一錢半）　丁香　人參（各二錢）

橘紅（五錢）

右爲細末。每服二錢。水二盞。生薑三片。同煎至一盞。去滓涼服。食前和滓服亦可。

濇脈主病第二十一

濇脈少血。或中寒濕。反胃結腸。自汗厥逆。

靈樞決氣篇曰。中焦取汁。變化而赤。是謂血。壅遏營氣。令無所避。是謂脈。脈之與血。同質異名。是二

（也汗厥之澁氣虛液少也至于反胃腸結之澁不唯血枯并津液亦枯矣）

而一。況體爲陰液。多則滑利。少則枯澁。理勢之必然者。（枯澁虛澁血少宜四物湯之類）寒濕襲人。肌膚痺着。氣道不利。脈安得不澁。（滯濇之濇。宜和劑滲濕湯。百一除濕湯。三因腎着湯之類）反胃則朝食暮吐。暮食朝吐。或隨食隨吐。胃無餘液。以致腸中枯燥而大便秘結。脈安得不澁。（枯澁之濇宜六君子湯。寶鑑人參利膈丸。統旨滋血潤腸湯。滋陰清膈飲之類。）自汗者。汗時時自出也。出則液耗。是謂脫液。漏而不止。衛氣散失。四肢厥寒。是謂亡陽。陽亡液脫。脈又安得不澁。（虛澁之澁。宜十全大補湯。濟生耆附湯。黃耆建中湯之類。）一澁脈也。而有虛澁。滯澁。枯澁之分。是又在診之者。自爲靈通耳。

附方

四物湯　治肝脾腎血虛發熱。或寒熱往來。或日晡熱甚。頭目不清。或煩躁不寐。胸膈作脹。脇肋疼痛等症。凡血虛諸病。以此爲主治。若脾氣虛而不能生血。宜四君子。若脾氣鬱而血虛。宜歸脾。湯若腎水涸而不生肝血。宜六味丸。

當歸（三錢）　白芍藥（一錢）　熟地黃（三錢）

川芎（半錢）

右水煎服

和劑滲濕湯（見第十七）

百一除濕湯　治寒濕所傷。身體重着。腰脚酸疼。大便溏泄。小便或澁或利。

半夏麴（炒）　厚朴（薑製）　蒼术（米泔製各二兩）

藿香葉　陳皮（去白）　白茯苓（去皮各一兩）

甘草（炙七錢）　白术（生用一兩）

右㕮咀。每服四錢。水一盞。薑七片。棗一枚。煎七分。食前溫服。

三因腎着湯　治腎虛傷濕。身重腰冷。如坐水中。不渴。小便自利。

乾薑（炮）　茯苓（各四兩）　甘草（炙）

白术（各二兩）

每服四錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

六君子湯（見第十六）

寶鑑人參利膈丸　治胸中不利。大便結燥。痰嗽喘滿。脾胃壅滯。推陳致新。治膈氣之聖藥也。

木香　檳榔（各七錢半）　人參

當歸（酒洗）　藿香　甘草

枳實（麩炒黃各一兩）　大黃（酒濕蒸熟）　厚朴（薑製各二兩）

右爲細末。滴水爲丸。如桐子大。每服三五十丸。食後諸飲下。

統旨滋血潤腸湯　治血枯。及死血在膈。飲食不下。大便燥結。

當歸（酒洗三錢）　芍藥（煨）　生地黃（各一錢半）

紅花（酒洗）　桃仁（去皮尖炒）　大黃（酒煨）

枳殼（麩炒各一錢）

水一鐘半。煎七分。入韭菜汁半酒盞。食前服。

滋陰清膈飲（統旨）　治陰火上衝。或胃火太盛。食不入。脈洪數者。

當歸　芍藥（煨）　黃蘗（鹽水炒）

黃連（各一錢半）　黃芩　山梔

生地黃　甘草（三分）

水二鐘。煎七分。入童便竹瀝各半酒盞。食前服。

十全大補湯（見第十六）

濟生耆附湯　治氣虛陽弱。虛汗不止。肢體倦怠。

黃耆（去蘆蜜炙）　附子（炮去皮臍各等分）

右㕮咀。每服四錢。水一盞。生薑十片。煎八分。食

前溫服。未應。更加之。

黃耆建中湯　治血氣不足。體常自汗。

黃耆　桂（各一錢半）　白芍藥（三錢）

甘草（一錢）

每服五錢。水一鐘半。薑五片。棗二枚。煎八分去滓。入稠餳一大匙。再煎服。舊有微溏或嘔者。不用餳。

弦脈主病第二十二

弦脈主飲。病屬膽肝。弦數多熱。弦遲多寒。浮弦支飲沉弦懸痛。陽弦頭痛。陰弦腹痛。

夫飲入于胃。必陽氣爲之遊溢輸布。藏府受其灌溉。形體賴其濡滋。若陽運之力薄。則不能遊溢輸布。停畱于中而飲之諸證起矣。其脈弦者。弦爲陰脈。斂束急直。無抑揚鼓動之勢。正陽運之不足也。若非有飲而見弦脈。病又當在膽與肝耳。蓋膽爲甲木。肝爲乙木。自北而東。在肝爲厥陰而陰盡。在膽爲少陽而陽微。初春之象。逗氣尚少。升如一縷。有弦義焉。數則爲熱。弦而兼數者。病亦兼熱。遲則爲寒。弦而兼遲者。病亦兼寒。弦則爲飲。弦而浮。則飲停在上。名曰支飲。支者。支分之義。不在胃而支畱於心胸間也。（宜仲景苓桂术甘湯。小青龍湯。和劑倍术丸。破飲丸。六君子湯。仲景澤瀉湯。海藏五飲湯之類。）弦而沉。則飲停在下。當爲懸痛。懸者。懸閣之義。不在胃而懸畱于腹脇間也。以寒飲而畱於陰分。故在內痛。（宜濟生八神來復丹。三因控涎丹之類。）弦脈不但主飲而又主痛者。以弦寒飲束。氣不舒暢故耳。陽弦者。寸弦也。邪在三陽。三陽走頭。故頭痛。（宜玄珠茶調散。半夏白术天麻湯。仲景吳茱萸湯之類。）陰弦者。尺弦也。邪在三陰。三陰走腹。故腹痛。（宜仲景小建中湯。香砂理中湯。東垣厚朴湯。仲景四逆湯之類。）

附方

仲景苓桂术甘湯（見第十六）

小青龍湯（見第十六）

和劑倍术丸　治五飲。一曰畱飲。停水在心下。二曰澼飲。水在兩脇。三曰痰飲。水在胃中。四曰溢飲。水溢在膈。五曰流飲。水在腸間。瀝瀝有聲。皆由飲水過多。或飲冷酒所致。

白术（二兩）　桂心　乾薑（各一兩）

右爲末。蜜丸。每二十丸。溫米飲下。加至三十丸。食前服。

破飲丸　治五飲停蓄胸膈。呼吸之間。痛引兩脇。脹滿氣促。胸腹結爲癥瘕。支滿胸膈。旁及兩脇。

捻心疼痛。飲食不下。反胃吐逆。九種心疼。積年宿食不消。久瘧久痢。遁尸疰忤。顛癎厥運。心氣不足。憂愁思慮。婦人腹中諸病。並皆治之。

蓽撥　丁香（不見火）　縮砂仁
蝎稍　胡椒　木香（不見火）
烏梅肉　青皮　巴豆（去皮膜各等分）

右將青皮巴豆。以漿水同浸一宿。次日濾出同炒。青皮焦。去巴豆。水淹烏梅肉蒸一炊久。細研

爲膏。入藥末和勻。丸如菉豆大。每服五七丸。臨睡生薑湯下。

仲景六君子湯（見第十六）

仲景澤瀉湯　治飲停心下。常苦眩冒。或胸中痞結。堅大如盤。下則小便不利。

澤瀉（五兩）　白朮（二兩）

水二升。煑一升。分溫再服。

海藏五飲湯　治五飲最效

旋覆花　人參　陳皮（去白）
枳實　白朮　茯苓
厚朴（製）　半夏（製）　澤瀉
猪苓　前胡　桂心
白芍藥　炙甘草（各等分）

右每一兩分四服。薑十片。水二盞。煎至七分。去滓溫服無時。因酒成飲。加葛根葛花砂仁。

濟生八神來復丹　治寒痰冷飲。久積心胸。或嘔

逆喘促。或心腹攪疼。或飲食不安。狀如反胃等證。

硝石（一兩。同硫黃爲末。磁器內以微火炒。用柳篦攪。不可火太過。恐傷藥力。再研極細。名二氣末。）
太陰玄精石（飛研一兩）
五靈脂（水澄清。濾去砂石。晒乾。）　青皮（去白）
陳皮（去白各二兩）　舶上硫黃（透明）　沉香
木香（堅實者）　天南星（粉白者各一兩）

右爲末。飛麫糊爲丸。如桐子大。每服三十丸。空

心米飲送下。

三因控涎丹　凡人忽患胸背手足頸項腰胯等。隱痛難忍。筋骨牽引釣痛。時時走易不定。乃是痰涎在心膈上下。變爲此疾。或手足冷痺。氣脉不通。誤認癱瘓也。

甘遂（去心）　紫大戟（去皮）　真白芥子（各等分）

右爲末。糊爲丸桐子大。晒乾。食後臥。淡薑湯或熱水下五七丸。至十丸。痰猛加數丸。

玄珠茶調散　治風熱上攻頭目。及頭風熱痛。不可忍。

片芩（二兩。酒拌炒三次。不可令焦。）　小川芎（一兩）

細茶葉（三錢）　白芷（五錢）　薄荷（三錢）

荊芥穗（四錢）

頭巔及腦痛。加細辛藁本蔓荊子。（各三錢）

右爲細末。每服二三錢。用茶清調下。

秘藏半夏白朮天麻湯　治素有脾胃之證。時顯煩躁。大便不利。又出入爲寒氣所鬱。悶亂大作。火鬱不伸故也。醫疑有熱。服疏風丸下之。原證不減。復添嘔逆。食不能停。痰唾稠粘。湧出不止。眼澁頭旋。惡心煩悶。氣短促上。喘無氣力。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。是胃氣已損。復下兩次。重虛脾胃。病名曰痰厥頭痛。厥者。痰之濁氣逆上。淆溷清陽。故旋暈。非有痰厥逆而上也。

半夏（一錢五分）　白朮　炒麴（各一錢）

天麻　黃耆　人參

蒼朮　陳皮　澤瀉

茯苓（各五分）　大麥麪（一錢半）　乾薑（三分）

黃蘗（二分）

仲景吳茱萸湯　傷寒論云。食穀欲嘔者。屬陽明也。吳茱萸湯主之。金匱云。嘔而胸滿者。茱萸湯主之。又云。乾嘔吐涎沫。頭痛。茱萸湯主之。觀此。

則凡胃虛寒不能納食。或吐冷飲酸水者。皆効。

吳茱萸（一升洗）　人參（三兩）　生薑（六兩）

大棗（十二枚）

右四味。以水七升。煑取二升。去滓溫服七合。日三服。

仲景小建中湯（加黃耆一兩半。人參二兩。名黃耆建中湯。）　金匱要略云。虛勞裏急。悸。衄。腹中痛。失精。四肢酸疼。手足煩熱。咽乾口燥。小建中湯主之。又千金療男女

因積冷氣滯。或大病後不復常。苦四肢沉重。骨肉酸疼。吸吸少氣。行動喘乏。胸滿氣急。腰背強痛。心中虛悸。咽乾唇燥。面體少色。或飲食無味。脇肋腹脹。頭重不舉。多臥少起。甚者積年。輕者百日。漸致瘦弱。五藏氣竭。則難可復常。六脈俱不足。虛寒之氣。少腹拘急。羸瘠百病。黃耆建中湯主之。

桂枝（三兩）　甘草（炙二兩）　大棗（十二枚）

芍藥（六兩）　生薑（三兩）　膠飴（一升）

右六味。以水七升。煑取三升。去滓。內飴。更上微火消解。溫服一升。日三服。嘔家不可用建中湯。以甜故也。

香砂理中湯（即理中圓加木香砂仁。服法亦同。見第十七）　治脾虛氣滯。或受外寒。泄瀉腹痛。喜溫。或嘔吐。胸膈滿悶腸腹雷鳴等證

東垣厚朴湯　治胸腹脹痛。或腸鳴後重。或受寒

及寒飲食作痛。脈沉遲而弦者宜之。

厚朴（薑製）　陳皮（去白各二兩）　甘草（炙）

乾薑（各五錢）　茯苓（去皮一兩）

右㕮咀。每服一兩。水煎服。

仲景四逆湯　治中外皆寒。四肢逆冷。腹痛腸鳴。或汗多亡陽。或中寒瀉利清穀。舌滑氣冷。一切陰寒勝而陽虛。脈沉遲弦弱者。此方主之。

甘草（炙一兩）　乾薑（一兩半）　附子（一枚生用去皮破八）

片

右三味。以水三升。煑取一升二合。去滓。分温再服。强人大附子一枚。乾薑三兩。

緊脉主病第二十三

緊脉主寒。又主諸痛。浮緊表寒。沉緊裏痛。

緊與弦相似。但多鼻動夭矯之勢。所謂如轉索者是也。陽爲寒束。崛强不平。故作是狀。爲諸痛者。亦此義耳。浮以候表。浮而緊。寒在表也。（宜温散）沉以候

裏。沉而緊。寒在裏也。（宜温中）裏爲陰分。以陰寒而襲陰分。陽困陰凝。故痛也。

長短細大主病第二十四

長脉氣平。短脉氣病。細則氣少。大則病進。

長脉氣暢。故曰平。短脉氣促。故曰病。細爲正不足。故氣少也。大爲邪有餘。故病進也

浮沉主病第二十五

浮長風癇。沉短宿食。血虛脉虛。氣實脉實。

長類乎弦。亦肝木之象也。素問玉機眞藏論曰。肝脉端直以長是也。浮則爲風。風木偏勝。癇證作矣。（宜疎風豁痰養榮。如河間犀角丸。集驗龍腦安神丸之類。）沉主裏。沉而短。爲中氣局促。宿食停畱之礙也。（宜温而推之。如和劑感應丸。紅丸子之類。）脉爲血府。脉虛者血虛。脉由氣行。氣實者脉實。

附方

河間犀角丸　治風癲癇。發作有時。揚手擲足。口吐痰涎。不省人事。暗倒屈伸。

犀角末（半兩）　赤石脂（三兩）　朴硝（二兩）

白僵蠶（一兩）　薄荷葉（一兩）

右爲末。麪糊丸如梧子大。每服二三十丸。温水下。日三服。不拘時。如覺痰多。卽減數。忌油膩炙煿。

集驗龍腦安神丸（見第十九）

和劑感應丸　治中虛積冷。氣弱有傷。停積胃脘。不能傳化。或因氣傷冷。或因饑飽食飲酒過多。

心下堅滿。兩脇脹痛。心腹大痛。霍亂吐瀉。大便頻數。後重遲澁。久痢赤白。膿血相雜。米穀不化。愈而復發。又治中酒嘔吐。痰逆惡心。喜睡頭旋。胸膈痞滿。四肢倦怠。不思飲食。不拘新舊冷積。並皆治之。

南木香　肉豆蔻　丁香（各一兩半）

乾薑（炮一兩）　巴豆（七十粒去皮心膜研出油）

杏仁（一百四十粒湯泡去皮尖研）　百草霜（二兩）

右前四味爲末。外入百草霜研。與巴豆杏仁七味同和勻。用好黃蠟六兩。溶化成汁。以重絹濾去滓。更以好酒一升。於銀石器內煮蠟數沸。傾出候酒冷。其蠟自浮於上。取蠟秤用。凡春夏修合。用清油一兩。銚內熬令香熟。次下酒煮蠟四兩。同化成汁。就銚內乘熱拌和前項藥末。秋冬修合。用清油一兩半。同煎煮熟成汁。和前藥末成劑。分作小錠。油紙裹放。旋丸服之。每三十丸。空心薑湯下。

和劑紅丸子　壯脾胃。消宿食。去膨脹。

京三稜（浸軟切片）　蓬莪朮（煨）　青皮（去白）

陳皮（去白各五斤）　乾薑（炮）　胡椒（各三斤）

右爲末。用醋麪糊丸如梧桐子大。礬紅爲衣。每服三十丸。食後薑湯送下。小兒臨時加減與服。

洪細主病第二十六

洪脉爲熱。其陰則虛。細脉爲濕。其血則虛。

洪脉滿指。浮大兼備。陽有餘之象。故當爲熱。有餘於陽。則不足于陰。故爲陰虛。細爲陰脉。細藐不振。陰濕之候。細又爲血虛者。蓋脉以血爲體。細藐之甚。體于何有。故血虛。

緩類主病第二十七

緩大者風。緩細者濕。緩澁血少。緩滑內熱。

空疏緩大。風所致也。緩漫濡細。濕所侵也。緩而濇滯。血必少也。緩而滑疾。內有熱也。

[illegible]

濡弱小主病第二十八

濡小陰虛，弱小陽竭。陽竭惡寒。陰虛發熱。

濡小之脈。卽所謂如帛浮水面。有上無下。陰虛之候也。弱小之脈。體不充，勢不鼓。陽竭之候也。陽竭，則陰乘陽。故惡寒。陰虛。則陽乘陰，故發熱。（陽竭者補陽。宜四君耆附之類。陰竭者補陰。宜六味丸。四物湯之類。）

附方

四君子湯（見第十六）

六味丸（見第十六）

四物湯（見第二十一）

微脈主病第二十九

陽微惡寒。陰微發熱。男微虛損。女微瀉血。

脈經云。微脈不勝尋按。若有若無。言其虛極也。寸微爲陽微。陽微卽陽虛而陰氣上入陽中。故惡寒也。尺微爲陰微。陰微卽陰虛而陽氣下陷入陰中。故發熱也。男人得此。不唯惡寒發熱而且爲虛損。女人得此。不惟惡寒發熱而且爲瀉血。（虛損者未必不失血。瀉血者，未必不成虛損。男子補其陽。女子補其陰。）

動脈主病第三十

陽動汗出。陰動發熱。爲痛與驚，崩中失血。

傷寒論曰。陰陽相搏名曰動。又曰。數脈見于關上。上下無頭尾。如豆大。厥厥動搖者。名曰動。旣云在關，是居尺寸之中。若不能分陰分陽者。然云陰陽相搏。又云陽動陰動。又似乎有勝有負。故陽虛者。

爲陽動陽負。負則外衛不密而汗自出矣。陰虛者。爲陰動陰負。負則內守不寧而熱自發矣。爲痛爲驚者。陰陽不和。氣搏擊則痛。氣擴迸則驚。味厥厥動搖四字。情形宛然。陰陽相搏不和。不和則衛守兩失其職。而崩中失血之證。有自來矣。（陽衛陰守）

革脈主病第三十一

虛寒相搏。其名爲革。男子失精。女子失血。

傷寒論辨脈法云。脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。

減則爲寒。芤則爲虛。虛寒相搏。此名爲革。婦人則半產漏下。（宜補血）男子則亡血失精。（宜塡精）此節正革脈之証脚也。蓋革如皮革。急滿指下。今云脈弦而大。非革而何。只此四字。可以盡革脈之形狀矣。弦則爲減以下。又發明所以爲革。并革之所以爲病也。弦則脈體弦急細斂。是陽氣之減少也。弦而大。是改細斂爲濶大。其弦急之體仍在。弦急爲陽減。改大則中芤。陽減爲寒。中芤爲虛。旣虛且寒。徒革于外而中則空。在女則爲半產漏下。在男則爲亡血失精。是皆中空之驗。

榮行脈中衛行脈外道雖不同彼此相將今脈數則知爲陽盛矣時一止者榮不將衛故促脈遲則知爲陰盛矣時一止者衛不將榮故結此亦促結之義動象形容於此更覺顯然

醫燈續焰卷四

錢塘後學潘　楫碩甫詮
同邑社盟王佑賢聖翼評
門人　張文啓開之
　　　沈晋垣亮宸　校

促結主病第三十二

陽盛則促。肺癰陽毒。陰盛則結。疝瘕積鬱。

數脈時見一止。名曰促。數則爲熱。爲陽盛。主上焦熱聚成毒。或熱聚肺成癰。（陽毒宜消散。如黃芩花粉連翹枳殼荊防之類。肺癰宜清解。如仲景桔梗湯之類。）脈氣流行。爲其阻礙。故一止也。不數而緩。時見一止。名曰結。爲陰盛。主陰分或腹中聚疝痼瘕。（宜元戎萬病紫菀丸。寶鑑沉香桂附丸之類。）久積成鬱。氣堅結不散。脈氣至此。亦爲所礙。故一止也。難經十八難曰。結甚則積甚。結微則積微。是又當審止歇之多寡而斷病之輕重耳。

附方

佑賢曰此方治肺癰如神但桔梗須北產味苦者多去蘆頭爲妙

仲景桔梗湯　金匱要略云。欬而胸滿。振寒脉數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。又治心藏發咳。咳而喉中如梗狀。甚則咽腫喉痹。亦治血痺。

桔梗（一兩）　甘草（二兩）

右二味。以水三升。煑取一升。分温再服。則吐膿血也。

元戎萬病紫菀丸　治臍腹久患痃癖如碗大。及

諸黃病。每地氣起時。上氣衝心。繞臍絞痛。一切虫咬。十種水病。十種蠱病。及反胃吐食。嘔逆惡心。飲食不消。天行時病。女人多年月露不通。或腹如懷孕多血。天陰即發。又治十二種風。頑痺不知年歲。晝夜不安。夢與鬼交。頭多白屑。或哭或笑。如鬼魅所著。腹中生瘡。腹痛。服之皆効。

紫菀（去苗）　菖蒲（九節者去毛）　吳茱萸（湯洗七次焙乾）

柴胡（去鬚）　厚朴（薑製一兩）　桔梗（去蘆）

茯苓（去皮）　皂莢（去皮弦子炙）　桂枝

乾薑（炮）　黃連（去鬚八錢）　巴豆（去皮膜出油研）

人參（去蘆）　羌活　獨活

防風（各半兩）　蜀椒（去目及閉口者微炒出汗）

川烏（炮去皮臍半兩加三錢）

右爲細末。入巴豆研勻。煉蜜丸如桐子大。每服三丸。漸加至五丸七丸。生薑湯送下。食後臨臥服。孕者不宜服。（此方分兩。一依元板善本校定。厚朴黃連下。有分兩而無各字。）

（川烏乃云半兩加三錢。不知何謂。考温白丸方。惟川烏二兩半。餘藥各半兩。亦恐有訛。重於[illegible]古。姑仍之。）

痔漏腸風酒下　赤白痢訶子湯下　膿血痢米飲湯下　墮傷血悶四肢不收酒下　蛔虫咬心檳榔湯下　氣噎憂噎荷葉湯下　打撲損傷酒下　中毒帶灰甘草湯下　一切風升麻湯下　寸白虫檳榔湯下　霍亂乾薑湯下　咳嗽杏仁湯下　腰腎痛豆淋酒下　陰毒

傷寒温酒下　吐逆生薑湯下　飲食氣塊麵湯下　肺氣井花水下　脾風陳皮湯下　頭痛水下　心痛温酒下　大小便不通燈草湯下　因物所傷以本物湯下　吐水漿湯下　氣病乾薑湯下　小兒天弔風搐防風湯下防已亦可　小兒疳痢葱白湯下　小兒乳食傷白湯下　月信不通紅花酒下　婦人腹痛川芎酒下　懷孕半年後胎漏艾湯下　有子氣衝心酒下　產暈痛温酒下　血氣痛當歸酒下　產後心腹脹滿豆淋酒下　難產益智湯下　產後血痢當歸湯下　赤白帶下酒煎艾湯下　解内外傷寒粥飲下　室女血氣不通酒下　子死腹中葵子湯下　又治小兒驚癎。大人顛狂。一切風。及無孕婦人。身上頑麻。狀如虫行。四肢俱腫。呻吟走痛等疾。　楊駙馬患風氣衝心。飲食吐逆。遍身枯瘦。日服五丸。至七丸。至二十日。瀉出肉塊如蝦蟆五六枚。白膿二升愈。　趙侍郎先食後吐。目無所見。耳無所聞服至五十日。瀉青蛇五七條。長四寸許。惡膿三升愈。　王氏患大風。病眉髮墮落。手掌生瘡服之半月。瀉出癩虫二升。如馬尾。長寸許。後愈　李靈患肥氣。日服五丸。經一月。瀉出肉鱉三枚。愈。茹黄門卒中風。病發時服藥。瀉出惡膿四升。赤黄水一升。一肉虫如亂髮愈。　李知府妻楊氏。帶下病七年。月崩不止。骨瘦着床。日服五丸。至十丸。十五丸。取下膿血五升。黄水一升。肉塊如雞子狀愈。此藥治一切萬病如神。唯初有孕者不宜服。

寶鑑沉香桂附丸　治中氣虛弱甚。脾胃虛寒。臟府積冷。心腹疼痛。手足厥逆冷便利無度。七疝引痛不可忍。喜熱熨少緩者。

沉香　附子（炮）　川烏（炮）

第一〇七八冊　續修四庫全書第36　版正內

[illegible]所碍之[illegible]勢氣衰[illegible]脉乃虛[illegible]生死之分

大要着意

[illegible]者心氣不[illegible]而動也

乾薑（炮）　良薑　官桂

吳茱萸（湯泡去苦水）　茴香（炒各一兩）

右末。好醋煮糊丸梧子大。每五十丸。至七八十丸。空心米飲下。

代脉主病第三十三

代則氣衰。或泄膿血。傷寒心悸。女胎三月。

代亦歇止之脉。但促結之止。內有所礙。雖止而不全斷。中有還意。代則大止不還。下復至。如更代者

非元氣衰微之甚。不至此也。泄膿血者。則榮血耗竭。隧道空虛。故見此欲脫不續之狀。（素問脉要精微論云。數動一代者。病在陽之脉也。洩及便膿血。）傷寒心悸。有中氣虛者。有停飲者。有汗下後者。中氣虛。則陽陷。陽受氣于胸中。陽氣陷。則不能上充于胸中。故悸。（宜黃耆建中湯之類）停飲者。飲水多而停于心下也。水停心下。水氣上凌。心不自安。故悸。（宜小青龍湯之類）汗後。則裏虛矣。况汗乃心液。心液耗則心虛。心虛故悸。（宜炙甘草湯黃耆建中湯之類）諸悸者

[illegible]產[illegible]三五[illegible]三月[illegible]七[illegible]婦人[illegible]此三經不[illegible]多至期[illegible]不養則[illegible]之不[illegible]血而虛[illegible]月依經[illegible]其氣血虛[illegible]調之自[illegible]全足月[illegible]或外感內傷等症各宜

隨症調治

未必皆脉代。今脉代者。正指汗後之悸。以汗為心液。脉為心之合耳。女胎十月而產。府藏各輸真氣資之培養。一月之時。足厥陰脉養之。足厥陰者。肝也。二月。足少陽脉養之。足少陽者。膽也。三月。手厥陰脉養之。手厥陰者。心包絡也。四月。手少陽脉養之。手少陽者。三焦也。五月。足太陰脉養之。足太陰者。脾也。六月。足陽明脉養之。足陽明者。胃也。七月。手太陰脉養之。手太陰者。肺也。八月。手陽明脉養

之。手陽明者。大腸也。九月。足少陰脉養之。足少陰者。腎也。十月。足太陽脉養之。足太陽者。膀胱也。是以諸經脉各養三十日也。若至期當養之經。虛實不調。則胎孕為之不安。甚則下血而墮矣。十二經中。獨心與小腸不養胎者何歟。夫心為牡藏。小腸為之府。主生血而合脉。素問平人氣象論曰。藏真通于心。心藏血脉之氣也。有孕。則經血不通。許學士所謂妊娠閉經。隨以養胎者是也。平人氣象論

[illegible]曰心主脉
[illegible]液汗汗後
心虛故心悸
而脉[illegible]麥冬

又曰。婦人手少陰脉動甚者。姙子也。歷觀經論。是知胎以血爲體。而始終十月。皆頼乎心。自不當在輪養中又分次第矣。三月之時。心胞絡養胎。靈樞經脉篇云。心包主脉。若分氣及胎。脉必虛代。在五藏生成篇又云。心合脉。蓋心與心胞雖分二經。原屬一藏故耳。

附方

黄耆建中湯　見第二十一

生液本經主
[illegible]絡脉絕生
地黄血本經
毛折跌絕筋
續絕聖藥
阿膠乃驢皮
濟水煮成經
水篇云心合
濟水五藏生
成篇云肺合
皮毛所謂毛
合精而成
者不巧似
現人參補
真而生脉
[illegible]脾果甘

仲景小青龍湯　見第十六

仲景炙甘草湯　傷寒論云。傷寒脉結代。心動悸。炙甘草湯主之。

甘草（炙四兩）　生薑（切三兩）　桂枝（去皮三兩）

人參（二兩）　生地黄（一斤）　阿膠（二兩）

麥門冬（去心半升）　麻子仁（半升）　大棗（擘十二枚）

右九味。以清酒七升。水八升。先煑八味。取三升。去滓。内膠烊消盡。温服一升。日三服。一名復脉湯。聖濟經曰。津耗散爲枯。五藏痿弱。榮衛涸流。濕劑所以潤之。麻仁阿膠麥門冬地黄之甘潤經益血。復脉通心也。

[illegible]脾藥爲胃
行津液而通
脉生薑溫中
而出脉桂枝
行營而達脉
麻仁潤滋而
補脉一名復
脉湯不虛矣

又人病脉不
病曰生脉病
人不病曰死
故曰脉者元
氣也

脉病順逆第三十四

脉之主病。有宜不宜。陰陽順逆。吉凶可推。

有是病。則有是脉。如影之隨形也。與病相宜則順。不相宜則逆。逆之與順。何從區別。是又在陰陽耳。如表病見表脉。裏病見裏脉。實病見實脉。虛病見虛脉。陽病見陽脉。陰病見陰脉之類。皆順而相宜者也。反此則逆。逆順一分。而病之吉凶。從可推矣。

[illegible]風一證與
[illegible]之
不同乃仲
所謂衛[illegible]
爲中風者
[illegible]

中風脉證第三十五

中風浮緩。急實則忌。浮滑中痰。沉遲中氣。尸厥沉滑。卒不知人。入藏身冷。入府身溫。

風性空疎。中之于表。浮緩是其宜也。（宜千金小續命湯。輕則仲景桂枝湯。加減用之。）急強而實。脉無柔和。邪氣太甚。正氣何堪。故忌。若浮而滑。滯有物參。非浮緩比。此則中痰

元氣虧損
致衛氣解
而[illegible]八風
邪卒入吾
故名曰中
入有經絡
臟左右後
之不同治
培元氣衛
爲善法非
風藥汗吐
攻邪之比

之如中風者。（宜二陳湯。防風竹瀝生薑之類。甚則探吐。）若沉而遲。則不在表而在裏。亦非中風。名曰中氣。七情之所爲也。（宜和劑四七湯。易簡星香湯。蘇合香丸之類。）尸厥亦類中風。卒然僵仆。昏不知人。其脉沉滑者。沉爲裏。滑爲邪。邪入于裏。與血氣相并。邪入正虛。搏入藏府。入藏則邪干神舍。氣陷從陰。故身冷。藏不受邪。僅入于府。氣出從陽。故身温。即金匱要略所謂脣口青。身冷。爲入藏。即死。如身和汗自出。爲入府。即愈者是也。（宜蘇合香丸。仲

景備急丸。本事勝金丸。千金返魂湯之類。并萬氏灸百會法。）

附方

金匱千金小續命湯　通治八風五痺痿厥等疾。

以一歲爲總。六經爲別。春夏加石膏知母黄芩。秋冬加官桂附子芍藥。又於六經別藥內。隨證細分加減。自古名醫不能越此。

麻黄（去節）　人參（去蘆）　黄芩（去腐）
芍藥　甘草　川芎
杏仁（去皮尖炒）　防風（兩半）　防已
官桂（各一兩）　附子（炮去皮臍半兩）

右除附子杏仁外。爲麤末。後入二味和勻。每服五錢。水一盞半。生薑五片。煎至一盞。去滓。稍熱食前服。

附雲岐子加減法

加精神恍惚。加茯苓遠志。　心煩多驚者。加犀角屑（半兩）。　骨節間煩痛有熱者。去附子。倍芍藥。

骨節冷痛。倍用桂枝附子。　燥悶小便澁者。去附子。倍芍藥。入竹瀝一合煎。藏寒下痢者。去防已黄芩。倍附子。加白朮。（一兩。熱痢不可用附子。）　脚弱。加牛膝石斛。（各一兩）　身疼痛。加秦艽。（一兩）　腰痛。加桃仁杜仲。（各半兩）　失音加杏仁。（一兩）　如或歌或笑。無所不及者。用麻黄。（三兩）人參桂枝白朮。（各二兩）去附子防風生薑。加當歸。（一兩）　自汗者。去麻黄杏仁。加白朮。（一兩）　春加麻黄。（一兩）　夏加黄芩。（七錢）

秋加當歸。（四兩）冬加附子。（半兩）

仲景桂枝湯（見第十九）

二陳湯（見第十六）

和劑四七湯（見第十七）

易簡星香湯　治中風痰盛。服熱藥不得者。

南星（八錢）　木香（一錢）

每服四錢。水一盞。薑十片。煎七分。不拘時溫服。

蘇合香丸（見第十八）

仲景三物備急丸

大黃（一兩）　乾薑（一兩）　巴豆（一兩去皮心熬外研如脂）

右藥各須精新。先擣大黃乾薑爲末。研巴豆內末中。合擣一千杵。用爲散。蜜和丸亦佳。密器中貯之。莫令泄。〇主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死。以煖水若酒。服大豆許三四丸。或不下。捧頭起灌令下咽。須臾當差。如未差。更與三丸。當腹中鳴。即吐下便差。若口噤。亦須折齒灌之。

[illegible]

[illegible]日有忽[illegible]心失神[illegible]所謂王[illegible]則十二

本事勝金丸　治中風忽然昏倒若醉。形體昏悶四肢不收。風涎潮于上膈。氣閉不通。

生薄荷（半兩）　猪牙皂角（二兩搥碎水一升二味一處浸取汁研成膏）

瓜蒂末（一兩）　藜蘆（二兩）

硃砂（半兩研）

右將硃砂末二分。與二味末研勻。用膏子搜和

丸如龍眼大。以朱砂爲衣。溫酒化下一丸。甚者二丸。以吐爲度。得吐即醒。不醒不可治。必用方。論中風無吐法。引金虎碧霞爲戒。且如卒暴涎生。聲如引鋸。牙關緊急。氣閉不行。湯藥不能入。命在須臾者。執以無吐法可乎。但不當用銀粉藥。恐損脾。壞人四肢爾。（羅謙甫方。有粉霜鉛粉。無藜蘆。）

千金返魂湯　治卒感忤。鬼擊飛尸。諸奄忽氣絕無復覺。或已死。絞口噤不開。去齒下湯。湯入

[illegible]便閉 不[illegible]者 之法張 爲急杏 宗利氣 心桑發 自內達 以桂心 節佐以 草助子氣 壯陰清氣 氣絡邪皆 [illegible]

口不下者。分病人髮。左右捉踏肩引之藥下。復增取盡一升。須臾立醒。

麻黃（三兩）　桂心（二兩）　甘草（一兩）

杏仁（七十粒）

右㕮咀。水八升。煑取三升。分三服。（肘後方云。張仲景方。無桂心。只三味。）

灸法

灸風池。百會。曲池。合谷。風市。絕骨。環跳。肩髃。三

里等穴。皆灸之以鑿竅疎風。

性空疎令 散解故有 汗[illegible] 寒性凝斂 除斂束故 汗

風寒脈證第三十六

風傷於衛。浮緩有汗。寒傷于榮。浮緊無汗。

風爲陽邪。衛爲陽氣。風陽空疎。衛陽浮越。寒爲陰邪。營爲陰血。寒陰斂束。血陰凝泣。故風必傷衛。寒必傷營者。皆類同而象似也。空疎浮越。自當有汗而脈緩矣。（仲景桂枝湯證）斂束凝泣。自當無汗而脈緊矣。（仲景麻黃湯證）

[illegible]傷元氣 [illegible]佐使

附方

仲景桂枝湯（見第十九）

仲景麻黃湯（見第十六）

暑濕脈證第三十七

暑傷于氣。脈虛身熱。濕傷于血。脈緩細澁。

暑亦陽邪。性熱而散。傷于氣分。從其類耳。陽邪傷氣。氣必煩蒸。故身熱。氣散不斂。故脈虛。（宜清暑益氣湯。加味香薷飲之類。）濕爲水濕。血液相近。傷血亦從其類。脈緩

細澁。流衍滲着之象也。（宜敗毒散。和劑五積散之類。）

[illegible]風寒 [illegible]自 [illegible]爲害最 [illegible]能使 [illegible]去故

附方

清暑益氣湯（見第十六）

十味香薷飲（見第十六）

敗毒散（活人）

羌活　獨活　前胡

柴胡　芎藭　枳殼

白茯苓　桔梗　人參（已上各一兩）

甘草（半兩）

右爲細末。每服二錢。水一盞。入生薑二片。煎七分。溫服。或沸湯點。亦得。治傷寒溫疫。風濕風眩。拘蜷。風痰頭疼目眩。四肢痛。增寒壯熱項强睛疼及老人小兒皆可服。或瘴煙之地。或瘟疫時行。或胸多風痰。或處卑濕脚弱。此藥不可闕也。日二三服。以知爲度。頻熱口乾。加黃芩。

和劑五積散　治感冒寒邪。頭疼身痛。項背拘急。

惡寒嘔吐。或腹痛。又治傷寒發熱。頭疼惡風。無問內傷生冷。外感風寒。及寒濕客於經絡。腰脚痠疼。及婦人經血不調。或難產並治。

白芷　茯苓　半夏（湯洗七次）

當歸　芎藭　甘草（炙）

肉桂　芍藥（各三兩）　枳殼（去瓤麩炒）

麻黃（去節根）　陳皮（去白各六兩）　桔梗（去蘆十二兩）

厚朴（去粗皮薑製）　乾薑（各四兩）　蒼朮（泔浸去皮二十四兩）

右㕮咀。每服四錢。水一盞。薑三片。葱白三根。煎七分熱服。冒寒用煨薑。挾氣加茱萸。婦人調經催產。加艾醋。

傷寒脈證第三十八

傷寒熱病。脈喜浮洪。沉微濇小。證反必凶。汗後脈靜。身涼則安。汗後脈躁。熱甚必難。陽病見陰。病必危殆。陰病見陽。雖困無害。上不至關。陰氣已絕。下不至關。陽氣已竭。代脈止歇。藏絕傾危。散脈無根。形損難醫。

此種係熱病內經乃傷寒之類非冬時正傷寒之病氣化者比汗法雖同用藥人異熟讀全文自得之

素問熱論曰。今夫熱病者。皆傷寒之類也。又曰。人之傷于寒也。則爲病熱。熱雖甚。不死。觀此。則知傷寒雖是陰寒之邪。襲人生氣中。正氣與之抗拒。鬱蒸成熱。亦理勢之必然者。抗拒在表。故脈浮。鬱蒸成熱。故脈洪。熱病得此陽脈。知正氣不陷縮而能鼓發。勝邪必矣。故喜焉。若沉微濇小。是皆陰類。證陽脈陰。表病見裏。證與脈反。邪盛正衰。凶之兆也。至若汗後。邪解正復。此時脈躁盛者。亦應寧靜。身

[illegible]前一分入[illegible]之至合此[illegible]者自是了

[illegible]者元氣也[illegible]氣則生生

體自然凉和。設脉仍躁而熱加甚。是正氣已衰。邪氣更進。必難乎其爲生矣。即素問評熱論所謂有病温者。汗出輙復熱。而脉躁疾不爲汗衰。狂言不能食。病名陰陽交者是也。（一泒陽邪。陰不能復。者與陽交并爲一而不分。是陰已絶亡。故死。）陽病見陰者。見陰脉也。即上文所云熱病而得沉微澁小之類。言證與脉反。故亦危殆。陰病見陽者。見陽脉也。亦似與證相反。惟傷寒則不然。傷寒自表入裏。從陽之陰。刻刻侵傳。層層漸入。

今陰病得陽脉。是轉寒凛而變温和。起深沉而出浮淺。死陰忽作生陽。病雖困篤。自當無害。故仲景云。陰病見陽脉者生。陽病見陰脉者死。尺爲陰。尺脉上不至關。是陰已絶于下。寸爲陽。寸脉下不至關。是陽已竭于上。脉經曰。陽生于寸。動于尺。陰生于尺。動于寸。言陰陽互相生動。今兩不至關。是陰陽離異矣。素問生氣通天論曰。陰陽離决。精氣乃絶。非此之謂歟。代脉止歇者。乃藏真不能接續。其

[illegible]止[illegible]此脉[illegible]不病[illegible]死期

[illegible]分言之[illegible]傷脾宜分

[illegible]食傷胃宜

傾危可立見也。散脉無根者。謂脉外散而不歛。內無根蔕之候。若形見損傷。必難醫治。仲景平脉篇云。傷寒欬逆上氣。其脉散者死。謂其形損故也。其義謂欬逆屬肺。散脉屬心。肺金心火。火刑其金。故主死。形刑二義俱通。姑兩存之。

飲食勞倦第三十九

飲食內傷。氣口急滑。勞倦內傷。脾脉大弱。

飲食有節。五内受益。何言傷乎。傷則過于飲食。甚

至停蓄不消。而氣口急滑之脉見矣。急則不運不輸。滑則有水有物。胃中停滯而急滑應于氣口者。以氣口正在右關脾胃之前故也。（宜推之運之。如東垣枳术導滯丸。丹溪保和丸。潔古枳术丸。麯蘗枳术丸。東垣葛花解酲湯之類。）動而生陽。身固不宜久逸。東垣先生論升陽益胃湯方後云。小役形體。使胃氣與藥。得以轉運升發。此即動而生陽之義。又上古天真論云。不妄作勞。皆不言不勞。但令小役。不令過役。并不妄勞耳。若煩擾而過于勞。

第1118冊　續修四庫全書　第3　版反外

（[illegible]主四肢四[illegible]未於脾[illegible]過文甚好）

外則體倦。內則脾傷。蓋脾土合肌肉而主四肢。配陽明胃腑受納水穀。醖釀精微以灌溉四藏。為人身陽氣生化之源。過勞則肢體轉旋。四肢舉動。陽氣張亂。無往非脾氣之應。則無往非脾氣之傷矣。

脾脈反大弱者。氣張則大。氣耗則弱也。（宜補中益氣湯之類）

附方

枳术導滯丸（東垣）　治傷濕熱之物。不得旋化而作痞滿悶不安。

黃芩　茯苓　白术

黃連（各三錢）　澤瀉（二錢）　枳實（麩炒去瓤）

神麯（炒各五錢）　大黃（煨一兩）

右為末。湯浸蒸餅為丸。食遠白湯下五十丸。

丹溪保和丸（見第十七）

潔古枳术丸（見第十七）

麴蘖枳术丸（見第二十）

東垣葛花解酲湯　治飲酒太過。嘔吐痰逆。心神

（[illegible]自病苦[illegible]故重用發餘則醒溫中和脾木而已中[illegible]者勿忘）

煩亂。胸膈痞塞。手足顫搖。飲食減少。小便不利

青皮（去穰三錢）　木香（五分）　橘紅

人參　猪苓（去皮）　白茯苓（各一錢半）

神麯（炒）　澤瀉　乾薑

白术（各二錢）　白荳蔻　葛花

砂仁（各五錢）

右為極細末。每服三錢。白湯調服。但得微汗。則酒病去矣。此蓋不得已而用之。豈可恃此酗飲

（[illegible]曰人身[illegible]運用莫於脾過勞生化之源而中氣虧能方用參[illegible]耆滋培[illegible]升柴從[illegible]陽[illegible]及[illegible]上[illegible]土[illegible]中[illegible]所以生[illegible]胃氣[illegible]夏之）

成病。自損元氣。惟病酒者思之。

東垣補中益氣湯　治勞役過度。飲食失節。四肢倦怠。口乾身熱。手心蒸熱。手背不熱。時或頭痛。微惡風寒。自常汗出。或氣高而喘。身熱而煩。其脈洪大無力。或脈微細軟弱。或唯右脈虛大。或中氣虛弱而不能攝血。或中氣不足而誤用尅伐。或飲食勞倦而患瘧痢。脾胃氣虛而久不能愈。或腠理不密。易傷風寒。微邪腠肺而咳嗽不

一名 0898 册 ... 5 反二下

[illegible]東垣立[illegible]意也

巳。或病久元氣下陷。或傷恐元氣不升。或元氣虛弱。感冒風寒。不勝發表。或入房之後。勞役感冒。或勞役感冒而後入房。或陽氣不升而頭暈作眩。額上喜温而漸愈等證。不論內外病候。審是因於勞役者。以之爲主。治之法。能生長身中胃氣而行春夏之令。亦能使脾土以生肺金。爲肝心脾肺滋化源之劑。

黃耆（病甚熱甚者一錢）　人參（三分有嗽去之）　甘草（炙五分）

當歸（酒製）　橘皮　升麻

柴胡（各三分）　白朮（五分）

（薛新甫常用方耆參朮各一錢半歸一錢橘七分柴升各五分）

水二盞。棗一枚。薑一片。煎至一盞。量氣弱氣盛。臨病斟酌水盞大小。去滓。食遠稍熱服。如傷重者。不過二服而愈。

氣病脈證第四十

欲知是氣。下手脈沉。沉極則伏。濇弱久深。

[illegible]曰諸氣[illegible]皆屬於[illegible]肺病者

氣者。七氣也。七氣爲內因。故脈沉。沉之極。雖按之至骨。猶不斷絕。是爲伏脈。再或見濇之往來不利。弱之無力衰微。非七氣內傷之久。不如是也。

六鬱脈證第四十一

六鬱多沉。滑痰緊食。氣濇血芤。數火細濕。

鬱有六種。亦爲內因。鬱則不復浮暢。故脈多沉。多沉者。不盡沉也。沉而滑。則有水有物。痰停之鬱也。沉而緊。則寒實有物。食積之鬱也。沉而濇。則往來

滯濇。氣虛不响之鬱也。沉而芤。則沉下中空。血虛不濡之鬱也。沉而數。則不能炎上。火伏之鬱也。沉而細。則附骨流衍。濕着之鬱也。（大抵以越鞠丸爲主最妙。如欲分治。痰宜濟生導痰湯。重則滾痰丸。食宜丹溪保和丸。氣宜準繩氣鬱湯。血宜血鬱湯。火宜熱鬱湯。濕宜濕鬱湯之類。）

附方

越鞠丸（丹溪）　治六鬱胸膈痞滿。或吞酸嘔吐。飲食不化。此治鬱之聖藥也。

[illegible]而上焦不[illegible]以致穀味[illegible]宜而食飲[illegible]化也若朮[illegible]鬱神麴[illegible]鬱撫芎[illegible]血鬱山梔[illegible]火鬱香附[illegible]氣鬱者肉[illegible]之鬱用山[illegible]穀食之鬱[illegible]用參[illegible]藥非所以理胃中生氣而使[illegible]權自開也發是鞠[illegible]

蒼朮（米泔浸一宿炒）　神麴（炒）　撫芎

山梔（炒）、　香附（炒）　山查（淨肉）

麥芽（炒各等分）

右末、水調神麴麥芽作糊丸如梧子大。每七八十丸。白湯下。

濟生導痰湯　治痰涎壅盛。胸膈留飲。痞塞不通

半夏（湯洗七次四兩）　南星（炮去皮）　枳實（去穰麩炒）

赤茯苓（去皮）　橘紅（各一兩）　甘草（炙半兩）

右㕮咀。每服四錢。水一盞。薑十片。煎八分食遠溫服。

滾湯丸（見第十七）

丹溪保和丸（見第十七）

準繩氣鬱湯　治因求謀不遂。或橫逆之來。或貧窮所迫。或暴怒所傷。或悲哀所致。或思念太過。皆爲氣鬱。其狀胸滿脇痛。脈沉而濇者是也。

香附（童便浸一宿焙乾杵去毛爲粗末三錢）　蒼朮（炒）

[illegible]

橘紅　製半夏（各一錢半）　貝母（去心）

白茯苓（去皮）　撫芎　紫蘇葉（自汗用子）

山梔仁（炒共一錢）　甘草　木香

檳榔（各五分）　生薑（五片）

煎服。如胸脇作痛。此有血滯也。宜參血鬱湯治之。

血鬱湯　凡七情鬱結。盛怒叫呼。或起居失宜。或挫閃致瘀。一應饑飽勞役。皆能致血鬱。其脈沉

濇而芤。其體胸脇常有痛如針刺者是也。

香附（童便製二錢）　牡丹皮　赤麴（炒）

川通草　穿山甲（炒）　降真香

蘇木　山查肉　大麥芽（炒研各一錢）

紅花（七分）

水酒各一半煎。去滓。入桃仁（去皮）泥七分韭汁半盞。和勻通口服。

熱鬱湯　有陰虛而得之者有胃虛食冷物。抑遏

陽氣于脾土中而得之者。其治法皆見發熱条中。此則治夫非陰虛。非陽陷。亦不發熱而常自蒸蒸不解者也。

連翹（四錢）　薄荷葉　黃芩（各一錢五分）
山梔仁（炒二錢）　麥門冬（去心三錢）　甘草（五分）
鬱金（一錢）　瓜蔞皮穰（二錢）

竹葉七片煎服。問何不用蒼朮香附撫芎。曰。火就燥。燥藥皆能助火。故不用也。

濕鬱湯　治因雨露所襲。或嵐氣所侵。或坐臥濕地。或汗出衣衫。皆爲濕鬱。其狀身重而痛。倦怠嗜臥。遇陰寒則發。脈沉而細緩者是也。

蒼朮（三錢）　白朮（炒）　香附（炒）
橘紅　厚朴（薑汁炒）　半夏（製）
白茯苓（去皮）　撫芎　羌活
獨活（各一錢）　甘草（五分）

生薑五片。水煎。

虞摶云。一男子年二十九。三月間房事後。騎馬渡溪。遇深淵沉沒。幸得馬徙無事。連濕衣行十五里抵家。次日增寒壯熱。肢節煩疼。似瘧非瘧之狀。一醫作虛證治而用補氣血藥。服之月餘不效。又易一醫作勞瘵治。用四物湯。加知蘖地骨皮之類。及丹溪大補陰丸。倍加紫河車。服至九月。反加滿悶不食。乃顧倩有乳婦人在家。止喫人乳汁四五杯。不喫米粒。召余診視。六脈皆洪緩。重按若牢。右手爲甚。余作濕鬱處治。用平胃散。倍蒼朮。加半夏茯苓白朮川芎香附木通砂仁防風羌活。加薑煎服。黃昏服一貼。一更時又進一貼。至半夜。遍身發紅丹如癮疹。片時隨沒而大汗。索粥與稀粥二碗。由是前病除減。能食。仍與前方服三貼。後以茯苓滲濕湯。倍加白朮。服二十貼平安。

醫燈續焰卷四終

清有氣機脉有氣機擺得個中妙理未來陰狀自可說丼

醫燈續焰卷五

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖翼評
門人　朱之棟華斯　徐　提子先　校

痰病脉證第四十二

滑主多痰。弦主留飲。熱則滑數。寒則弦緊。浮滑兼風。沉滑兼氣。食傷短疾。濕留濡細。

滑爲水物兼有之象。主多痰者。以痰爲飲結成形故也。弦則弦直而斂。不能抑揚鼓蕩。是陽運之力薄。故飲留焉。（宜和劑倍术丸苓桂术甘湯之類）以飲較痰。尚未結聚。所以弦不似滑之纍纍替替有物形也。大約氣機鼓動屬熱。滑數是已。斂束屬寒。弦緊是已。鼓動浮越。風之象也。故浮滑者兼風。（宜青州白丸子法製半夏清心牛黄丸沉香墜痰丸清氣化痰丸之類）動疾沉下。氣之鬱也。故動滑者兼氣。停食于中。則氣爲食礙。不能透達。脉爲之短。短則氣遏于内。勢反成疾。短疾之脉。與滑近似。故滑亦主食也。（宜丹溪保和丸之類）濕爲陰邪。留必緩滲。非若陽邪之變動迅疾。故脉亦濡細耳。（宜仲景澤瀉湯之類）

附方

和劑倍术丸（見第二十二）

仲景苓桂术甘湯（見第十六）

和劑青州白丸子　治男婦手足癱瘓。風痰壅盛。嘔吐涎沫。及小兒驚風。婦人血風。

半夏（生七兩水浸洗）　南星（生三兩）　白附子（生二兩）

川烏（生半兩去皮臍）

右爲末。以生絹袋盛。於井花水内擺出。如未出者。更以手揉出。如有滓。更研再入絹袋。擺盡爲度。置磁盆中。日晒夜露。至曉撇去舊水。別用井水攪。又晒至來日早。再換新水。攪如此法。春五日。夏三日。秋七日。冬十日。去水晒乾。後如玉片。研細。以糯米粉煎粥清丸菉豆大。薑湯下二十

[illegible]日人身[illegible]全在脾宜布倘氣制通便利治半夏爲之要藥痰氣自則嘔酸喘不足慮也

丸。無時　如癱瘓風。溫酒下。　小兒驚風。薄荷湯下五丸。

法製半夏　治一切痰嗽。或嘔吐冷飲酸水。風痰痰癖。胸膈否悶。喘促等證。

半夏（揀大者五斤）　明礬（一斤四兩搗碎）　生薑（一斤四兩搗碎）

右三味。用泉水共浸七日。撩去半夏皮。加朴硝二斤八兩。換水浸七日。加猪牙皂角切片一斤四兩。浸七日。此後用泉水。每日一換。至四十九

日。撈起晒乾爲末。每用二錢。煎蘿蔔湯調下。小兒諒減之。

[illegible]贊曰此丸爲世所重然[illegible]藥品精新[illegible]如法方[illegible]效

和劑清心牛黃丸　治諸風緩縱不隨。語言蹇澁。心怔健忘。恍惚去來。頭目眩冒。胸中煩鬱。痰涎壅塞。精神昏憒。又治心氣不足。神志不定。驚恐悲憂。虛煩少睡。喜怒無時。或發狂顛。神情昏亂。

白芍藥　麥門冬（去心）　黃芩

當歸（去苗）　防風（去苗）　白朮（各一兩半）

柴胡　桔梗　芎藭

白茯苓（去皮）　杏仁（去皮尖雙仁麩炒黃別研各一兩二錢半）

神麴（研）　蒲黃（炒）　人參（去蘆各二兩半）

羚羊角（屑）　麝香（研）　龍腦（研各一兩）

肉桂（去粗皮）　大豆黃卷（碎炒）　阿膠（碎炒各一兩七錢半）

白斂　乾薑（炮各七錢半）　牛黃（研一兩二錢）

犀角（屑二兩）　雄黃（研飛八錢）　乾山藥（七兩）

甘草（剉炒五兩）　金箔（一千二百片內四百片爲衣）

大棗（一百枚蒸熟去皮核研成膏）

右除棗。杏仁。金箔。二角屑。及牛黃雄黃。腦麝外。共爲細末。入餘藥和勻。用煉蜜與棗膏爲丸。每兩作十丸。金箔爲衣。每服一丸。溫水化下。食後服。小兒驚癇。酌量多少。竹葉湯化下。

沉香墜痰丸　治宿食不消。咽膈不利。欬嗽痰涎。頭目昏暈。嘔逆惡心。胸膈不快。

沉香　木香（各二錢）　青皮（去白二錢半）

半夏麯（二兩）　檳榔（大者三枚用麯裹煨熟）

右為細末。用生薑汁浸蒸餅為丸。如小菉豆大。每服二十丸。不拘時薑湯下

清氣化痰丸　順氣快脾。化痰消食。

半夏　南星（去皮臍）　皂角（切）

白礬　乾薑（各四兩）

右先將白礬等三味。用清水五碗。煎取水三碗。却入半夏二味浸兩日。再煑至半夏南星無白

點為度。晒乾。

青皮（去穰）　陳皮　真蘇子（炒）

蘿蔔子（炒另研）　杏仁（去皮尖炒研）　葛根

神麯（炒）　麥蘗（炒焦）　山查（去核）

香附（各二兩）

右為末。蒸餅丸桐子大。每服五七十丸。臨卧食後茶湯下。

丹溪保和丸（見第十七）

[illegible]故　[illegible]入　[illegible]　[illegible]大[illegible]　[illegible]兼見立　[illegible]敗矣

仲景澤瀉湯（見第二十二）

瘧疾脈證第四十三

瘧脈自弦。弦數者熱。弦遲者寒。代散者折。

素問瘧論曰。夫痎瘧皆生于風。蓋風屬木而應春。弦是其本脈。生于風。則象風。故脈自弦。又瘧之作也。邪正交爭。或寒而熱。熱而寒。寒熱往來。正邪出入。樞主于中。經云。少陽為樞。少陽亦應乎春。故脈亦當弦。弦而兼數。數為熱。是知瘧之多熱也。（多熱多汗

、宜小柴胡湯或加知母石膏黃連之類則渴欲冷飲脈數大者宜白虎湯之類）甚。弦而兼遲。遲為寒。是知瘧之多寒也。（熱少寒多甚或厥冷嘔逆宜二陳薑桂柴胡白朮草果之類雖消于亦不妨用但宜細審其證則百發百中矣）若代止而又散。乃正氣虛脫。不續不斂之象。邪盛正衰。定主凶折。（此屬危殆之證若欲用藥非大補氣血如參耆炙草朮附薑桂之類不能挽回于萬一者）

附方

仲景小柴胡湯　傷寒論云。傷寒五六日。中風。往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或

[illegible]

胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞕。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。小柴胡湯主之。此半表半裏。寒熱往來之藥也。今用治瘧之寒熱往來者皆効。

柴胡（半斤）　黃芩　人參

甘草（炙）　生薑（各三兩）　半夏（半斤）

大棗（十二枚）

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。若胸中煩而不嘔者。去半夏人參。加栝蔞實一枚。若渴者。去半夏。加人參合前成四兩半。加栝蔞根四兩。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥三兩。若脇下痞鞕。去大棗。加牡蠣四兩。若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂枝三兩。溫覆取微汗愈。若欬者。去人參大棗生薑。加五味子半升。乾薑三兩。

[illegible]

仲景白虎湯（加人參名人參白虎湯）　傷寒論云。傷寒脉浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。又云吐下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。大抵表裏皆熱。在表多汗。非閉鬱之熱。在裏渴煩。非入府堅實之熱。轉夏爲秋之劑也。

知母（六兩）　石膏（一斤）　甘草（炙二兩）

粳米（六合）

右四味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升日三。

泄瀉脉證第四十四

泄瀉下利。沉小滑弱。實大浮洪。發熱則惡。

瀉痢見于下部。時時唯出。無論因之內外。總屬傷陰耗裏之虛證。沉小滑弱。乃爲相宜。（滑乃有餘似乎相反。然寔）（共有水液而不因瀉痢枯涸耳。大約宜五苓散。平胃散。東垣升陽除濕湯。理中湯。五味子散。四神丸）（七味白朮散。痢則芍藥湯。香連丸。益元散。敗毒東垣芍藥黃芩湯。和劑真人養藏湯。金匱桃花湯）

（白頭翁湯。和劑參苓白朮散。俱當審寒熱虛實選用之。）若實大浮洪則惡矣。實大與虛反。浮洪與爽反。邪盛正衰。不言可喻。再加發熱。則陰氣彌傷而裏氣彌耗。不至躁亡不已也。

附方

五苓散（見第十七）

平胃散　治脾胃不和。不思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。口苦無味。胸滿短氣。嘔噦噫氣吞酸。面黃

肌瘦。體倦節痛。常自利。常發霍亂。反胃等證。

蒼朮（去粗皮米泔浸五斤）　陳皮（三斤二兩去白）　甘草（剉炒三十兩）

厚朴（去粗皮薑製炒三斤二兩）

右爲細末。每服二錢。水一盞。薑三片。棗二枚。同煎七分。去滓溫服。或去薑棗帶熱服。空心食前。入鹽一捻。沸湯點服亦得。常服調氣煖胃。化宿食。消痰飲。辟風寒冷濕不正之氣。

東垣升陽除濕湯　治脾胃虛弱。不思飲食。腸鳴

[illegible]賢曰開此
[illegible]方出自龍宮
[illegible]有加白朮丹
參白蒺梨各
二兩隨症用
別所治甚廣
[illegible]志者留多
[illegible]修合以濟
[illegible]人

腹痛。泄瀉無度。小便黃。四肢困弱。

甘草　大麥蘗麵（如胃寒腹鳴者加）

陳皮　豬苓（已上各三分）　澤瀉

益智仁　半夏　防風

神麴　升麻　柴胡

羌活（已上各五分）　蒼朮（一錢）

右㕮咀作一服。水三大盞。生薑三片。棗二枚。同煎一盞。去滓空心服

理中湯（見第十七）

二神丸　治脾腎虛弱。侵晨五更作瀉。全不思食或食而不化。大便不實神效。

破故紙（炒四兩）　肉豆蔻（生用二兩）

用紅棗四十九枚。生薑四兩。同煑熟。去薑及核。取肉和藥丸如梧子。每服五七十丸。空心湯下。

五味子散　治腎泄。在侵晨五更作瀉。或大便

實。不能去後。
五味子（炒二兩）　吳茱萸（炒五錢）
爲末。每服二錢。白湯調服。爲丸更妙。
四神丸。　治脾腎虛弱。大便不實。飲食少思。
即二神丸。五味子散合丸。空心食前服。
錢氏七味白术散　治中氣虧損。津液短少。口舌
乾渴。或口舌生瘡。不喜冷飲。或吐瀉後口乾。最
宜服。

人參　白术　木香
白茯苓　甘草　藿香（各五分）
乾葛（一錢）
右水煎服
芍藥湯　治便血後重。經曰。溲而便膿血。知氣行
而血止也。行血。則便膿自愈。調氣。則後重自除
白芍藥（二兩）　當歸　黃連
黃芩（各五錢）　檳榔　木香

甘草（各二錢）　桂（二錢半）
右㕮咀。每服五錢。水煎服。痢不減。加大黃。
香連丸　治痢疾。并水瀉。暑瀉。甚效。
黃連（十二兩。另用吳茱萸十兩。爲末。二味熱水拌和入磁器。置熱湯中。頓一日。同炒至黃
連紫色。去茱用連。）
爲末。每四兩。配木香一兩。醋打米糊爲丸如梧
子大。每服三十丸。白湯下。久痢中氣下陷。以補
中益氣湯下。中氣虛者。四君子加薑桂湯下。

益元散（一名天水散　一名六一散）　治傷寒表裏俱熱。煩渴口
乾。小便不通。及霍亂吐瀉。下利腸澼。五淋。及婦
人產難。催生下乳。
桂府滑石（膩白者水飛六兩）　粉草（去皮一兩研爛）
右爲極細末。每服三錢。白湯調下。新水亦得。加
薄荷末少許。名雞蘇散。加青黛末少許。名若玉
散。治療並同。
敗毒散（見第三十七）

東垣芍藥黃芩湯　治洩痢腹痛。或後重。身熱。久不愈。脉洪疾者。及下痢膿血稠粘

黃芩　白芍藥（各一兩）　甘草（五錢）

右㕮咀。每服一兩。水一盞半。煎一盞。溫服無時。如痛。加桂少許。

和劑真人養藏湯　治大人小兒。冷熱不調。下痢赤白。或便膿血。有如魚腦。裏急後重。臍腹疞痛。及脫肛墜下。酒毒濕毒。便血並宜服。

人參　白朮　當歸（各六錢）

白芍藥　木香（各一兩六錢）　甘草

肉桂（各八錢）　肉果（麵裹煨半兩）　御米殼（蜜炙二兩六錢）

訶子肉（一兩二錢）

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。煎八分。去滓。食前溫服。忌酒麵生冷腥膩之物。滑泄夜起久不差者。加附子四片。

金匱桃花湯　治下痢膿血

赤石脂（一斤一半剉一半篩末）　乾薑（一兩）

粳米（一升）

右先以水七升。煮米薑令熟。去滓。溫七合。內石脂末方寸匕。日三服。若一服愈。勿服。

金匱白頭翁湯　治熱痢膿血

白頭翁（二兩）　黃連　黃蘗

秦皮（各三兩）

右以水七升。煮二升。去滓溫服一升。不愈更服。

和劑參苓白朮散　治久瀉痢。或大病後調理。消渴者尤宜。

人參　乾山藥　蓮肉（去心）

白扁豆（去皮薑汁浸炒各一斤半）　於白朮（二斤）

桔梗（炒黃色）　砂仁　白茯苓（去皮）

薏苡仁　炙甘草（各一斤）

右爲細末。每服二錢。米湯調下。或加薑棗煎服。或棗肉和丸如桐子大。每服七十丸。空心米飲

[illegible]之上口爲[illegible]門言飲食至此賁起而[illegible]以上焦主[illegible]也胃之下口爲幽門言[illegible]食至此已[illegible]而下幽隱[illegible]下焦主出也若上無

[illegible]陽氣運化以[illegible]納下無陰[illegible]氣傳送以主[illegible]俱屬胃海[illegible]乾枯氣血兩[illegible]衰所由來者[illegible]矣故弦澁[illegible]相搏之脉見[illegible]總用養胃生[illegible]然而十難[illegible]生者實若[illegible]衰老者或因[illegible]飲食過多胃[illegible]一時難運[illegible]則上衝嘔吐[illegible]受物故然

下，或煉蜜丸如彈子大，湯化下。

嘔吐反胃脉證第四十五

嘔吐反胃，浮滑者昌，弦數緊濇，結腸者亾。

嘔吐有聲有物，反出于胃，上焦之病也。宜（仲半夏湯，生薑半夏湯。二陳湯之類。）上焦，則脉應浮。有物，則脉應滑。浮滑爲陽，飲食之能納能運而不反者，陽之力也。故云浮滑者昌。若得弦數緊濇之脉，則逆矣。蓋弦狀陰飲，陽運衰微。又弦爲肝木之脉，嘔吐屬胃，胃者土

也。木來乘土，土將受剋。金匱要略云：脉弦者虛也。胃氣無餘，亦懼胃土虛而見肝木之脉也。宜（平肝補脾。如四君子湯，六君子湯加防風白芍之類。）數則爲熱，熱當消穀而反吐穀者，乃知數爲虛數。虛則不運，數則氣促，嘔吐不止。胃將由此而敗。金匱要略云：陽氣微，膈氣虛，脉乃數。宜（補中兼清虛熱。如六君子湯加竹茹生薑茱萸製黃連之類。）緊則爲寒。寒則無陽以運，故上出而嘔吐。宜（溫中散寒。如理中湯、藿香安胃散之類。）濇脉枯澁，吐亡津液之所致也。金匱要略所謂朝

[illegible]出脉亦有[illegible]方浮者此[illegible]恭證治以[illegible]氣緊爲胸[illegible]自愈

食暮吐，暮食朝吐，宿穀不化，名曰胃反。脉緊而濇，其病難治者是也。宜（補氣而生津。如四君子湯，加黃耆五味子之類。）夫胃爲水穀之海。若再加大腸秘結，是全無陰液，而水穀之海枯矣。水穀之海枯而能生者，未之有也。（翻胃糞如羊屎者不治）

附方

仲景大半夏湯（見第二十）

仲景生薑半夏湯　要略云：病人胸中似喘不喘，

似嘔不嘔，似噦不噦，胸中憒憒然無奈者，生薑半夏湯主之

半夏（半升）　生薑汁（一升）

右以水三升，煮半夏取二升，內生薑汁，煮取一升半，小冷，分四服，日三夜一。服止，停後服。

二陳湯（見第十六）

四君子湯（見第十六）

六君子湯（見第十六）

[illegible]脫者後天[illegible]穀氣可[illegible]故生漸絕[illegible]元天眞元[illegible]元不可續[illegible]死日漸墜[illegible]元暴昏[illegible]穀氣輸亦

仲景理中湯（見第十七）

藿香安胃散（見第二十）

霍亂脉證第四十六

霍亂之候。脉代勿訝。厥逆遲微。是則可怕。

仲景云。嘔吐而復下利。名曰霍亂。（宜仲景通脉四逆湯。理中圓。四逆加人參湯之類）

霍亂者。揮霍撩亂。不能自持。陰陽乖離。上下亟奪。是時脉或代止。勿驚訝也。乃卒吐暴下。穀神頓委。暫不接續故耳。若手足厥冷。脉復遲微

是則大爲可怕。蓋手足爲諸陽之本。遲微爲純陰之脉。陽衰陰盛。眞元漸絕之象也。是故暴脫者能漸生。而漸絕者。又何能暴起哉。（暴脫者。如日中風雨。風雨過而日仍明。漸絕者。如日漸西墜。墜則終此日矣。九死之證也。設欲用藥救治。非附子理中湯。四逆加人參湯之類不可。）

附方

仲景通脉四逆湯　傷寒論云。少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脉微欲絕。身反不惡寒。其

[illegible]曰四肢[illegible]陽之本[illegible]以四肢厥[illegible]微陽氣之[illegible]然亦有[illegible]而厥者[illegible]是而非[illegible]死關頭[illegible]

人面赤色。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止脉不出者。通脉四逆湯主之。今用治霍亂吐利。脉不出者亦宜。

甘草（二兩炙）　附子（大者一枚生用去皮臍破八片）

乾薑（三兩强人可四兩）

右以水三升。煮一升二合。去滓分溫再服。其脉漸出者愈。

仲景理中圓（見第十七）

仲景四逆加人參湯　治一切虛寒亡陽。下利四肢厥逆等證。

甘草（二兩炙）　乾薑（一兩半）　人參（一兩）

附子（一枚生用去皮破八片）

右以水三升。煮一升二合。去滓分溫再服。强人可大附子一枚。乾薑三兩。

附子理中湯（見第十七）

欬嗽脉證第四十七

欬嗽多浮。聚胃關肺。沉緊小危。浮濡易治。

欬嗽不一。强半爲風寒痰飲。風寒則傷于皮毛。宜（汗解。如麻黃湯參蘇飲之類。）痰飲則停于胸胃。（宜二陳湯。仲景小青龍湯。扳華半夏溫肺湯之類。）皮毛者。肺之合也。邪襲其合肺氣應之。故上逆而爲欬。胃居肺下。寒冷飲停滯于中。上射于肺。肺氣逆之。故亦上逆而爲欬。經云。形寒飲冷則傷肺。（痰飲寒濕之氣。上熏于肺。肺不清淨。咳嗽從生。）形寒固傷于外。而冷飲寒痰。則皆聚于胃也。肺居最上。皮毛最表。故

此症危在脈。亦若沉緊。尚可溫補。小則正氣衰微。精不[illegible]者攻不能受。故難治

脈多浮耳。沉緊小危者。沉則邪入裏。緊則寒不散。小則正氣衰。均主病危。若浮而濡。浮則在表。濡受邪輕。故云易治。

[illegible]自邪寒[illegible]入乃在中[illegible]實攻積藥[illegible]大爲善法

附方

麻黃湯（見第十六）

參蘇飲　治痰積中脘。暈眩嘈雜。怔忡驚逆。或痰停關節。手足𨅊曳。口眼喎斜。半身不遂。嘔吐惡心。頭疼發熱。及感冒風邪。鼻塞增寒欬嗽等證。

人參　紫蘇葉　前胡

半夏（製）　葛根（各一錢）　茯苓

枳殼　桔梗　陳皮（各八分）

木香（四分）

加葱白生薑煎服

二陳湯（見第十六）

仲景小青龍湯（見第十六）

扳粹半夏溫肺湯　治心腹中脘痰水冷氣。心下汪洋嘈雜。常多涎唾。口中清水自出。脇肋急脹痛。不欲食。此胃氣虛冷所致。其脈沉弦細遲。

旋覆花　人參　細辛

桂心　甘草　陳皮

桔梗　芍藥　半夏（製各半兩）

赤茯苓（七錢半）

右㕮咀。每服四錢。生薑三片。水煎食後服

喘急脈證第四十八

[illegible]所以載氣[illegible]肩息爲氣[illegible]形者有餘[illegible]衛傷不足[illegible]爲形不能[illegible]氣仲景云[illegible]逆上氣脈[illegible]者死爲其[illegible]損故也

喘急息肩。浮滑者順。沉濇肢寒。散脈逆證。

呼吸疾速曰喘。氣息短促曰急。息肩者。肩隨息動。吸則提氣。呼則舒氣。出入不利。故肩亦爲之聳動耳。脈浮滑者。浮爲陽。爲表。爲風。（宜汗解。仲景麻黃湯或香蘇散。及枳桔桑杏之類）滑爲陽。爲痰。爲食。（痰宜枳桔二陳湯。蔞仁蘇子。及三子養親湯之類。食宜丹溪保和丸、平胃散、和劑小七香丸。或瓜蒂散吐之。）或因外邪閉遏。或爲內物阻撓。致令機關壅滯。胸膈否塞。而爲喘急息肩者有矣。苟能散其邪。則機關可利。推其物。則

否塞可通。故曰順。脈沉濇者。沉爲陰。爲裏。爲下部。濇爲陰。爲虛。乃元氣不能接續。不能舒徐以達上焦。不能達上。又豈能充四肢乎。是以喘急息肩而四肢又寒也。若更見散脈。則元真將隨喘而散亡必矣。故曰逆。（脈濇肢寒。陽退陷而不達。喘息脈散。陽散越而脫根。）

附方

仲景麻黃湯（見第十六）

香蘇散（寶鑑）　治水氣虛腫。小便赤濇。

陳皮（去白一兩）　防己　木通

紫蘇葉（各半兩）

右爲末。每服二錢。水二盞。生薑三片煎至一盞去滓食前溫服。

枳桔二陳湯（即二陳加枳殼桔梗）

三子養親湯　治年高痰盛氣實。并氣壅哮喘等證。

紫蘇子（沉水者）　白芥子　蘿蔔子（各三錢）

右水二鍾。薑二片。煎七分。食後服。

丹溪保和丸（見第十七）

平胃散（見第四十四）

和劑小七香丸（見第十七）

仲景瓜蒂散

瓜蒂（二十個）

右剉以水一升。煮取五合。去滓頓服。

欬病脈證第四十九

向可温若無火即火候所云之不熱矣

病熱有火。洪數可醫。沉微無火。無根者危。

病熱而有火證。是火病也。火則脈應洪數。脈證相宜。故可醫治。若得沉微之陰脈。是無火矣。無火而仍病熱。則知爲無根之陽。虛見熱象也。故主危殆。

清心蓮子飲（和劑） 治心虛有熱。小便赤濁。

黃芩　麥門冬（去心）　地骨皮

車前子　甘草（炙各一錢半）　石蓮肉

白茯苓　黃耆（蜜炙）　人參（各七分）

水二盞煎一子才中沉冷。空心温服。發熱加柴胡薄荷。

導赤散（錢氏） 丹溪云。導赤散。正小腸藥也。

生地黃　木通　甘草（各等分）

右同爲末。每服三錢。水一盞。入竹葉七片。同煎五分。食後温服。

錢氏瀉黃散 治脾家鬱熱口甜口瘡喜飲煩躁

藿香（七錢）　山梔仁（一兩）　石膏（半斤）

甘草（二兩）　防風（四兩）

右剉同蜜酒微炒香。爲細末。每服二錢。水一盞。煎清汁飲。

瀉青丸

當歸（去蘆焙稱）　草龍膽（焙稱）　川芎

梔子　川大黃（煨）　羌活

防風（去蘆）

右各等分爲末。煉蜜爲丸雞頭大。每服一丸。煎

竹葉湯。同砂糖温水化下。

局方八正散 治大人小兒。心經邪熱。一切藴毒。咽乾口燥。大渴引飲。心忪面赤。煩躁不寧。目赤睛疼。唇焦鼻衄。口舌生瘡。咽喉腫痛。又治小便赤澁。或癃閉不通。及熱淋血淋。並宜服之。赤氣分藥也。

瞿麥　萹蓄　車前子

滑石　甘草（炙）　山梔子仁

木通　大黃

右爲散。每服二錢。水一盞。入燈心廿莖。煎七分去滓食後臨卧温服小兒量與之

左金丸　治肝火脇肋刺痛。或發寒熱。或頭目作痛。或大便不實。小便淋秘。或小腹疼痛。一切肝火之症。以此主治。

黃連（六兩）　吳茱萸（湯煮片時一兩）

粥和丸。陳皮白术湯送服。

河間防風通聖散　表裏氣血總清之藥

防風　川芎　當歸

芍藥　大黃　薄荷葉

麻黃　連翹　芒硝（盆硝是已上各半兩）

石膏　黃芩　桔梗（各一兩）

滑石（三兩）　甘草（二兩）　荊芥

白术　梔子（各二錢半）

爲末。每服五錢。水煎食遠服。

升陽散火湯　男婦四肢發熱。肌熱。筋痺熱。骨髓中熱發如火。燎於肌膚。捫之烙手。此證多因血虛而得。或胃虛過食冷物。抑遏陽氣於脾土。火鬱發之。此方是也。

升麻　葛根　獨活

羌活（各五錢）　防風（二錢半）　柴胡（八錢）

甘草（三錢炙二錢生）　人參　白芍藥（各五錢）

右㕮咀。每服半兩。或一兩。水煎稍熱服。

陽毒升麻湯　治傷寒雜病。汗吐下後變成陽毒。發狂譫妄。喉痛下利。

升麻（五錢）　犀角　射干

黃芩　人參　甘草（各二錢五分）

右㕮咀。水煎服。

清胃湯　治醇酒厚味。脣齒作痛。或齒齦潰爛。連頭面頸項作痛。

黃連（一錢五分）　當歸　生地黃

牡丹皮（各一錢）　升麻（二錢）

右水煎服

千金黑奴丸　治大熱陽毒。發狂發斑。煩躁大渴。

黄芩　釜底煤　芒硝

竈突墨　梁上塵　小麥奴

麻黄　大黄（各一兩）

右爲末。煉蜜丸如彈大。新汲水化服。不定再服半丸。飲水盡。足當發寒。寒已汗出乃差。未汗。再服半丸。不大渴者。不可與。

瀉白散　治肺火欬喘。面紅。喉咽不清。

地骨皮（二錢）　桑白皮（二錢）　甘草（五分）

爲末。水一盞煎六分服。

當歸龍薈丸　治肝經實火。大便秘結。小便澁滯。或胸膈作痛。陰囊腫脹。凡屬肝膽實熱。並宜用之。

當歸　龍膽草　梔子仁

黄連　黄芩（各一兩）　大黄

蘆薈　青黛（各五錢）　木香（二錢五分）

麝香（五分另研）

爲末。炒神麯糊丸。每服二十丸。薑湯下。

骨蒸脉證第五十

骨蒸發熱。脉數而虚。熱而濇小。必殞其軀。

骨蒸發熱者。熱自骨起。蒸騰于外。內傷虚勞之熱也。脉數而虚。是其本然。葢以數爲熱。虚爲勞耳。若蒸熱而見濇小之脉。濇則精血少。小則元氣衰。真陰日損。邪火日增。不至于殞軀不已也。（方參看勞極門）

醫燈續焰卷五終

醫燈續焰目錄

卷之六

勞極脉證第五十一

四君子湯（見第十六）　補中益氣湯（見第三十九）
參术膏　四物湯（見第二十一）
六味地黃丸（見第十六）　八珍湯（見第十六）
聖愈湯　濟生續斷湯
木瓜散　鹿角丸

保命金剛丸　丹溪虎潛丸
保命黑地黃丸　資生丸（即大啓脾丸）
楊氏還少丹　龜膠
鹿膠　保和丸（見第十七）
平胃散（見第四十四）　元戎逍遙散
腎着湯（見第二十一）　金匱腎氣丸（見第十六）
寶鑑天真丹　小青龍湯（見第十六）
麻黃湯（見第十六）　夢授天王補心丸

朱砂安神丸（見第十九）　朱雀丸
和劑人參養榮湯

失血脉證第五十二

瘀血脉證第五十三

桃仁承氣湯（見第二十）　仲景大黃䗪虫丸

精濁脉證第五十四

知檗八味丸　河間秘真丸
猪肚丸　清心蓮子飲（見第四十九）

萆薢分清飲　六味地黃丸（見第十六）
導赤散（見第十七）　六一散（見第四十四）

三消脉證第五十五

金匱猪苓湯　仲景人參白虎湯（見四十三）
子和加減三黃丸　和劑凉膈散
和劑酒煮黃連丸　六一散（見第四十四）
大黃黃連瀉心湯　六味地黃丸（見第十六）
固本丸　知檗八味丸（見第五十四）

小便淋閟脉證第五十六

局方石韋散　三因石燕丸
瞿麥湯　沉香散
鹿角霜丸　兎絲子丸
黄耆湯　補中益氣湯（見第二十九）
立効散　濟生小薊子飲
肉蓯蓉丸　八味地黄丸（見第十六）
六一散（見第四十四）　本事火府丹

導赤散（見第十七）　局方八正散（見第四十九）

卷之七

大便燥結第五十七

局方麻仁丸（局方即和劑）　四物湯（見第二十一）
東垣導滯通幽湯　得効五仁丸
得効皂莢丸　聖惠搜風順氣丸
濟生蓯蓉潤腸丸　大承氣湯（見第十七）
小承氣湯（見第十七）　四君子湯（見第十六）
八珍湯（見第十六）　十全大補湯（見第十六）
六味地黄丸（見第十六）　八味地黄丸（見第十六）
六磨湯　得効橘杏丸
蘇麻粥　黄耆湯
六一散（見第四十四）　局方半硫丸
枳實理中湯（見第十七）

癲狂脉證第五十八

靈苑辰砂散　歸脾湯

人參琥珀丸　補中益氣湯（見第三十九）
仲景四逆散　鐵甕申先生交感丹（見首）
（附降氣湯）　桃仁承氣湯（見第三十）
代抵當丸（見第二十）　逍遥散（見第五十一）
天王補心丸（見第五十一）　朱雀丸（見第五十一）
白虎湯（見第四十三）　大承氣湯（見第十七）
小承氣湯（見第十七）　凉膈散（見第十九）
紫雪　滚痰丸（見第十七）

琥珀壽星丸　瀉青丸（見第四十九）
癇病脈證第五十九
集驗龍腦安神丸（見第十九）
河間犀角丸（見第二十五）　清心牛黃丸（見第四十二）
神應丹　三聖散
大承氣湯（見第十七）
喉痺脈證第六十
和劑甘桔湯　三因荆芥湯

和劑解毒雄黃丸　寶鑑碧玉散
寶鑑開關散　瓜蒂散（見第四十八）
寶鑑備急如聖散　咽喉備急丹
寶鑑增損如聖散　瑞竹羅青散
燒鹽散　四七湯（見第四十七）
四味湯　白礬散

卷之八

眩暈脈證第六十一

芎藭散　東垣羌活湯
涼膈散（見第十九）　防風通聖散（見第四十九）
東垣半夏白朮天麻湯（見第二十二）
滚痰丸（見第十七）　玉液湯
四物湯（見第二十一）　補中益氣湯（見第三十九）
頭痛脈證第六十二
桂枝湯（見第十九）　玄珠茶調散（見第二十二）
麻黃湯（見第十六）　九味羌活湯（見第十六）

瀉青丸（見第四十九）　二仙散
對金散　神芎丸（見第十七）
涼膈散（見第十九）　奇効芎朮湯
半夏白朮天麻湯（見第二十二）
瓜蒂散（見第四十八）　紅豆散
局方玉壺丸　補中益氣湯（見第三十九）
六君子湯（見第十六）　四物湯（見第二十一）
逍遙散（見第五十一）　六味地黃丸（見第十六）

八味地黃丸（見第十六）

心腹痛脈證第六十三

二陳湯（見第十六）　丹溪海蛤丸

前胡半夏湯　正傳加味枳朮丸

香砂平胃散（見第四十四）　香蘇散（見第四十八）

參蘇飲（見第四十七）　五積散（見第三十七）

蘇合香丸（見第十八）　統旨清中湯

越鞠丸（見第四十一）　左金丸（見四十九）

黃耆建中湯（見第二十一）　補中益氣湯（見第三十九）

六君子湯（見第十六）　金匱九痛丸

神効剪紅丸　蕪荑散　一

仲景烏梅圓　萬應丸

集効丸　仲景備急丸（見第三十五）

紫金錠（即玉樞丹）　四七湯（見第十七）

枳桔二陳湯（見第四十八）　平胃散（見第四十四）

東垣溫胃湯　來復丹（見第十七）

理中湯（見第十七）　東垣天台烏藥散

半硫丸（見第五十七）　烏藥順氣散

鐵甕申先生交感丹（見第五十八）

溫膽湯（見第二十一）　小柴胡湯（見第四十三）

此勞五藏疲勞也

醫燈續焰卷六

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖翼評
門人　王元洪樞伯
　　　蔣式金子如　校

勞極脉證第五十一

勞極諸虛。浮耎微弱。土敗雙弦。火炎急數。

勞極者。五勞六極也。巢氏病原云。五勞者。一曰志勞。二曰思勞。三曰心勞。四曰憂勞。五曰瘦勞。（瘦當是肝勞）又云。肺勞者。短氣而面腫。鼻不聞香臭。肝勞者。面目乾黑。口苦。精神不守。恐畏不能獨卧。目視不明。心勞者。忽忽喜忘。大便苦難。或時鴨溏。口內生瘡。脾勞者。舌苦直。不得咽唾。腎勞者。背難以俛仰。小便不利。色赤黃而有餘瀝。莖內痛。陰濕囊生瘡。小腹滿急。此五勞各見五藏氣化及經絡諸證。亦甚明顯。但與前五勞。不甚符合。姑存此。俟再考也。

[illegible]血脈肌[illegible]五[illegible]不足[illegible]克于所[illegible]虛則氣[illegible]于所合爲[illegible]也皆兼有[illegible]故云六極

六極者。一曰氣極。令人內虛。五藏不足。邪氣多。正氣少。不欲言。（宜四君子湯補中益氣湯參朮膏之類）二曰血極。令人無顏色。眉髮墮落。忽忽喜忘。（宜四物湯六味丸八珍湯聖愈湯之類）三曰筋極。令人數轉筋。十指爪甲皆痛。苦倦。不能久立。（宜四物湯聖愈湯劑生續斷湯木瓜散之類）四曰骨極。令人痠削。齒苦痛。手足煩疼。不可以立。不欲行動。（宜六味丸鹿角丸保命金剛丸丹溪虎潛丸之類）五曰肌極。令人羸瘦無潤澤。飲食不生肌膚。（宜四君子湯保命黑地黃丸資生丸之類）六曰精極。令人少氣。噏噏然內虛。五藏氣不足。髮毛落。悲傷喜忘。（宜六味丸還少丹鹿膠之類）是卽五藏所合之病。虛損而至于極處者也。腎則多一精極。故爲六極。其證與五藏配合。甚爲有理。此巢氏之三昧論也。諸虛者。言一切虛損不足。卽五勞六極。更有七傷。俱該在內。巢氏云七傷者。一曰陰寒。二曰陰萎。三曰裏急。四曰精連連。五曰精少。陰下濕。六曰精淸。七曰小便苦數。臨事不卒。又云七傷者。一曰大飽傷脾。脾傷善噫。

五分[illegible]則[illegible]

欲卧面黄、宜（資生丸、保和丸、平胃散之類）二曰大怒氣逆傷肝、肝傷少血目闇、宜（四物湯、元戎逍遥散之類）三曰强力舉重、久坐濕地傷腎。腎傷少精、腰背痛、厥逆下冷。宜（黑地黄丸、腎着湯、八味丸、寶鑑天真丹之類）四曰形寒寒飲傷肺。肺傷少氣。欬嗽鼻鳴。宜（小青龍湯、麻黄湯之類）五曰憂愁思慮傷心、心傷苦驚喜忘善怒。宜（天王補心丸、朱砂安神丸、朱雀丸之類）六曰風雨寒暑傷形、形傷髮膚枯夭、宜（人參養榮湯之類）七曰大恐懼不節傷志。（言大恐懼而不節于慾也）志傷恍惚不樂。宜（天王補心丸、安神丸之類）是

云七傷、亦合于五藏。但多一形志。故云七傷。較前所云七傷、此為得理。蓋前七傷、大抵俱屬腎證。人身感疾、觸處可傷、豈獨一腎、若云腎有七傷則可。正文不言七傷而註錄者、欲其便于查考耳。夫勞極損傷。氣血日耗。形體漸衰、所見之脉。隨病呈象、如尜虛之浮、不鼓之爽、欲絶之微。無力之弱。雖云病脉、然與病猶相宜也。至若雙弦。乃知土敗。急數定為火炎。蓋弦為肝木。雙弦則木太盛。久、病之土

病虛脈弱治宜從補若變弦急數則正衰邪實補劑難施故云不治

何堪其侮、故知其必敗也。數已為熱。急數則躁疾直强、略無半點和柔、邪火炎炎、真陰自絶、兩皆不治之證。

附方

四君子湯（見第十六）

補中益氣湯（見第三十九）

參术膏　治中風虛弱。諸藥不應。或因用藥失宜。耗散元氣、虛證蜂起、但用此藥、補其中氣、諸證

自愈。

人參　白术（各等分）

右水煎稠收膏。湯化服之。

四物湯（見第二十一）

六味丸（見第十六）

八珍湯（見第十六）

聖愈湯　治一切失血。或血虛煩渴躁熱、睡卧不寧。或瘡證膿水出多。五心煩熱作渴等證。

熟地黃（生者自製）　生地黃　當歸（酒拌各一錢）

人參一　黃耆（炒）　川芎（各二錢）

右水煎服

濟生續斷湯　治肝勞虛寒。脇痛脹滿。攣縮煩悶眼昏不食。

川續斷（酒浸）　川芎　當歸（酒浸去蘆）

陳皮（去白）　半夏（製）　乾薑（炮各一兩）

肉桂（不見火）　炙甘草（各半兩）

㕮咀。每服四錢。水一盞。薑五片。煎服無時。

木瓜散　治筋虛極。脚手拘攣。十指甲痛。數轉筋。甚則舌卷卵縮。唇青面黑。

木瓜（去子）　虎脛骨（酥炙）　五加皮（洗）

當歸（酒浸）　桑寄生　酸棗仁（炒）

人參　柏子仁　黃耆（各一兩）

炙甘草（一兩）

煎服法同前。

鹿角丸　治骨虛極。面腫垢黑。脊痛不能久立。血氣衰憊。髮落齒枯。甚則喜唾。

鹿角（二兩）　牛膝（酒浸焙去蘆一兩半）

右為細末。煉蜜丸如梧子大。每服七十丸。空心鹽湯下。

保命金剛丸　治腎損骨痿。不能起于床。宜服此益精。

萆薢　杜仲（去絲炒）　蓯蓉（酒浸）

兎絲子（酒浸各等分）

右為細末。酒煮猪腰子。搗和丸如桐子大。每服五七十丸。空心用溫酒送下。

丹溪虎潛丸

龜板　黃蘗（各四兩）　知母

熟地黃（各二兩）　牛膝（三兩半）　芍藥（一兩半）

瑣陽　虎骨（酥炙）　當歸（各一兩）

陳皮（七錢半）　乾薑（半兩）

一高七七八冊　貴參四庫全書　高　8　反正句

[illegible]醫曰東垣云胃壯元氣[illegible]則能食而不饑過時而[illegible]傷此丸能[illegible]饑者飽飽[illegible]饑壯胃故[illegible]觀劑中消

右爲末。酒糊丸。加附子。治痰厥如神。

保命黑地黃丸（加五味子爲腎氣丸）　治陽盛陰衰。脾胃不足。房室虛損。形瘦無力。面多青黃而無常色。此補氣益胃之劑也。

蒼朮（泔浸）一斤　熟地黃（一斤酒蒸搗如泥）

五味子（半斤）　乾薑（秋冬一兩夏半兩春七錢）

右爲細末。棗肉丸如桐子大。食前米飲。或酒服百丸。治血虛久痔甚妙。經云。腎苦燥。急食辛以

潤之。此藥開腠理。生津液。通氣。又五味子酸以收之。此雖陽盛而不燥熱。乃是五藏虛損于內故可益血收氣。此藥類象神品方也。

資生丸　健脾開胃。消食止瀉。調和藏府。滋養榮衛。王肯堂先生曰。余初識繆仲淳時。見袖中出彈丸咀嚼。問之。曰。此得之秘傳。饑者服之即飽飽者服之即饑。因疏其方。余大善之。而頗不信其消食之功。已于醉飽後。頓服二丸。徑投枕臥

夙興了無停滯。始信此方之神也。先恭簡年高脾弱。食少痰多。餘齡葆攝。全賴此方。因特附著于此。與世共之。

白朮（米泔水浸用山黃土拌蒸九次晒九次去土切片焙乾三兩）

人參（去蘆人乳浸透飯鍋上蒸熟三兩）　白茯苓（去粗皮水飛去筋膜人乳拌飯鍋上蒸熟晒乾一兩五錢）　橘紅

山查肉（炒）　神麴（炒各二兩）　川黃連（薑汁炒）

白荳蔻仁（微炒）　澤瀉（去毛炒各三錢半）　桔梗（米泔浸炒）

真藿香（洗）　甘草（蜜炙去皮各五錢）　白扁豆（去殼炒）

蓮肉（去心皮各一兩）　薏苡仁（淘淨炒三兩）　乾山藥（炒）

麥芽麵（炒）　芡實（淨肉炒各一兩五錢）

末之。煉蜜丸。每丸二錢重。每服一丸。醉飽後二丸。細嚼。淡薑湯下。

楊氏還少丹　大補心腎脾胃。一切虛損。神志俱耗。筋力頓衰。腰腳沉重。肢體倦怠。血氣羸乏。小便渾濁。

乾山藥　牛膝（酒浸）　遠志（去心）
山茱萸（去核）　白茯苓（去皮）　五味子
巴戟（酒浸去心）　肉蓯蓉（酒浸一宿）　石菖蒲
楮實　杜仲（去粗皮薑汁酒拌同炒斷絲）
舶茴香（各一兩）　枸杞子　熟地黃（各二兩）

此據寶鑑所定。攷楊氏原方。山藥牛膝各一兩半。茯苓茱萸楮實杜仲五味巴戟蓯蓉遠志茴香各一兩。菖蒲地黃枸杞各半兩。

右爲細末。煉蜜同棗肉爲丸。如桐子大。每服三十丸。食前溫酒或鹽湯下。日三服。五日覺有力。十日精神爽。半月氣壯。二十日目明。一月夜思飲食。冬月手足常暖。久服令人身體輕健。筋骨壯盛。悅澤難老。更看體厚加減。如熱加山梔（一兩）。心氣不寧。加麥門冬（一兩）。少精神。加五味子（一兩）。陽弱加續斷（一兩）。常服固齒無瘴瘧。婦人服之。容顏悅澤。煖子宮。去一切病。

[illegible]嘉　[illegible]陰能　[illegible]故熬　[illegible]腹前　[illegible]去兩　[illegible]專精　[illegible]補　[illegible]陰精　[illegible]治最切

龜膠　治諸虛百損。精少髓枯。腎衰水道竭乏。血液乾涸。一切陰不足之證。

龜殼十斤。或數十斤。水浸五七日。視上黑皮浮起。即取刮淨純白。如灼過以刀剜去焦跡。再洗淨。石臼中搗碎。入磁罐中包固。再坐大鍋中。隔水煮。水乾。旋以溫水添足。不斷火。一二晝夜。視板酥爛。汁稠。濾去板滓。將汁入錫鍋內或磁鍋。桑火緩緩熬收。不住攪動。至滴水不散。用銅杓

挑入磁器中。冷即成餅。每服不拘多少。滾水溫酒任化下。

[illegible]腎曰鹿爲　[illegible]陽氣通於　[illegible]生無兩月　[illegible]可廿斤陽　[illegible]固聚於頭　[illegible]其易且　[illegible]故凡真　[illegible]不足者用　[illegible]爲效頗捷　[illegible]鹿合用　[illegible]仙膠

鹿膠　治陽衰。形羸體瘦。少氣困乏。力減神疲。或精冷無子。及一切虛寒陽不足之證。

嫩鹿角不拘多少。寸截浸水數日。去粗皮。隔水煮如龜板法。服法亦同。但角堅硬。必煮一日。方搗碎。再入罐煮收如上。俱宜臘月水煮。鹿膠經久不臭。若二膠合服。陰陽兩補。更妙也。

丹溪保和丸（見第十七）

平胃散（見第四十四）

元戎逍遥散　治血虛勞倦。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心忪頰赤。口燥咽乾。發熱盜汗。減食嗜卧。及血熱相搏。月水不調。臍腹脹痛。寒熱如瘧。又療室女榮衛不和。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。漸成骨蒸。（加山梔牡丹皮名加味逍遥散）

白茯苓（去皮）　白术（炒）　當歸

白芍藥（炒）　柴胡（各一兩）　甘草（半兩）

右㕮咀。每服四錢。水一鍾。煨生薑一塊切片。煎至六分。去滓熱服無時。

腎着湯（見第二十一）

金匱腎氣丸（見第十六）

寶鑑天真丹　治上焦陽虛

沉香　穿心巴戟（酒浸）　茴香（炒）

萆薢（酒浸炒）　葫蘆巴（炒香）　破故紙（炒香）

杜仲（麩炒去絲）　琥珀　黑牽牛（鹽炒去鹽各一兩）　官桂（半兩）

右十味爲末。用清酒打糊爲丸如桐子大。每服五十丸。空心温酒送下。鹽湯亦可。

仲景小青龍湯（見第十六）

仲景麻黃湯（見第十六）

天王補心丸　寧心保神。益血固精。壯力強老。令人不忘。除怔忡。定驚悸。清三焦。化痰涎。祛煩熱。

療咽乾。育養心神。

人參（去蘆五錢）　當歸（酒浸）　五味子

麥門冬（去心）　天門冬（去心）　柏子仁

酸棗仁（各一兩）　白茯苓（去皮）　玄參

丹參　桔梗　遠志（各五錢）

生地黄（四兩）　黄連（酒洗炒二兩）

右爲末。煉蜜丸如桐子大。朱砂爲衣。每服二三十丸。臨卧燈草竹葉煎湯下。

[illegible]脉自來[illegible][illegible]所雜者

朱砂安神丸（見第十九）

朱雀丸（百一）　治心腎不交。心神不定。事多健忘。

沉香（半兩）　茯神（二兩）

右爲細末。蜜丸如小豆大。飛朱砂爲衣。每服三十丸。食後用人參湯下。

和劑人參養榮湯　治脾肺俱虛。發熱惡寒。肢體瘦倦。食少作瀉等證。若氣血虛而變見諸證。勿論其病。勿論其脉。但服此湯。其病悉退。

白芍藥　陳皮　人參

黃耆（蜜炙）　桂心　當歸

白朮　甘草（炙各一錢）　熟地黃

五味子（炒杵）　白茯苓（去皮各七分半）　遠志（去心五分）

右薑棗水煎服

失血脉證第五十二

諸病失血。脉必見芤。緩小可喜。數大可憂。

衛行脉外。榮行脉中。凡失血之病。脉中必空。故見芤象。若緩小不足。與病相宜。是可喜也。脉數而大。邪盛正衰。且爲火象。必爍眞陰。誠爲大可憂者。

[illegible]營衛中[illegible]脉了然

[illegible]其象四[illegible]脉不[illegible]其氣[illegible]病是其死必

瘀血脉證第五十三

瘀血内畜。却宜牢大。沉小濇微。反成其害。

血畜于内。瘀凝不行。瘀凝則脉大。不行則脉牢。亦因病呈象也。逐之使去。巢穴一空。而致新不難矣。（宜桃仁承氣湯或丹皮紅花之類）設脉沉小澁微。是病有餘而脉反不足。病有物而脉若無物。雖云瘀血。亦不過着

于經絡。如仲景所云榮衛氣傷。内有乾血之類。似非瘀畜于一處者。故脉見如斯。補之有礙。逐之不能。是反成其害也（宜大黃䗪虫丸）

附方

仲景桃仁承氣湯（見第二十）

仲景大黃䗪虫丸　結在内者。手足脉必相失。宜此方。然必兼大補劑。瓊玉膏之類服之。

大黃（十分古以二錢半爲一分當是二兩半蒸）　黃芩（二兩）

[illegible]精白濁固[illegible]下焦症候[illegible]分由中焦脾[illegible]不運以致[illegible]精下陷濕[illegible]膀胱者爲[illegible]兩症亦宜[illegible]者[illegible]出精遺濁[illegible]濁道二者[illegible]分別

甘草（三兩）　桃仁（一升）　杏仁（一升去皮尖）

地黃（十兩）　芍藥（四兩）　乾漆（一兩）

䖟虫（一升）　水蛭（百枚）　蠐螬（一升）

䗪虫（半升）

右十二味。末之。煉蜜爲丸小豆大。酒飲服五丸。日三服。

精濁脉證第五十四

遺精白濁。微濇而弱。火盛陰虛。芤濡洪數。

腎主藏精。慾後方爲施泄。今或念動即出。或無慾自遺。此皆腎虛不能藏攝故耳。（宜知柏八味丸河間秘真丸猪肚丸之類）白濁者。小便色白而濁。亦爲腎虛胞冷。不能分清所致。（宜清心蓮子飲萆薢分清飲之類）形屬精液。證屬脫亡。脉安得不微濇而弱也。設見芤濡洪數之脉。芤濡固爲陰虛。而洪數實因火盛。火盛則精遺。火盛則便濁。似與腎之虛。胞之寒。而不能藏。不能別者。大徑庭矣。臨診可忽乎哉。（宜[illegible]丸導赤散六一散之類）

[illegible]治遺[illegible]方甚多[illegible]出乎[illegible]夢而[illegible]思想[illegible]數方心虛[illegible]氣虛[illegible][illegible]者[illegible]不升[illegible]不通也[illegible]拒之則[illegible]其自有要[illegible]矣

附方

知母八味丸（即六味丸加知母黃蘗）

河間秘真丸　治白淫。小便不止。精氣不固。或有餘瀝。及夢寐陰人通泄。

龍骨（一兩）　大訶子皮（五枚）　縮砂仁（半兩）

硃砂（一兩研細留一分爲衣）

右爲末。麪糊丸菉豆大。每服一二十丸。空心溫酒熱水任下。不可多服。

猪肚丸　治醉飽後遺精神効

牡蠣（煆另研極細）　白朮（各四兩）　苦參（三兩）

猪肚（一具煮極爛去油膜搗如泥）

右前三味。搗篩極細。同猪肚搗數百杵。令極勻。燥畧增肚汁。丸如梧子大。每服五十丸。空心米飲送下。不但治遺滑。即勞瘦者。亦能肥也。

清心蓮子飲（見第四十九）

萆薢分清飲　治真元不固。不時白濁。或小[illegible]

數。凝如膏糊等證。

益智仁　川萆薢　石菖蒲

烏藥（各等分）

右㕮咀。每服四錢。水一盞。入鹽一捻。煎七分。食前溫服。一方加茯苓甘草。

六味丸（見第十六）

錢氏導赤散（見第四十九）

六一散（見第四十四）

三消脉證第五十五

三消之脉。浮大者生。細小微濇。形脫可驚。

三消者。上中下也。渴而多飲爲上消。素問氣厥論謂之鬲消。（宜金匱豬苓湯人參白虎湯子和加減三黃丸涼膈散酒煮黃連丸六一散之類）消穀善饑爲中消。素問脉要精微論謂之消中。（宜酒煮黃連丸大黃黃連瀉心湯山梔黃連之類）渴而便數有膏爲下消。素問氣厥論謂之肺消。飲一溲二。後人又謂之腎消。（宜六味丸固本丸知柏八味丸之類）婁全善亦云。腎消者。飲一溲

（消渴乃腎氣
[illegible]周于病也
[illegible]朗可療久
[illegible]腎水乾枯
[illegible]陽獨治于
[illegible]一生者矣）

二。其溲如膏油。即膈消消中之傳變。總不外火爍真陰。津液燥竭。自古論之者多矣。唯劉河間。張戴人二論。辟義暢達。最爲中綮。茲錄于左。河間曰。五臟六腑四肢。皆稟氣于脾胃。行其津液以濡潤養之。然消渴之病。本濕寒之陰氣極衰。燥熱之陽氣太盛故也。治當補腎水陰寒之虛。而瀉心火陽熱之實。除腸胃燥熱之甚。濟身中津液之衰。使道路散而不結。津液生而不枯。氣血和而不澁。則病自

已矣。況消渴者。因飲食服餌之失宜。腸胃乾涸而氣不得宣平。或精神過違其度而耗亂之。或因大病。陰氣損而血液衰虛。陽氣慓悍而燥熱鬱甚之所成也。若飲水多而小便多。名曰消渴。若飲食多。不甚渴。小便數而消瘦者。名曰消中。若渴而飲水不絕。腿消瘦而小便有脂液者。名曰腎消。一皆以燥熱太甚。三焦腸胃之腠理怫鬱結滯。緻密壅滯。復多飲于中。終不能浸潤于外。榮養百骸。故渴不止。

小便多出或數溲也。戴人之論、則曰火能消物、燔木則爲炭、燔金則爲液。燔石則爲灰。煎海水則爲鹽。鼎水則乾、人之心腎爲君火、三焦膽爲相火。得其平。則烹煉飲食、糟粕去焉、不得其平。則燔灼藏府而津液耗焉。夫心火甚于上、爲膈膜之消。甚于中。爲腸胃之消。甚于下、爲膏液之消。甚于外。爲肌肉之消。上甚不已、則消及于肺。中甚不已。則消及于脾。下甚不已。則消及于肝腎。外甚不已、則消及于筋骨。四藏皆消盡。則心始自焚而死矣。故知消渴一證。調之而不下、則小潤小濡、固不能殺炎上之勢。下之而不調。亦旋飲旋消。終不能沃膈膜之乾。下之調之。而不减滋味。不戒嗜慾。不節喜怒。則病已而復作。能從此三者。消渴亦不足憂矣。二人此論。消渴之因證。可謂既明且悉。不煩再解。但其脉浮大者。尚屬彌漫寬散。前河間云。使道路散而不結。津液生而不枯。氣血和而不澁。則病自已。

然非彌漫寬散之氣機。不能得此不結不枯不澁之病機耳、故云浮大者生。若脉細小浮濇。則氣血之虛衰枯槁。不言可知。再加身體瘦悴。是謂形脫。即戴人所云木爲炭。金爲液、石爲灰。水爲鹽。鼎水乾之義。形氣兩敗。豈直可驚已哉。

附方

金匱猪苓湯　治發熱渴欲飲水。小便不利。

猪苓　茯苓　阿膠

滑石　澤瀉（各一兩）

右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內膠烊消。溫服七合。日三服。

仲景人參白虎湯（見第四十三）

子和加減三黃丸　治丹石毒。及熱渴。以意測度。須大實者方用。

黃芩（春四兩夏秋六兩冬三兩）　大黃（春三兩夏一兩秋[illegible]兩冬四兩）

黃連（春四兩夏七兩秋三兩冬二兩）

一多一一、 册 續修四庫全書 3 版 夕

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服十丸。服一月病愈。

和劑凉膈散（見第十九）

和劑酒煮黃連丸 治伏暑發熱。嘔吐惡心。并治膈熱。解酒毒。厚腸胃。

黃連（去鬚十二兩） 好酒（五斤）

右將黃連以酒煮乾。研爲末。滴水丸如桐子大。每服三五十丸。空心熱水送下。

六一散（見第四十四）

大黃黃連瀉心湯 治太陽病。發汗。遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裏俱虛。陰陽血氣並竭。無陽則陰獨。復加燒鍼。因胸煩。面色青黃。膚瞤者。難治。若色微黃。手足温者。易愈。心下痞。按之濡。其脉關上浮者。

大黃（二兩） 黃連（一兩） 加黃芩爲伊尹三黃湯

右剉如麻豆。沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分温再服。

六味丸（見第十六。）

固本丸（葉氏加人參名人參固本丸） 夫心生血。血生氣。氣生精。精盛則鬚髮不白。容貌不衰。今人滋補血氣。多用性熱之藥。殊非其治。此方蓋用生地黃能生精血。用天門冬引入所生之地。熟地黃能補精血。用麥門引入所補之地。又以人參能通心氣。使五味併歸于心。

生地黃（洗） 熟地黃（洗再蒸） 天門冬（去心） 麥門冬（去心各一兩）

右爲末。煉蜜丸如桐子大。空心温酒。或鹽湯下三十丸。

知蘗八味丸（見第五十四）

小便淋閟脉證第五十六

小便淋閟。鼻頭色黃。濇小無血。數大何妨。

淋者。淋瀝不淨。閟者。閉塞不通。其證小便少而數。

少腹弦急痛引于臍。病原論皆謂腎虛膀胱熱之所成也。分有五種。曰石淋。勞淋。血淋。氣淋。膏淋。石淋者。淋而出石也。腎主水。水結則化爲石。腎虛爲熱所乘。熱則成淋。其病狀。小便則莖裏痛。尿不能卒出。痛引少腹。膀胱裏急。沙石從小便出。甚者塞痛。令人悶絕。（宜局方石葦散三因石燕丸之類）氣淋者。腎虛膀胱熱。氣脹所爲也。膀胱合與腎爲表裏。膀胱熱。熱氣流入于胞。熱則生實。令胞內氣脹。則小腹滿。腎虛

不能制其小便。故成淋。其狀膀胱小便皆滿。尿澁常有餘瀝是也。亦曰氣癃。（宜瞿麥湯沉香散之類）膏淋者。淋而有肥。狀似膏。故謂之膏淋。亦曰肉淋。此腎虛不能制肥液。故與小便俱出也。（宜鹿角霜丸兎絲子丸之類）勞淋者。謂勞傷腎氣而生熱成淋也。腎氣通于前陰。其狀尿留莖內。數起不出。引小腹痛。小便不利。勞倦即發也。（宜黃耆湯補中益氣湯之類）血淋是熱淋之甚者。則尿血。謂之血淋。心主血。血之行身。通遍經絡。循環府臟。熱甚則散失其常經。溢滲入胞而成血淋也。（宜立効散濟生小薊飲子之類）五種之外。復有寒熱二種。寒淋者。其病狀先寒戰。然後尿是也。由腎氣虛弱。下焦受冷氣入胞與正氣交爭。寒氣勝則戰寒而成淋。正氣勝則戰寒解。方得小便也。（宜肉蓯蓉丸八味丸之類）熱淋者。三焦有熱氣。摶于腎。流入于胞而成淋也。其狀小便赤澁。亦有宿病淋。今得熱而發者。其熱甚則變尿血。亦有小便後如小豆羮汁狀者。畜作有時也。（宜六

一散本事火府丹導赤散局方八正散之類）巢氏之說如此。恐未必盡然。大抵皆三焦氣化不及。熱迫膀胱。令水道澁滯之所成也。勞氣血膏石。雖分五種。其病機必因勞動火。火盛摶氣。甚及于血。血轉爲膏。膏轉爲石。自清而濁。自薄而厚。自柔而堅。自無形而漸有形。亦熬汁成膏。煮水結鹽之義。豈真有砂石出水藏哉。至若腎虛不能制肥液。更可笑也。歷考內經。并運氣等篇。肝心脾肺腎。小腸督脈。亦皆有此證。三焦

[illegible]焦膀胱合[illegible]其義如完[illegible]古所未發

內經云飲入于胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸于肺通調水道下

膀胱病此者。爲獨多耳。夫三焦膀胱者。素問靈蘭秘典。雖列爲二。在三焦。則曰决瀆之官。水道出焉。在膀胱。則曰州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。三焦之下。卽接膀胱。一主藏。一主出。相爲依倚。故靈樞本藏篇云。腎合三焦。三焦膀胱者。腠理毫毛其應。又四時氣篇云。小腹痛腫。不得小便。邪在三焦約。取之太陽大絡。又五癃津液篇云。三焦閉不瀉。津液不化。不得滲膀胱。則下焦脹。又本輸篇云。

膀胱者。津液之府也。少陽屬腎。腎上連肺。故將兩藏。三焦者。中瀆之府也。水道出焉。屬膀胱。是孤之府也。觀此則知三焦膀胱。名雖二而實一。故古人刺灸之法。多取三焦穴。而不取膀胱。義可想矣。所謂少陽屬腎者。少陽正指三焦手少陽。非足少陽也。卽腎合三焦之變文。腎上連肺者。言以最下之腎。而相將于最上之肺。凡在兩藏之中者。俱在相將之內。此所以成一三焦也。况肺主氣而通調水道。三焦亦主氣而上下遊行。如是則淋秘又不獨下焦爲然。上中下之氣。有一不化。則不得如决瀆之水而出矣。熱乘津液。則水道不利。水道不利而有熱必鬱蒸而外發黄色。見于鼻者。以鼻爲肺竅耳。脉濇小者。濇滯微小而不滑利也。徵其正衰而無血。數大爲火象。火證見之。又何妨乎。較之無血者。是爲易治。

[illegible]此[illegible]之氣有不化則施[illegible]觀此論則徹底了然矣

附方

局方石葦散　治腎氣不足。膀胱有熱。水道不通。淋瀝不宣。出少起數。臍腹急痛。蓄作有時。勞倦卽發。或尿如豆汁。或便出砂石。

芍藥　白朮　滑石

葵子　瞿麥　石葦（去毛）

木通（各二兩）　當歸（去蘆）　甘草

王不留行（各一兩）

右爲細末。每服二錢。空心煎小麥湯調下。日二

三服。

三因石燕丸　治石淋。因憂鬱氣注下焦。結如食鹽。小便痛不可忍。或出砂石而後小便通。

石燕（火燒令通赤水中淬三次研極細水飛焙乾）　石葦（去毛）

瞿麥穗　滑石（各一兩）

右爲細末。麵糊丸桐子大。每服十丸。用瞿麥燈心煎湯。食前送下。日二三服。甚卽以石葦去毛。瞿麥穗木通各四錢。陳皮茯苓各三錢。爲末。每

服三錢。以水一盞。煎七分。去滓服。

瞿麥湯　治心經蘊熱。小便赤澁痛。

瞿麥穗（七錢半）　冬瓜子　茅根（各半兩）

黃芩（去黑心六錢）　木通（二錢半）　竹葉（一把）

滑石（二兩研爲細末分作三帖）　葵子（二合）

右除滑石外。粗搗篩。分作三劑。每劑用水三盞。煎二盞。去滓。入滑石末一貼。攪勻食前溫服。

沉香散　治氣淋。多因五內鬱結。氣不舒行。陰滯于陽而致壅滯。小腹脹滿便尿不通。大便分泄。小便方利。

沉香　石葦（去毛）　滑石

王不留行　當歸（各半兩）　葵子

白芍藥（各七錢半）　甘草　橘皮（各二錢半）

右爲末。每服二錢。煎大麥湯下。

鹿角霜丸（三因）　治膏淋。

鹿角霜（用麋角連頂骨者。鋸作挺子。長三寸。洗了。用水桶內浸。夏三冬五。晝夜。用清水

同入鍋內煮之。覺湯少。添溫湯。日夜不絕。候角酥糜爲度。輕漉出。用刀刮去皮。如雪白。放在篩子上。候自乾。微火焙之。其汁漫大煎膏。凝卽角膠。候角極乾。爲細末。卽鹿角霜。）

白茯苓　秋石（各等分）

右爲細末。糊丸如桐子大。每服五十丸。米飲下。

兎絲子丸

兎絲子（去塵土水淘淨酒浸控乾蒸搗焙）　桑螵蛸（炙各半兩）

澤瀉（二錢半）

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。空心

清米湯送下。

黃耆湯　治腎虛變勞淋。結澁不利。

黃耆（二兩）　人參　五味子

白茯苓（去皮）　旱蓮子　磁石（火煅醋淬）

滑石（各一兩）　桑白皮（七錢半）　枳殼（去瓤麩炒）

黃芩（各半兩）

右搗篩。每服三錢七。水一盞。煎七分。服無時。

補中益氣湯　見第三十九

立効散　治小便淋閉作痛。有時尿血。下焦結熱。

瞿麥穗　山梔子（炒）　甘草（各三錢）

右作一服。水二鍾。煎一鍾。食前服。

濟生小薊飲子　治下焦結熱。尿血成淋。

生地黃（四兩）　小薊根　滑石

通草　蒲黃（炒）　藕節

淡竹葉　當歸（去蘆酒浸）　山梔仁

甘草（各半兩）

右㕮咀。每服四錢。水一盞。煎八分。空心溫服。

肉蓯蓉丸　治冷淋。

肉蓯蓉（酒浸切焙）　熟地黃　山藥

石斛（去根）　牛膝（酒浸切焙）　官桂（去粗皮）

檳榔（各半兩）　附子（炮去皮臍）　黃耆（各一兩）

黃連（去鬚七錢半）　細辛（去苗葉）　甘草（炙各二錢半）

右爲末。蜜丸桐子大。每服二十丸。鹽酒下。

八味丸　見第十六

六一散　見第四十四

本事火府丹　治心經蘊熱。小便赤少。五淋濇痛。

黃耆（一兩）　生乾地黃（二兩）　木通（三兩）

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服五十丸。木通煎湯下。

導赤散　見第五十四

局方八正散　見第四十九

醫燈續焰卷六終

血乃諸家
血由自各
產後脫血
衝任脈虛
大有分

醫燈續焰卷七

錢塘後學潘　楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人　陳一潛子含　顧濬合章之　校

大便燥結脈證第五十七

大便燥結。須分氣血。陽數而實。陰遲而濇。

燥結一證。稍有分別。大抵血液少者多燥濇。氣火盛者多結滯。然而燥則必結。結則必燥。又似難為分別。但以脈合證。而屬氣屬血。自井然矣。氣火盛者。為陽。脈必有餘。故數實也。（宜局方麻仁丸之類）血液少者。為陰。脈必不足。故遲濇也。（宜四物湯東垣導滯通幽湯之類）氣血一判而再審其因。有風燥。（宜五仁丸得効皂莢丸搜風順氣丸之類）火燥。（宜大小承氣湯麻仁丸之類）亡血燥。（宜四物湯之類）產後脫血燥。（宜四物湯加人參黃耆之類）嘔吐傷液燥。（宜四君子加麥冬五味之類）汗後亡液燥。（宜八珍湯十全大補湯之類）腎虛液少燥。（宜六味丸八味丸之類）老

但知有
而不知
然即仲
間陰結
方亦妙
而實不
溫藥下

年血衰燥。（宜四物湯麻仁丸濟生蓯蓉潤腸丸之類）氣實壅盛結。（宜六磨湯得効橘杏丸蘇麻粥之類）氣虛不能傳送亦結。（宜黃耆湯之類）氣熱乾涸結。（宜大承氣湯麻仁丸六一散之類）氣寒凝滯不行亦結。（宜局方半硫丸枳實理中湯之類）但宜以脈辨證。以證求因。而用藥擬方。無餘蘊矣。

附方

和劑麻仁丸　治腸胃熱燥。大便秘結。

厚朴（去皮薑製炒）　白芍藥　枳實（麩炒各半斤）

大黃（蒸焙一斤）　麻仁（別研五兩）　杏仁（去皮尖炒五兩半）

右為末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。臨臥溫水下。大便通利則止。

四物湯（見第二十一）

東垣導滯通幽湯　治幽門不通。上衝吸門不開。噎塞氣不得上下。大便難。脾胃初受熱中。多有此證。治在幽門。以辛潤之。

當歸身　升麻稍　桃仁泥

醫曰津液
枯傳道屬
故陳皮分
兩浮於五仁

甘草（各一錢）　紅花（少許）　熟地黃

生地黃（各五分）

水二盞，煎一盞，調檳榔末五分，稍熱服。

得效五仁丸　治津液枯竭，大腸秘澁，傳道艱難。

桃仁　杏仁（炒去皮尖，各一兩）　柏子仁（半兩）

松子仁（一錢二分半）　郁李仁（炒，一錢）　陳皮（四兩，另為末）

右將五仁另研如膏，入陳皮末，研勻，煉蜜丸如桐子大，每服五十丸，空心米飲下。

得效皂角丸　專治有風人藏府秘塞，大效。

豬牙皂角　枳殼（去瓤）　羌活

桑白皮　檳榔　杏仁（去皮尖，另研）

麻仁（另研）　防風　川白芷

陳皮（去白，各等分）

右為末，蜜丸如桐子大，每服三五十丸，白湯下。蜜湯亦可。

聖惠搜風順氣丸　治三十六種風，七十二種氣，

曰因風
諸症
此方
後風順
無風何
氣不逆
令人
虛實
用之也

去上熱下冷，腰脚疼痛，四肢無力，多睡少食，羸瘦，顏色不完黃赤，惡瘡下疰，口苦無味，憎寒毛聳，積年癥癖氣塊，丈夫陽事斷絕，女子久無子嗣，久患寒瘧，吐逆瀉痢，變成勞疾，百節酸疼，小兒老人皆可服，補精駐顏，疎風順氣

車前子（二兩半）　白檳榔　火麻子（微炒去殼，另研）

郁李仁（湯泡去皮，研）　兎絲子（酒浸焙，炮曬乾）　牛膝（酒浸一宿）

乾山藥（各三兩）　枳殼（去瓤麩炒）　防風（去叉）

獨活（各一兩）　錦紋大黃（五錢半，生半熟）

右為末，煉蜜丸如桐子大，每服二十丸，酒茶米飲任下，百無所忌，早晨臨卧各一服，服一月消食，二月去腸內宿滯，三月無倦少睡，四月精神強勝，五月耳目聰明，六月腰脚輕健，一年百病皆除，老者返少。如服藥覺藏府微動，以羊肚肺羹補之。久患腸風便血，服之除根，如顫語蹇澁，及癱瘓，服之[illegible][illegible]平復，酒後一服，宿酲消盡，百

病不生。孕婦勿服。

濟生蓯蓉潤腸丸　治發汗利小便。亡津液。大腸秘。老人虛人皆可服。

肉蓯蓉（酒浸焙二兩）　沉香（另研一兩）

右爲末。麻子仁汁打糊。丸如桐子大。每服七十丸。空心米飲下。

大承氣湯（見第十七）

小承氣湯（見第十七）

四君子湯（見第十六）

八珍湯（見第十六）

十全大補湯（見第十六）

六味丸（見第十六）

八味丸（見第十六）

六磨湯　治氣滯腹急。大便秘澁。

沉香　木香　檳榔

烏藥　枳殼　大黃（各等分）

右各件熱湯磨服。

得効橘杏丸　氣秘老人。虛弱人。皆可服。

橘紅（取末）　杏仁（去皮尖另研各等分）

右和勻。煉蜜丸如桐子大。每服七十丸。空心米飲下。

蘇麻粥　順氣。滑大便。

紫蘇子　麻子仁（不拘多少）

二味研爛。水濾取汁。煮粥食之。

黃耆湯　年高便秘宜服。

綿黃耆　陳皮（去白各半兩）

爲末。每服三錢。用大麻仁一合爛研。以水投取漿水一盞。濾去滓。於銀石器內煎。候有乳起。即入白蜜一大匙。再煎令沸。調藥末空心服。此藥不冷不燥。其効如神。

六一散（見第四十四）

局方半硫丸　年高冷秘虛秘。及痃癖冷氣。

半夏（湯洗七次焙乾爲細末）　硫黄（明淨者研極細用權）

（木槌殺過）

右以生薑自然汁同熬。入乾蒸餅末攪和勻。入臼內杵數百下。丸如桐子大。每服十五丸。至二十丸。無灰溫酒。或生薑湯任下。婦人醋湯下。俱空心服。

枳實理中湯（見第十七）

癲狂脈證第五十八

癲乃重陰。狂乃重陽。浮洪吉兆。沉急凶殃。

癲者。顛也。謂發時顛倒。異于平日。語言錯亂。喜怒無因。或笑或歌。或悲或泣。神迷意惑。穢絜妄知。平日能言。發反沉默。平日沉默。發反多言。甚或行步不休。或復偃仆不起。俗呼爲失心風。狂者。剛暴猖狂。叫號罵詈。甚則踰垣上屋。蹈火赴湯。不避死生。不知饑飽。倍常勇力。若邪所憑。俗呼爲發狂。二者證既不同。因當各異。古人多以顛狂混稱。亦疎略矣。蓋人身氣爲陽。血爲陰。府爲陽。藏爲陰。府之手足六經爲陽。藏之手足六經爲陰。形質可見者爲陽。神志不可見者爲陰。身半已上爲陽。身半已下爲陰。表爲陽。裏爲陰。凡此陰陽。俱各兩相依倚。互爲交通。而後氣血和平。府藏安靜。經脈調勻。形神合一。上下無厥逆之虞。表裏無盛虛之變。如是則微疴小疾。亦無自而生。况癲狂乎。今癲云重陰者。謂偏重于陰也。邪入于陰而陰實也。五藏爲陰。神志舍于五藏。亦爲陰。設或抑鬱不伸。謀思不遂。悲哀不置。侘傺無聊。久久藏神凝結。情識昏迷。靈明何有。此癲之成于神志者也。（宜靈苑辰砂散歸脾湯人參琥珀丸之類）一種因陽虛不能衛外。反下陷而附并于陰。附并于陰。則陰氣實。下而不上。則升降斎而癲疾作矣。即脈經所謂陽附陰則癲者是也（宜升陽益氣如補中益氣湯四逆散之類加減用之）一種因三陽經從頭下行。三陰經不得從足上行而逆下。下則陰經實。亦似陽附陰之義

陽之所依倚之理後分重由陽發以在癲狂治治案

但此直指經脉之逆。經所謂癲疾厥狂。久逆之所生者是也。（宜調其升降。正其逆順。如交感丹加升麻巴戟木香桂枝之類）一種因内有畜血。令人如狂。或善忘。或如見鬼。如狂者。如狂而非狂。即癲狀也。血者。神明之府。血蓄不行。神機大礙。故見上證。血爲陰。是亦重陰陰實之義。謂之邪入于陰亦可。（宜桃仁承氣湯代抵當丸之類）狂則反是。乃重陽陽實之證也。素問宣明五氣篇云。邪入於陽則狂。邪入陽。則陽實。陽實則熱盛。陽性主動。以盛熱

而加以動性。猖狂剛暴。不言可知。又生氣通天論云。陰不勝其陽。則脉流薄疾。并乃狂。并則陽重陽實之義。故素問病能論云。狂生于陽也。又云陽明者常動。巨陽少陽不動。不動而動大疾。此其候也蓋言陽明之經脉常動。以陽明爲水穀之海。其氣充盛。故常動。巨陽少陽之脉不動。言二經之氣。不如陽明之盛。故不動。不動者。非不動也。不如陽明之常動也。今無論常動者。即不動者。亦常動而動

且大疾。是爲狂病之候。觀此。則狂病之爲重陽實明矣。與上文脉流薄疾。并乃狂。若出一義。又靈樞通天篇亦云。陽重脫。易狂。脫非陽脫。言重并于陽分。而若與陰脫離也。又靈樞本神篇云。肝悲哀動中。則傷魂。魂傷則狂忘不精。肺喜樂無極。則傷魄。魄傷則狂。狂者意不存人。夫肝爲木。性上達而藏魂。故魂主升。陽也。悲哀而至于動中。則神情消沮。恍成秋金而剋木。木受剋。則肝氣傷。肝氣傷則

魂無所歸。而欲其精明不忘。不可得矣。（宜升達。如逍遙散加鬱金香附遠志茯神木香之類）肺屬金。性收降而藏魄。故魄主降陰也。喜樂而至于無極。則神情渙散。恍成夏火而剋金。金受剋。則肺氣傷。肺氣傷則魄無所歸。一派浮陽。動成狂妄。又安能内照而意存人事哉。（宜收歛。如天王補心丸朱雀丸加龍骨牡蠣棗仁茯神之類）又靈樞經脉篇云。陽明病至。則惡人與火。聞木聲則惕然而驚。心欲動。獨閉戶塞牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。夫邪

蓋陽明則陽盛熱甚。人則增煩。火則助熱。故惡也。聞木聲而驚者。驚其相尅。故惕然心動也。閉戶塞牖。即惡人火之義。甚則欲上高而歌。棄衣而走者。以四肢爲諸陽之本。熱實四肢。徒于登躍。故能上高而歌。身表爲諸陽之署。熱盛于身。意求凉爽。故欲棄衣而走。（宜白虎湯承氣湯凉膈散紫雪之類）又靈樞大惑論云。衛氣不得入于陰。常留于陽。留于陽則陽氣滿。陽氣滿則陽蹻盛。不得入于陰。則陰氣虛。故目不瞑。

[illegible]如云不知十二經絡開[illegible]動手便錯[illegible]以經絡如此分疏精詳[illegible]矣

又曰衛氣留于陰。不得行于陽。留于陰則陰氣盛。陰氣盛則陰蹻滿。不得入于陽。則陽氣虛。故目閉也。其中言及二蹻者。以二蹻之脉。皆上會于目內眥。陽脉交于陰。則陰蹻盛。故目閉。陰脉交于陽。則陽蹻盛。故目開。靈樞癲狂篇。首敘目之內外。及上下眥者。亦以癲則目閉。狂則目開。而明陰陽之所以不同也。是皆不易之理。然而兼痰兼火兼風者。常十之五。以三種兼證而較量之。則癲必多痰。而狂必多火多風也。痰則多滯九竅。九竅從陰從藏。九竅不利。故多癲。風火多淫四肢。四肢從府從陽。四肢盛實。故多狂。陰陽分屬。二說覺更了然。（痰宜滾痰丸壽星丸風火宜瀉青丸之類）其脉浮洪者。是爲陽脉。陽狂得之。與證相宜。即陰癲得之。亦從陰轉陽。自裏達表之象。故勻爲吉兆。若沉而急。沉則入陰迫裏。急則强急不柔。是無胃氣之脉也。不論狂癲。凶殃立至。又不獨脉爲然而證亦不可忽者。故癲狂篇。言嘔多

沃沫。氣下泄者不治。又言癲發如狂者不治。蓋嘔多沃沫。脾敗。氣下泄。腎敗。脾腎二藏。爲人之先後二天。二藏已敗。自無生理。發如狂者。陰竭于內。陽散于外。脫根外越。燈滅忽明之象。亦主死。如是則脉與證。又不可不參看也。

附方

靈苑辰砂散　治風痰諸癇。狂言妄走。精神恍惚。思慮迷亂。乍歌乍哭。飲食失常。疾發仆地。吐沫

瞑目魂魄不守

辰砂（一兩須光明有墻壁者）　酸棗仁（半兩微炒）

乳香（半兩光瑩者）

右量所患人飲酒幾何。先令恣飲沉醉。但勿令嘔吐。至靜室中。以前藥都作一服。溫酒調之。令頓飲。如飲酒素少人。但以隨量取醉。服藥訖。便安置床枕令卧。病淺者半日至一日。病深者至三兩日。令家人潛伺之。鼻息勻調。但勿喚覺。亦不可驚觸使覺。待其自醒。即神魂定矣。萬一驚寤。不可復治。吳正肅公少時心病。服此一劑。五日方寤。遂瘥。

歸脾湯　治因思氣結。因憂抑鬱。以致脾傷而心下痞悶。痞不得寐。右關脈結而大。或思慮傷脾。不能統血而血妄行。或健忘怔忡。驚悸盜汗。或心脾作痛。嗜卧少食。大便不調。或肢體重痛。月經不調。赤白帶下。或思傷脾而患瘧痢等證。

人參　白术　白茯苓

黃耆　龍眼肉　酸棗仁（各二錢）

遠志　當歸（各一錢）　木香

甘草（各五分）

右加薑棗煎服。

人參琥珀丸　治失神狂亂。哀樂無由。驚悸不時。夜不能寐。一切恍惚不寧等證。

人參（去蘆）　琥珀（另研）　茯神（去木）

白茯苓（去皮）　石菖蒲（節密小者）　遠志（各半兩酒浸半日去心）

乳香（另研）　硃砂（另研水飛）

酸棗仁（溫酒浸半日去殼紙上炒令香熟各二錢半）

右爲細末。煉蜜丸桐子大。每服二十丸。食後溫酒下。日再服。如不能飲。棗湯下。

補中益氣湯（見第三十九）

仲景四逆散　傷寒論云。少陰病四逆。其人或欬或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四

[illegible]心腎[illegible]爲[illegible]也此在用蒼[illegible]中樞不服法

[illegible]日中痞則[illegible]下不交痞[illegible]通而水得升火得降與[illegible]根而能關[illegible]之義同

逍散主之。

甘草（炙）　枳實（破水漬炙乾）　柴胡

芍藥

右四味。各十分。擣篩。白飲和服方寸匕。日三服。

申先生交感丹　補虛損。固精氣。烏鬚髮。此鐵甕城申先生方也。久服令人有子。

蒼朮（刮淨一斤分作四分用酒醋米泔鹽湯各浸七日焙研）

川椒紅（炒研）　小茴香（各四兩炒研）

又交感丹　凡人中年精耗神衰。盖由心血少。火不下降。腎氣憊。水不上升。致心腎隔絕。榮衛不和。上則多驚。中則寒痞。飲食不下。下則虛冷遺精。愚醫徒知峻補下田。非惟不能生水滋陰。而反見衰悴。但服此方半年。屏去一切暖藥。絕嗜慾。然後習秘固泝流之術。其效不可殫述。俞通奉年五十一。遇鐵甕城申先生。授此服之。老猶如少。年至八十五乃終也。因普示羣生。同登壽域。

茯神（去皮木四兩）　香附子（一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃）

爲末。煉蜜丸彈子大。每服一丸。侵晨細嚼。以降氣湯下。

降氣湯

香附子（如上法半兩）　茯神（二兩）　炙甘草（一兩半）

爲末。點沸湯。服前藥。

仲景桃仁承氣湯　見第二十

代抵當丸　見第二十

逍遙散　見第五十一

天王補心丸　見第五十一

朱雀丸　見第五十一

仲景白虎湯　見四十三

仲景大承氣湯　見第十七

小承氣湯　見第十七

凉膈散　見第十九

紫雪。治發班咽痛。及暑中三陽。脚氣煩躁。

升麻（六錢）　黃金（十兩）　寒水石

石膏（各四兩八錢）　犀角　羚羊角（各一兩）

玄參（一兩六錢）　沉香　木香

丁香（各五錢）　甘草（八錢）

用水五盞。先煮黃金至三盞。入諸藥。再煎至盞。去滓。入芒硝三兩二錢。慢火煎。以柳木攪不停手。候欲凝。入磁盆中。更下硃砂麝香末。各三

分。急攪令勻。候冷凝結成雪。每一錢細細嚥之。

滾痰丸（見第十七）

琥珀壽星丸（局方用南星一斤硃砂二兩琥珀一兩無猪心血）

天南星一斤（掘坑深二尺用炭火五斤于坑內燒熱紅取出炭掃淨用好酒一升澆之將南星趁熱下坑內用盆急蓋訖泥壅合經一宿取出再焙乾爲末）

琥珀（四兩另研）　硃砂（一兩研飛以一半爲衣）

右和勻。猪心血三個。生薑汁打麵糊攪令稠粘。將心血和入藥末。丸如梧子大。每服五十丸。用

（[illegible]乃氣并於[illegible]則氣并[illegible]絡亦屬[illegible]爲而得）

（[illegible]非石癲之由[illegible]並而成也見[illegible]丸然自無[illegible]二）

人參湯。空心送下。日三服。

瀉青丸（見第四十九）

癇病脉證第五十九

癇病宜虛。實急者惡。浮陽沉陰。滑痰數熱。

癇之始發。卒然跌仆。手足牽掣。口噤作聲。或吐沃沫痰涎。一飯頃。氣平甦醒。與癲痓二證。似是而非。癲證則如上文所云。痓證則多身强直。如弓反張。亦無癇證之作聲也。然有陰陽二種。正如小兒之

急驚慢驚。陽癇先身熱。瘈瘲驚啼而後發。其脉浮洪。病屬六府。外在肌膚。輕淺易治。（宜集驗龍腦安神丸河間犀角丸之類）陰癇身冷。不驚掣。不啼叫。卒然而發。略無先兆。其脉沉濡。病屬五藏。內在骨髓。深重難治。（宜清心牛黃丸神應丹之類）昔賢皆謂有痰有熱。客于心胃之間。因聞大驚而作。若熱盛。雖不聞驚亦作。是謂先有痰熱而後發癇也。恐未必然。總不如三因之論爲的。其論以驚動藏氣不平。鬱而生涎。閉塞經絡。厥而

乃成。或在母腹受驚、或感六氣、或飲食不節。逆于藏氣而成。蓋忤氣得之外。驚恐得之內。飲食得之屬不內外。所因不同、治法亦異。如驚者。安神丸以平之。挾痰者。三聖散以吐之。挾火者。清神湯以凉之。可下者。即以承氣湯下之。其脈總宜虛而不宜實。實則邪盛。若實而急。是無胃氣、唯強急而不柔和。凶惡之徵也。浮則癇發于陽。沉則癇發于陰。滑則癇發多痰。數則癇發多熱。因病見脈。因脈知病。

亦理之自然耳。

附方

龍腦安神丸　見第十九

河間犀角丸　見第二十五

清心牛黃丸　見第四十二

神應丹　治諸癇

好辰砂（不拘多少）

右細研。猪心血和勻。以蒸餅裹劑蒸熟。就熱取

[illegible]之症須[illegible]痛並舉[illegible]者症相類[illegible]治各異喉[illegible]者氣之所[illegible]上下也氣[illegible]天明喉[illegible]數之道

出。丸如桐子大。每服一丸。人參湯下。食後臨臥俱可。

三聖散

瓜蒂（揀淨炒）　防風（去蘆各三兩）　藜蘆（聖惠方減用之或一兩或半兩或三錢）

右為麤末。每服約半兩。以虀汁三茶盞。先用二盞煎三五沸。去虀汁。次入水一盞。煎至三沸。却將先二盞同一處熬二沸。去滓澄清放溫。徐徐

服之。以吐為度、不必盡劑。

大承氣湯　見第十七

喉痺脈證第六十

喉痺之脈。數熱遲寒。纏喉走馬。微伏則難。

痺者。閉也。閉塞不通之謂。乃火盛氣結。以致喉嚨腫脹。呼吸難通。壅塞痰涎。水漿不下。一二日。即能殺人。十二經脈。與經別。多過于此。即不然。亦在其前後左右也。有經脈過者。有經別過者。有經脈經

[illegible]地[illegible]會厭懸[illegible]舌本口頰[illegible]以相關[illegible]喉[illegible]入差之說[illegible]生死懸[illegible]不可忽[illegible]經之[illegible]後分[illegible]甚

別俱過者。如肺手太陰經脈。無過于此者。而經別篇則云手太陰之正。上出缺盆。循喉嚨。大腸手陽明之脈。循缺盆。上頸貫頰。經別篇又云。上循喉嚨。胃足陽明之脈。循喉嚨。入缺盆。經別篇又云。上循咽。出于口。脾足太陰之脈。上膈夾咽。連舌本。經別篇又云。上結于咽。貫舌中。心手少陰之脈。上夾咽。經別篇又云。上走喉嚨。出于面。小腸手太陽之脈。循咽下膈。其支者。循頸上頰。而經別則無。膀胱足

太陽之脈。自腦還出。別下項。經別篇又云。直者。從膂上出于項。腎足少陰之脈。循喉嚨。夾舌本。經別篇又云。直者繫舌本。復出于項。心包絡手厥陰之脈。亦無過此者。而經別則云。手厥陰之正。別屬三焦。出循喉嚨。三焦手少陽之脈。上項繫耳後。而經別則無。經別雖無。其手厥陰之正。有別屬三焦。出循喉嚨者。以三焦與心包爲配。故曰。屬屬則經脈相屬而合一也。膽足少陽之脈。下加頰車。下頸。經

別篇又云。足少陽上夾咽。出頤頷中。肝足厥陰之脈。循喉嚨之後。上入頏顙。而經別亦無。故靈樞第十篇。諸經是動所生之病。有云頸腫者。（手陽明是動）有云顑頷喉痺者。（手陽明所生）有云頸腫喉痺者。（足陽明所生）有云舌本強者。（足太陰是動）有云舌本痛者。（足太陰所生）有云嗌乾者。（手少陰足厥陰二經是動）有云嗌痛頷腫者。（手太陽是動）有云頸頷腫者。（手太陽所生）有云項痛者。（足太陽所生）有云咽腫者。（足少陰所生）有云嗌乾及痛者。（足少陰所生）有云嗌

腫喉痺者。（手少陽是動）有云頷痛者。（足少陽所生）種種不同。總無外氣火二字。與本篇所云。氣有餘。則當脈所過者熱腫。同一義也。（宜黃芩枳殼連翹丹皮薄荷荊芥山梔防風牛蒡玄參黃蘗黃連山豆根射干升麻生地甘草桔梗石膏等藥在臨症定在何經相宜者用又不可純用寒凉須配輕散者斯善矣）然諸證之中。唯喉痺爲急。而喉痺中。又唯以發于手少陰少陽二經者。爲最急。蓋喉主天氣。通呼吸。爲生氣之門。火熱搏聚。則腫脹。腫脹則竅閉。竅閉則氣塞。氣塞則痰涎壅。愈壅愈塞。愈塞。

愈壅。呼吸亦將從此而斷。況少陰君火。少陽相火。火性速而炎上。較之他經。不更烈乎。故一二日。即成不治。唯鍼刺出血。以瀉其實。探吐痰涎。以決其壅。皆倉卒治標之妙法也。（刺腫處出血用鵞翎蘸醋滋之味以探吐）其脉多數。數則爲熱故耳。間有脉遲者。乃是外寒襲經。經氣不利。鬱滯于所過之處。故亦爲痺。外則兼表證。內亦不如數熱之腫痛。此不但忌用寒凉。而且當溫散也。更有一種纏喉風。或麻或痒。又腫又

痛。纏綿于內。腫達于外。一種走馬喉痺。須臾之間。痛而腫。腫而閉。閉而氣絕。暴發暴死。如走馬然。二者俱火中挾風。火性烈。風性疾。風火交煽。故發病凶暴如此。（此等證雖刺最妙）其脉應浮大洪數。而反見微伏。是正衰邪盛。補瀉兩從。欲其生也。不亦難乎。

附方

和劑甘桔湯　治風痰上壅。咽喉腫痛。吞吐有礙

苦桔梗（一兩）　炙甘草（二兩）

每服三錢。水一盞。煎七分。食後溫服。

三因荆芥湯　治咽喉腫痛。語聲不出。嚥之痛甚

荆芥（半兩）　桔梗（二兩）　甘草（一兩）

右剉散。每服四錢。水一盞。薑三片。煎六分。去滓溫服。

和劑解毒雄黃丸　治纏喉風。及急喉痺。卒然倒仆。牙關緊急。不省人事。

雄黃（研飛）　鬱金（各一兩）　巴豆（去皮出油十四枚）

右爲細末。醋煮麵糊爲丸。如菉豆大。熱茶清下七丸。吐出頑痰立甦。如未。再服。如至死者。心頭猶熱。灌藥不下。即以刀尺鐵匙。斡開口灌之。下咽無有不活。如小兒驚熱。痰涎壅塞。或二丸三丸。量大小加減。一法用雄黃丸三粒。醋磨化灌之尤妙。其痰即瘥。

寶鑑碧玉散　治心肺積熱。上攻咽喉。腫痛閉塞水漿不下。或喉痺。重舌。木舌。腫脹。皆可服。

青黛　盆硝　蒲黃

甘草（各等分）

右爲細末。研勻。每用少許。吹入咽喉內。細細嚥下。若作丸。用砂糖爲丸。每兩作五十丸。每服一丸。噙化嚥下。

寶鑑開關散　治喉風氣息不通

白殭蠶（炒去絲嘴）　枯白礬（各等分）

右爲細末。每服三錢。生薑蜜水調下。細細服之。

瓜蒂散　見第四十八

寶鑑備急如聖散　治時氣纏喉風。漸入咽喉。閉塞水穀不下。牙關緊急。不省人事。

雄黃（細研）　藜蘆　白礬（飛）

猪牙皂角（去皮弦）

右等分。爲細末。每用一豆大。鼻內喑之。立効。

咽喉急備丹

青黛　芒硝　白殭蠶（各一兩）

甘草（四兩）

右爲細末。用臘月內牛膽有黃者。盛藥其中。

四十九日。多時爲妙。

寶鑑增損如聖散　治風熱攻衝會厭。語聲不出。

咽喉妨悶腫痛

桔梗（二兩）　甘草（一兩半）　枳殼（湯浸去穰二錢半）

防風（半兩）

右爲細末。每服三錢。水一大盞。煎至七分。去滓。入酥如棗許。攪勻。食後溫服。

瑞竹羅青散　治单雙乳蛾

蒲黃（五錢）　羅青　盆硝（各研三錢）

甘草（二錢）

右爲細末。每服一錢。冷蜜水調。細細嚥之。吞不下。雞翎蘸藥喉內掃之。立効。

燒鹽散　治中懸癰垂長。咽中妨悶。

燒鹽枯礬研細。各等分。和勻。以筯頭點之。即消。

四七湯（見第十七）

四味湯　治咽喉中如有物噎吐不利。

半夏（以生薑汁浸一宿湯浸切洗）　厚朴（刮去粗皮以生薑汁浸炙黃）

赤茯苓（刮去黑皮二兩）　陳橘皮（以湯浸去白焙各一兩）

右剉碎。每服三錢七。水一盞。入生薑一棗大（拍）碎。煎六分。去滓。食遠温服。

白礬散　治急喉閉。

白礬（三錢）　巴豆（三個去皮作六瓣）

右將礬於銚內。慢火熬化爲水。置巴豆其內候乾。去巴豆。取礬研爲末。每用少許。吹入喉中。愈。

醫燈續焰卷七終

經云治病必求其本本者因也茲緣症求因搭恐無遺

醫燈續焰卷八

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖翼評
門人　李　彣珥臣
　　　徐鳴鶴子和

眩暈脈證第六十一

諸風眩暈。有火有痰。左澁死血。右大虛看。

眩者。目乍黑乍明。眈眈不定也。暈者頭昏目旋轉。

岑岑欲倒也。高巔而見動象。風性爲然。故眩暈者。多屬諸風。（或兼見惡風項强等證脈應浮宜芎藭散東垣羌活湯之類）又不獨一風也。有因于火者。有因于痰者。有因于死血者。有因于虛者。夫火性上炎。衝于巔頂。動搖旋轉。不言可知。（或兼見心煩口燥面赤耳鳴嘈雜吞酸等證脈應數宜凉膈散防風通聖散之類）胸中痰濁。隨氣上升。頭目位高而空明。清陽所注。淆濁之氣。擾亂其間。欲其不眩不暈。不可得矣。（或兼見吐痰嘔飲胸否腸鳴等證脈應滑宜東垣半夏白术天麻湯滚痰丸玉液湯之類）諸陽上

[illegible]曰眩暈頭目之病[illegible]中不用艽[illegible]者恐留中[illegible]不止也

行于頭。諸脉上注于目。血死。則脉凝泣。脉凝泣。則上注之力薄矣。薄則上虛而眩暈生焉。其脉左手必澁。澁爲滯澁。徵死血之不流利也。（或兼見脇痛喜忘目黃便黑等證宜四物湯丹皮紅花桃仁之類）又爲枯濇。徵血液之不充足也。謂之血虛眩暈亦可。（宜四物湯）脉必徵于左者。以左心主血。肝藏血。腎主液爲血之源耳。頭以法天。爲陽之首。又云清陽出上竅。而目在其中。淸陽者。氣也。氣不足。則不能上達。以致頭目空虛。而眩暈時

時作矣。其脉右手必大而無力。散漫空鬆之象也。謂之氣虛眩暈亦可。脉必徵于右者。以右肺主氣。脾生氣。命門火爲氣之根耳。（宜補中益氣湯芎歸菊花之類）

附方

芎藭散　治風頭旋。眼目昏痛眩暈。倦怠心忪。

芎藭　前胡　白殭蠶（炒）
人參（各一兩）　蔓荊子　天麻（酒浸焙）
防風（去叉各半兩）

右爲末。每服二錢。食後溫酒調下。

東垣羌活湯　治風熱壅盛。上攻頭目昏眩。

羌活　防風　黃芩（酒洗各一兩）
柴胡（七錢）　黃連（酒煮一兩）　黃檗（酒炒）
瓜蔞（酒洗各半兩）　甘草（炙七錢）　白茯苓（五錢）
澤瀉（三錢）

右爲麄末。每服五錢。水煎取清。食後或先卧。通口熱服之。日二服。

凉膈散（見第十九）

防風通聖散（見第四十九）

右散賈同知權宜武劉庭瑞及河間者共四方其中藥品增減分量多寡俱不相同但河間適中選用當從之也。

半夏白术天麻湯（見第二十二）

滾痰丸（見第十七）

玉液湯　治七情所傷。氣鬱生涎。隨氣上逆。頭目

山四氣真合脉妙絶不獨此然

眩暈。心嘈忪悸。肩背骨痛。

半夏（肥大者六錢，湯泡七次，切作片）

右作一服。水一鍾半。生薑十片。煎至八分。去滓。入沉香末少許。不拘時温服。

四物湯（見第二十一）

補中益氣湯（見第三十九）

頭痛脉證第六十二

頭痛多弦。浮風緊寒。熱洪濕細。緩滑厥痰。氣虛弦耎。

血虛微濇。腎厥弦堅。真痛短濇。

弦爲陰脉。勁直而無抑揚之勢。乃陽虛不能張大。或致外邪所乘。況頭乃六陽所聚。邪束于外。陽鬱於中。安得不痛。故頭痛者多弦。多弦者。不皆弦也。亦有脉浮而痛者。屬風。風性飄蕩虛浮也。（兼見惡風發熱自汗等證。宜仲景桂枝湯、玄珠茶調散之類）脉緊而痛者屬寒。寒性收歛緊實也。（兼見惡寒發熱無汗體痛等證。宜仲景麻黃湯、九味羌活湯之類）脉洪而痛者屬熱。熱性充溢洪大也。（兼見惡熱面赤口乾等證。其痛刺動

云手三之脉受風伏留而不者爲厥頭以手三陽脉不入準痛也若太入絡腦

不定。宜瀉青丸、二仙散、對金散、神芎丸、凉膈散之類）脉細而痛者屬濕。濕性滲衍濡細也。（兼見體痛頭重肙鼻塞目黃等證。宜奇効芎朮湯、半夏白朮天麻湯，或瓜蒂散或紅豆散搐鼻）脉緩滑而痛者屬痰。痰乃凝水結液。停蓄不流。故替替然緩滑也。（兼見嘔逆痞悶腸鳴等證。宜局方玉壺丸、半夏白朮天麻湯之類）脉弦耎而痛者屬氣虛。氣虛則弦歛耎弱而無鼓動之力。（兼見惡寒痛而空暈四肢多寒喜煖氣虛微體倦等證。宜補中益氣湯、六君子湯之類）脉微濇而痛者屬血虛。血虛則微弱濇滯而有乾燥之象。（兼見面白口乾頭兩側痛甚而兼暈痛加于夜或文熱等

證。宜四物湯、逍遙散之類）脉弦堅而痛者屬腎。腎氣厥逆。不能接引膀胱。膀胱經氣壅遏。上實下虛。巔爲之痛。脉亦弦直而堅實也。即靈樞經脉篇。所云膀胱是動則病衝頭痛。難經六十難所云厥頭痛者是也。（兼見頭重暈厥痛少腹裏急上熱下寒等證。宜六味丸、八味丸、羌活川芎之類）難經單言手三陽而不及足三陽。恐未盡善。素問五藏生成篇云。頭痛巔疾。下虛上實。過在足少陰巨陽。甚則入腎。此正指膀胱厥痛不已。甚則入腎而爲真頭痛

也。其痛連腦盡痛。齒亦痛。蓋腎主骨。主髓。髓以腦爲海。而齒則骨之餘也。其脉短濇者。短則陽脫于上。濇則陰衰于下。若手足厥寒至節者。必死不治（此等證若欲治之非猛進烏附之藥不可或灸百會穴以望生于萬一）雖然。頭痛又不止此數種。六府之清陽固上升。而五藏之精華亦上注。外有六淫之侵。內有經絡之逆。使隧道壅遏。清陽混濁。而痛作于頭巔者多矣。故五藏六府。皆能病此。但宜細察其脉。與兼見之證。以別其藏

府陰陽。寒熱虛實而施治焉。則萬舉萬當矣。

附方

桂枝湯（見第十九）

玄珠茶調散（見第二十二）

麻黃湯（見第十六）

九味羌活湯（見第十六）

瀉青丸（見第四十九）

二仙散即茶調散

大黃　黃芩（各二兩）　牽牛

滑石（各四兩）

右爲細末。滴水爲丸如小豆大。溫水下十五丸。

每服加十丸。以利爲度。日三服。

對金散　治偏正頭風。

大黃　黃芩（各等分）

右二味爲極細末。每服四分。臨睡用好酒調下。仍飲酒盡量一醉。散髮露頂卧。令人扇頭數百

扇。蓋煖。睡至明日病失矣。不愈。再一服如前法。

須大醉扇透。百發百中。

神芎丸（見第十七）

涼膈散（見第十九）

奇効芎朮湯　治濕頭痛。眩暈痛極。

川芎　附子（生去皮臍）　白朮（已上各三錢）

桂心（去皮）

右作一服。水二鍾。生薑七片。棗二枚。煎至一鍾。

食遠服。

半夏白术天麻湯（見第二十二）

瓜蒂散（見第四十八）

頭重紅荳散

麻黃根（炒半錢）　苦丁香（半錢）　紅荳（十粒）

羌活　連翹（各三錢）

右五味爲細末。鼻內搐之。

和劑玉壺丸　治風痰吐逆。頭痛目眩。胸膈煩滿。

飲食不下。及咳嗽痰盛。嘔吐涎沫。

天南星（生）　半夏（生各一兩）　天麻（半兩）

頭白麪（三兩）

右爲細末。滴水爲丸如梧桐子大。每服三十丸。用水一大盞。先煎令沸。下藥煮五七沸。候藥浮即熟。漉出放温。別用生薑湯下。不計時候服。

補中益氣湯（見第三十九）

六君子湯（見第十六）

瀉注兼見之
疰痛每遇情

四物湯（見第二十一）

逍遥散（見第五十一）

六味丸（見第十六）

八味丸（見第十六）

心腹痛脉證第六十三

心腹之痛。其類有九。細遲從吉。浮大延久。

心腹之痛。其類甚多。此僅言有九者。亦舉其要耳。曰飲。曰食。曰風。曰寒。曰熱。曰悸。曰虫。曰忤。曰疰。飲

者。痰飲也。痰飲兩中。清陽淆濁。故痛。（兼見氣喘否悶等證。其脉滑。宜二陳湯丹溪海蛤丸前胡半夏湯之類）食者。食物也。食物停積。氣礙不行。故痛。或飽食寒涼餧敗之物。擾亂中和。亦痛。（兼見脹滿嘔噯食臭惡食等證。其脉緊滑。宜加味枳术丸香砂平胃散之類）風者。風邪也。乘虛內干。邪正相搏。故痛。（兼見自汗惡風等證。其脉緩。宜香蘇散參蘇飲之類）寒者。寒邪也。乘虛內襲。榮脉凝泣。故痛。（兼見惡寒嘔逆喜温等證。其脉緊。宜五積散蘇合香丸之類）熱者。火也。火鬱不發。鬱蒸于中。故痛。（兼見惡熱熱中嘈雜吞酸等證。其脉數。宜梔吉清中湯越鞠丸佐金

（丸之類。）悸者。心中動悸也。中氣空虛。乍有所觸。不能持定。故痛。（兼見心煩心悸恍惚等證其脈虛微痛而欲按宜黃耆建中湯補中益氣湯六君子湯之類）蟲者。蟲積也。飲食不節。寒熱不時。以致蟲動。蟲動。則攻衝上下。故痛。（兼見面黃白斑駁嘔吐清水沃沫或作或止或痛處動欲食等證其脈大小不勻宜九痛丸剪紅丸蕪荑散仲景烏梅圓萬應丸集效丸之類。）忤者。客忤也。不正之邪。一時干忤。亂其清道。撓其運機。故痛。（兼見吐逆頭目不清或妄見妄言或不知人等證其脈數動宜蘇合丸備急丸紫金錠九痛丸之類）疰者。尸疰也。如蠱如蛭。不識何因。或去或

此症用尾壟
骨一味煅爲
末湯服甚妙

來。痛無定所。此得之凶人所傳。即傳尸氣也。（兼見骨蒸吐血欬嗽勞損諸證其脈微弱而數宜于勞瘵門選方對證用之）外有瘀血痛。厥心痛。真心痛三種。瘀血痛者。痛在胃脘。或熱飲食。或極嘔吐。致傷胃脘。絡血迸溢。瘀留于中。氣爲所礙。或作或止。或食下痛甚。或飲湯水作呃。其脈濇。（宜二陳湯桃仁紅花五靈脂玄胡香附韭汁藕汁紅曲之類）厥心痛者。因諸藏府經絡。有循胃口上膈者。（手太陰肺）有絡肺下膈者。（手陽明大腸）有下膈屬胃絡脾者。（足陽明胃）有從胃別上膈注心中者。（足太陰脾）有絡心下膈抵胃者。（手太陽小腸）有夾脊者。（足太陽膀胱）有絡心注胸中者。（足少陰腎）有起于胸中。出屬心包絡下膈者。（手厥陰心包絡）有布膻中。散絡心包下膈者。（手少陽少焦）有下胸中貫膈者。（足少陽膽）有夾胃上貫膈。布脇肋者。（足厥陰肝）有循腹裏。上關元者。（奇經任脈）有並於脊裏者。（奇經督脈）有夾臍上行。至胸中而散者。（奇經衝脈）有入裏維絡諸陰者。（奇經陰維脈）是諸藏府經絡。及任督衝維之脈。氣有厥逆。則經有偏盛。而當脈所過。

如胃口。胸。膈。心包。膻中。脊。脇。臍。腹等處。隨經相引而痛。乃諸經之痛。豈心痛哉。（諸經之痛則隨經有兼見之證如肺經痛。惡寒。氣急。脹滿。痛引缺盆。宜參蘇飲。香蘇散。蘇合丸之類。大腸痛。上引腸。腸鳴口乾。宜四七湯。枳桔二陳湯之類。胃痛。引脾。及臍乳。嘔吐。宜二陳湯。平胃散。東垣温胃湯。來復丹之類。脾痛。引胃脘心下。腹脹。善噫。善嘔。食不下。宜二陳湯。香砂平胃散。理中湯。來復丹之類。小腸痛。引膈胃。腸鳴。宜二陳湯。四七湯。蘇合丸之類。膀胱痛。引腰脊。惡寒。宜參蘇飲。東垣天台烏藥散。腎痛。引胸中腰脊。心如饑。上氣。喝喝而喘。善恐。宜牛黃丸。烏藥順氣散之類。心包痛。引包絡胸脇。胸脇支滿。心動。心煩。喜笑。宜二陳湯。鐵甕先生交感丹之類。三焦痛。引心包絡未。耳鳴。宜二陳湯。益智去之類。膽痛。引胸膈脇肋。足）

膽痛其矣名真

（苦善太息。振寒。宜二陳湯。溫膽湯。小柴胡湯之類。脇痛。引膈胃脇肋。嗌乾。嘔逆。胸滿。宜二陳湯。四七湯。來復丹之類。）真心痛者。真藏痛也。蓋心為一身君主。神明所居。邪不易侵。病不易及。必也真藏自虛。神明失守。致心包厥痛之邪。乘虛而入。難經言其痛甚但在心。但在心。則毫不控引他處。必兼見神昏舌短。手足青冷。斯為旦發夕死。夕發旦死之真心痛耳。已上諸痛。若脈見細遲。是氣減舒徐。厥邪衰退之象。理應從吉。設或大浮。知邪方盛。況心腹裏證

而得表脈。更非所宜。雖不至于頃躯。亦難愈也。

附方

二陳湯（見第十六）

丹溪海蛤丸　治痰飲心痛

海蛤（燒為灰研極細過數日火毒散用之）　瓜蔞仁（帶瓤同研）

右以海蛤入瓜蔞內。乾濕得所為丸。每服五十丸。

前胡半夏湯　治痰盛

前胡　半夏（薑製）　茯苓（各二錢）

陳皮　木香　紫蘇

枳殼　甘草（各一錢）

右作一服。水二鍾。生薑三片。烏梅一個。煎一鍾。食遠服。

正傳加味枳朮丸　治痰積。食積。酒積。果積。食積。肉積。在胃脘當心而痛。及痞滿惡心。嘈雜噯氣。吞酸吐嘔。脾疼等證。

白朮（三兩）　枳實（麩炒黃色）　蒼朮（米泔浸三宿焙）

豬苓（去黑皮）　麥蘖麪（炒微黃）　半夏（湯泡透各一兩）

澤瀉（去毛）　赤茯苓（去皮）　川芎

黃連（陳壁土炒去土）　白螺殼（煅各七錢）　縮砂仁

草豆蔻　黃芩（陳壁土同炒）　青皮（去白）

萊菔子（炒）　乾生薑（各七錢）　陳皮（去白）

香附米（童便浸）　神麴（炒微黃）　瓜蔞仁

厚朴（薑製炒）　檳榔（各三錢）　木香

甘艸（各二錢）

吞酸。加吳茱萸湯泡。寒月五錢。熱月二錢半。久病挾虛。加人參。白扁豆。石蓮肉。各五錢。時常口吐清水。加炒滑石一兩。牡蠣五錢。

右爲細末。用青荷葉泡湯浸晚粳米。研粉作糊爲丸。如桐子大。每服七十丸。多至百丸。清米飲送下。

香砂平胃散（見第四十四）

香蘇散（見第四十八）

參蘇飲（見第四十七）

五積散（見第三十七）

蘇合香丸（見第十八）

統旨清中湯　治火痛

黃連　山梔（炒各二錢）　陳皮

茯苓（各一錢半）　半夏（一錢薑湯炮七次）　草荳蔻仁（搥碎）

甘草（炙各七分）

水二鍾。薑三片。煎八分。食前服。

越鞠丸（見第四十一）

左金丸（見第四十九）

黃耆建中湯（見第二十一）

補中益氣湯（見第三十九）

六君子湯（見第十六）

金匱九痛丸　治九種心痛

附子（炮二兩）　生狼牙（炙香）　巴豆（去皮心炒研如脂各）

（半兩）　人參　乾薑

吳茱萸（各一兩）

右爲末。煉蜜丸如桐子大。酒下。强人初服三丸。日三服。弱者二丸。兼治卒中惡腹脹。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。併冷腫上氣。落馬墜車血疾等證。皆主之。忌口如常法。

神効剪紅丸　專取一切虫積。神効無比。凡人百病。皆人飲酒過度。食傷生冷。致使脾胃不和。心

膈脹滿。嘔惡咽酸。常吐清水。面色痿黃。不進飲食。山嵐瘴氣。水腫蠱脹。齁𩔰欬嗽。痰涎壅滯。酒積。食積。氣積氣塊。翻胃。噎膈。嘔逆。惡心。腸風痔漏。臟毒酒痢。累塊積熱。上攻頭目。下生瘡癬。婦人血氣。寒熱往來。肌體羸弱。月經不調。赤白帶下。鬼氣鬼胎。產後諸疾。小兒五疳虫積。誤吞銅鐵。惡食惡毒等物。並宜服之。每服五更雞鳴時。用冷茶清吞下。更用馬桶盛糞于野地看之。庶見藥易辨。或虫或積。或如魚凍。或作五色等積。若一次未見虫積。更看第二三次下來。此即是病根。有積消積。有氣消氣。有虫取虫。有塊消塊。若病根去。其病自消。若病淺。即一服見効。若源深。更須再一服。能宣導四時蘊積。春宣積滯。不生瘡毒。夏宣暑濕。不生熱痢。秋宣痰飲。不生瘴瘧。冬宣風寒。不生瘟疫。此藥溫和。不動元陽真氣。亦無反惡。小兒半服。孕婦依服。其效如神。

一上末　檳榔生研細。取淨末一斤。以二兩爲母。餘十四兩。上第一次。以一等羅篩過。取齊晒乾

二上末　商陸。即樟柳根。白者可用。赤者殺人。金毛狗脊。貫衆。各四兩。已上三味。和一處研極細末。上第二次。以二等羅篩過。取齊晒乾。

又方不用貫衆。則虫出來。猶未死也。

三上末　三稜醋煮。莪朮醋煮。各八兩。青木香。西木香。各四兩。雷丸醋煮二兩半。南木香二兩。已上六味。和一處研極細末。上第三次。以三等羅篩過。取齊晒乾

四上末　大黃剉碎。酒浸晒乾。研細取淨末一斤。上第四次。以四等羅篩。取齊晒乾。

五上末　黑牽牛。半生半炒。研細取頭末淨一斤。上第五次。以五等羅篩過。取齊晒乾。又方有枳殼一斤。爲母。有藿香四兩。和入諸藥。

右作五處。另研極細末。要作五次上末。却用茵蔯半斤。大皂角一斤。煎汁濾淨。法水爲丸。如菉豆大。晒乾。後用丁香末一兩。或加蘆薈末二兩亦妙。以前淨汁煎一滾。酒入丸藥。旋搖令光瑩爲度。再以阿膠二兩。以前汁熬溶。酒入丸藥。旋搖光瑩。晒乾。壯人每服五錢。弱人每服四錢。更以茶清吞下。小兒減半。

蕪荑散　治大人小兒蚘咬心痛。經云。虫貫心則

殺人。欲驗之。大痛不可忍。或吐青黃綠水涎沫。或吐虫出。發有休止。此是蚘心痛也。宜速療之。

蕪荑　雷丸（各半兩）　乾漆（搥碎炒火烟盡一兩）

右爲細末。每服三錢。温水七分。盞調和。服不拘時。甚者不過三服。小兒每服半錢。

仲景烏梅圓

烏梅（三百枚）　細辛（六兩）　乾薑（十兩）

當歸（四兩）　黃連（一斤）　附子（六兩炮去皮）

蜀椒（四兩去汗）　桂枝（六兩去皮）　人參（六兩）

黃蘗（六兩）

右十味。異搗篩合治之。以苦酒浸烏梅一宿。去核蒸之五升米下。飯熟。搗成泥和藥。令相得。內臼中。與蜜杵二千下。圓如梧桐子大。先食飲服十圓。日三服。稍加至二十圓。禁生冷滑物臭食等。

萬應丸　取虫積神効

黑牽牛（取頭末）　大黃　檳榔（各八兩）

雷丸（醋煮）　南木香（各一兩）　沉香（五錢）

右將黑牽牛。大黃。檳榔。和一處爲末。以大皂角苦練皮。各四兩煎汁。法水爲丸。如菉豆大。後以雷丸。木香。沉香。和一處研末爲衣。每服三四十丸。五更用砂糖水送下。或作末服亦可。

集効丸　治因藏府虛弱。或多食甘肥。致蛔虫動作。心腹絞痛。發則種聚。往來上下。痛有休止。腹

中煩熱。口吐涎沫。是蛔虫。宜服此藥。若積年不瘥。服之亦愈。又治下部有虫。生痔癢痛。

木香　鶴虱（炒）　訶子（麵裹煨去核）

檳榔　蕪荑（炒）　附子（煨去皮臍）

乾薑（各七錢半）　大黃（一兩半）　烏梅（十四個去核）

右為末。煉蜜丸如桐子大。每服三四十丸。食前用陳皮湯下。婦人淡醋湯送下。

備急丸（見第三十五）

紫金錠　一名玉樞丹。一名神仙解毒萬病丹。治一切藥毒。菰子毒。鼠莽毒。惡菌蕈。金石毒。喫疫死牛馬肉毒。河豚毒。時行瘟疫。山嵐瘴瘧。忽然喉閉。纏喉風。脾病黃腫。赤眼瘡癤。衝冒寒暑。熱毒上攻。或自縊溺水。打撲損傷。癰疽發背。未破魚臍瘡腫。湯火所傷。百虫鼠犬蛇傷。顛邪狂走。鬼胎鬼氣。並宜服之。凡人居家。或出入。不可無此藥。真濟世衛家之寶。如毒藥蠱毒最多。若遊宦嶺表。纔覺意思不快。便服之即安。二廣山谷間。有草曰胡蔓草。又名斷腸草。若人以急水吞之急死。緩水吞之緩死。又取毒蛇殺之。以草覆之。以水灑之。數日菌生其上。取為末。酒調以毒人。始亦無患。再飲酒。即毒發立死。其俗淫婦人多自配合北人。與人情分相好。多不肯逐北人回。陰以藥置食中。北人還。即戒之曰。子某年來。若從其言。即復以藥解之。若過期不往。必死矣。名

曰定年藥。北人屆彼。亦宜誌之。若覺中毒。四大不調。即便服之。或於雞豚魚羊鵝鴨等肉下藥。復食此物。即觸發其毒。急服此藥一粒。或吐或利。隨服便瘥。昔一女子久患勞瘵。為屍虫所噬。磨一粒服之。一時久。吐下小虫千餘條。一大者。正為兩段。後只服蘇合香丸。半月遂服如常。至牛馬六畜中毒。亦以此救之。無不效。

山茨菰（南北處處有之俗名金燈籠葉似韭花似燈籠色白上有黑點結子三稜二月）

（謂花結子四月初苗枯即空地得之遲則萬腐爛難尋矣與有毒老鴉蒜極相類但蒜無毛茨菰上有毛包裹宜擇去皮洗極淨焙二兩）

川文蛤（一名五倍子槌破洗刮內淨焙乾二兩）

千金子（一名續隨子去殼揀色白者用紙包裹換紙研數十次去盡油以色白再研紙無油成霜為度一兩）

麝香（揀盡血毛皮殼細研淨三錢）

紅芽大戟（杭州紫大戟為上江南土大戟次之去蘆根洗極淨焙乾一兩半北方綿大戟色白者大峻利反能傷人弱人服之有吐血者慎之）

右各研為細末和勻。以糯米粥為劑。每料分作四十粒。於端午重陽七夕合。如欲急用。辰日亦可。於木臼中杵數百下。不得令孝婦人。孝子。不具足人。雞犬之類見之。切宜秘惜。不可廣傳。輕之無効。　如癰疽發背未破之時。用冷水磨塗痛處。并磨服。良久覺痒立消。　陰陽二毒。傷寒心悶。狂言亂語。胸膈壅滯。邪毒未發。及瘟疫山嵐瘴氣。纏喉風。冷水入薄荷一葉。同研下。　急中顛邪。喝叫亂走。鬼胎鬼氣。並用煖無灰酒下。

自縊并落水死。心頭煖者。及驚死。鬼迷死。未隔宿者。並冷水磨灌下。　蛇犬蜈蚣傷。並用冷水磨塗傷處。　諸般瘧疾。不問新久。臨發時。煎桃柳枝湯磨下。　小兒急慢驚風。五疳八痢。蜜水薄荷一葉同磨下。　牙關緊急。磨塗一丸。分作三服。量大小與之。　牙痛酒磨塗。及含藥少許吞下。　湯火傷。東流水磨塗傷處。　打撲損

傷。炒松節無灰酒下。　年深日久頭疼。太陽疼。用酒入薄荷葉磨。紙花貼太陽穴上。　諸般癱疾。口眼喎斜。眼目掣眨。言語蹇澁。卒中風口噤。牙關緊急。筋脉攣縮。骨節風腫。手足疼痛。行步艱辛。一應風氣疼痛。並用酒磨下。有孕婦人不可服。（一方加山豆根全蝎朱砂雄黃各一兩）

四七湯（見第十七）

枳桔二陳湯（見第四十八）

平胃散（見第四十四）

東垣溫胃湯　治服寒藥多。致脾胃虛弱。胃脘痛。

白豆蔻（二分）　益智　砂仁

厚朴　甘草　乾薑

薑黃（各二分）　黃耆　陳皮（各七分）

人參　澤瀉（各三分）

右為細末。每服三錢。水一盞。煎半盞。食前溫服。

來復丹（見第十七）

理中湯（見第十七）

東垣天台烏藥散　治一切沉寒痼冷。心腹攪痛。

并積年寒疝。

天台烏藥　木香　茴香（炒）

青皮（去白）　良薑（炒各五錢）　檳榔（剉二枚）

川楝子（十個）　巴豆（十四枚）

右十味。先以巴豆打碎同楝子用麩炒黑色。去巴豆麩。俱不用。外為細末。每服一錢。溫酒調下。

痛甚者。炒生薑熱酒下。

和劑半硫丸（見第五十七）

烏藥順氣散　治風氣攻注四肢。骨節疼痛。遍身頑麻。及癱瘓。步履艱難。腳腰痿軟。或心腹疼痛。

麻黃（去根節）　陳皮　烏藥（各二錢）

白殭蚕（去系嘴炒）　乾薑（炮五分）　川芎

枳殼　桔梗　白芷

甘草（炒各一錢）

水二鍾。薑三片棗一枚。煎八分。食遠服。

鐵甕先生交感丹（見第五十八）

温膽湯（見第二十）

小柴胡湯（見第四十三）

醫燈續焰卷八（終）

醫燈續焰目錄

卷之九

疝氣脉證第六十四
桂附二陳湯　東垣川苦楝散
金匱烏頭煎（見第十七）　和劑葫蘆巴丸
蘇合香丸（見第十八）　桂枝湯（見第十九）
東垣丁香楝實丸　茴香散
木香散　天台烏藥散（見第六十三）

腰子散　五苓散（見第十七）
仲景牡蠣澤瀉散　正氣天香散（見第十七）
金匱蜘蛛散　荔核散
三層茴香丸　濟生橘核丸
香附散　龍膽瀉肝湯
加味逍遙散（見第五十一）
腰痛脉證第六十五
調肝散　加味逍遙散（見第五十一）
逍遙散（見第五十一）　東垣羌活勝濕湯
川芎肉桂湯　九味羌活湯（見第十六）
金匱腎氣丸（見第十六）　六味地黃丸（見第十六）
直指青娥圓　東垣蒼朮湯
統旨清濕散　四物湯（見第二十一）
平胃散（見第四十四）　導痰湯（見第四十一）
保命煨腎丸　黑地黃丸（見第五十一）
知蘗地黃丸（見第五十四）　局方普賢正氣散

二至丸　子和無比山藥丸
金匱腎著湯（見第二十一）　子和禹功散
良方人參順氣散　烏藥順氣散（見第六十三）
調榮活絡飲　仲景桃仁承氣湯（見第二十）
滾痰丸（見第十七）
腳氣脉證第六十六
麻黃湯（見第十六）　桂枝湯（見第十九）
九味羌活湯（見第十六）　敗毒散（見第三十七）

集驗麻黃左經湯　得効芎芷香蘇散
大黃左經湯　小柴胡湯（見第四十三）
半夏左經湯　大料神秘左經湯
加味敗毒散　胃苓湯（見第十七）
六物附子湯　仲景麻黃附子細辛湯
金匱八味丸（見第十六）　茱萸木瓜湯
神應養真丹　追毒湯

卷之十

痿病脈證第六十七

丹溪虎潛丸　補陰丸
四物湯（見第二十一）　三因加減四斤丸
東垣神効黃耆湯　錢氏瀉黃散（見第四十九）
仲景炙甘艸湯（見第三十三）
熟地黃丸（見第五十一）　知蘖八味丸（見第五十四）
加味逍遙散（見第五十一）　胃苓湯（見第十七）
金匱防已黃耆湯　東垣參朮湯
六味地黃丸（見第十六）

痺病脈證第六十八

當歸湯　紫蘇子湯
茯神湯　萆薢丸
奇効人參散　加味五痺湯
温中法麴丸　黃耆丸
茯苓川芎湯　腎瀝湯
仙靈脾散　三因控涎丹（見第二十二）

烏藥順氣散（見第六十五）　丹溪二妙散
東垣神効黃耆湯（見第六十七）
東垣溫經除濕湯　史國公浸酒方

五疸脈證第六十九

金匱茵蔯湯　金匱消石礬石散
金匱梔子大黃湯　金匱黃耆芍桂酒湯
金匱桂枝加黃耆湯　金匱猪膏髮煎
金匱茵蔯五苓散　大黃硝石湯

小半夏湯　小柴胡湯（見第四十三）

小建中湯

卷之十一

水病脉證第七十

金匱防巳黄耆湯（見第六十七）

仲景越婢湯　金匱防巳茯苓湯

金匱蒲灰散　越婢加术湯（即前越婢湯）

甘艸麻黄湯　當歸散

分氣補心湯　分氣香蘇飲

導水茯苓湯　胃苓湯（見第十七）

元戎調胃白术澤瀉散

金匱腎氣丸（見第十六）　濟生腎氣丸

調榮飲　四製香附丸

濟生實脾飲　復元丹（見第六十四）

金匱桂枝去芍藥加麻辛附子湯

金匱枳术湯　麻黄附子湯

葶藶丸　和劑五皮飲

除濕湯（見第二十一）　四磨湯

琥珀飲子　五苓散（見第十七）

和劑木香流氣飲　和劑黑錫丹

和劑蘇子降氣湯　寶鑑導滯通經湯

和劑木瓜圓　消導寬中湯（加味五皮湯）

消風敗毒散　和劑升麻和氣散

補中益氣湯（見第三十九）　六味地黄丸（見第十六）

東垣人參平肺散　八正散（見第四十九）

仲景梔子豉湯

醫燈續焰卷九

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖翼評
門人　余正巳君求
　　　李國璋彥卿　校

疝氣脈證第六十四

疝氣弦急積聚在裏。牢急者生。弱急者死。

疝氣者氣聚而大。外仍歛束。故脈則見弦急而症

則多脹痛也。字下從山。亦是聚而大之之義。皆從寒濕積鬱于裏得之。間有曰風。曰熱者。亦不過寒風濕熱耳。其發也、多惡寒、寒熱、嘔逆不食。狀類傷寒。但兼腹痛、或小腹痛脹、或只遶臍痛。或上衝心胸痛。或傍引脇肋痛、或臍下鞭急、或氣走腸鳴、或控引睾丸。痛脹急墜。或氣歸囊袋。收縱不時。甚或囊外或冷。或濕、或熱、或紅。亦有出水。及久久成㿗者。此皆裏有故積、復感風寒亦濕、或加奔走焦勞。以致觸動積邪。氣聚而發。或一二日。或延多日。得溫煖及出汗。俱能氣散而解也。其脈弦急者。弦急乃厥陰肝脈。疝多發于肝故也。又弦歛急直。氣不鼓暢。主諸痛脹。疝則未有不痛不脹者。若弦急而牢。見積聚之有根。亦徵元本之壯實。脈證兩宜。故曰生。若但急而弱、急則邪盛。弱則正衰。更非積聚在裏者之所宜故曰死。所云多發于肝者。素問五藏生成論。平人氣象論。長刺節論。謬刺論。及靈樞

經脈篇之言也。而素問骨空論又云。有發于任脈督脈者。素問陰陽別論。五藏生成論。脈要精微論。玉機眞藏論。大奇論。四時刺逆從論。及靈樞邪氣藏府病形篇。經筋篇。又皆云有發于別藏別府者。骨空論言任脈有內結七疝之名。而未有七疝之狀。巢氏因敘七疝曰厥疝。曰癥疝。曰寒疝。曰氣疝。曰盤疝。曰胕疝。曰狼疝。而張子和復立七疝之名曰寒疝。曰水疝。曰筋疝。曰血疝。曰氣疝。曰狐疝。曰

[illegible]疝。外復有小兒㿗疝。及膀胱小腸氣。亦指稱爲疝者。聚訟紛紛。迄無定論。近惟張景岳一辨。最爲詳悉得理。玆錄于左。不敢再贅。景岳曰。愚按本經諸篇。所言疝證不一。有云狐疝者。以其出入不常也。有㿗疝者。以其頑腫不仁也。有衝疝者。以其自少腹上衝心而痛也。有厥疝者。以積氣在腹中而氣逆爲疝也。有瘕疝者。以少腹寃熱而痛出白。一名蠱也。有六經風疝者。如四時刺逆從論之所

云也。有小腸病者。如邪氣藏府病形篇曰。小腸病者。小腹痛。腰脊控睾而痛。時窘之後者。亦疝之屬也。是皆諸疝之義。按骨空論曰。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。蓋任脈者。起于中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。總諸陰之會。故諸疝之在小腹者。無不由任脈爲之原。而諸經爲之派耳。云七疝者。乃總諸疝爲言。如四時刺逆從論所言者六也。邪氣藏府病形篇所言者一也。蓋以諸經

[illegible]分治直[illegible]提綱[illegible]多說

之疝。所屬有七。故云七疝。若狐㿗衝厥之類。亦不過爲七疝之別名耳。後世如巢氏所敘七疝。則曰厥。癥。寒。氣。盤。胕。狼。至張子和非之曰。此俗工所立謬名也。蓋環陰器上抵少腹者。乃屬足厥陰肝經之部分。是受疝之處也。又曰。凡疝者。非肝木受邪。則肝木自甚。皆屬肝經。於是亦立七疝之名。曰寒。水。筋。血。氣。狐。㿗。治多用下。繼自丹溪以來。皆宗其說。然以愚觀之。亦未爲得。夫前陰小腹之間。乃足

三陰。陽明任。衝。督。脈之所聚。豈得獨以厥陰經爲言。但如四時刺逆從論所云。六疝皆兼風言者。本非外入之風。蓋風屬肝。肝主筋。故凡病各經之疝者。謂其病多在筋而皆挾肝邪則可。若謂必在厥陰則不可也。後世議論徒多。又安能出內經之囿範哉。學者當以經旨爲正。至于治之之法。大都此證寒則多痛。熱則多縱。濕則多㿉墜。虛者亦然。若重在血分者不移。在氣分者多動。分察六者於諸

經。各因其多少虛實兼治之。自無不効也。

巢氏七疝狀

厥逆心痛。足寒諸飲食吐不下。名曰厥疝。宜（桂附二陳湯之類）

腹中氣滿。心下痛。氣積如臂。名曰癥疝。宜（東垣川苦楝散）

寒飲食。卽脇下腹中盡痛。名曰寒疝。宜（仲景烏頭煎和劑葫蘆巴丸之類）

腹中乍滿乍減而痛。名曰氣疝。宜（蘇合香丸東垣川苦楝散之類）

腹中痛在臍傍。名曰盤疝。宜（桂枝湯東垣丁香楝實丸之類）

腹中臍下有積聚。名曰胕疝。宜（茴香散之類）

小腹與陰相引而痛。大便難。名曰狼疝。宜（木香散丁香楝實丸之類）

張子和七疝狀

寒疝。其狀囊冷結硬如石。陰莖不舉。或控睪丸而痛。得於坐卧濕地。或寒月涉水。或冒雨雪。或坐卧磚石。或風冷處。使內過勞。宜以温劑下之。久而無子。宜（東垣天台烏藥散之類）

水疝。其狀腎囊腫痛。陰汗時出。或囊腫而狀如水晶。或囊癢而搔出黃水。或少腹中。按之作水聲。得于飲水醉酒。使內過勞。汗出。而遇風寒濕之氣。聚於囊中。故水多。令人爲卒疝。宜以逐水之劑下之。有漏針去水者。人多不得其法。宜（腰子散五苓散仲景牡蠣澤瀉散之類）

筋疝。其狀陰莖腫脹。或潰或膿。或痛而裏急筋縮。

或莖中痛。痛極則痒。或挺縱不收。或白物如精。隨溲而下。久而得于房室勞傷。及邪術所使。宜以降心之劑下之。宜（白芍茯苓當歸小茴香青皮黃蘗蒼术川楝之類）

血疝。其狀如黃瓜。在少腹兩傍。橫骨兩端約中。俗云便癰。得于重感春夏大燠。勞於使內。氣血流溢滲入脬囊。留而不去。結成癰腫。膿少血多。宜以和血之劑下之。宜（歸芍牛膝靈脂青皮木香丹皮没藥玄胡索之類）

氣疝。其狀上連腎區。下及陰囊。或因號哭忿怒。則

[illegible]家另立諸之名各隨

[illegible]形狀而[illegible]分言有寒[illegible]筋水氣血[illegible]洋總不出[illegible]中厥氣爲[illegible]耳

氣鬱而脹。怒哭號罷。則氣散者是也。有一治法。以針出氣而愈者。然針有得失。宜以散氣之藥下之。或小兒亦有此疾。俗曰偏氣。得於父已年老。或年少多病。陰痿精怯。強力入房。因而有子。胎中病也。此證不治。惟築賓一穴灸之。（宜正氣天香散之類）

狐疝。其狀如瓦。臥則入小腹。行立則出小腹。入囊中。狐則晝出穴而溺。夜則入穴而不溺。此疝出入上下往來。正與狐相類也。亦與氣疝大同小異。今

人帶鉤鈐是也。宜以逐氣流經之藥下之。（宜金匱蜘蛛散之類）

㿗疝。其狀陰囊腫縋。如升如斗。不癢不痛者是也。得之地氣卑濕所生。故江淮之間。湫溏之處。多感此疾。宜以去濕之藥下之。女子陰戶突出。雖亦此類。乃熱則不禁固也。不可便謂虛寒而澁之。燥之。補之。本名曰㿗。宜以苦下之。以苦堅之。（宜荔核散三層茴香丸。宜橘核丸香附散之類。女子陰突。肝火居多。宜龍膽瀉肝湯加味逍遙散。或少加升提之類）

已上子和論疝七條。形證可謂詳悉。但七疝七名。形證亦異。治之當各有方。而俱云下者。恐出偏見。今擬對證方藥于下。在診之者。合宜則用。亦不敢槩云不可下也。

附方

桂附二陳湯（即二陳加肉桂附子）

東垣川苦楝散

木香　川楝子（剉細用巴豆十粒打破一處炒黃去巴豆）

茴香（鹽一匙炒黃去鹽各一兩）

右爲細末。每服二錢。空心食前。溫酒調下。

金匱烏頭煎（見第十七）

和劑葫蘆巴丸　治小腸疝氣。偏墜陰腫。小腹有形如卵。上下來去。痛不可忍。或絞結繞臍攻刺。嘔吐悶亂。

葫蘆巴（炒一斤）　茴香（鹽炒十二兩）　吳茱萸（洗炒十兩）

川楝子（去核炒一斤二兩）　巴戟（去心炒）

川烏（各六兩炮去皮）

右爲末。酒糊丸如桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心溫酒下。小兒五丸。茴香湯下。食前。一方有黑牽牛。

蘇合香丸（見第十八）

桂枝湯（見第十九）

東垣丁香楝實丸　治男子七疝。痛不可忍。婦人瘕聚帶下。

當歸（去蘆）　附子　川楝子

茴香（炒各一兩）

右四味剉碎。以好酒三升。同煮酒盡。焙乾。作細末。每秤藥末一兩。再入下項藥。

丁香　木香（各五分一作二錢）　全蝎（十三個）

玄胡索（五錢一作一兩）

右四味。同爲細末。入前項當歸等末拌勻。酒糊丸如桐子大。每服三十丸。至百丸。空心食前溫酒送下。一方無當歸木香。名苦楝丸。

茴香散　治膀胱氣痛。

茴香　蓬朮　京三稜

金鈴子肉（各一兩）　炙甘草（半兩）

右爲細末。每服二錢。熱酒調服。每發痛甚連日。只二三服立定。

木香散　治心疝。小腹痛悶不已。

木香　陳皮　良薑

乾薑　訶子（去核）　枳實（各一錢半）

草豆蔻　黑牽牛　川芎（各一錢）

水二鍾。煎一鍾。食前服。或爲細末。每服二錢。白湯調服。

東垣天台烏藥散（見第六十三）

腰子散　治腎氣作痛

黑牽牛（炒熟）　白牽牛（炒熟）

爲細末。每用三錢。猪腰子一對。薄切開縫。入川

椒五十粒。茴香一百粒。以牽牛末。徧擦入腰子中。線紮濕紙數重裹。煨香熟。出火氣。燈後空心嚼喫。好酒送下。少頃就枕。天明取下惡物即愈。

五苓散（見第十七）

金匱牡蠣澤瀉散

牡蠣　澤瀉　蜀漆（洗去腥）

栝蔞根　葶藶子　商陸根（熬）

海藻（洗去鹹已上各等分）

右七味。異擣下。篩爲散。更入臼中治之。白飲和服方寸七。小便利止後服。

正氣天香散（見第十七）

金匱蜘蛛散

蜘蛛（十四枚炒焦）　桂（半錢要入厥陰取其肉厚者）

右爲散。每服一錢。蜜丸亦可。雷公云。凡使勿用五色者。兼大身上有刺毛者。并薄小者。須用屋西南有網。身小尻大。腹內有蒼黃膿者眞也。凡

[illegible]

用去頭足了。研如膏。投藥中。此余之法。仲景炒焦用。全無功矣。

荔核散　治疝氣陰核腫大。痛不可忍。

荔枝核（十四枚燒灰存性用新者）　八角茴香（炒）

沉香　木香　青鹽

食鹽（各一錢）　川楝肉　小茴香（各二錢）

右爲細末。每服三錢。空心熱酒調服。

三層茴香丸　治腎與膀胱俱虛。爲邪氣搏結。遂

成寒疝。伏留不散。臍腹疼痛。陰核偏大。膚囊腫。重墜滋長。有妨行步。瘙痒不止。時出黃水。浸成瘡瘍。或長怪肉。屢治不痊。以致腎經閉結。陰陽不通。外腎腫脹。冷硬如石。漸大。皆由頻服熱藥內攻。或因兜取。以致如此。用藥溫導陽氣。漸退寒邪。補虛消疝。暖養腎經。能使復元。一應小腸氣寒疝之疾。久新不過三料。

第一料

舶上茴香（用鹽半兩同炒焦黃和鹽秤）　川楝子（炮去核）

沙參（洗剉）　木香（各一兩）

右爲細末。煮米糊爲丸。如桐子大。每服二十丸。空心用温酒。或鹽湯下。日三服。小病一料可安。纔盡。便可用第二料。

第二料藥加

蓽撥（一兩）　檳榔（半兩）

右共前藥六味。重五兩半。爲末。依前糊丸。丸數

湯使亦如前。若病未愈。服第三料。

第三料藥加

白茯苓（四兩紫實者去黑皮）　黑附子（炮去皮臍秤半）
（兩或加作一兩）

右通前八味。重十兩。並依前糊丸湯使。丸數加至三十丸。小腸氣發頻。及三十年者。寒疝氣如栲栳大者。皆可消散。神効。

濟生橘核丸　治四種㿗病。卵核腫脹。偏有小大。或堅硬如石。痛引臍腹。甚則膚囊腫脹成瘡。時出黃水。或成癰潰爛。

橘核　海藻　昆布

海帶（各洗）　川楝肉（炒）　桃仁（麩炒各一兩）

製厚朴　木通　枳實（麩炒）

延胡索（炒）　桂心　木香（各半兩）

爲細末。酒糊丸如梧子大。每服七十丸。空心鹽酒鹽湯下。虛寒甚者。加炮川烏一兩。堅脹久不

消者。加硇砂二錢。醋煮旋入。

香附散　治㿗疝脹。及小腸氣。

右用香附不拘多少。爲末。每用酒一盞。入海藻一錢。煎至半盞。先撈海藻細嚼。調香附末二錢服。一方以海藻爲末。用熱酒調尤効。甚者灌之。一方熱酒下荆芥末。

龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱。兩拗腫痛。或腹中疼痛。或小便澁滯等證。

龍膽草（酒拌炒黃）　澤瀉（各一錢）　車前子（炒）
木通　生地黃（酒拌）　山梔（炒）
當歸（酒拌）　黃芩（炒）　甘草（各五分）

右水煎服

加味逍遙散（見第五十一）

腰痛脈證第六十五

腰痛之脈。多沉而弦。兼浮者風。兼緊者寒。弦滑痰飲。濡細腎着。大乃腎虛。沉實閃肭。

腰痛者。足之六經病也。足三陽從頭走足。足三陰從足入腹。各經受邪。則隨各經之所過者爲痛。與頭心爲痛之義畧同。而手之六經不與焉。以手經不至于腰也。其因有三。曰外因。内因。曰不内外因。外因者。風熱寒濕也。木化風。火化熱。水化寒。土化濕。風多傷厥陰。火多傷少陽。寒多傷太陽少陰。濕多傷太陰陽明。此言邪傷足三陰三陽之經也。亦各從其類也。厥陰腰痛。腰中如張弓弩弦。（宜調肝散加味逍遙散之類）少陽腰痛。如以針刺其皮中。循循然不可以俛仰。不可以顧。（宜逍遙散倍白芍加枳殼木香之類）太陽腰痛。則引項脊尻背如重狀。（宜東垣羌活勝濕湯川芎肉桂湯九味羌活湯之類）足少陰腰痛。痛引脊內廉。（宜金匱八味丸六味丸青娥圓之類）太陰散脈腰痛。腰下如有橫木居其中。甚則遺溲。（宜東垣蒼木湯統旨清濕散之類）陽明腰痛。不可以顧。顧如有見者。善悲。（宜四物湯平胃散導痰湯之類）内因者。恐懼失志。恚怒忿恨。抑鬱憂思也。恐懼失志則傷腎。恚怒忿恨則傷肝。抑鬱憂思則傷脾。此言情志不得其所。三陰藏氣自傷也。亦各從其類也。腎傷腰痛。虛羸不足。面目黧黑。遠行久立。力不能盡。（宜六味丸腎氣丸黑地黃丸之類）肝傷腰痛。腹急脇脹。目視䀮䀮。所祈不得。意淫于外。宗筋弛縱。及爲白淫。（宜六味丸加知蘗之類）脾傷腰痛。肌肉濡漬。痺而不仁。飲食不化。腸胃脹滿。閉墜腰脇。（宜平胃散局方普賢正氣散之類）不内外因者。房室過度。煩勞不節以致精力耗竭。腰脊空虛。發爲腰痛。蓋精藏于腎。而腰者

[illegible]

内因兼[illegible]症

不内外因兼見形體症

腎之府，力出于脊，而腰者脊所系，其痛轉側屈伸不得，膝酸脛冷，腰中冷，面黑，傴僂不能久立。（宜二至丸、子和無比山藥丸、六味丸之類）一種腰痛，因作勞多汗，衣裹冷濕，久久得之，其證身重不渴，小便自利，食飲如常，腰以下冷重如帶五千錢者，名曰腎着。（腎着者，因勞極腎脊之氣張散，汗濕乘之，乘其已所勝也。濕因汗滲腰脊之間，着而不行，精邪有着落，無彼他處，故但腰痛而重，更無他證，如上所云。宜仲景腎着湯、子和禹功散、若清濕散、滲濕湯之類）一種因撲擊墮墜，閃朒，氣血凝滯，或只氣滯而血未至于瘀，或血瘀結而氣久方行，令人傴僂腫痛而重，牽引脇脊。

氣滯者，呼吸亦痛，不能轉側，鼻塞，身不動則痛亦定。（宜良方人參順氣散、烏藥順氣散之類）血瘀者，亦轉側不能，腰下重痛若錐刀之刺，大便黑，面目黃，日輕夜重。（宜調榮活絡飲、仲景桃仁承氣湯之類）一種積痰停飲，阻滯于腰脇之間，有礙氣道，亦能作痛，其痛或作或止，或移易不定，或不仁，或麻木，或痛處如冰，腰脊重墜。（宜導痰湯、王隱君滾痰丸之類）以上諸證大抵外因寒濕多，而風熱少。內因，憂多，肝次之，而脾藏少，不內外因，感亦明顯，若謹慎善攝之人，自不多罹，并可終身不一遇也。諸腰痛，脉多沉弦者，沉為在裏，在下，弦則為痛，故多沉弦也。兼浮者，沉弦中有泛泛欲浮之勢，所爾如水漂木，舉之有餘，是狀風邪虛浮之性，非言在表之浮也。兼緊者寒，寒緊斂也。兼滑者痰飲，痰飲滑利也。兼濡細者腎着，腎着者濕，濡細滲着也。兼大者腎虛，腎虛不斂藏而反空鬆虛大也。兼實者閃朒，閃朒非血瘀，則氣滯，皆成凝滯，故沉實也。

附方

調肝散　治鬱怒傷肝，發為腰痛。

半夏（製三分）　辣桂　宣木瓜

當歸　川芎　牛膝

細辛（各二分）　石菖蒲　酸棗仁（盪去皮，微炒）

甘草（炙各一分）

每三錢，薑五片，棗二枚，煎服。

加味逍遙散（見第五十一）

東垣羌活勝濕湯　治脊痛項強。腰似折。項似拔。衝頭痛。乃足太陽經不行也。

羌活　獨活　藁本

防風（各一錢）　蔓荊子（三分）　川芎（二分）

甘草（炙五分）

右㕮咀。作一服。水二盞。煎一盞。去滓食後溫服

東垣川芎肉桂湯　丁未年冬。曹通甫自河東來。

有役人小翟。宿於寒濕之地。腰痛不能轉側。兩脇搐急作痛。月餘不愈。腰痛論中所說。皆爲足太陽。足少陰血絡中。有凝血作痛。間有一二證。屬少陽膽經。外絡脉病。皆宜去血絡之凝乃愈。其內經有云。冬三月。禁不得鍼。只宜服藥通其經絡。破其血絡中敗血。此方主之。

羌活（一錢半）　柴胡（一錢）　獨活（五分）

肉桂　蒼朮（各一錢）　防風

曰此方[illegible]腎命

溝門元氣虛寒者爲宜故又能安胎以女子系胞處也

漢防巳（各三分）　桃仁（五枚去皮另研如泥）　歸稍

甘草（炙）　川芎（各一錢）　炒麪

右㕮咀。水酒煎。去滓食遠熱服。

九味羌活湯（見第十六）

六味丸（見第十六）

八味丸（見第十六）

直指青娥圓　治腎虛腰痛。益精助陽。烏鬚壯脚

用安胎飲呑。神効。

破故紙（四兩炒香）　杜仲（去麄皮剉四兩用生薑二兩半擣淹炒乾）

右爲末。用胡桃肉三十個研膏。入少熟蜜圓桐子大。每服五十圓。食前下。

東垣蒼朮湯　治濕熱脚腿疼痛。

蒼朮（五錢去濕止痛）　柴胡（三錢行經）　防風（一錢半去風勝濕）

黃蘗（一錢半始得之時寒也久不愈寒化爲熱除熱止痛）

水二鍾。煎至一鍾。空心食前服。

疏肯清濕散

黃蘗（鹽水拌炒一錢五分）　澤瀉（一錢）　蒼朮（一錢半米泔浸炒）

杜仲　白芍藥（煨）　牛膝（酒浸）

木瓜　葳靈仙　陳皮（各一錢）

甘艸（三分）

痛甚者。加乳香沒藥末五分。臨服調入。

四物湯（見第二十一）

平胃散（見第四十四）

導痰湯（見第四十一）

保命煨腎丸　治腎肝損。及脾損穀不化。宜益精緩中消穀。

牛膝　萆薢　杜仲（炒去絲）

白蒺藜　防風　兎絲子（酒浸）

肉蓯蓉（酒浸）　葫蘆巴　破故紙（酒炒各等分）

官桂（減半）

右爲細末。將猪腰子製如食法。搗爛。煉蜜和杵。丸如桐子大。每服五七十丸。空心用温酒送下。

[illegible]白鹿乃獸屬陽夏得陰氣而解麋乃澤獸屬陰冬至得陽氣而角解方中以此二品爲君故名二至

治腰痛不起。甚効。

黑地黃丸（見第五十一）

知蘗八味丸（見第五十四）

和劑普賢正氣散

陳皮　半夏　蒼朮

厚朴　藿香　甘草

生薑（各等分）

每服五錢。水二盞。葱二莖。黑豆百粒。煎八分。不

拘時熱服。

二至丸　治老人虛弱。腎氣虛損。腰痛不可屈伸。

附子（炮去皮臍）　桂心（不見火）　杜仲（去皮薑汁炒去絲）

補骨脂（炒各一兩）　鹿角（鎊）　麋角（鎊各二兩）

鹿茸（酒炙）　青鹽（另研各半兩）

右細末。酒煮糊和丸。如桐子大。每服七十丸。空心同胡桃肉細嚼。用鹽湯。或鹽酒送下。如惡熱藥者。去附子。加肉蓯蓉一兩。

子和無比山藥丸　治諸虛百損。五勞七傷。肌體消瘦。目暗耳鳴。

赤石脂（煅）　茯神（去皮木）　山茱萸（去核）

熟乾地黃（酒浸）　巴戟（去心）　牛膝（去根酒浸）

澤瀉（已上各一兩）　杜仲（去皮切薑汁炒）　兎絲子（酒浸）

五味子（揀六兩）　肉蓯蓉（酒浸四兩）

右爲細末。煉蜜爲丸如桐子大。每服三十丸。空心温酒。或鹽湯送下。

腎着湯（見第二十一）

子和禹功散

黑牽牛（四兩）　茴香（炒一兩）

右爲末。薑汁調一二錢服。

艮方人參順氣散　治氣滯腰痛。

人參　川芎　桔梗

白朮　白芷　陳皮

枳殼　麻黃（去節）　烏藥

白薑（炮）　甘草（炙各一錢）

水二鍾。煎一鍾。或爲細末。食前用甘艸湯調服。

一方加五加皮一錢。

烏藥順氣散（見第六十三）

調榮活絡飲　治失力腰閃。或跌撲瘀血。及大便不通而腰痛。

川大黃　當歸條　川牛膝（去蘆酒洗）

杏仁（去皮研如泥各二錢）　赤芍藥　紅花

羌活　懷生地黃（酒洗各一錢）

川芎（一錢半）　桂枝（三分）

水一鍾半。煎八分。食前温服。

桃仁承氣湯（見第二十）

滚痰丸（見第十七）

脚氣脉證第六十六

脚氣有四。遲寒數熱。浮滑者風。濡細者濕。

脚氣一證。經名厥。漢名緩風。宋齊後始名脚氣。陳

[illegible]疾治[illegible]其[illegible]疾[illegible]所兼[illegible]不外[illegible]三[illegible]爲患[illegible]行流[illegible]凝痛[illegible]者至[illegible]

無擇謂風寒暑濕四邪，皆能成。今歷診是證，成于寒濕者，十常八九。經曰：清濕襲邪，病起于下。信然哉。其始發也甚微，發亦易解，故人常忽而不覺。覺亦不速治，及其深久，愈發愈重，甚至痿痺不仁者有之，入腹衝心者有之，身命從此而殞，可哀也。足三陰三陽六經，皆有此證，而發于三陽者輕，三陰者重。以三陰屬藏，經絡居裏，若非藏氣大虛，邪不易及。其證不論陰陽，初發時，大類傷寒，頭痛發熱

爲選此當用子和[illegible]淋之法爲妙也。能別三陰三陽經絡清楚，則取効自捷。即使通腿紅腫，亦自發有處形有盛，非可泛然。細觀此論，請詳且盡。

惡寒嘔吐，但足屈伸不能，或痛或紅爲異耳。在陽多惡寒壯熱，頭痛，或骨節痛，或嘔吐渴煩，或叫號譫語，或腿脚紅紫極熱，大腫大痛，手不可按，或頑痺麻木，患多在腿外廉陽分，三陽經所過之處，面光澤，脈多浮。在陰，多惡寒，甚或厥逆，不發熱，或微熱，頭不痛，或骨痛筋攣，或嘔逆，或神昏沉默，或腹痛下利，或畏見光明，或大小便閉，或心煩動悸，或小腹不仁，或衝胸悶亂，痛處腫痛，或不腫，或微赤而熱，或反極冷。患多在腿內廉陰分，三陰經所過之處，面青慘，脈多沉。此言陰陽之大槩，若細別之。太陽則發熱頭痛，惡寒目眩，項強，腰脊身體及外踝後至小指外側皆痛。（宜仲景麻黃湯、桂枝湯、九味羌活湯、敗毒散、集驗麻黃左經湯之類）陽明則翕翕發熱，口鼻乾，善欠，股自髀膝臏胻外廉以下足跗中指內俱痛。（宜得效芎芷香蘇散、大黃左經湯之類）少陽則往來寒熱，口苦，脇痛，面垢，頭目眩痛，腋下馬刀腫痛，髀膝外至胻及外踝諸指節皆

痛。（宜小柴胡湯、半夏左經湯之類）三陽并合爲病，則憎寒壯熱，自汗惡風，或無汗惡寒，眩暈重着，關節掣痛，手足拘攣，疼痛冷痺，腰腿緩縱不隨，心躁氣上，嘔吐下利，其脈浮弦緊數。（宜大料神秘左經湯、加味敗毒散之類）太陰則腹滿胸膈痞，舌系急，循胻骨下股膝內前廉，內踝過核骨後廉，足大指之端內側皆痛。（宜胃苓湯、六物附子湯之類）少陰則腰脊痛，上衝胸咽，饑不能食，面黑，大小淋閟，善恐，小趾、足心、內踝、跟中、腨內廉皆痛。（宜麻黃附子細辛湯）

（金匱八味丸之類）厥陰。則腰脇偏痛。臍攣急嗌乾嘔逆。洞泄。足大趾連足趺上廉。上膕至內廉。循股環陰。小腹。及臍諸處脹痛。（宜蘇子木瓜湯。神應養真丹之類）三陰并合爲病。則四肢拘攣上氣。喘滿。小便閉澁。心熱煩悶。偏身浮腫。脚弱緩縱。不能行步。（宜加味敗毒散。進毒湯之類）已上六經受病。流注自汗爲風勝。（脉多浮滑。宜多羌活獨活防風桂枝）無汗疼痛爲寒勝。（脉多遲宜多桂附薑辛）熱煩爲暑勝。（脉多數宜多黄芩黄蘗木瓜香薷）重着腫滿爲濕勝。（脉多濡細宜多蒼术澤瀉薏苡防已茯苓）

至如防已。木瓜。米仁。檳榔。蒼术。黄蘗。肉桂。桂枝。巴戟。萎蕤。木通。羌活。枳殼。澤瀉。桑枝之類。各隨其氣所勝者而偏調之。餘相宜者而倍用之。又不可拘于一方也。東垣謂此疾。南方卑下。乃清濕之邪。外襲經絡而成。如北方地高。外鮮水濕。發此者。皆內傷酒乳。濕熱之邪下注也。故南則宜作寒濕治。北則宜作濕熱治。此雖發前人之未發。恐未必盡然也。南方固下。[illegible]無

（倣賢曰經脉者行血氣通陰陽以營於[illegible]者也爲邪所著使致留滯此湯能佈經逐邪以復其道故名）

跋涉洗濯之事。是在圓機者。謹察證脉而分別之斯善矣。

附方

仲景麻黄湯（見第十六）

仲景桂枝湯（見第十九）

九味羌活湯（見第十六）

敗毒散（見第三十七）

集驗麻黄左經湯　治風寒暑濕。流注足太陽經

腰足攣痺。關節重痛。行履艱難。憎寒發熱。無汗而寒。或自汗惡風。頭痛眩暈。并一切癱瘓麻木等證。

麻黄（去節）　乾葛　細辛（去苗）

白术（去蘆）　茯苓（去皮）　防已（去皮）

桂心　羌活（去蘆）　防風（去蘆）

甘艸（炙各等分）

右㕮咀。每服七錢。水二盞。薑五片。棗一枚。煎一

盞。空心服。自汗去麻黃。加肉桂。芍藥。重着加朮。陳皮。無汗。減桂。加杏仁。澤瀉。

得効芎芷香蘇散

川芎（七錢）　甘艸（二錢）　紫蘇葉
乾葛　白茯苓　柴胡（各半兩）
半夏（六錢）　枳殼（炒三錢）　桔梗（生二錢半）
陳皮（三錢半）

每服三錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎八分。不拘

時溫服。

大黃左經湯　治風寒暑濕。流注足陽明經。腰脚痺痛。行步艱難。涎潮昏塞。大小便秘澁。腹痛嘔吐。或復下利。惡聞食氣。喘滿肩息。自汗譫妄。並宜服之。

大黃（煨）　細辛（去苗）　茯苓（去皮）
防己（去皮）　羌活（去蘆）　黃芩
前胡（去蘆）　枳殼（去穰麩炒）　厚朴（薑製）
甘草（炙）　杏仁（去皮尖麩炒）

右各等分。每服七錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。煎八分。空心熱服。　腹痛。加芍藥。　秘結。加阿膠。　喘急。加桑白皮。紫蘇。　小便秘。加澤瀉。　四肢瘡痒浸淫。加升麻。（各等分）

仲景小柴胡湯（見第四十三）

半夏左經湯　治足少陽經受風寒濕暑。流注發熱。腰脚俱痛。頭疼眩暈。嘔吐酸水。耳聾驚悸。熱

悶心煩。氣促喘滿。肩背麻痺。腰腿不隨。

半夏（湯泡七次切片）　乾葛　細辛（去苗）
白朮（去蘆）　茯苓（去皮）　桂心
防風（去蘆）　乾薑（炮）　黃芩
甘草（炙）　柴胡（去蘆）　麥門冬（去心各七錢半）

右㕮咀。每服七錢。水一盞半。薑五片。棗二枚。煎一盞。去滓。空腹服。熱悶。加竹瀝。每服半合。喘滿。加杏仁。桑白皮。

大料神秘左經湯　治風寒暑濕流注足三陽經，手足拘攣疼痛，行履艱難，憎寒發熱，自汗惡風，或無汗惡寒，頭眩腰重，關節掣痛，或卒中昏塞，大小便秘澀，或腹痛嘔吐，下利，惡聞食臭，髀腿頑痺，緩縱不隨，熱悶驚悸，心煩氣上，臍下冷痺，喘滿氣塞。

麻黃（去節）　乾葛　細辛（去苗）

厚朴（薑製）　茯苓（去皮）　防己（去皮）

枳殼（去穰麩炒）　桂心　羌活（去蘆）

防風（去蘆）　柴胡（去蘆）　黃芩

半夏（酒洗七次）　乾薑（炮）　麥門冬（去心）

甘草（炙各等分）

右㕮咀，每服七錢，水一盞半，生薑五片，棗一枚，煎一盞，去滓，空心服。自汗，加牡蠣、白术，去麻黃。腫滿，加澤瀉、木通。熱甚無汗，減桂，加橘皮、前胡、升麻。腹痛吐利，去黃芩，加芍藥、附子，炮。大便秘，加大黃、竹瀝。喘滿，加杏仁、桑白皮、紫蘇等分。凡有此病，備細詳證，逐一加減，無不愈者。

加味敗毒散　治三陽經脚氣流注，脚踝焮熱赤腫，寒熱如瘧，自汗惡風，或無汗惡寒。

人參（去蘆）　赤茯苓（去皮）　甘草（炙）

芎藭　前胡（去蘆）　羌活（去蘆）

獨活（去蘆）　枳殼（去穰麩炒）　桔梗（去蘆）

大黃（煨）　蒼术（米泔浸各等分）

右每服五七錢，水一盞半，薑五片，薄荷五葉，煎一盞，去滓熱服。皮膚赤疹，加蟬蛻。

胃苓湯（見第十七）

六味附子湯　治四肢流注于足太陰，骨節煩疼，四肢拘急，自汗短氣，小便不利，惡風怯寒，頭面手足腫痛。

附子（去皮臍）　桂心　防己（去皮各四兩）

白术（去蘆）　茯苓（去皮各三兩）　炙甘草（二兩）

右㕮咀。每服五錢。水二盞。生薑七片。煎一盞。去滓。空心溫服。

仲景麻黃附子細辛湯

麻黃（去節）　細辛（各二兩）　附子（一枚炮）

右三味。以水一斗。先煑麻黃減二升。去上沫。內藥。煑取三升。去滓。溫服一升。日三服。

八味丸（見第十六）

茱萸木瓜湯　治脚氣衝心。悶亂不識人。手足脉欲絶。

吳茱萸（半兩）　乾木瓜（一兩）　檳榔（一兩）

右㕮咀。每服八錢。以水一盞半。生薑五片。煎一盞。去滓溫服。不拘時候

神應養眞丹　治厥陰肝經受邪。四氣所傷。肝藏。或左癱右瘓。涎潮昏塞。半身不遂。手足頑麻。言語蹇澁。頭旋目眩。牙關緊急。氣喘自汗。心神恍惚。肢體緩弱。上攻頭目。下注脚膝。榮氣凝滯。遍身疼痛。兼治婦人產後中風。角弓反張。墜車落馬。打撲傷損。瘀血在內等證。

當歸（酒浸去蘆）　天麻　川芎

羌活（去蘆）　白芍藥　熟地黃（各等分）

右爲細末。煉蜜和丸如彈子大。每服一丸。木瓜兎絲子煎酒下。　脚痹薏苡仁煎酒下。　中風溫酒米湯下。　一方無羌活。入木瓜。熟阿膠等

分。

追毒湯　治肝腎脾三經。爲風濕寒熱毒上攻。陰陽不和。四肢拘攣。上氣喘滿。小便秘澁。心熱煩悶。徧身浮腫。脚弱緩縱。不能行步。

半夏（湯洗七次）　黃耆（去蘆）　甘草（炙）

當歸（去蘆）　人參（去蘆）　厚朴（薑製）

獨活（去蘆）　橘皮（去白各一兩）　熟地黃

芍藥　枳實（去瓤麩炒）　麻黃（去節各二兩）

桂心（三兩）

右㕮咀。每服八錢。水一大盞半。薑七片。棗三枚

煎一大盞。去滓。空心溫服。日三夜一。

醫燈續焰卷九終

醫燈續焰卷十

錢塘後學潘楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人 曾應遴兆青
蕭明俊公澍 校

痿病脈證第六十七

痿病肺虛。脈多微緩。或濇或緊。或細或濡。

痿者。萎也。足痿不用。有委靡不振之義。故字從委。

其證五藏俱能成。而此獨歸之肺者。本素問也。素問痿論。岐伯曰。肺熱焦。則皮毛虛弱急薄。著則生痿躄。又曰。肺者。藏之長也。爲心之蓋也。有所失忘。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱葉焦。五藏因肺熱葉焦。發爲痿躄。觀岐伯所言。則知五藏之痿。必自肺始。內則先葉焦。而外則先皮毛虛弱急薄也。蓋肺居心上。爲最高。外合皮毛。爲最表。故云藏之長。心之蓋。主一身之氣。而司呼吸。朝百脈而行榮衛。

故平人氣象論曰。藏真高于肺。以行榮衛陰陽也。其令收斂。其化清肅。設有失志。求謀不得。則肺氣鬱。鬱則收者愈收。氣鬱爲火。而熱生焉。熱則清肅之化不行。炎蒸之邪自迫。斯時也。氣不寧靜。則喘鳴。藏不濡潤則焦萎。然不獨一肺止也。蒸稟榮衛耗竭。藏陰嗣是。五藏之合。如筋脉肉骨之屬。亦皆不得其榮潤。而諸痿之證作矣。故岐伯又曰。心氣熱。則下脉厥而上。上則下脉虛。虛則生脉痿。樞折挈。脛縱而不任地也。（宜丹溪虎潛丸補陰丸之類）肝氣熱。則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋痿。（宜四物湯三因加減四斤丸之類）脾氣熱。則胃乾而渴。肌肉不仁。發爲肉痿。（宜東垣神效黃耆湯錢氏瀉黃散之類）腎氣熱。則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲骨痿。（宜丹溪虎潛丸三因加減四斤丸之類）此皆言肺熱葉焦。皮毛急薄。熱留着不去。災及四藏而發爲諸痿也。若四藏不虛。雖隙可乘。則熱亦不能據襲。故下文岐伯復曰。悲哀大甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數溲血也。故本論曰。大經空虛。發爲肌痺。傳爲脉痿。（宜仲景炙甘草湯黑地黃丸之類）此言悲哀太甚。致心系急而胞絡絕。評熱論曰。胞脉者。屬心而絡于胞中。絕則不能上交于心。亢陽內迫。內迫則血溢下崩。隨溲而出。崩則大經空虛。無以榮灌脉絡。故先爲肌痺而漸傳爲脉痿也。又曰。思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。故下經曰。筋痿者。生于肝使內也。（宜知蘗八味丸四物湯加味逍遙散之類）此言外想邪淫而不遂。及甚于入房。一則肝火抑鬱。一則陰精耗亡。皆前陰所關。前陰者。宗筋也。宗筋無陰以養。而反爲火迫。故弛縱痿弱。及淫念動而白物隨下。故筋痿者。生于肝使內也。又曰。有漸于濕。以水爲事。若有所留。居處相濕。肌肉濡漬。痺而不仁。發爲肉痿。故下經曰。肉痿者。得于濕地也。（宜胃苓湯仲景防己黃耆湯東垣參术湯之類）此言從事于水濕之處。居處皆濕。漸受其邪。

留著而濡漬肌肉之間。久則肌肉不仁。發爲肉痿。故肉痿者。得之濕地也。又曰。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍于腎。腎者。水藏也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發爲骨痿。故下經曰。骨痿者。生于大熱也。（宜知蘗八味丸六味丸補陰丸之類）此言遠行勞倦。逢熱而渴。渴則內熱。熱甚。內熱甚。則乘其虛者而迫之。遠行勞倦。則腎氣適虛。（經脉別論云。持重遠行。汗出于腎。腎虛明矣）腎虛。則受其熱而不

勝。漸至髓減骨枯。以致足不任身。發爲骨痿。故骨痿者。生于大熱也。又曰。陽明者。五藏六府之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。衝脉者。經脉之海也。主滲灌谿谷。與陽明合于宗筋。陰陽總宗筋之會。會于氣街。而陽明爲之長。皆屬于帶脉。而絡于督脉。（腰脊不舉似兼督脉證）故陽明虛。則宗筋縱。帶脉不引。（前白淫似帶脉不引證）故足痿不用也。又曰。各補其滎而通其俞。調其虛實。和其逆順。筋脉骨肉。各以其時

解答切當理　井井有條

受月。則病已矣。前岐伯論痿之感受傳變。可謂盡矣。而終復歸之陽明者。何哉。蓋陽明爲水穀之海。衝爲血海。此不言水穀而言五藏六府之海。不言血而言經脉之海。見藏府經脉。無非二者爲之源。一潤宗筋爲陽。一灌谿谷爲陰。總宗筋而會于氣街。推陽明爲之長者。氣街乃陽明正脉。亦有尊水穀之義。督脉直行。帶脉橫圍。陽明衝脉。皆屬帶而絡督。陽明虛。則不能榮養宗筋。而帶脉亦無力收

引。故足痿不用也。是知束骨利機關者。必藉乎宗筋。而宗筋又藉陽明之榮潤。故治痿者。獨取陽明也。然必兼視各藏之滎俞。宜補宜通。受病之時月。或衰或盛。而後逆順可和。虛實可調。病良已矣。此岐伯答帝治痿之針法也。其脉多微緩。或濇或緊。或細或濡者。以微應皮毛。緩應肌肉。濇應血脉。緊應筋膜。細濡應骨髓耳。

附方

[illegible]腎門腎肝亦虛用緩中[illegible]精之劑因[illegible]衰久熱淫於內何以用鹿茸五味要知虛熱與邪熱自是不同

虎潛丸（見第五十一）

補陰丸

黃蘗　知母（俱鹽酒拌炒）　熟地黃

敗龜板（酥炙各四兩）　白芍藥（炒）　陳皮

牛膝（酒浸各二兩）　虎脛骨（酥炙）　鎖陽（酒浸酥炙）

當歸（酒洗各一兩半）　冬月加乾薑（五錢半）

右為末，酒煮羯羊肉為丸，鹽湯下。

四物湯（見第二十一）

三因加減四斤丸　治腎肝虛，熱淫于內，致筋骨痿弱，不自勝持，起居須人，足不任地，驚恐戰掉，潮熱時作，飲食無味，不生力氣，諸虛不足。

肉蓯蓉（酒浸）　牛膝（酒浸）　天麻

木瓜（乾）　鹿茸（燎去毛切酥炙）　五味子（酒浸）

熟地黃　兔絲子（酒浸另研各等分）

右為細末，煉蜜丸如桐子大，每服五十丸，空心温酒米飲任下。一方不用五味子，有杜仲。

[illegible]自陽虛[illegible]寬而服[illegible]芍藥恐[illegible]也

東垣神効黃耆湯

黃耆（二錢）　人參（去蘆）　白芍藥

炙甘草（各一錢）　蔓荊子（剉二分）　陳皮（去白五分）

水一盞八分，煎一盞，去滓，臨卧稍熱服。如小便淋澁，加澤瀉五分。如有大便熱，澁，加黃蘗（酒炒）四次，三分。麻木不仁，雖有熱，不用黃蘗，再加黃耆一錢。如眼縮小，去芍藥。忌酒醋濕麵、大料物、葱韭蒜，及淡滲生冷硬物。麻木重甚者，加芍藥木通各一錢。

錢氏瀉黃散（見第四十九）

仲景炙甘草湯（見第三十三）

黑地黃丸（見第五十一）

知蘗八味丸（見第三十四）

加味逍遙散（見第五十一）

胃苓湯（見第十七）

仲景防已黃耆湯

防己（一兩）　甘艸（半兩炒）　白术（七錢半）

黄耆（去蘆一兩一分）

右剉，每抄五錢匕，生薑四片，大棗一枚，水盞半，煎八分，去滓溫服，良久再服。喘者，加麻黄半兩。胃中不和，加芍藥三分。氣上衝者，加桂枝三分。下有陳寒者，加細辛三分。服後當如虫行皮中，從腰下如冰，後坐被上，又以一被繞腰以下，溫令微汗差。

東垣參术湯　治氣虚顫掉

人參　白术　黄耆（各二錢）

白茯苓　炙甘艸　陳皮（各一錢）

甚者加附子（童便製一錢）

水二鍾，煎八分，食前服。

六味丸（見第十六）

痺病脉證第六十八

風寒濕氣。合而爲痺，浮濇而緊。三脉乃備。

[illegible]也以[illegible]　爲病也　[illegible]五藏之所[illegible]言謂之五

痺之一證，無如素問痺論之精且詳矣。其言邪客之多少，傳變之淺深，證狀之虚實，府藏之死生，榮衛形體之異，寒熱陰陽之分，皆辭義顯明，不可增損一字。茲錄全文于左。黄帝問曰：痺之安生？岐伯對曰：風寒濕三氣雜至，合而爲痺也。其風氣勝者爲行痺，寒氣勝者爲痛痺，濕氣勝者爲着痺也。帝曰：其有五者，何也？岐伯曰：以冬遇此者爲骨痺，以春遇此者爲筋痺，以夏遇此者爲脉痺，以至陰遇

此者爲肌痺，以秋遇此者爲皮痺。帝曰：内舍五藏六府，何氣使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，内舍於其合也。故骨痺不已，復感于邪，内舍于腎。筋痺不已，復感于邪，内舍于肝。脉痺不已，復感于邪，内舍于心。肌痺不已，復感于邪，内舍于脾。皮痺不已，復感于邪，内舍于肺。所謂痺者，各以其時重感于風寒濕之氣也。凡痺之客五藏者，肺痺者，煩滿喘而嘔。（宜[illegible]蘇子湯之類）心痺者，脉不通，煩則心

（食飲之邪舍於府故曰淫泆）

下鼓。暴上氣而喘。嗌乾善噫。厥氣上則恐。（宜茯神湯之類）肝痺者。夜臥則驚。多飲。數小便。上爲引如懷。（宜萆薢丸奇劾人參散之類）腎痺者。善脹。尻以代踵。脊以代頭。（宜加味五痺湯奇劾人參散之類）脾痺者。四肢解墮。發欬嘔汁。上爲大塞。（宜溫中法麯丸黃耆丸之類）腸痺者。數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。（宜茯苓川芎湯之類）胞痺者。少腹膀胱。按之內痛。若沃以湯。澀于小便。上爲清涕。（宜腎瀝湯之類）陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。淫氣喘

息。痺聚于肺。淫氣憂思。痺聚于心。淫氣遺溺。痺聚于腎。淫氣乏竭。痺聚于肝。淫氣肌絶。痺聚在脾。諸痺不已。亦益內也。其風氣勝者。其人易已也。帝曰。痺其時有死者。或疼久者。或易已者。其故何也。岐伯曰。其入藏者死。其留連筋骨間者。疼久。其留皮膚間者。易已。帝曰。其客于六府者。何也。岐伯曰。此亦其食飲居處。爲其病本也。六府亦各有俞。風寒濕氣。中其俞。而食飲應之。循俞而入。各舍其府也。

帝曰。以鍼治之奈何。岐伯曰。五藏有俞。六府有合。循脉之分。各有所發。各隨其過。則病瘳也。帝曰。榮衛之氣。亦令人痺乎。岐伯曰。榮者。水穀之精氣也。和調于五藏。灑陳于六府。乃能入于脉也。故循脉上下。貫五藏。絡六府也。衛者。水穀之悍氣也。其氣慓疾滑利。不能入于脉也。故循皮膚之中。分肉之間。熏于肓膜。散于胸腹。逆其氣則病。從其氣則愈。不與風寒濕氣合。故不爲痺。帝曰。善。痺或痛。或不

痛。或不仁。或寒。或熱。或燥。或濕。其故何也。岐伯曰。痛者。寒氣多也。有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行濇。經絡時疏。故不通。皮膚不營。故爲不仁。其寒者。陽氣少。陰氣多。與病相益。故寒也。其熱者。陽氣多。陰氣少。病氣勝。陽遭（甲乙經作乘）陰。故爲痺熱。其多汗而濡者。此其逢濕甚也。陽氣少。陰氣盛。兩氣相感。故汗出而濡也。帝曰。夫痺之爲病。不痛何也。岐伯曰。痺在于骨則重。在于脉則血凝

一第〩〩〧冊 續修四庫全書 第 2 反王勺

而不流，在于筋則屈不伸，在于肉則不仁，在于皮則寒，故具此五者則不痛也。凡痺之類，逢寒則虫，（甲乙經作急）逢熱則縱。帝曰：善。其脈浮濇而緊者，浮為風，濇為濕，緊為寒，乃一脈中見此三種，始為三邪雜合。若雜合中，邪有偏勝，則又當審脈之浮多、濇多、緊多，以別之也。王方十一首，固與本論府藏證對，殊不知三邪之變見于形體者，不可膠紀。論中雖分行痛着三種，而三種之證，未經刻出，如痛痿

走注，麻木不仁，拳攣重着等證，似與前方淡不相關。若槩治之，恐迂緩無神，故又選對證名方於後，以便採用焉。（行痺宜仙靈脾散、三因控涎丹，痛痺宜烏藥順氣散、丹溪二妙散，着痺宜東垣苓芍黃耆湯[illegible]除濕湯、史國公浸酒之類）

附方

當歸湯

當歸（酒洗二錢）　赤芍藥（煨一錢半）　獨活

防風　赤茯苓　黃芩

秦艽（各一錢）　杏仁（去皮尖八分）　甘艸（六分）

桂心（三分）

水二鍾，薑三片，煎八分，不拘時溫服。

紫蘇子湯　治肺痺，胸心滿塞，上氣不下。

紫蘇子（炒八兩）　半夏（湯洗五兩）　陳皮（去白）

桂心（各三兩）　人參　白朮

甘艸（炙各二兩）

右㕮咀，每服四錢，水一盞，生薑五片，棗一枚，煎

七分，去滓，不拘時溫服。

茯神湯　治心痺，神思昏塞，四肢不利，胸中煩悶，時復恐悸。

茯神（去木）　羌活（去蘆）　麻黃（去根節）

麥門冬（去心焙）　龍齒（各一兩）　遠志（去心）

犀角屑　薏苡仁　人參（去蘆）

蔓荊子　防風（各七錢五分）　赤芍藥

甘艸（炙各五錢）

右㕮咀。每服三錢。水一鍾。薑五片。煎七分。去滓。不拘時溫服。

萆薢丸　治肝痺。緩筋脉。去邪毒。調榮衛。

萆薢　羌活（去蘆）　天麻（酒浸一宿切焙各一兩）　附子（炮去皮臍半兩）　乳香

沒藥（另研各二錢半）

右爲細末。入乳香沒藥同研勻。煉蜜丸彈子大。每服一丸。空心溫酒化下。日再服。

奇効人參散　治肝痺。氣逆。胸脇引痛。眠臥多驚。筋脉攣急。此藥鎮肝去邪。

人參（二兩）　杜仲（去麄皮炒）　黃耆（蜜炙）

酸棗仁（微炒）　茯神（去木各一兩）　五味子

細辛（去苗）　熟地黃　秦艽（去苗土）

羌活（去蘆）　丹砂（細研）　芎藭（各半兩）

右爲細末。入丹砂。再研令勻。每服一錢。不拘時。溫酒調下。日三服。

加味五痺湯　治五臟痺證。

人參　茯苓　當歸（酒洗）

白芍藥（煨）　川芎（各一錢肝心腎痺倍之）

五味子（十五粒）　白朮（一錢脾痺倍之）　細辛（七分）

甘草（五分）

水二鍾。煎八分。食遠服。肝痺。加酸棗仁。柴胡。心痺。加遠志。茯神。麥門冬。脾痺。加厚朴。枳實。砂仁。神麴。肺痺。加半夏。紫菀。杏仁。麻黃。

腎痺。加獨活。官桂。杜仲。牛膝。黃耆。萆薢。

溫中法麴丸　治脾痺。發欬嘔汁。

法麴（炒）　枳實（麩炒）　白茯苓

吳茱萸（湯浸焙炒）　桂心　厚朴（去皮薑汁炒）

當歸（切焙）　甘草（炙各三兩）　麥蘖（微炒五合）

細辛（去苗）　乾薑（炮）　麥門冬（去心焙）

附子（炮去皮臍）　桔梗（炒）　人參（各一兩）

右爲細末。煉蜜丸桐子大。每服七十丸。食前熱

水下。日三服。

黃耆丸　治脾痺。肌肉消瘦。心腹脹滿。水穀不化。食即欲嘔。飲食無味。四肢怠惰。或時自利。

黃耆（剉）　石斛（去根）　附子（炮去皮臍）
肉蓯蓉（酒浸切焙）　益智（去皮）　白朮
人參（各一兩）　厚朴（去皮薑汁炒）　桂心（各一兩半）
五味子　當歸　白豆蔻（去殼）
枳實（麩炒）　沉香（剉）　良薑（各七錢五分）

訶黎勒（煨去核二兩）　吳茱萸（湯洗）　丁香（各半兩）

爲細末。煮棗肉和。搗五百杵。丸如梧子大。每服三十丸。食前溫酒送下。

茯苓川芎湯

赤茯苓（一錢半）　桑白皮　防風
蒼朮（米泔浸一錢炒）　麻黃　芍藥（煨）
當歸（酒洗各一錢）　官桂（五分）　川芎（一錢二分）
甘草（四分）

[illegible]筋骨[illegible]而用蒼朮之痛非有濕者不可各隨氣血加藥是丹溪一生活[illegible]

水二鍾。棗二枚。煎八分。食前溫服。

腎瀝湯

麥門冬（去心）　五加皮　犀角（各一錢半）
杜仲（薑汁炒去心）　桔梗　赤芍藥（煨）
木通（各一錢）　桑螵蛸（一個）

水二鍾。入羊腎少許。煎八分。食前服。

仙靈脾散　治風走注。往來不定。

仙靈脾　威靈仙　芎藭

蒼耳子（炒）　桂心（各一兩）

右爲細末。每服一錢。溫酒調。不拘時。

三因控涎丹（見第二十二）

烏藥順氣散（見第六十五）

丹溪二妙散　治筋骨疼痛。因濕熱者。如有氣。加氣藥。如血虛。加補血藥。如痛甚。加薑汁。熱辣服之。

黃蘗（炒）　蒼朮（炒製去皮）

右爲末。生蠶研。入湯煎沸調服。此二物皆有雄壯之氣。如表實氣實者。少酒佐之。

東垣神效黃耆湯　（見第六十七）

東垣溫經除濕湯　治肢節沉重疼痛無力之聖藥。

羌活（七分）　獨活　黃檗

麻黃（去節）　當歸（各三分）　柴胡

黃耆　黃連　木香

草豆蔻　神麯（各二分）　人參

甘草（炙）　澤瀉　猪苓

白朮（各一錢）　陳皮　蒼朮（各二錢）

白芍藥（三錢）　升麻（五分）

右作二服。用水二大盞。煎一盞。去滓。食遠稍熱服。

史國公浸酒方　專治左癱右瘓。四肢頑麻。骨節酸疼。諸般寒濕風氣。

酓蒸如醖酒
餅麴合醱造
資流入身之
濕熱成疸病

當歸　虎脛骨（酒浸一日焙乾酥炙）

羌活　鱉甲（炙）　萆薢

防風（去蘆）　秦艽　川牛膝

松節　晚蠶砂（各二兩）　枸杞子（五兩）

乾茄根（八兩飯上蒸熟）

用無灰酒一斗。絹袋盛藥入酒內。封十日。取飲時。不可面向罈口。恐藥氣衝人頭面。飲酒不可間斷。飲盡藥滓。晒乾爲末。米糊丸梧子大。空心

酒下五十丸。忌食發風動氣之物。

五疸脉證第六十九

五疸實熱。脉必洪數。澁微屬虛。最忌發渴。

疸者。黃疸也。謂濕疸。穀疸。女勞疸。酒疸。及黃汗也。名雖分五。實脾胃爲之總司。濕熱爲之原始。夫脾胃屬土。合肌肉而主四肢。其化濕。其性滯着。其色黃。其脉遲緩。所畏者風木。而復喜風之燥。能制者寒水。而反惡水之濕。人之病也。若內無脾胃之鬱。

[illegible]五疸雖[illegible]原皆本

[illegible]則[illegible]此[illegible]黃[illegible]會蒸[illegible]致

外無風濕之搏，雖有外邪，氣機自利，熱不會蒸，黃又何自而成乎。故金匱要畧論濕疸曰：寸口脉浮而緩，浮則爲風，緩則爲痺，痺非中風，四肢苦煩，脾色必黃，瘀熱以行。蓋言風之獨行者，乃名中風，中風則腠理空疎，皮毛開泄，汗出熱越，不能發黃。今則脉浮而緩，浮固爲風，緩爲土濕，濕則痺着，非若風之疎利，必鬱瘀成熱，脾土所主之四肢，亦苦煩悶，而黃色則蒸行於表也。其論穀疸，則曰趺陽脉

穀疸所食氣傷胃加飲傷熱濕者然

緊而數，數則爲熱，熱則消穀，緊則爲寒，食卽爲滿。尺脉浮，爲傷腎；趺陽脉緊，爲傷脾。風寒相搏，食穀卽眩，穀氣不消，胃中苦濁，濁氣下流，小便不通，陰被其寒，熱流膀胱，身體盡黃，名曰穀疸。夫人飲食入胃，胃主消納，脾主運輸，脾胃溫和，兩稱其職。今胃熱而過于強，則徒能消納，脾寒而失之弱，則不能運輸，既寒且弱，肝木得以乘之。木者風也，風與寒搏，脾愈不運，更加以食，氣愈不消，搏於寒，則中爲滿，搏於風，則上爲眩。氣既不消，胃中自濁，濁則不能淸升，而反下流，下流則脾之緊寒乘腎，胃之數熱乘膀胱。（尚書洪範曰：土爰稼穡。稼穡作甘，夫萬物藉土以生，人賴稼穡以養，稼穡者穀也。穀氣下流而必歸之腎與膀胱者，亦土乘水義。難經三十七難曰：脾氣通于口，口和則知穀味矣。脾主五味，食味之歸于脾者，不可勝數，而獨言一穀味者，正稼穡作甘之義也。）膀胱者，州都之官，主藏津液。腎者水藏，主通二陰。熱流膀胱，而小便又復不利，水與熱鬱，未有不蒸㑹而成黃者，以膀胱太陽主表，故黃遍于周身也。（或兼寒熱，不食，

[illegible]疸得之[illegible]使內緊[illegible]胃之閉關胃不利致有此疸

食卽頭眩，心胸不安，久久發黃，爲穀疸，宜茵蔯湯加減主之。）其論女勞疸，則曰額上黑，微汗出，手足中熱，薄暮卽發，膀胱急，小便自利，名曰女勞疸，腹如水狀，不治。此言女勞而成疸，則黃不言可知矣。細察仲景文義，是亦穀氣鬱蒸之變證也。蓋人過勞於房室，則傷精，精傷則腎虛，腎虛則眞水不足，眞水不足，則相火熾炎。於是胃中濁熱之氣，不流于膀胱，而竟歸之腎。一以乘不足之水虛，一以就同類之火熾，火熾則君火亦

（酒疸是積飲傷脾以脾土主濕化為酒毒之濕熱致疸成病者乎）

因而動。況子午同氣。心腎交通。故不惟腎經之足心熱。而心經之掌心亦熱也。薄暮氣降而屬陰。乘其已虛之陰。助其下流之勢。無如此際。故薄暮病即發也。膀胱雖虛急。而熱不內蓄。故小便自利也。若濕熱相火鬱甚。久而不愈。則脾氣積而不運。腎氣散而不藏。致腹脹如有水狀者。是脾腎兩敗。故不治也。金匱又云。黃家日晡所發熱。而反惡寒。此爲女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。足下

熱。因作黑疸。其腹脹如水狀。大便必黑。時溏。此女勞之病。非水也。腹滿者難治。宜硝礬散主之。其論酒疸。則曰心中懊憹而熱。不能食。時欲吐。名曰酒疸。酒疸者。過飲而病黃。亦穀氣鬱蒸之變證也。靈樞論勇篇云。酒者。水穀之精。熟穀之液也。熱則已經醞釀。扳其精微。蛻其糟粕。純陽氣勝之物。其性慓悍。多升而少降。（今人飲少酒即頭面先紅此多升少降之明驗也）非上所云穀氣。未經腐熟醞釀者比。故濕熱不流於下。

（黃汗以汗出入水中浴濕發汗際所致法當先衛宜陽故治黃汗者以黃耆桂枝湯主）

但積於中焦。鬱胃薰心。令人外發黃而內煩懊。不能食而時欲吐也。又云。酒疸諸證。小便不利。心中熱。足下熱。又或無熱譫語。小腹滿欲吐。鼻燥。其脈浮者。先吐之。沉弦者。先下之。心中熱欲嘔者。吐之愈。酒疸下之。久久爲黑疸。目青面黑。心中如噉蒜虀狀。大便正黑。皮膚爪之不仁。其脈浮弱。雖黑微黃。故知之。酒疸心中懊憹。或熱痛。梔子大黃湯主之。黃汗一證。仲景金匱要畧收入水氣病中。其主

治與治疸亦自懸絕。後人以其汗黃。遂列爲五疸之一。實非疸也。今本文旣云五疸。則黃汗在其中。似不可移去。姑從之。而論治仍從要畧。在圓機者。自爲識別可也。要畧曰。黃汗之爲病。身體重。發熱汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃如檗汁。脈自沉。從何得之。師曰。以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。宜黃耆芍桂酒湯主之。此黃汗之病因也。蓋人作勞汗出。陽氣動張。陰液妄泄。此時玄府未閉。

榮衛兩虛。卽浴于水。水寒之邪。未有不乘虛而入者。入則水濕內侵。浮陽外拒。鬱擁于肌肉之間。肌肉者。脾土之合。故身則發熱而汗則見黃色也。可以榮衛虛而受邪。邪入則愈虛。而陽仍不固。陰液仍泄。卽仲景所云陽浮者。熱自發。陰弱者。汗自出之義。以汗液出多。故渴。以水氣在表。故狀如風水。水性就下。故脉沉。治以黃耆芍桂酒湯者。所以和榮固衛。托裏建中。則黃從汗減。水從汗消。與治疸

甲錯言皮膚燥澁之甚如鱗甲之錯

之發汗利小便者。固不可同日語也。又云。黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重。汗出已輒輕者。久久必身瞤。瞤卽胸中痛。又從腰已上必汗出。下無汗。腰髖弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。小便不利。此爲黃汗。桂枝加黃耆湯主之。此黃汗之變證也。黃汗旣爲陰陽

兩虛。陽則浮散于表。陰則脫根於下。兩脛逆冷者。其常也。今不冷而反發熱。是熱爲濕鬱所成。乘陰之虛。流注下焦。以及于脛。而脛以上之諸節。歷遍而痛。不言可知。此黃汗之傳爲歷節者如此。衛者。陽氣也。勞則陽動。陽動則衛氣張散。卒遂食穀。胃陽驟升。張散之虛陽。不能羈縶氣之慓悍。故與之俱出而爲汗也。又暮爲陽衰之時。勞動衰耗之陽。暮則愈衰。衰則不能外固。而汗因盜出矣。此黃汗

理明義實無一毫用力處

[illegible]竭之後証見[illegible]至妙

之挾勞氣者如此。凡熱隨汗而解者。理之常也。今汗已。反更發熱。如是久久。則津液銷亡。肌膚枯澁。身體又安得不甲錯乎。甲錯而熱仍不止。不但淺災肌膚。亦將駢延肉理。惡瘡之生。勢所必然。（如流注疱瘍之類故云惡）身重者。水濕之邪也。汗出輒輕。似乎邪解。今云久久者。必輕而復重。重而復輕。亡散衛陽。耗竭津液。不知其幾。而邪仍不去。則必轉爲身瞤而胸中痛矣。靈樞本藏篇云。衛氣和。則分肉解利。皮

膚調柔，腠理緻密。又云衛氣者，所以溫分肉，充皮膚，肥腠理，司開闔。素問痺論又云：衛氣循皮膚之中，分肉之間，熏于肓膜，散于胸腹。調經論亦云：陽受氣于上焦，以溫皮膚分肉之間。觀諸篇論，則知人身分肉腠理，皆衛氣之所充實，上焦胸腹，皆衛陽之所布輪。今衛氣亡散，分肉腠理，不能緻密，而反空虛，空虛，故瞤而動。上焦胸腹，不得受其熏布，亦隨瞤而爲虛痛也（痛必欲按）。榮氣既虛，衛復不固，況

腰已上爲陽，陽主開，故汗出；腰以下爲陰，陰主闔，榮衛虛而邪復滯着，故無汗。唯其無汗，邪不發解，故知有物在皮中，而腠膲爲之弛痛也。劇則三焦皆無所御，榮衛不能相將，氣不將于上，則不能食；氣不將于中，則生煩躁；氣不將于下，則小便不利。治以桂枝加黃耆湯者，與上條黃耆芍桂酒湯之義亦同。但此條云食已汗出，常暮盜汗，汗已反熱，汗出輒輕而不解，汗上出而下無，皆似病在汗處。

故加薑棗甘草，欲助脾胃以行津液，益辛甘以別取正汗耳。諸病黃家，但利其小便，假令脈浮，宜以汗解之，宜桂枝加黃耆湯主之（治疸利小便，固一定之法，然脈浮者鬱在表，又宜以汗解也）。諸黃，豬膏髮煎主之。黃疸病，茵蔯五苓散主之（二者通治之方）。黃疸腹滿，小便不利而赤，自汗出，此爲表和裏實，當下之，宜大黃硝石湯（汗出爲表和，腹滿便實爲裏實，裏實者宜下之）。黃疸病，小便色不變，欲自利，腹滿而喘，不可除熱，熱除必噦，噦者，小半夏湯主之。

（小便色不變，大便欲自利，裏無熱也，則喘滿爲虛象，若認爲熱而除之，必胃寒作噦矣。）諸黃，腹痛而嘔者，宜柴胡湯（腹痛而嘔，半表半裏，柴胡湯即小柴胡湯也）。男子黃，小便自利，當與虛勞小建中湯（黃而小便自利，知非濕鬱，乃男子勞役傷脾所致，脾傷則見土色）。病黃疸，發熱煩喘，胸滿口燥者，以病發時，火劫其汗，兩熱所得，然黃家所得，從濕得之，一身盡發熱而黃，肚熱，熱在裏，當下之（凡病肚熱者，熱在腹，不獨疸也，手按則知）。脈沉，渴欲飲水，小便不利者，皆發黃（沉爲在裏，渴爲裏熱，熱則多飲，而小便復不利，必鬱爲黃）。腹滿，舌痿黃燥，

[illegible]湧陰　[illegible]纂　[illegible]則例

不得睡。屬黃家。（胃土鬱則水液不分布故腹滿舌燥經云胃不和則睡不安皆黃家之先驅也）黃疸之病。當以十八日爲期。治之十日已上瘥。反劇爲難治。（土旺于四時各一十八日濕土之病期亦應之十日以上則旺氣漸衰邪宜漸退反劇者則正不勝邪故云難治）疸而渴者。其疸難治。疸而不渴者。其疸可治。發於陰部。其人必嘔。發於陽部。其人振寒而發熱也。（濕土鬱而成疸內關脾胃發于脾陰則嘔發於胃陽則振寒發熱皆二經是動之病）正文云。五疸實熱。以疸皆濕與熱鬱。外不得通。內不得泄。畜蒸成黃。虛鬆而有通泄處。

則不能成黃。故曰實熱。若是。則脉自應洪數。濇微者。自應爲虛黃也。渴爲裏熱。黃爲表蒸。表裏熱气。陰何以堪。又疸既濕鬱。汗溺不通。可復加之飲乎。渴則多飲。故最忌也。（丹溪云黃疸不必分五總是濕熱不分則何以處治是失之太簡巢氏廣爲九疸亦失之太繁唯金匱論證處方言言中的學者宗之自無過不及之偏也）

附方

金匱茵蔯湯　治寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。名爲穀疸。

目[illegible]疸乃　[illegible]於　[illegible]可攻發　[illegible]結茵　[illegible]梔子　[illegible]熱宜矣

茵蔯蒿（六兩）　梔子（十四枚）　大黃（二兩）

右以水一斗。先煑茵蔯減六升。內二味。煑三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皁角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

硝石礬石散　治女勞疸。身黃額黑。日晡發熱惡寒。膀胱急。小腹滿。足下熱。因作黑疸。其腹滿如水狀。大便必黑。時溏。此女勞之病。非水也。

硝石　礬石（各燒等分）

右爲散。以大麥粥汁和服二錢。日三。重衣覆取汗。隨大小便去。小便黃。大便黑。是其候也。

金匱梔子大黃湯　治酒疸。心中懊憹。或熱痛。

山梔子（十四枚）　大黃（一兩）　枳實（五枚）

豆豉（一升）

右四味。以水六升。煑二升。分溫三服。

金匱黃耆芍桂酒湯

黃耆（五兩）　白芍藥　桂枝（各三兩）

右以苦酒一升水七升相和煮三升。溫服一升。當心煩。服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也。

金匱桂枝加黃耆湯　治黃疸脈浮而腹中和者。宜汗之若腹滿欲嘔吐懊憹而不和者宜吐之。不宜此方。

桂枝　白芍藥　生薑（各三兩）

黃耆　甘艸（各二兩）　大棗（十二枚）

右以水八升。煮三升。溫服一升。須臾飲熱稀粥一升餘。以助藥力。取微汗。若不汗。更服。

金匱猪膏髮煎

猪膏（半斤）　亂髮（如雞子大二枚）

右二味和膏中。煎髮消藥成。分再服。病從小便出。

金匱茵蔯五苓散

茵蔯蒿末（十分）　五苓散（五分）

右二味和。先食飲方寸七。日三服。

金匱大黃硝石湯

大黃　黃蘗　硝石（各四兩作滑石）

梔子（十五枚）

右以水六升。煮二升。去滓。內硝石。更煮取一升。頓服。

金匱小半夏湯

半夏（一升）　生薑（半斤）

右以水七升。煮一升半。分溫服

小柴胡湯（見第四十三）

小建中湯（見第二十二）

醫燈續焰卷十終

素問云水入於經其血乃成靈樞云經脈者受水而行之則知水爲血之本者

醫燈續焰卷十一

錢塘後學潘楫碩甫註

同邑社盟王宗賢聖與評

余應章漢持

門人張晨星太章校

朱衍陸鄰侯

水病脈證第七十

脈得諸沉。責其有水。浮氣與風。沉石或裏。沉數爲陽

沉遲爲陰。浮大出厄。虛小可驚。

據正文水氣有四。曰氣水。曰風水。曰石水。曰裏水。金匱要畧多皮水。正水。黃汗。無氣水。裏水。而氣水。裏水。又各突見一條。于後豈以皮水卽氣水。與風水之脈皆浮者。皆爲表水。而以正水。石水。黃汗之脈皆沉者。皆爲裏水者乎。其脈雖諸種不一。而沉則在在皆兼。卽氣水風水之在表而脈應浮者。亦必有沉。沉欲下之勢。蓋沉下者。水之性也。以狀言。

[illegible]

[illegible]

浮則以位言耳。若沉而數。乃爲陽水。證必兼陽而熱多。沉而遲。乃爲陰水。證必兼陰而寒多。水脈浮大。水氣渙散。災厄將由之象。水脈虛小。則正衰邪存。誠可驚也。金匱要畧曰。風水其脈自浮。外證骨節疼痛惡風。又云脈浮而洪。浮則爲風。洪則爲氣。風氣相搏。風強則爲癮疹。身體爲痒。痒爲泄風。久爲痂癩。氣強則爲水。難以俛仰。風氣相擊。身體洪腫。汗出乃愈。惡風則虛。此爲風水。不惡風者。小便

通利。上焦有寒。其口多涎。此爲黃汗。又云。寸口脈沉滑者。中有水氣。面目腫大。有熱。名曰風水。視人之目裹上微擁。如蠶新臥起狀。其頸脈動。時時欬。按其手足上。陷而不起者。風水。又云。太陽病。脈浮而緊。法當骨節疼痛。反不疼。身體反重而痠。其人不渴。汗出卽愈。此爲風水。惡寒者。此爲極虛發汗得之。渴而不惡寒者。此爲皮水。身腫而冷。狀如周痺。胸中窒。不能食。反聚痛。暮躁不得眠。此爲黃汗。

痛在骨節。欬而喘。不渴者。此爲脾脹。其狀如腫。發汗卽愈。然諸病此者。渴而下利。小便數者。皆不可發汗。又云。風水脉浮身重。汗出惡風者。防已黃耆湯主之。腹痛加芍藥。又云。風水惡風。一身悉腫。脉浮不渴。續自汗出無大熱。越婢湯主之。皮水。其脉亦浮。外證胕腫。按之没指。不惡風。其腹如鼓。不渴當發其汗。又云。皮水爲病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。防已茯苓湯主之。又云。厥而

者。蒲灰散主之。正水。其脉沉遲。外證自喘。石水。其脉自沉。外證腹滿不喘。（黃汗其脉沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿）裏水者。一身面目黃腫。其脉沉。小便不利。故令病水。假如小便自利。此亡津液。故令渴也。越婢加朮湯主之。甘草麻黃湯亦主之。又云。心水者。其身重而少氣。不得臥。煩而躁。其人陰腫。（宜防已茯苓湯當歸散之類）肝水者。其腹大。不能自轉側。脇下腹痛。時時津液微生。小便續通。（宜分氣補心湯當歸散之類）肺水者。其身腫。小便難。時時鴨溏。（宜分氣香蘇飲導水茯苓湯之類）脾水者。其腹大。四肢苦重。津液不生。但苦少氣。小便難。（宜胃苓湯調胃白朮澤瀉散之類）腎水者。其腹大。臍腫腰痛。不得溺。陰下濕。如牛鼻上汗。其足逆冷。面反瘦。（宜金匱腎氣丸濟生腎氣丸之類）又云。寸口脉沉而遲。沉則爲水。遲則爲寒。寒水相搏。趺陽脉伏。水穀不化。脾氣衰。則鶩溏。胃氣衰。則身腫。少陽脉卑。少陰脉細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經爲血。血不利。則爲水。名曰

分。（宜調榮散四製香附丸之類）又云。寸口脉遲而濇。遲則爲寒。濇爲血不足。趺陽脉微而遲。微則爲氣。遲則爲寒。寒氣不足。則手足逆冷。手足逆冷。則榮衛不利。榮衛不利。則腹滿腸鳴相逐。氣轉膀胱。榮衛俱勞。陽氣不通。卽身冷。陰氣不通。卽骨疼。陽前通。則惡寒。陰氣通。則痺不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。名曰氣分。（宜防已茯苓湯實脾飲復元丹之類）又云。氣分。心下堅大如盤。邊如旋杯。水

飲所作，桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之。又云，心下堅大如盤，邊如旋盃，水飲所作，枳朮湯主之，（旋圖也桮高於盤盤大於桮此桮盃之異總皆水飲聚結）又云，水之為病，其脈沉小，屬少陰。浮者為風，無水，虛脹者，為氣水，發其汗即已。脈沉者，宜麻黃附子湯，浮者，宜杏子湯。又云，病者苦水，面目四肢身體皆腫，小便不利，脈之不言水，反言胸中痛，氣上衝咽，狀如炙肉，當微欬喘。審如師言，其脈何類，師曰。寸口脈沉而緊，沉為水，

緊為寒，沉緊相搏，結在關元，始時當微，年盛不覺，陽衰之後，榮衛相干，陽損陰盛，結寒微動，腎氣上衝，喉咽塞噎，脅下急痛，醫以為留飲而大下之，氣擊不去，其病不除，後重吐之，胃家虛煩，咽燥欲飲水，小便不利，水穀不化，面目手足浮腫，又與葶藶丸下水，當時如小差，食飲過度，腫復如前，胸脅苦滿，象如奔豚，其水揚溢，則浮欬喘逆，當先攻擊衝氣令止，乃治欬，欬止其喘自差，先治新病，病當在

後，（緣宜金匱腎氣丸）又云，趺陽脈當伏，今反緊，本自有寒疝瘕，腹中痛，醫反下之，下之即胸滿短氣。又云，趺陽脈當伏，今反數，本自有熱，消穀，小便數，今反不利，此欲作水。又云，寸口脈浮而遲，浮脈則熱，遲脈則潛，熱潛相搏，名曰沉。趺陽脈浮而數，浮脈即熱，數脈即止，熱止相搏名曰伏，沉伏相搏名曰水，沉則絡脈虛，伏則小便難，虛難相搏，水走皮膚，即為水矣。又云，寸口脈弦而緊，弦則衛氣不行，緊即惡

寒，水不沾流，走于腸間。又云。少陰脈緊而沉。緊則為痛，沉則為水，小便即難，脈得諸沉。當責有水，身體腫重，水病脈出者死，（脈出者脈出腎少陰之部水源泛濫而散欲其歸源不可得矣）又云，夫水病人，目下有臥蠶，面目鮮澤。脈伏，其人消渴，病水腹大，小便不利，其脈沉絕者，有水。可下之。又云，病下利後，渴飲水，小便不利，腹滿因腫者，何也。答曰，此法當病水，若小便自利，及汗出者，自當愈，又云，諸有水者，腰以下腫，當利小便。腰

[illegible]此大法

三藏作用得失說得最精務熟玩之

本在腎末在肺乃水之源流治水方法發此體認

以上腫。當發汗。乃愈。以上金匱論水病之寒熱虛實。表裏陰陽藏府氣血。雖有多種。然約而言之。總不外腎脾肺三藏。爲之原始也。蓋腎居下焦。屬水。統攝陰液。爲水之宗本。右爲相火。火以濟寒。故水得以宣揚也。脾居中焦。屬土。合肌肉。爲水之隄防主化穀生津。津生不竭。故水得以灌溉也。肺居上焦。屬金。主氣。爲水之化源。行榮衛而出治節。故水得以通調也。人或房室勞倦。憂思恐懼。飲食起居

各以類傷其藏而藏氣虛。虛則各失其職。而水液之常道紊矣。在腎則不能統攝宣揚而停蓄。在脾則不能隄防灌溉而濫行。在肺則不能生化通調而壅閉。況脾與胃合。胃又倚腎爲關。關門不利。則水聚。利則必由于氣化。是肺又爲腎關之所倚也。故素問水熱穴論曰。其本在腎。其末在肺。皆聚水也。右仲景治水方法。皆以脈證爲本。而後量其輕重虛實。治之百無一失。世俗庸醫。欲求急効。動以

破氣去水爲正治。不知暫寬一二。腫滿續至。坐視其死者比比。可勝悼哉。後學當不厭其繁而一唯以靈素金匱爲準。斯得之矣。○準繩云。腫病不一。或徧身腫。或四肢腫。面腫。脚腫。皆謂之水氣。然有陽水。有陰水。並可先用五皮飲。或除濕湯加木瓜腹皮各半錢。如未効。繼以四磨飲。○徧身腫。煩渴小便赤澁。大便多閉。此屬陽水。輕宜四磨飲。添磨生枳殼。兼進保和丸。重則疏鑿飲子利之。以通爲

度。亦有雖煩渴而大便已利者。此不可更利。宜用五苓散加木通大腹皮半錢以通小便。○徧身腫不煩渴。大便自調。或溏泄。小便雖少而不赤澁。此屬陰水。宜實脾飲。小便多少如常。有時赤。有時不赤。至晚則微赤。却無澁滯者。亦屬陰也。不可遽補。木香流氣飲。繼進復元丹。若大便不溏。氣息脹滿。宜四磨飲下黑錫丹。○四肢腫。謂之肢腫。宜五皮飲加薑黃木瓜各一錢。或四磨飲。或用白术三兩。

吹咀。每服半兩。水一盞半。大棗三枚。拍破。同煎至九分。去滓溫服。日三無時。名大棗湯。○面獨腫。蘇子降氣湯。兼氣急者尤宜。或煎熟去滓後。更磨沉香一呷。○有一身之間。唯面與雙脚浮腫。早則面甚。晚則脚甚。經云。面腫爲風。脚腫爲水。乃風濕所致。須問其大小腸通閉。别其陰陽。二證前後用藥。除濕湯。加木瓜腹皮白芷各半錢。可通用。或以蘇子降氣湯。除濕湯。各半貼煎之。○羅謙甫導滯

通經湯。治面目手足浮腫。○感濕而腫者。其身雖腫而腰下至脚尤腫。腿脹滿尤甚于身。氣或急。或不急。大便或溏。或不溏。但宜通利小便爲佳。煎五苓散吞木瓜丸。（內犯牽牛。不可輕服。）亦間進除濕湯。加木瓜腹皮各半錢。炒萊菔子七分半。○因氣而腫者。其脉沉伏。或腹脹。或喘急。宜分氣香蘇飲。○飲食所傷而腫。或胸滿。或噯氣。宜消導寬中湯。○不服水土而腫者。胃苓湯。加味五皮湯。○有患生瘡。用乾

自有外[illegible]得汗徹[illegible]之生瘡出路不見與數[illegible]邪閉或能外達有膨脹喘[illegible]而死者慎

瘡藥太早。致徧身腫。宜消風敗毒散。若大便不通。升麻和氣散。若大便如常。或自利。當導其氣自小便出。宜五皮飲。加生料五苓散。腹若腫。只在下。宜除濕湯。和生料五苓散。加木瓜澤瀉之類。○已上數條。爲有餘之證。○大病後浮腫。此係脾虛。宜加味六君子湯。白术三錢。人參黃耆各一錢半。白茯苓二錢。陳皮半夏麯芍藥木瓜各一錢。炙甘草大腹皮木香各五分。薑棗煎服。小便不利。間入五苓

散。○有脾肺虛弱。不能通調水道者。宜用補中益氣湯。補脾肺。六味丸補腎。○有心火尅肺金。不能生腎水。以致小便不利而成水證者。宜人參平肺散。○若腎經陰虧。虛火爍肺金而小便不生者。用六味地黃丸以補腎水。用補中益氣湯以培脾土。脾肺腎之氣交通。則水穀自然尅化。二經既虛。漸成水脹。又誤用行氣分利之藥。以致小便不利。喘急痰盛。已成蠱證。宜加減金匱腎氣丸主之。○已

古法精詳集前悉投靑[illegible]無遺漏

腫脹之疾禁忌須嚴

上數條。爲不足之證。○不足者正氣不足。有餘者。邪氣有餘。凡邪之所湊。必正氣虛也。故以治不足之法治有餘。則可。以治有餘之法治不足。則不可。○參古法。如水腫因氣爲腫者。加橘皮。○因濕爲腫者。煎防巳黃耆湯。調五苓散。因熱爲腫者。八正散。○如火熱爍肺爲腫者。乃絕水之源也。當清肺除燥。水自生矣。于梔子豉湯中加黃芩。○如熱在下焦。陰消。使氣不得化者。當益陰而陽氣自化。黃

蘗黃連是也。○如水脹之病。當開鬼門。潔淨府也。白茯苓湯主之。○白茯苓湯。能變水。白茯苓、澤瀉各二兩。郁李仁五錢。水一碗。煎至一半。生薑自然汁入藥。常服無時。從少至多。服五七日後。覺腹下再腫。治以白朮散。白朮、澤瀉各半兩。爲末。煎服三錢。或丸亦可。煎茯苓湯下三十丸。以黃耆芍藥建中湯之類調養之。平復後。忌房室、猪魚鹽麵等物。○香茹熬膏。丸如桐子大。每服五丸。日三。漸增以小便利爲度。○冬瓜不限多少。任喫。○鯉魚一頭重一斤已上者。煮熟。取汁和冬瓜葱白作羹食之。○青頭鴨或白鴨。治如食法。細切。和米并五味煮熟作粥。食之。宜空腹將進。昔人論水病。卽經義者。固惟仲景一人。近世何柏齋、張景岳二論。亦庶幾焉。故附錄於左。柏齋曰。造化之機。水火而已。宜平不宜偏。宜交不宜分。水爲濕。爲寒。火爲燥。爲熱。火性炎上。水性潤下。故火宜在下。水宜在上。則易交

也。交則爲既濟。不交則爲未濟。不交之極。則分離而死矣。消渴證。不交而火偏盛也。水氣證。不交而水偏勝也。制其偏而使之交。則治之之法也。小火不能化大水。故必先瀉其水。後補其火。開鬼門。瀉在表在上之水也。潔淨府。瀉在裏在下之水也。水勢既減。然後用煖藥以補元氣。使水火交。則用藥之次第也。又云。盧氏以水腫隸肝腎胃而不及脾。丹溪非之似矣。然實則皆非也。蓋造化生物。天地

水火而已矣，主之者天也，成之者地也，故曰乾知太始，坤作成物，至于天地交合變化之用，則水火二氣也，天運水火之氣于地之中，則物生矣。然水火不可偏盛，太旱物不生，火偏盛也，太澇物亦不生，水偏盛也，水火和平，則物生矣。此自然之理也。人之藏府，以脾胃為主，蓋飲食皆入于胃而運以脾，猶地之土也。然脾胃能化食與否，實由于水火二氣，非脾胃所能也。火盛，則脾胃燥，水盛，則脾胃濕，皆不能化物，乃生諸病，水腫之證，蓋水盛火少不能化也，火衰，則不能化水，故水之入于脾胃者，皆滲入血脉骨肉，血亦化水，肉發浮腫，皆自然之理也，導去其水，使水少減，復補其火，使二氣平和，則病去矣，丹溪謂脾失運化，由肝木侮脾，乃欲清心經之火，使肺金得令以制肝木，則脾土全運化之職，水自順道，乃不為腫，其詞迂而不切，故書此辯之。

景岳曰，愚按脹滿一證，觀靈樞脹論之義，則五藏六府，無不有之，再考諸篇，如脉要精微論曰，胃脉實，氣有餘則脹，邪氣藏府病形篇曰，胃病者，腹䐜脹，胃脘當心而痛，本神篇曰，脾氣實，則腹脹，涇溲不利，陰陽應象大論曰，濁氣在上，則生䐜脹，此皆實脹也，太陰陽明論曰，飲食起居失節，入五藏，則䐜滿閉塞，經別篇曰，足太陰之別公孫，虛則鼓脹，皆虛脹也，經脉篇曰，胃中寒，則脹滿，異法方宜論曰，藏寒生滿病，風論曰，胃風鬲塞不通，腹善脹，失衣則䐜脹，此皆寒脹也，陰陽別論曰，二陰一陽發病，善脹心滿，診要經終論曰，手少陰終者，腹脹閉，足太陰終者，腹脹閉，此心脾受傷之脹也。此外六元正紀，至真要大等論，有云太陰所至。為身重胕腫，及土鬱之發，太陰之初氣，太陰之勝復。皆濕勝之腫脹也，有曰水運之太過，有曰寒勝則浮，有曰太陽之司天，太陽之勝復，皆寒勝之腫脹也，有

此證病提法

曰少陰之司天。少陰之勝復。少陽之司天。少陽之勝復。有曰熱勝則腫。皆火勝之腫脹也。有曰厥陰之司天在泉。厥陰之復。有曰陽明之復。是皆木邪侮土。及金氣反勝之腫脹也。據此則不唯五藏六府。即五運六氣。亦無不皆有是病。然至真要大論曰。諸濕腫滿皆屬于脾。水熱穴論曰。其本在腎。其末在肺。皆聚水也。又曰。腎者胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。由此言之。則諸經雖皆有脹。

然無不關於脾肺腎三藏。蓋脾屬土。主運化。肺屬金。主氣。腎屬水。主五液。凡五氣所化之液。悉屬于腎。五液所行之氣。悉屬于肺。轉輸于二藏之中。以制水生金者。悉屬于脾。所以腫脹之生。無不由此三者。但證有陰陽虛實。如諸論之所云者。不可不辯。大都陽證多熱。熱者多實。陰證多寒。寒者多虛。先脹于內而後及于外者多實。先腫于表而後甚于裏者多虛。小便黃赤。大便秘結者多實。小水清

在氣不能升清降濁在血不能上下分消

白。大便稀溏者多虛。脈滑數有力者多實。弦浮微細者多虛。形色紅黃。氣息麤長者多實。容顏憔悴。音聲短促者多虛。凡是實證。必由六淫有餘。傷其外。或飲食怒氣。傷其內。故致氣道不行。三焦壅閉。此則多在氣分。無處不到。故不分部位而多通身浮腫。又或氣實于中。則爲單腹脹急。然勢邪急速。其至必暴。每成于旬日數日之間。此惟少壯者多有之。但破其結氣。利其壅滯。則病無不愈。此治實

之道也。若是虛證。必由五志積勞。或酒色過度。傷其脾腎。日積月累。其來有漸。此等病候。多染于中年之外。其形證脈氣。必有虛寒之候。顯然可察。非若實證之暴至而邪熱壅結。肝氣悍逆之有因也。治實者本無所難。最難者在治虛耳。然虛有在氣者。有在水者。在氣者。以脾氣虛寒。不能運化。所謂氣虛中滿者是也。在水者。以脾虛不能制水。則寒水反侮脾土。泛濫爲邪。其始也。必從陰分。漸次而

[illegible]化源正[illegible]義

升。按肉如泥。腫有分界。所謂水鼓水脹者是也。然水雖制于脾。而實主於腎。蓋腎本水藏。而元陽生氣所由出。若腎中陽虛。則命門火衰。既不能自制陰寒。又不能溫養脾土。陰陽不得其正。則化而爲邪。夫氣即火也。精即水也。氣之與水。本爲同類。但在於化與不化耳。故陽王。則化而精能爲氣。陽衰則不化而水即爲邪。凡火盛水虧。則病燥。水盛火虧。則病濕。故火不能化。則陰不從陽。而精氣皆化

爲水。所以水腫之證。多屬陽虛。故曰寒脹多。熱脹少也。然觀丹溪之治腫脹。云清濁相混。隧道壅塞而爲熱。熱留爲濕。濕熱相生。遂成脹滿。治宜補其脾。又須養肺金以制木。使脾無賊邪之患。滋腎水以制火。使肺得清化之令。其說重在濕熱。而猶以制火爲言。夫制火固可保金。獨不慮其不生土乎。若以此法。施于陽實而熱者則可。若以治陽虛而氣不化者。豈不反助陰邪而益其病哉。故予之治

只人有標治法故有消詳與之義

此。必察其果係實邪。則直清陽明。除之極易。凡屬虛勞內損者。多從溫補脾腎而愈。俱得復元。或臨證之際。有虛實未明。疑似難決者。則宜先以治不足之法。探治有餘。若果未投而病反加甚。是不宜補也。不妨易轍。自無大害。倘藥未及病而病自甚者。其輕重真假。仍宜詳察。若誤以治有餘之法治不足。而曾經峻攻者。真氣復傷。雖神丹不能療矣。或從清利。暫見平復。使不大補脾腎以培根本。雖

愈目前。未有不危亡踵至者。此治虛之道也。夫腫脹之病。多有標實本虛。最爲危候。若辨之不明。則殺人非淺。

附方

仲景防己黃耆湯（見第六十七）

仲景越婢湯　加朮四兩。即越婢加朮湯。

麻黃（六兩）　石膏（半斤）　生薑（三兩）

大棗（十五枚）　甘艸（二兩）

水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮三升。分溫三服。

防己茯苓湯

防己　黃耆　桂枝（各三兩）

茯苓（六兩）　甘艸（二兩）

水六升。煮二升。分溫三服。

蒲灰散

蒲灰（一兩七錢半）　滑石（五錢）

右杵爲散。飲服方寸匕。日三服。

甘艸麻黃湯

甘艸（二兩）　麻黃（四兩）

水五升。先煮麻黃去上沫。內甘艸煮三升。溫服一升。重覆汗出。不汗再服。愼風寒。

當歸散　水腫之疾多由腎氣不能攝養心火。心火不能滋養脾土。故土不制水。水氣盈溢。氣脈閉塞。滲透經絡。發爲浮腫。心腹堅脹。喘滿不安。

當歸　桂心　木香

赤茯苓　木通　檳榔

赤芍藥　牡丹皮　陳皮

白朮（各一錢三分）

水二鍾。紫蘇五葉。木瓜一片。煎一鍾。不拘時服。

分氣補心湯　治心氣鬱。發爲四肢浮腫。上氣喘急。

木通　川芎　前胡（去苗）

大腹皮（泡）　青皮　白朮

枳殼（麩炒）　甘艸（炙各一錢）　香附（去毛炒）

白茯苓　桔梗（各一錢半）　細辛

木香（各五分）

水二鍾。薑三片。紅棗二枚。煎一鍾。食前服。

分氣香蘇飲

桑白皮（炒）　陳皮　茯苓

大腹皮　香附（炒各一錢）　紫蘇（一錢半）

桔梗　枳殼（各八分）　草果仁（七分）

五味子（十五粒）

水二鍾薑三片煎八分入鹽少許食前服

導水茯苓湯　治水腫。頭面手足。徧身腫如爛瓜。手按而陷。手起隨高。喘滿倚息。不能轉側。不能倒臥。飲食不下。小便秘澁。溺出如割。或如黑豆汁。諸藥不効。用此即愈。

赤茯苓　麥門冬（去心）　澤瀉

白朮（各三兩）　桑白皮　紫蘇

檳榔　木瓜（各一兩）　大腹皮

陳皮　砂仁　木香（各七錢半）

右㕮咀。每服半兩。水二盞。燈艸二十五根。煎八分。去滓。空心服。如病重者。可用藥五兩。再加去心門冬二兩。燈艸半兩。水一斗。於砂鍋內熬一大碗。再下小銚內。煎至一大盞。五更空心服。滓再煎服。連進三服。小水自利。一日添加一日。

胃苓湯（見第十七）

元戎調胃白朮澤瀉散　治痰病化爲水氣。傳爲水鼓。不能食。

白朮　澤瀉　芍藥

陳皮　茯苓　生薑

木香　檳榔（各等分）

右爲末。水煎服。一法加白朮。治臍腹上腫。如神。心下痞者。加枳實。下盛者。加牽牛。

金匱八味丸（見第十六）

濟生腎氣丸　治腎虛脾弱。腰重脚腫。小便不利。或肚腹腫脹。或喘急痰盛。已成蠱證。其効如神。此證多因脾胃虛弱。治失其宜。元氣復傷而變者。非此不救

熟地黃（四兩）　薯蕷（一兩）　山茱萸（一兩）

澤瀉（一兩）　茯苓（三兩）　牡丹皮（一兩）

肉桂（一兩）　附子（炮五錢）　牛膝（一兩）

吉賢曰香附質堅多毛而氣勝爲肺家專藥故入肺經以行榮衛是以婦女經

車前子（一兩）

右末。煉蜜丸如桐子大。每服七八十丸。空心米飲下。

調榮飲　治瘀血留滯化爲水。四肢浮腫。皮肉赤紋。名血分。

蓬朮　川芎　當歸

延胡索　白芷　檳榔

陳皮　赤芍藥　桑白皮（炒）

大腹皮　赤茯苓　葶藶（炒）

瞿麥（各一錢）　大黃（一錢半）　細辛

官桂　甘草（炙各五分）

作一服。水二鍾。薑三片。紅棗二枚。煎一鍾。食前服。

四製香附丸　治婦人女子。經候不調。

香附（浸去皮一斤分作四分酒浸一分鹽水浸一分童便浸一分醋浸一分各三日焙乾）

右爲細末。醋糊丸如桐子大。每服七十丸。空心

[illegible]

食前溫酒下。（香附子血中之氣藥也開鬱行氣而血自調何病不瘳婦人宜常服之）

濟生實脾飲　治陰水發腫。用此先實脾土。

厚朴（去皮薑製）　白朮　木瓜（去穰）

大腹子　附子（炮）　木香（不見火）

草果仁　白茯苓（去皮）　乾薑（炮各一兩）

甘草（炙半兩）

右㕮咀。每服四錢。水盞薑五片。棗一枚。煎七分。

不拘時溫服。

復元丹（見第六十四）

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝　生薑（各三兩）　甘草（一兩）

大棗（十二枚）　麻黃　細辛（各二兩）

附子（一枚炮）

右以水七升。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮取二升。分溫三服。當汗出如蟲行皮中。即愈。

金匱枳朮湯

枳實（七枚）　白朮（二兩）

右㕮咀，以水五升，煮取三升，分温三服，腹中軟，即當散也。

麻黃附子湯

麻黃（三兩）　甘草（二兩）　附子（一枚炮）

水七升，先煮麻黃去上沫，内二味，煮取二升半，温服八合，日三服。

葶藶丸　治肺氣欬嗽，面目浮腫，喘促不安，小便赤色。

甜葶藶（隔紙炒）　貝母（煨黃色）　木通（各一兩）

杏仁（去皮尖雙仁炒）　防己（各二兩）

爲末，棗肉丸如桐子大，每服五十丸，桑皮煎湯食前下。

和劑五皮散　治風濕客于脾經，氣血凝滯，致面目虛浮，四肢腫滿，心腹膨脹，上氣喘急，兼治皮水妊娠胎水。

五加皮　地骨皮　生薑皮

大腹皮　茯苓皮（各等分一方加白木磨沉香木香入服）

右㕮咀，每服三錢，水一盞，煎七分，熱服無時。

除濕湯（見第二十一）

濟生四磨湯　治七情感傷，上氣喘悶不食，

人參　檳榔　沉香

天台烏藥

右四味，各濃磨水，取七分，煎三五沸，放温，空心服，或下養正丹尤佳。

濟生疏鑿子飲　治水氣，浮腫喘急，煩躁多渴，大小便不利，服熱藥不得者。

澤瀉　商陸　赤小豆（炒）

羌活（去蘆）　大腹皮　椒目

木通　秦艽（去蘆）　茯苓皮

檳榔（各等分）

右㕮咀。每四錢、水一盞、薑五片、煎七分。空心服。

五苓散（見第十七）

和劑木香流氣飲　治諸氣痞塞不通。胸膈膨脹。面目虛浮。四肢腫滿。口苦咽乾。大小便秘。

半夏（湯洗七次焙二兩）　青皮（去白）　厚朴（薑製去麄皮）

紫蘇（去梗）　香附子（去毛炒）　甘草（炙各一斤）

陳皮（去白二斤）　肉桂（去麄皮不見火）　蓬莪朮（煨）

丁香皮（不見火）　草果仁（各六兩）　木通（去節八兩）

藿香葉　白芷　赤茯苓（去皮）

白朮　乾木瓜　人參（去蘆）

石菖蒲（各四兩）

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。薑三片。棗二枚。煎七分。熱服。

和劑黑錫丹　治痰氣壅塞。上盛下虛。心火炎盛。腎水枯竭。一應下虛之證。及婦人血海久冷無子。赤白帶下。

沉香　葫蘆巴（酒浸炒）　附子（炮）

陽起石（研細水飛各一兩）　肉桂（半兩）

破故紙　舶茴香（炒）　肉豆蔻（麵裹煨）

木香　金鈴子　硫黃

黑錫（去滓秤各二兩）

右用黑盞。或新鐵銚內。如常法結黑錫硫黃砂子。地上出火毒。研極細。餘藥細末和勻。自朝至暮。以研至黑光色為度。酒糊丸如桐子大。陰乾。

入布袋內擦令光瑩。每四十丸。空心鹽薑湯。或棗湯下。女人艾棗湯下。

和劑蘇子降氣湯　治虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛。痰涎壅盛。胸膈噎塞。并久年肺氣至效。

紫蘇子（炒）　半夏（湯炮各二錢半）　前胡（去蘆）

甘草（炙）　厚朴（去皮薑製炒）　陳皮（去白各一錢）

川當歸（去蘆一錢半）　沉香（七分）

水二鍾。薑三片。煎一鍾。不拘時服。虛冷人。加桂

仲賢曰有白朮而曰消滯不用與桑皮云通經甚苦有不可細思之

五分。黃耆一錢。

貞鑑導滯通經湯　治脾濕有餘。及氣不宣通。面目手足浮腫。

木香　白朮　桑白皮

陳皮　茯苓（各等分）

右㕮咀。每五錢。水二盞。煎一盞。去滓溫服。空心食前。內經云。濕淫所勝。平以苦熱。以苦燥之。以淡泄之。陳皮苦溫。理肺氣。去氣滯。故以爲主。桑皮甘寒。去肺中水氣。水腫臚脹。利水道。故以爲佐。木香苦辛溫。除肺中滯氣。白朮苦甘溫。能除濕和中。以苦燥之。白茯苓甘平。能止渴。除濕。利小便。以淡滲之。故以爲使也。

和劑木瓜圓　治腎經虛弱。下攻。腰膝沉重少力。腿腳腫癢。疰破生瘡。腳心癮痛。筋脈拘攣。或腰膝緩弱。步履艱難。舉動喘促。面色黧黑。大小便秘澀。飲食減少。無問久新。並宜服之。

熟地黃（洗焙）　陳皮（去白）　烏藥（各四兩）

黑牽牛（炒三兩）　石楠藤　杏仁（去皮尖）

當歸　蓯蓉（酒浸焙）　乾木瓜

續斷　牛膝（酒浸各二兩）　赤芍藥（一兩）

右爲細末。酒糊爲圓。如桐子大。空心木瓜湯吞三五十圓。溫酒亦得。

消導寬中湯

白朮（一錢五分）　枳實（麩炒）　厚朴（薑製）

陳皮　半夏　山查肉

茯苓　神麯（炒）　麥芽（炒）

蘿蔔子（炒各一錢）

水二鍾。薑三片。煎八分。小便不利加（豬苓澤瀉）

加味五皮湯　即五皮散。腳腫加五加皮。木瓜。防已。不服水土。入胃苓湯。

消風敗毒散

人參　獨活　柴胡

桔梗　枳殼（麩炒）　羌活
茯苓　川芎　前胡
甘草　荊芥　防風（各一錢）

水二鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

和劑升麻和氣散

乾薑（五分）　乾葛（一兩）　大黃（蒸半兩）
熟枳殼（五分）　桔梗　熟蒼朮
升麻（各一兩）　芍藥（七錢半）　陳皮
甘草（各一兩半）　當歸　熟半夏
白芷　茯苓（各二錢）

每服四錢。水一盞。薑三片。燈心十莖。煎七分。食前溫服。

補中益氣湯（見第三十九）

六味丸（見第十六）

東垣人參平肺散　治肺受熱而喘。

桑白皮（炒二錢）　知母（一錢半）　甘草（炙）

[illegible]白盲夢
[illegible]剂非肺
[illegible]生之熱
[illegible]中用人
[illegible]味

茯苓　人參　地骨皮
天門冬（去心各一錢）　青皮　陳皮（各六分）
五味子（三十粒搥碎）

水二鍾。生薑五片。煎一鍾。食遠溫服。如熱。加黃芩。薄荷葉各一錢。

八正散（見第四十九）

梔子豉湯

梔子（十四枚炒）　香豉（四合）

傷寒汗吐下後。虛煩不得眠。心中懊憹者。此方主之、○汗吐下之後正氣不足。邪氣乘虛而結于胸中。故煩熱與懊憹。煩熱者。煩擾而熱。懊憹者。懊惱憹悶也。梔子味苦。能湧吐熱邪。香豉氣腐。能尅制熱勢。所謂苦勝熱。腐勝焦也。是方也。惟吐無形之虛煩則可。若用之以去實。則非梔子所能宜矣。宜實者。以瓜蒂散主之。

醫燈續焰卷十一　終

醫燈續焰目錄

卷之十二

脹滿脈證第七十一

枳實理中湯（見第十七）　金匱厚朴七物湯

仲景大柴胡湯　寶鑑晞露丸

寶鑑木香通氣散　寶鑑見晛丸

寶鑑和血通經湯

積聚脈證第七十二

濟生大七氣丸　東垣肥氣丸

東垣息賁丸　金匱鼈甲煎丸

東垣伏梁丸　半夏湯

東垣痞氣丸　東垣奔豚丸

三因奔豚湯　萬病紫菀丸（見第三十二）

太無神功助化散　寶鑑醋煮三稜丸

寶鑑聖散子　三聖散

控涎丹（見第二十二）　雲岐牡丹散

三因化氣丸（見第三十二）　保和丸（見第三十七）

沉香化氣丸

中惡脈證第七十三

蘇合香丸（見第十八）　調氣平胃散

六君子湯（見第十六）　香砂四君子湯（見第十六）

千金返魂湯（見第三十五）　玉樞丹（見第六十三）

華佗救中惡方　又方

又方　解砒毒

解附子天雄川烏斑蝥毒

解河魨毒　解巴豆毒

解諸藥毒　解刺毛蟲毒

解鬱肉漏脯毒　解馬肉毒

解牛肉毒　解犬肉毒

解中箭死烏獸肉毒

解諸魚毒　解蟹毒

解諸果毒　解諸菌毒

解野芋毒　解閉口椒毒
解水莨菪葉毒　解芹菜毒
解貪食成病　解諸食物毒

卷之十三

癰疽脉證第七十四

遠志酒　獨勝散
人參敗毒散（見第三十七）　飛龍奪命丹
蟾酥丸　真人活命飲

護心散　防風通聖散（見第六十）
神効托裏散　正鐵箍散
鐵井欄　補中益氣湯（見第二十丸）
玉樞丹（見第六十三）　十全大補湯（見第十六）
當歸補血湯（見第十六）　神仙太乙膏
替針丸　六君子湯（見第十六）
圍藥　金絲萬應膏
八珍湯（見第十六）　疥瘡大楓膏

桃花隔紙膏　千槌膏
烏龍膏　麥飯膏
精要神異膏　內托復煎散
神仙蠟礬丸　癰疽收口藥
比天膏　仙傳萬靈膏
解輕粉毒　花蕊石散

卷之十四

肺癰脉證第七十五

金匱甘草乾薑湯　金匱葶藶大棗瀉肺湯
金匱桔梗湯（見第三十二）　仲景炙甘草湯（見第三十五）
千金甘草湯　千金生薑甘草湯
千金桂枝去芍藥加皂角湯
外臺桔梗白散　千金葦莖湯
瀉白散　四物湯
肺癰神方　濟生排膿散
又排膿散　肺癰收口方

又肺癰方　治吐膿血方
又治肺癰方　試肺癰法
腸癰脉證第七十六
薏苡附子敗醬散　大黄牡丹湯
萬氏治腸癰方　薏苡仁湯
四聖散　神仙蠟礬丸（見第七十四）
雲母膏　排膿散

醫燈續焰卷十二

錢塘潘楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖與評
俞其恒子占
門人張其旋上有校
陳梅隽曾詠

脹滿脉證第七十一

脹滿脉弦。土制於木。濕熱數洪。陰寒遲弱。浮爲虛滿。緊則中實。浮大可治。虛小危極。

滿乃脹之漸，脹乃滿之極

[illegible]在内陰之[illegible]守也

脹。謂脹于外。滿。謂滿於中。排藏府而郭胸脇。急皮膚而露筋脉。臍凸腰圓。鼓之如鼓。胸腹之疾也。間亦有脹及于頭面四肢者。與水腫大同小異。而此則無水耳。大抵飲食不節。起居失宜。房室過勞。憂思無極。久久皆足以耗其守陰。衰其陽運。致氣壅滯留中。而脹滿之疾漸起矣。故實者少。虛者多。熱者少。寒者多。成於他藏府者少。成于脾胃者多。益

虛則氣空浮。故易鼓而大。寒則氣凝滯。故易壅而堅。脾胃居中。以胸腹爲宮城。屬土而化濕。性緩氣屯。故亦易脹易滿。此但言其常耳。至若五藏六府盛衰之脹。五運六氣勝負之脹。有實者。有熱者。有成于他藏府者。又不能以此數端盡也。在圓機者。自爲審別。再宜參看張景岳水脹一論。斯得之矣。

靈樞諸脹。則有本神篇所云。腎氣實則脹。（腎主藏精已中實而更加以實其爲脹也。不言可知）經脈篇所云。胃病則大腹水腫。

（胃屬土、而主中焦、土病不能制水、則水氾濫、而腹大矣、）又云。胃中寒。則脹：（寒則氣滯而壅塞故）又云。足太陰虛則鼓脹。（脾足太陰主運、虛則不運、不運則脹、虛則空、故如鼓也、）邪氣藏府病形篇所云。三焦病者。腹氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘急。溢則水留。卽爲脹。候在足太陽之外大絡。（三焦主氣、爲遊行之部、病則氣化滯而遊行阻、故病如是、在太陽者三焦膀胱耳、）熱病篇所云。男子如蠱。女子如怚。（蠱者蠱毒也、脹急如蠱毒、怚者阻也、阻滯如懷孕、皆形容腹之大、）素問諸脹。則有脈解篇所云。太陰所謂病脹者。太陰子也。十一月萬物氣皆藏于中。故曰病脹。（亦氣藏而中實、故病如是、）大奇論所云。肝滿。肺滿。腎滿。皆實。卽爲腫。肺之壅。喘而兩胠滿。肝壅。兩胠滿。臥則驚。不得小便。腎壅。胠下至少腹滿。脛有大小。髀胻大跛。易偏枯。（肺主氣、而呼吸應兩胠、肝主驚、主疏泄、而經兩胠、腎經脛與髀、所以步履、乃其部分、故肺壅實則氣喘而兩胠滿、肝壅實則滿臥驚而難小便、腎壅實則少腹滿而脛髀斯大跛偏枯、）調經論所云。志有餘則腹脹。（志爲腎所藏、有餘則實、實則脹、與腎氣實則脹之義同、）脈要精微論所云。胃氣實則脹。（胃脈下膈屬胃絡脾、其支者起于胃口、下循腹裏、實則經

脈瀧湧、故脹、）陰陽應象大論所云。中滿者。瀉之于內。（中滿實則從內瀉之、如攻下之類、若虛滿虛脹瀉之、反成其害也、不可不審、）又云。濁氣在上。則生䐜脹。（清陽上升、濁陰下降、濁不降而陰滯于上、䐜脹生焉、）生氣通天論所云。因于氣爲腫。四維相代。陽氣乃竭。（氣者榮衛藏府之氣也、流行如常、何腫之有、設或不調不順、則壅滯而形腫于外、四維乃人之四肢、爲諸陽之本、更代俱病、陽氣不從此衰竭乎、卽本篇所云、失之則外壅肌肉、衛氣散解之義、）太陰陽明論所云。飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之。則入五藏。入五藏。則䐜滿閉塞。（飲食起居爲內傷、內傷則陰受之、而入藏

（故内則病脹滿閉塞也、）平人氣象論所云。盛而緊曰脹。（此言脹病之脉也、盛則氣實緊則氣強、皆中有餘邪故脹、）異法方宜論所云。藏寒生滿病。（此言脹病生于方土也、北土地寒、乳酪爲食、外寒飲而內滿脹、故滿病生焉、）五常政大論所云。適寒凉者脹。（適往也、之往寒凉之處、外閉內鬱故脹、）之刺熱篇所云。下牙車。爲腹滿。（此言外部之色應腹中而知其滿也、牙車即牙床轉動之處、牙車之下正應腹中、腹脹者牙車下當見青白色、青白爲寒、寒則凝滯故脹也、）金匱要畧。論諸脹滿有云。趺陽脉微弦。法當腹滿。不滿者。必便難。兩胠疼痛。此虚寒從下上也。以温藥服之。（微弦之脉、陽不能運、腹自當滿、設不滿亦當便難、兩胠痛、正不運不通故耳、然見于胃足趺陽之脉、則知虚寒自下逆上也、服以温藥則能通能運而愈矣、如枳實理中湯之類、）又云病者腹滿。按之不痛爲虚。痛者爲實。可下之。舌黄未下者。下之黄自去。（正虚于内、按以實其虚、故不痛、邪實于内、按以實其實、故痛、）又云。腹滿時減。復如故。此爲寒。當與温藥。（得煖必減）

煖滿則有時而減

（如理中湯加丁桂之類、）又云。病腹滿。發熱十日。脉浮而數。飲食如故。厚朴七物湯主之。又云。按之心下滿痛者。此爲實也。當下之。（下固可下、要審其滿痛者爲何物、）宜大柴胡湯。

[illegible]堅氣散[illegible]推之移[illegible]也註[illegible]來

又云。腹滿不減。減不足言。當須下之。宜大柴胡湯。已上諸脹諸滿。雖種種不同。然而無一不關于脾胃者。蓋脾胃者土也。居中而統四藏。胸腹乃其城府。胸腹脹滿。猶城府崩裂。未有城府崩裂。而土能獨全者。有諸中。形諸外。此必然之理也。脉若見弦。知木來侮土。更爲不吉。若見數洪。必濕熱之變。若見遲弱。乃陰寒所凝。浮則氣散。外雖滿而中必虚。緊則氣欽。外固堅而中更實。浮而大者。元氣之振作。與病形相宜。故云可治。虚而小者。知元氣之衰微。又與病形相反。故云危極。外有腸覃石瘕二種。女子之病也。寳鑑言之甚詳。以其類乎脹滿。故附錄於此。腸覃者。寒氣客于腸外。與衛氣相搏。氣不得榮。因有所繫。癖而內着。惡氣乃起。瘜肉乃生。其始生也。大如雞卵。稍以益大。至其成。如懷子之狀。久者離歲。按之則堅。推之則移。月事以時下。此其候也。（夫腸者大腸也、覃者延也、大腸以傳導爲事、乃肺之府也、肺主衛、衛爲氣、得熱則泄、得冷

（則凝，今寒客于大腸，故衛氣不榮，有所繫止而結瘕在內貼着其廷，久不已，是名腸覃也。氣散則清氣聚，則澀結為瘕聚，所以惡氣發起，瘜肉乃生，小漸益大，至期而鼓其腹如懷子之狀也。此氣病而血未病，故月事不斷，應時而下，本非妊娠，可以此為辨矣。晞露丸、木香通氣散主之。）石瘕者。生于胞中。寒氣客于子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當瀉不瀉。衃以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生于女子。可導而下。（夫膀胱為津液之府，氣化則能出焉。今寒客于子門，則氣塞而不通，血壅而不流，所以留止，結硬如石，是名石瘕也。此病先氣病而後血病，故月事不來，則可宜導而下出者也。難經云：任之為病，其內苦結，男子為七疝，女子為瘕聚。此之謂也。非大辛之劑不能已也。可服見睍丸、和血通經湯。）

腫脹五傷者死。唇黑傷肝。缺盆平傷心。臍凸傷脾。足心平傷腎。背平傷肺。皆不治。

諸脹滿病。腹脹。身熱。或腹大脹。四末清。脫形。泄甚。或腹脹便血。其脈大。時絕。或嘔欬。腹脹且飧洩。其脈絕。或面黑齒長而垢。腹脹閉。上下不通。或腹脹不得息。善噫善嘔。嘔則逆。逆則面赤。不逆則上下不通。不通則面黑。皮毛焦。或手足掌紋不見。或臍凸氣促等證。皆主必死。

附方

枳實理中湯（見第十七）

金匱厚朴七物湯

厚朴（半斤）　甘草　大黃（各三兩）
大棗（十枚）　枳實（五枚剉）　桂枝（三兩）
生薑（五兩）

水一斗。煮四升。溫服八合。日三服。嘔者。加半夏五合。下利。去大黃。寒多者。加生薑至半斤。

仲景大柴胡湯

[illegible]曰陰凝堅結并淡滲瘀腹此如日輸陰

柴胡　半夏（各半斤）　黃芩（三兩）
芍藥（三兩）　生薑（五兩）　枳實（四枚炙）
大棗（十二枚）

右七味。以水一斗二升。煮六升。去滓再煎。溫服一升。日三服。一方用大黃二兩。

寶鑑晞露丸　治寒傷于內。氣凝不流。結于腸外。久為癥瘕。時作疼痛。腰不可伸。

京三稜　蓬莪朮（二味各一兩並酒浸入巴豆三十粒切碎同炒）

（深黄色去巴豆不用）　乾漆（洗去腥炒烟盡）　川烏（炮各半兩）
硇砂（四錢另研）　輕粉（一錢另研）　茴香（鹽炒）
青皮（去白）　雄黄（另研）　穿山甲（炒各三錢）
麝香（五分另研）

右爲細末。研勻。生薑汁煮麵糊和丸。如梧子大。每服二十丸。至三十丸。空心生薑湯下。温酒亦得。

寶鑑木香通氣散　治寒氣結瘕。腹大堅滿。痛不可忍。

木香　戎鹽（炒）　京三稜（炮各半兩）
厚朴（一兩薑製）　枳實（麩炒）　甘艸（炙各三錢）
乾薑（炮）　蓬莪朮（炮各二錢）

右爲末。每服三錢。食前淡生薑湯調下。

梅日日氣曰取陰凝見之積消

寶鑑見晛丸　治寒氣客于下焦。血氣閉塞而成瘕聚。堅大久不消者。

附子（炮去皮臍四錢）　鬼箭羽　紫石英（各三錢）
澤瀉　肉桂　玄胡索
木香（各二錢）　檳榔（二錢半）　血竭（一錢半另研）
水蛭（一錢炒烟盡）　京三稜（五錢剉）　桃仁（三十粒湯浸去皮尖麩炒研）
大黄（二錢剉用酒同三稜浸一宿焙）

右十三味。除血竭桃仁外。同爲末。入另研二味和勻。用元浸藥酒打糊丸如桐子大。每服三十丸。食前淡醋湯下。温酒亦得。

寶鑑和血通經湯　治婦人室女受寒。月事不來。惡血積結。堅硬如石。

當歸　京三稜（炮各五錢）　廣茂（炮）
木香　熟地黄　肉桂（各三錢）
紅花　貫衆　蘇木（各二錢）
血竭（一錢另研）

右十味。除血竭外。同爲細末。和勻。每服三錢。熱酒一盞調下。食前。忌生冷。及當風大小便。

積聚脈證第七十二

[illegible]分陰　[illegible]細由　[illegible]成局　[illegible]氣字　[illegible]于手　[illegible]評令　[illegible]矣

總病在脊字故經云勇者氣行則已弱者則着而爲病

五藏爲積。六府爲聚。實强者生。沉細者死。

難經五十五難曰。積者。陰氣也。聚者。陽氣也。陰沉而伏。陽浮而動。又曰、積者。五藏所生。聚者。六府所成。越人以陰陽分藏府。既分藏府。自有五六之名。但歷考靈素積聚癥瘕之類。亦不全以藏府分也。如靈樞百病始生篇云。積之初成。必先身形自虛。而後外邪中傷。始於皮膚腠理毛髮。次絡脈。次經脈。次輸。次伏衝。次腸胃。次腸胃之外。募原之間。此

言邪氣自淺入深之常道也。然亦有不必傳至極處。邪之所在。無論淺深。若有積兩。卽積于彼。故本篇岐伯又曰。或着孫脈。或着絡脈。或着經脈。或着於膂筋。或着于腸胃之募原。上連於緩筋。邪氣淫泆。不可勝論。後復詳言留着成積之病狀。曰。其着孫絡之脈而成積者。其積往來上下。臂手孫絡之居也。浮而緩。不能句積而止之。故往來移行腸胃之間。水湊滲注灌。濯濯有音。有寒則䐜脹滿雷引。故時切痛。其着于陽明之經。則挾臍而居。飽食則益大。饑則益小。其着于緩筋也。似陽明之積。飽食則痛。饑則安。其着于腸胃之募原也。痛而外連於緩筋。飽食則安。饑則痛。其着于伏衝之脈者。揣之應手而動。發手。則熱氣下於兩股。如湯沃之狀。其着於膂筋在腸後者。饑則積見。飽則積不見。按之不得。其着于輸之脈者。閉塞不通。津液不下。孔竅乾壅。此邪氣之從外入內。從上下也。又云。積之始

生。得寒乃生。厥乃成積也。又云厥氣生足悗。悗生脛寒。脛寒。則血脈凝濇。血脈凝濇。則寒氣上入于腸胃。入于腸胃。則䐜脹。䐜脹。則腸外之汁沫迫聚不得散。日以成積。又云。卒然多食飲。則腸滿。起居不節。用力過度。則絡脈傷。陽絡傷。則血外溢。血外溢。則衄血。陰絡傷。則血內溢。血內溢。則後血。腸胃之絡傷。則血溢于腸外。腸外有寒汁沫。與血相摶。則并合凝聚不得散而積成矣。又云。卒然外中於

[illegible]

寒。若內傷于憂怒。則氣上逆。氣上逆。則六輸不通。溫氣不行。凝血蘊裹而不散。津液濇滲。着而不去。而積皆成矣。最後黃帝始曰。其生于陰者。奈何。岐伯曰。憂思傷心。重寒傷肺。忿怒傷肝。醉以入房。汗出當風。傷脾。用力過度。若入房汗出浴。則傷腎。此五藏之五傷也。雖不詳言成積之狀。謂之五藏所生可也。謂之即成肥氣。伏梁。痞氣。息賁。賁豚。五積之因亦可也。據本篇全文。及素問脈要精微論云。

推而外之。內而不外。有心腹積也。又五藏生成論云。赤脈之至也。喘而堅。診曰有積氣在中。時害于食。名曰心痺。（赤脈當是色赤而脈喘堅則知不獨心痺下文倣此）白脈之至也。喘而浮。上虛下實。驚。有積氣在胸中。喘而虛。名曰肺痺。青脈之至也。長而左右彈。有積氣在心下一支胠。名曰肝痺。得之寒濕。與疝同法。黃脈之至也。大而虛。有積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。黑脈之至也。上堅而大。有積氣在小腹與陰。名曰腎痺。又

[illegible]

平人氣象論云。寸口脈沉而橫。曰。脇下有積。腹中有橫積痛。又云。盛喘數絕者。則病在中。結而橫。有積矣。又大奇論云。腎脈小急。心脈小急。不鼓。皆為瘕。又云。三陽急。為瘕。又靈樞邪氣藏府病形篇云。心脈微緩。為伏梁。在心下。肝脈微急。為肥氣。在脇下。若覆杯。腎脈微急。為沉厥奔豚。又衛氣篇云。積痛可移者易已也。積不痛難已也。又難經十八難云。診在右脇有積氣得肺脈結。脈結甚則積甚。結

微則積微。診不得肺脈而右脇有積者。何也。然肺脈雖不見。右手脈當沉伏。又脈經云。脈遲而濇。中寒有癥結。又云。弦急疝瘕。小腹痛。又為癖病。又云弦小者寒癖。由是觀之。則脈之小也。微也。小急也。弦急也。沉也。沉伏也。遲也。濇也。實也。數絕也。沉橫也。結伏也。長而左右彈也。是皆陰寒斂實之脈。則知積之成也。亦多屬陰寒。陰寒則不能溫散。而易于凝着。始則毫厘之聚。日以增益。若堆積然。久久

[illegible]也　[illegible]分陰陽[illegible]動靜浮[illegible]見此處[illegible]分析最精

則小者大、軟者堅、虛者實、無形者有形。越人言其始發也、有常處、其痛不離其部、上下有所終始、左右有所窮處、又云、積者、陰氣也。又云、陰沉而伏、皆中的之語、聚則不然。越人謂聚者、陽氣也。六府所成。又云、陽浮而動、病發無根、痛無常處。夫無根無常、則氣不留止、偶與氣血相搏、則邪正相干、氣聚而痛、氣散則解、非若積之留止不移不散也。如腸腹攻衝、疝痃瘕熱、胸腹脹滿、切痛雷鳴等證、皆聚之類也。古人論積聚分藏府者、亦不過以沉伏留止不移者屬陰、陰則爲藏、浮動聚散不常者屬陽、陽則爲府耳。治之者、當于留止聚散上相機、不當于藏府二字上作工夫也。其脈實強者、陽脈也。一以徵邪正之相搏、一以徵元本之壯實、從府從陽、故曰生。其脈沉細者、陰脈也。一以徵邪氣之深入。一以徵元本之衰微、從藏從陰、故曰死。已上積聚二證、揭引靈素難經金匱諸書、其病因病狀、可謂

此處以元本盛衰分生死[illegible]極妙

[illegible]機四[illegible]積聚要[illegible]溫行自無[illegible]之養適氣[illegible]前過夫何[illegible]聚之有

詳且悉矣。但言證處、不斬然。亦不全屬一證。故雖有成方。不能插入。今歷觀積聚之由。似宜溫行。不宜寒斂、似宜運動樞機、不宜專尚攻尅。是選名方十九首。以便擇用焉。

附方

濟生大七氣丸　治積聚癥瘕。隨氣上下。心腹疞痛。上氣窒塞。小腹脹滿。大小便不利。

京三稜　蓬莪朮　青皮

陳皮（各去白）　藿香葉　桔梗（去蘆）

肉桂（不見火）　益智仁（各一兩半）　甘草（炙七錢半）

香附（炒去毛一兩半）

右㕮咀、每服五錢、水二盞、煎一盞。食前溫服。

東垣肥氣丸　治肝之積、在左脇下。如覆杯。有頭足。久不愈。令人咳逆瘖瘧。連年不已。其脈弦而細。

柴胡（二兩）　黃連（七錢）　厚朴（半兩）

[illegible]日攻利[illegible]藥過用損[illegible]戒半而[illegible]止

甘艸（炙三錢）　椒（炒去汗去目及閉口者四錢）
廣茂（炮）　昆布　人參（各二錢半）
皁角（去皮弦子煨）　白茯苓（去皮共一錢半）　川烏（炮去皮臍一錢二分）
乾薑　巴豆霜（各五分）

右除茯苓皁角巴豆。外爲極細末。再另研茯苓皁角爲細末。和勻。方旋旋入巴豆霜和勻。煉蜜丸如桐子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二丸漸加至大便微溏。再從兩丸加服起。周而復

始。積減大半。勿服。

東垣息賁丸　治肺之積。在右脅下。覆大如杯。久不已。令人洒淅寒熱。喘嗽發肺癰。其脈浮而毛。

厚朴（薑製八錢）　黃連（炒一兩三錢）　人參（去蘆）
乾薑（泡）　白茯苓（去皮另末）　川椒（炒去汗）
紫菀（去毛各一錢半）　桂枝（去麄皮）　桔梗
京三稜（炮）　天門冬（去心皮）　陳皮
川烏（炮去皮臍）　白豆蔻（各一錢）　青皮（五分）

[illegible]此與鼈甲丸品味甚多一治久瘧成積一治虛勞風氣皆正虛邪着久不去者非聚集衆力攻補兼施自不易愈

巴豆霜（四分）

右除茯苓巴豆霜旋入外。餘藥共爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服二丸。一日加一丸。二日加二丸。加至大便微溏。再從二丸加服起。煎淡薑湯食遠送下。周而復始。積減大半。勿服。秋冬加厚朴五錢。通前一兩三錢。黃連減七錢。用六錢。

金匱鼈甲煎丸　治瘧母。

鼈甲（炙三兩）　烏扇（燒）　黃芩

鼠婦（熬）　大黃　桂枝
石韋（去毛）　厚朴　紫葳
阿膠（各七錢半）　乾薑　人參
瞿麥　桃仁（各五錢）　柴胡
蜣螂（熬各一兩五錢）　芍藥　牡丹皮
䗪蟲（炒各一兩二錢半）　蜂窠（炙各一兩）　葶藶（炒）
半夏（各二錢半）　赤消（三兩）

右二十三味爲末。取煅竈下灰一斗。清酒一斛

五升浸灰。候酒盡一半。着鼈甲于中。煮令泛爛如膠漆。絞取汁。内諸藥煎爲丸。如桐子大。空心服七丸。日三服。（千金方用鼈甲十二片又以海藻三分大戟一分䗪蟲五分無鼠婦赤消二味以鼈甲煎和諸藥和丸）

東垣伏梁丸　治心之積。起臍上。大如臂。上至心下。久不愈。令人煩心。其脉沉而芤。

黃連（去鬚一兩半）　人參（去蘆）　厚朴（去皮薑製各半兩）

黃芩（三錢）　肉桂　茯神（去皮）

丹參（炒各一錢）　川烏（炮去皮臍）　乾薑（炮）

紅豆　菖蒲　巴豆霜（各五分）

右除巴豆霜外。爲末。另研巴霜。旋入和匀。煉丸如桐子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微溏。再從二丸加服。淡黃連湯下食遠。周而復始。積減大半。勿服。秋冬加厚朴半兩。通前共一兩。減黃連半兩。只用一兩。黃芩全不用。

半夏湯　治肺積息賁咳嗽。

半夏（湯泡去滑焙乾）　細辛（去苗葉）　桑白皮（炙）

前胡（去蘆各一兩半）　桔梗（炒）　貝母（去心）

柴胡（去苗）　訶梨勒（煨去核）　炙甘艸

人參（去蘆）　白朮（各一兩）

右㕮咀。每服三錢。水一盞。生薑三片。棗三枚。擘破。同煎至七分。去滓温服。食後臨卧各一服。

東垣痞氣丸　治脾之積。在胃脘。腹大如盤。久不

愈。令人四肢不收。發黃疸。飲食不爲肌膚。其脉浮大而長。

厚朴（製半兩）　黃連（去鬚八錢）　吳茱萸（燒三錢）

黃芩　白朮（各二錢）　茵蔯（酒製炒）

縮砂仁　乾薑（炮各一錢半）　白茯苓（另爲末）

人參　澤瀉（各一錢）　川烏（炮去皮臍）

川椒（各五分）　巴豆霜（另研）　桂（各四分）

右除茯苓巴豆霜。另研爲末旋入。外餘藥同爲

細末。煉蜜丸桐子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微溏。再從二丸加服。淡甘艸湯下食遠。剂而復始。積減大半。勿服。

東垣奔豚丸　治腎之積。發于小腹。上至心下。若豚狀。或上或下無時。久不已。令人喘逆。骨痿少氣。及治男子內結七疝。女子瘕聚帶下。其脉沉而滑。

厚朴（薑製七錢）　黃連（炒五錢）　苦楝子（酒煮五錢）

白茯苓（另末）　澤瀉　菖蒲（各二錢）

玄胡索（一錢半）　附子（去皮臍）　全蝎

獨活（各一錢）　川烏頭（炮）　丁香（各五分）

巴豆霜（四分）　肉桂（二分）

右除巴豆霜茯苓。另為末旋入。外餘藥為細末。煉蜜丸如梧子大。初服二丸。一日加一丸。二日加二丸。漸加至大便微溏。再從二丸加服。淡鹽湯下食遠。積減大半。勿服。秋冬加厚朴二兩。通前一兩二錢。　如積勢堅大。先服前藥不減。于一料中。加存性牡蠣三錢。疝帶下勿加。　如積滿腹。或半腹。先治其所起是何積。當先服本藏積藥。諸疾自愈。是治其本也。餘積皆然。　如服藥人覺熱。加黃連。　氣短加厚朴。　悶亂加桂。

三因奔豚湯

甘李根皮（焙）　乾葛　川芎

當歸　白芍藥　黃芩

甘艸（炙各一錢半）　半夏（湯炮七次二錢）

右作一服。水二鍾。薑五片。煎至一鍾。食前服。

萬病紫菀丸（見第三十二）

太無神功助化散　專治男子婦人腹中痞塊。不拘氣血食積所成。此方之妙。不可盡述。

地扁蓄　瞿麥穗　大麥蘖（各五錢）

神麯（二錢半）　沉香　木香（各一錢半）

甘艸（五錢）　大黃（二兩）

右爲細末，淨，依分兩和勻。男以燈心淡竹葉二味等分煎，及無灰酒同調服。湯多于酒。婦人用紅花燈心當歸等分煎湯，及無灰酒同調服，酒多于湯。忌油膩動氣之物，及房事一月。藥須于黃昏服。大小便見惡物爲度。

寶鑑醋煮三稜丸　治一切積聚。不拘遠年近日。治之神効。

京三稜（四兩醋煮軟竹刀切片晒乾）　川芎（二兩醋煮微軟切片）

大黃（半兩醋浸濕紙裹煨過切）

右爲末。醋糊丸如桐子大。每服三十丸，溫水下無時。病甚者一月効。小者半月効。

寶鑑聖散子　治遠年積塊。及婦人乾血氣。

硇砂　大黃（各八錢）　麥蘗（六兩炒取淨麪）

乾漆（炒烟盡二兩）　扁蓄　茴香（炒）

檳榔（各一兩）　婦人乾血氣。加穿山甲。（二兩炮）

右爲細末。每服五錢。臨卧溫酒調下。仰卧。此藥只在心頭。至天明大便如爛魚腸。小便赤爲驗。藥並無毒。有神効。小兒用一錢。十五以上三錢。空心服之。更効。（此按古方校定今綱目刻本硇砂六兩大黃八兩豈不誤人）

三聖散　消積塊。進飲食。

橘紅（一斤淨）　甘草（四兩）　鹽（半兩）

用水三四碗。從早煮至夜。以爛爲度。水乾則添水。晒乾爲末。淡薑湯調下。有塊者。加薑黃。（半兩）同前藥煮。　氣滯加香附（二兩）同前藥煮。　氣虛者。

加沈香（半兩）另入。　噤口痢。加蓮肉。（二兩去心）另入。

控涎丹（見第二十二）

雲岐牡丹散　治婦人久虛羸瘦。血塊走注。心腹疼痛。

牡丹皮　桂心　當歸

玄胡索（各一兩）　莪朮　牛膝

赤芍藥（各三兩）　京三稜（一兩半）

右爲粗末。每服三錢。水酒各半鍾。煎服。

三因化氣丸（見第三十二）

保和丸（見第三十七）

沉香化氣丸　專攻赤白青黃等色痢疾。諸般腹痛。飲食傷積。酒積。痰積。血積。跌蹼損傷。五積六聚。胸膈氣逆痞塞。胃中積熱。中滿腹脹。癥痞茶癖。及中諸毒惡氣。傷寒大便不通。下後遺積未盡。感時疫氣。瘴氣。并諸惡腫瘡瘍腫毒。及食諸般牛畜等物中毒。不問婦人小兒。並皆治之。

大黃（錦紋者）　黃芩（條實者各一兩）　人參（官揀去蘆）

白朮（去蘆肥者各三錢）　沉香（上好角沉水者四錢另爲末）

右將前四味剉碎。用雷竹瀝七浸七曝。候乾。爲極細末。和沉香末再研勻。用竹瀝入薑汁少許爲丸。如菉豆大。朱砂爲衣。晒乾。不見火。每服一錢。淡薑湯送下。小兒六分。

中惡脉證第七十三

中惡腹脹。緊細者生。脉若浮大。邪氣已深。

不善之謂惡。時襲游侵。忽然倒仆。昏不知人。或手足厥寒。或肌膚粟起。或語言錯妄。或唇齒噤閉。或肢體不仁。或面目青黑。即客忤卒厥。鬼擊飛尸之類。涉水登山。穿塚入廟。夜行露卧。弔死問喪者。多得之。然非正氣之大虛。邪亦不能一時中傷如此也。初宜灌以蘇合丸。候竅開氣轉。再以調氣平胃散與服。若服後吐下者。如六君子湯。香砂四君子湯。皆中的之藥。覛與證相宜者。投之自無不效也。

人之正氣。自內達表。自胸腹而達四肢者。其常也。卒中外邪。則正氣不能達外。而反退縮于中。退縮于中。則氣機斂實。而緊細之脉象見矣。度安得不脹。藥力一助。正氣必張。邪氣必散。緊者仍舒。細者仍充。而本來之面目可還也。故知其生。若脉浮大。則正先散越。散越于外。則裏更虛。裏更虛。則邪必深入。而欲爲之治。不亦難乎。

附方

蘇合香丸（見第十八）

調氣平胃散

木香　烏藥　白豆蔻

檀香　砂仁（各一錢）　藿香（一錢二分）

蒼朮（一錢半）　厚朴（薑汁炒）　陳皮（各一錢）

甘艸（五分）

水二鍾。薑三片。煎八分。食前服。

六君子湯（見第十六）

香砂四君子湯（即四君子加砂仁木香見第十六）

千金返魂湯（見第三十五）

玉樞丹（即紫金錠見第六十三）

華佗救中惡方　治一應忤惡鬼氣。

犀角末（五錢）　辰砂（水飛過）　麝香（研各二錢五分）

每服二錢。井水調下。如一時不能得此藥。用雄黃末一錢。煎桃枝葉湯調灌之。又無雄黃。可用着身上多時遺汗衣。或貼肉襯衣。男用女。女用

（花賢曰斑蝥毒最厲屢見少年人生便毒服此則小便急痛欲斃尿血尿肉苦不可言曾以大劑木通滑石黍豆逐[illegible]解之得免）

男燒存性。服二錢。百沸湯調下。

又方　韭菜搗汁滴鼻中。冬月用韭根。

又方　百會穴。人中穴。足大拇指。離甲一韭葉許。名鬼眼穴。及丹田。氣海諸穴。灸七壯。愈多愈妙。一二處醒。即止。不必俱灸也。以炭火烹米醋薰鼻亦妙。諸急證。宜先以牙皂末搐鼻取嚏。牙關緊者。以烏梅肉擦之自開。皆通關之法。後可進藥。

砒毒　早禾稈燒灰。新汲水淋汁。絹濾過。冷服一碗。得下利即安。新汲水調白扁豆末亦好。華佗用黑鉛磨濃水灌之。

附子天雄川烏斑蝥毒　煮大小黑豆汁飲。

河豚毒　倉卒無藥。用清油多灌之。得吐愈。

巴豆毒　煮黃連汁飲。

諸藥毒　甘艸黑豆淡竹葉等分。水一碗煎服。

刺毛蟲毒　疼痛不已。蚯蚓泥乾搽。又治胡蜂叮。

[illegible]間不宜[illegible]以[illegible]死[illegible]多無有大害

鬱肉漏脯毒（鬱肉密器蓋隔宿者漏脯茅屋漏下沾着者）　燒犬屎。酒服方寸匕。生韭汁亦好。

馬肉毒　香豉二兩。杏仁三兩。蒸一飯時。杵之。酒煎服。蘆根煮汁飲。亦良。

牛肉毒　甘艸煮汁飲之。即解。

犬肉毒　心下堅。腹脹口乾。發熱妄語。或洞下。杏仁一升。不去皮。熟研。以沸湯三升和取汁。分三服。利下肉片良。

佑賢曰小兒食白果多則吐涎沫不知人當急用白鯗頭煎湯灌之能解

中箭死鳥獸肉毒　大豆煮汁及鹽汁。服之解。

諸魚毒　橘皮煎濃汁飲之解。蘆根煮汁亦良。

蟹毒　紫蘇煮汁飲之。蘇子亦好。

諸果毒　猪骨燒過爲末。水服方寸匕。解。

諸菌毒　悶亂欲死。人糞汁飲一升。飲土漿一二升亦良。大豆濃煮汁飲之。或服吐利藥。俱可解。

亦治楓樹菌毒。令人哭不止。（哭一作笑）

野芋毒　即前方

閉口椒毒　戟人咽喉。氣欲絕。或吐白沫。身冷。用肉桂煎汁飲之。或多飲冷水。或食蒜或飲地漿。俱良。

水莨菪葉毒　人每誤認作菜食。令人狂亂吐血。甘草煮汁飲之。即解。

芹菜毒　手青腹滿痛。名蛟龍病。以芹上帶蛟屬精耳。用硬糖二三升煮服之。當吐如蜥蜴者

飽食成病方　食多不消。心腹堅滿痛。用鹽一升。水三升。煮鹽消化。分三服。當吐出食

諸食物毒　煮甘艸薺苨汁飲之。通能解。

醫燈續焰卷十三

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖翼評
梁州僑士望
門人余　禧亦祉校
侄時御汝霖

癰疽脈證第七十四

（諸癰疽分臟腑再合末節所論問答知向來俗醫憒憒）

癰疽浮數。惡寒發熱。若有痛處。癰疽所發。脈數發熱

而痛者陽。不數不熱。不疼陰瘡。未潰癰疽。不怕洪大。已潰癰疽。洪大可怕。

癰者。壅也。疽者。阻也。榮衛氣血。壅塞阻滯。鬱熱成膿之所致。有陰陽臟府之分。癰大而淺。疽小而深。大則氣鼓發。鼓發則向表而淺。小則氣收斂。收斂則近裏而深。淺則從府從陽。故易消易潰。深則從藏從陰。故難消難潰。易潰者。則毒從外洩。難潰者。則毒常內陷。此吉凶輕重之所由分也。方書謂其

（先以衛氣失常提出再貫串諸症分析淺深臨症自有到眉）

源有五。一曰天行昔氣。二曰七情內鬱。三曰體虛外感。四曰身熱搏于風冷。五曰食炙煿。飲法酒。服丹石等熱毒。雖分為五。然總不外三因也。三因者。一外因。如素問運氣等篇之太陽、少陰、陽明。太陰、少陽、厥陰之客氣。以及所至所復。寒燥濕邪。并熱淫所勝、歲火太過之發為痱疹瘡瘍。癰疽瘡腫。又據脈要精微論。帝曰。諸癰腫筋攣骨痛。此皆安生。岐伯曰。此寒氣之腫。八風之變也。又生氣通天論

曰。勞汗當風。寒薄為皶。鬱乃痤。（薄之淺則為痤鬱之久則為痤）又曰。陽氣者。開闔不得。寒氣從之。乃生大瘻。榮氣不從。逆于肉理。乃生癰腫。（腠理之開闔皆衛氣主之衛氣失常則開闔亦不得如常矣邪因乘隙而入結于筋絡故成傴僂邪若入附於脈則營亦不順逆于肉理之中久則結聚為癰腫也）又素問氣穴論曰。邪溢氣壅。脈熱肉敗。榮衛不行。必將為膿。內消骨髓。外破大膕。留于節腠。必將為敗。（邪留于節腠谿谷之間節腠谿谷神氣所注必大為敗壞豈僅消膿破膕而已）又靈樞刺節真邪篇曰。虛邪之中人也。搏于脈中。則

以下發各症惡病然治者苦心從此參亦思過半矣

爲血閉。不通則爲癰。（亦發氣不從義）又云。熱勝其寒。則爛肉腐肌爲膿。肉傷骨。肉傷骨。爲骨蝕。（熱氣勝久則爛肉腐化爲膿不外瀉而內入入則爛及于骨骨傷不易生新附骨如蟲之蝕也）又曰。邪氣中之。凝結日以易甚。連以聚居。爲昔瘤。（凝結之久日漸增聚則日漸長大矣不腐而大贅于形體其名日瘤昔者夙昔之謂言其久也）又曰。骨與氣并。日以益大。則爲骨疽。（邪附于骨久爲骨疽）又曰。有熱則化爲膿。無熱則爲肉疽。（此邪結于肉者有熱久則肉腐爲膿無熱久則肉化爲槊渣令疽瘤內常有此類）一內因。如素問陰陽別論曰。三陽爲病。發

寒熱。下爲癰腫。（三陽者太陽也太陽主表故發寒熱太陽走足故下爲癰腫）又素問氣厥論曰。腎移寒於脾。癰腫少氣。脾移寒於肝。癰腫筋攣。（腎水寒氣反移變于脾土是爲逆逆則氣壅肌肉而爲腫以脾主肌肉故脾以寒氣反移變于肝木亦爲逆逆則氣不得壅肌肉而筋亦攣腫以肝主筋故）又素問厥論曰。少陽厥逆。發腸癰。不可治。驚者死。（此言少陽逆行之火若厥逆結熱爲毒最甚故不可治若發驚是爲入藏主死以驚屬心藏則指厥陰心包絡也）又靈樞脉度篇曰。六府不和。則留結爲癰。（府爲陽陽主衛衛氣不和則留結于肌腠而癰腫矣）又玉版論。黄帝曰。病之生時。有

蓋氣有鬱皆屬于肺未有氣鬱而榮衛流通者斯症由情志而成故治法首用遠志等劑至于五志相勝

尤在攝生者寶貴省心

喜怒不測。飲食不節。陰氣不足。陽氣有餘。營氣不行。乃發爲癰疽。陰陽不通。兩熱相搏。乃化爲膿。（喜怒傷氣飲食傷藏不測者暴發之謂暴則氣逆而陽有餘不節者縱食偏嗜之謂不節則五宮傷而陰不足陽有餘則氣聚而熱勝陰不足則榮不行而熱亦勝兩熱相搏營衛不行故化膿而成癰疽也）又陳無擇亦云。癰疽瘰癧。不問虛實寒熱。皆由氣鬱而成。蓋言喜怒憂思久鬱所致。治以遠志酒獨勝散。兼以五志相勝之理。乃善。（如恐勝思思勝恐之類）不內外因。如素問生氣通天論曰。膏粱之變。足生大

丁。受如持虛。（足生者必生也）又異法方宜論曰。東方之域。天地之所生也。魚鹽之地。海濱傍水。其民食魚而嗜鹹。皆安其處。美其食。魚者使人熱中。鹽者勝血。故其民皆黑色疏理。其病皆爲癰瘍。其治宜砭石。（魚生于水外陰而內陽水之體也動而不息火之象也火藏于外陽藏于內美食久久使人熱中癰瘍之病乃其常耳）又有久服丹石法酒。熱毒蓄中。發爲癰疽疔癤。亦同膏粱之類。其脉浮數者。以血泣而氣復從之。邪與正鬱。鬱則化熱。故數也。在表在陽。故

瘡瘍舊列外科，以其症形在外，敷貼刀刺所加故也。不知症雖在外，病由內生，非精明臟腑經絡及內外

癰腫之脈寒熱大似傷寒，但傷寒病在表，瘡則痛無定所，瘡脈傷任形體，故痛止一處，分須認明施治

浮也。正爲邪搏，則宣暢外衛之力薄，故復惡寒。據脈證，似與傷寒表證無異。但傷寒雖有痛，或在頭，或在身體，或在骨節，未有痛止于一處者。今痛止一處而腐熱，此處必化熱爲膿，正癰疽所發之處也。即傷寒論辨脈法所謂諸脈浮數，當發熱而洒淅惡寒，若有痛處，飲食如常者，蓄積有膿是也。如此者，乃爲陽毒。若脈不數，身不熱，所患之處不疼，是邪客陰分，不能鼓發，多致內陷，然必兼有煩憒

嘔逆，胸膈不寧等證，否則不熱不疼，脈又不數，是一不病人也。何得謂之陰瘡而反重于陽證耶？方癰疽之未潰也，無論成膿與否，熱邪鬱蓄，外不疏通，脈之鼓湧洪大，是其宜也。至于已潰，則熱泄邪解，而洪大之脈宜衰矣。潰而不衰，一派熱邪，正從何復？誠爲大可懼者。與素問評熱病論所謂病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾，不爲汗衰，病名陰陽交者，同一義也。凡此癰疽瘍腫，自有專書，詮固不能

[illegible]以[illegible]取效，今人剿竊方書，不究義理，且對症爲此篇大法，已得真精者，再參看方書，方許入[illegible]

推述，然靈樞癰疽一篇，窮源別流，包括殆盡，恐業外醫者，不能出其範圍也。故備錄于左。黃帝曰：余聞腸胃受穀，上焦出氣，以溫分肉而養骨節，通腠理。（衛氣源流）中焦出氣如露，上注谿谷而滲孫脈，津液和調，變化而赤爲血，血和則孫絡先滿溢，乃注于絡脈，皆盈，乃注于經脈。陰陽已張，因息乃行。（宗氣源流）行有經紀，周有道理，與天合同，不得休止。切而調之，從虛去實，寫則不足，疾則氣減，留則先後。從虛

去虛，補則有餘。血氣已調，形氣乃持。余已知血氣之平與不平，未知癰疽之所從生，成敗之時，死生之期，有遠近，何以度之，可得聞乎？岐伯曰：經脈流行不止，與天同度，與地合紀。故天宿失度，日月薄蝕，地經失紀，水道流溢，草萓不成，五穀不殖，徑路不通，民不往來，巷聚邑居，則別離異處，血氣猶然，請言其故。夫血脈營衛，周流不休，上應星宿，下應經數。寒邪客于經絡之中則血泣，血泣則不通，不

命名固巧詮釋甚精

通。則衛氣歸之。不得復反。故癰腫。（言衛氣因以壅聚而不得復返於平常流行之故道也）寒氣化爲熱。熱勝則腐肉。肉腐則爲膿。膿不寫。則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則髓消。不當骨空。（骨空骨中之細孔如縣眼者所以通血液之滲灌）不得泄瀉。血枯空虛。則筋骨肌肉不相榮。經脈敗漏。薰於五藏。藏傷故死矣。黃帝曰。願盡聞癰疽之形。與忌曰名。岐伯曰。癰發于嗌中。名曰猛疽。（猛者猛烈急速之謂）猛疽不治。化爲膿。膿不寫。塞咽半日死。其化爲膿者。寫則合豕

膏。冷食三日已。發於頸。名曰天疽。（外在頸而內則入腋薰肺以其最上故曰天）其癰大以赤黑。不急治。則熱氣下入淵腋前傷任脈。內薰肝肺。十餘日而死矣。陽氣大發。消腦留項。名曰腦爍。（爍消爍也烈火熔金之謂腦被其熱爍亦如之煩心者腎毒傳心也）其色不樂。項痛而如刺以針。煩心者。死不可治。發于肩及臑。名曰疵癰。其狀色黑。急治之。令人汗出至足。不害五藏。癰發四五日。逞（速也）焫之。發于腋下。赤堅者。名曰米疽。（言其小如粟米也）治之以砭石。欲細

胸中衛氣所出之處名井者得非所出爲井之取義耶

而長。疏砭之。塗以豕膏。六日已。勿裹之。其癰堅而不潰者。爲馬刀挾纓。急治之。（馬刀蛤蠣之屬癰形似之挾纓者發于結纓之處大迎之下頸側也二癰一在腋一在頸常相連絡故俗名癧串）發于胸。名曰井疽。（言其深也）其狀如豆大。三四日起。不蚤治。下入腹不治。七日死矣。發于膺。名曰甘疽。色青。其狀如穀實菰蓏。常苦寒熱。急治之。去其寒熱。十歲死。死後出膿。（井屬土此疽發于陽明胃經隱名也即乳癰之類內蘊熱如穀食之稽蓄如栝蔞之包子雖不卽死亦不卽愈）發于脇。名曰敗疵。（亦乳串之類）敗疵者。女子

之病也。灸之。其病大癰膿。治之。其中乃有生肉。大如赤小豆。剉陵翹艸根。各一升。以水一斗六升。煮之竭。爲取三升。則強飲厚衣。坐于釜上。令汗出至足已。發于股脛。名曰股脛疽。其狀不甚變。而癰膿搏骨。不急治。三十日死矣。發于尻。名曰銳疽。（尾骨盡處而尖銳故名）其狀赤堅大。急治之。不治。三十日死矣。發于股陰。名曰赤施。（股陰足太陰厥陰二經所過之處火毒傷陰之甚則發此曰赤施者謂赤火之施發耳）不急治。六十日死。在兩股之內。不治

[illegible]

十日而當死。發於膝。名曰疵癰。其狀大癰色不變。寒熱。如堅石。勿石。石之者死。須其柔。乃石之者生。諸癰疽之發于節而相應者。不可治也。發于陽者。百日死。發於陰者。三十日死。（節爲神氣之所遊行出入。若上下左右相應而發者必死）發于脛。名曰兎齧。（如兎之齧傷。故在脛）其狀赤至骨。急治之。不治害人也。發于內踝。名曰走緩。（毒害于足則走緩而不能疾）其狀癰也。色不變。數石其輸而止其寒熱。不死。發于足上下。名曰四淫。（毒淫其末諸陽之本敗矣亦上下相應者）

其狀大癰。急治之。百日死。發于足傍。名曰厲癰。（厲惡也）其狀不大。初如小指發。急治之。去其黑者。不消輒益。不治百日死。（去其黑者不爾則增多）發于足指。名脫癰。其狀赤黑。死不治。不赤黑。不死。不衰。急斬之。否則死矣。（不赤黑者雖不死亦欲其即衰去不衰則急斬其指不然則毒入指髓而死）黃帝曰。夫子言癰疽。何以別之。岐伯曰。榮衛稽留于經脉之中。則血泣而不行。不行。則衛氣從之而不通。壅遏而不得行。故熱。大熱不止。熱勝則肉腐。腐

劉涓子生宋武帝時行世

遺方千金一失發其切實乃備是編古治癰疽之祖

則爲膿。然不能陷骨髓。不能焦枯五藏。不爲傷。故命曰癰。黃帝曰。何謂疽。岐伯曰。熱氣淳盛。下陷肌膚。筋髓枯。內連五藏。血氣竭。當其癰下。筋骨良肉皆無餘。故命曰疽。疽者上之皮夭以堅。上如牛領之皮。（皮夭白如牛領皮之堅厚也）癰者。其皮上薄以澤。此其候也。

癰疽雜述

鬼遺方云。癰之痛只在皮膚之上。其發如火焚茱。

初如黍米。三兩日如掌大。五七日。如碗大。即易治。如腫冷。（熱不外發）不發渴。（邪熱在內）發逆。（邪攻裏而嘔）治之難愈。○又云。疽發如小瘡。觸則徹心痛。四邊微起如橘皮孔。色紅赤不全變。膿水不甚出。至七八日。疼悶喘急。若始腫高。五七日忽平陷。此內攻之候也。○又云。癰疽有三等。毒氣浮淺。屬府。毒氣沉深。屬藏。毒氣猛烈而行經絡。或淺或深無定。五藏六府皆受五毒。難爲調理。雖宜于癰疽諸處。不問虛實高腫

起盛。光澤疼痛。只在皮肉之上。熱急脹滿。或有癢疼。別無惡候。初用混藥平氣。次用排膿發穴所謂（治瘡平氣者乃犀角散之類其方用犀角連翹漏蘆甘草當歸白芷皆發表之藥也所謂發熱者乃蘇針之類用皂角刺為君甘草用芎乳香為佐使亦托裏之藥也然不若荊市京直許方發表托裏為穩）

當疽發諸處。不拘大小。惟起在背。廣一尺二尺三尺。皮厚紫黑。高腫不常。內疼如錐刺攻擊。滿悶應四肢重疼。前心亦痛。餘處發猶可。唯虛處。及近筋骨處。若膿毒未潰。即傷爛筋骨肉。損為痈者。屬五

虛處易成漏近筋骨處易成廢況死生關係所在甚科者宜玩

藏毒氣深沉。氣伏堅實。不宜緩治之。須內實五藏。外透皮膚。令軟勻和。即膿透。宜用內托實藏氣之藥。排膿勻氣。乃可。不比癰之毒氣淺也。毋一類治之。

凡一切瘡腫。見有內攻之候。急以內托散。及內補湯藥。補填藏府令實。最怕透膜。膜穿十無一生矣。

初已見七惡之候而忽於平陷者死若無惡陷者非裏氣盛必調護違法知犯何逆急治始逆

○婁全善云。癰之邪淺。其稽留壅遏。獨在經脈之中。而專攻于外。故初發時。自表便發熱。患處便如碗如盆。高腫而痛甚者。縱欲下陷。緣正氣內固。不肯受。故或便秘。或發渴。發逆以拒之。是以骨髓終不焦枯。五藏終不傷也。疽之邪深。其稽留壅遏。內連五藏而不專攻于外。故身體或無熱。患處或不腫。毒甚者。聲嘶氣脫。眼黑眼小。十指腫黑如墨。多死也。治之之法。癰之初發。當以潔古法為主。表者散之。裏者下之。火以灸之。藥以敗之。膿未成者。必消。膿已成者。速潰。又當以鬼遺方為主。補填藏府

令實。勿令下陷之邪蔓延。外以火灸。引邪透出。使有穴歸着而不亂。則可轉死為生。今外科不分癰疽。一例宜熱拔毒。外以五香耗其氣。內以大黃瀉其血。終不能自悟其藥之非。惜哉。○集驗云。癰疽之名雖多。而其要則二。陰陽而已。發于陽者。為癰為熱。為實。發于陰者。為疽。為冷。為虛。故陽發。則皮薄色赤腫高。多有椒眼數十而痛。陰發。則皮厚色淡腫硬。狀如牛頸之皮而不痛。又有陽中之陰。似

（分陰分陽又分陰中之陰陽中之陽又分變陰變陽辨症審脉真非俗醫所能了了）

熱而非熱，雖腫而實虛，若赤而不燥，欲痛而無膿，既浮而復消，外盛而內腐，陰中之陽，似冷而非冷，不腫而實，赤徵而燥，有膿而痛，外雖不盛而內實，煩悶，陽中之陰，其人多肥，肉緊而內虛，陰中之陽，其人多瘦，肉緩而內實，而又有陽變而爲陰者，草藥涼劑之過也。陰變而爲陽者，大方熱藥之驟也。然陽變陰者，其證多，猶可返于陽，故多生。陰變爲陽者，其證少，不能復爲陰矣，故多死，然間有生者，

此醫偶合于法，百中得一耳，觀此，則癰與疽，但有陰陽深淺內外虛實之分，而無大小之別，精要乃謂二寸至五寸爲癰，五寸至一尺爲疽者，謬矣，凡癰疽之脉，沉實發熱煩躁，外無焮赤痛，其邪深在裏，宜先疎通以絕其源，浮大數，焮腫在外，當先托裏，恐邪入內，不沉不浮，內外證無，知其在經，當和榮衛。○身無熱而脉數者，內有癰膿。○數脉不歇見，當生惡瘡。○諸癰腫，欲知有膿無膿，以手掩腫

（明經絡辨氣血之多少乃治病之要術今人止據成方故錯悞者多取効者少）

上熱者，爲有膿，不熱者，爲無膿。○人身之有經絡，猶地理之有界分，治病不知經絡，猶捕賊不知界分，其能無誅伐無過之咎乎。況手足十二經絡，有血氣多少之分，如手少陽三焦，足少陰腎，太陰脾，多氣少血，手厥陰心包絡，手太陽小腸，足太陽膀胱，多血少氣，手陽明大腸，足陽明胃，多氣多血。此其大較也，多血少氣者，易愈，多氣少血者，難療。氣多之經，可行其氣，血多之經，可破其血，不可執一

（五善七惡知邪正之虛實瘡科毋忽）

也。○瘡瘍有五善七惡，動息自寧，飲食知味，一善也，便利調勻，二善也，膿清腫消，不臭，三善也，神采精明，語聲清爽，四善也，體氣和平，五善也。煩躁時嗽，腹痛渴甚，或泄利無度，小便如淋，一惡也。膿血大泄，腫焮尤甚，膿色臭敗，痛不可近，二惡也。喘粗短氣，恍惚嗜臥，三惡也。目視不正，黑睛緊小，白睛青赤，瞳子上看，四惡也。肩背不便，四肢沉重，五惡也。飲食不下，服藥而嘔，食不知味，六惡也。聲嘶色

（薛伯宗徙癰之法不知若何殊隔蒜治法方寄癰爲止）

敗、鼻青赤、面目四肢浮腫、七惡也。五善見三則瘥、七惡見四則危。○元戎云：瘡瘍自外而入者、不宜灸；自內而出者、宜灸。外入者、托之而不內；內出者、接之而令外。故經云：陷者灸之。灸而不痛、痛而後止其灸；灸而不痛者、先及其潰、所以不痛、而後及良肉、所以痛也。灸而痛、不痛而後止其灸；灸而痛者、先及其未潰、所以痛、而次及將潰、所以不痛也。○凡人初覺發背、欲結未結、赤熱腫痛、先以濕紙覆其上、立視候之、其紙先乾處、即是結癰頭也。取大蒜切成片、如當三錢厚薄、安于頭上、用大艾炷灸之。三壯即換一蒜片、痛者灸至不痛、不痛者灸至痛時方住。最要早覺早灸爲上。一日二日、十灸十活；三日四日、六七活；五六日、三四活；過七日、則不可救矣。若有十數頭作一處生者、即用大蒜研成膏、作薄餅、鋪頭上、聚艾于蒜餅上燒之、亦能活也。若背上初發赤腫一片、中間有一片黃粟米頭

（古云用藥如用兵須知用兵之利者當先知用兵之害學者所當知之）

（淺深處有大利有大害慎之慎之）

子。便用獨蒜切去兩頭、取中間半寸厚薄、正安于瘡上。着艾灸十四壯、多至四十九壯。○又頭爲諸陽所聚、艾炷宜少而小。若少陽分野、尤不可灸、灸之多至不救。亦有因灸而死者、蓋虛甚孤陽將絕、其脉必浮數而大、且鼓、精神必短而昏。無以抵當火氣、宜其危也。○方書治癰疽、用針烙者、乃用圓針如筯。如緯鋌大、頭圓平、長六七寸。一樣二枚、蘸香油于炭火中燒紅、于瘡頭近下烙之、宜斜入向軟處。一烙不透、再烙、必得膿也。總要用得其宜、若毒深針淺、膿不得出；毒淺烙深、損傷良肉、不當其所、他處作頭。此皆不能愈疾、反增痛苦。○又有用砭鎌者、此血實者宜決之。砭鎌者、磁鋒之類、未熟而決、以洩其毒。不可太深、所謂刺皮無傷肉、不可輕用。○又有敷貼之法、初生之瘡腫、似有頭而未起、即當貼溫熱藥、引出熱毒、火就燥之義。若瘡腫初生即高起、四畔焮赤、宜搗生寒藥貼之、折伏其

敷貼有期亦須留意

淋漬之法使不逆於肉理也

服藥有方將護有法自然重者輕危者安矣不[illegible]病[illegible]身者當加意

熱勢。驅逐其邪惡、撲火之義、大抵敷貼之法。欲消散腫毒。疏通血脈、寒熱錯綜、皆期於不成膿也。○又有用淋洗法。瘡腫初生。一二日不退。須用湯水淋射之。其在四肢者。溻漬之。其在腰腹及背者。淋射之。其在下部委曲者。淹漬之。無非疏導腠理。通調血脈。使無凝滯耳。

將護法

大凡瘡疽初生。皆如黍粒。其狀至微。人多忽視。因

成大患。能防於未形。理於未成。朝覺夕治。則必無危困矣。否則膿血結聚。毒入深沉。束手待斃。悔之何及。夫以不貲之軀。緩慢自忽。更托命庸醫。任其措置。危殆可立而至。故醫不可不擇。然當知其飽讀經書。久諳疾候。洞明色脈。湯藥熟閑。更平素仁善孝義。臨事不惑者。方爲良醫而濟我事也。又要在病人自克。不可恚怒悲憂。呼呼怨恨。及驕性情縱口腹。任勞役。惟宜恬澹耐煩。至如患人左右。尤

食物即是藥品一利一害關係非小指出示人爲利多矣

宜止息煩雜。一切打觸器物。諸惡音聲。爭辯是非。咒罵鬪毆。產婦淫男。體氣不潔。腥羶穢濁。雞犬畜獸。並須遠離。設親友問疾者。可以預囑徐行。低聲款曲。禮畢躬退。勿令咨嗟驚訝。話舊談新。妄言虛實。亂舉藥方。久坐多言。重疊省問。勞煩病體。惑亂性情。爲害非淺小也。其侍患者。宜壽近中年。性情仁厚。調治藥物。無失其時。畜中勿食野獸自死有病之肉。水族勿食異狀雜魚。及父母自身本命生

屬。蔬中勿食不時。無名。大熱。大寒。滑泄之菜。果中勿食不時。酸澀難化。及蟲蛀之物。止宜黃白粱米。稀粥軟飯。瓜齏蘿蔔豉醬。及酥爛潔淨猪羊等肉。勿令過饑。勿令太飽。此時猶忌一應麪果炙煿煎炒肥甘厚味。若肌膚將平。惡肉去盡。瘡口收斂。尚忌起立行步。揖待賓客。房室宴會。嗔怒沐浴。登陟遨遊。衝寒冒暑。直待瘡瘢平復。精神如故。氣力完全。方無所忌。百日內。慎勿觸犯之。此篇不但將護

瘡疽即一切虛損久疾。倘能奉行、自然大有裨益。故錄出與世共寶之。

附方

遠志酒　治一切癰疽發背。癤毒惡候。有死血陰毒在中。則不痛、傅之即痛。有憂怒等氣內攻。則痛。傅之即不痛。或蘊熱在內。手不可近。傅之淸凉。或氣血虛而不歛。傅之自歛。

遠志（不以多少泔浸搥去心乾爲末）

酒一盞。調末三錢。澄淸飲之。以滓傅于患處。

獨勝散　治癰疽。皆緣血滯氣凝而致者。

香附子（去毛令淨以生薑汁淹一宿焙乾研極細）

右無時。以白湯調二錢服。又云疽多因怒而得。但服香附。進食寬氣。自有神效。

人參敗毒散（見第三十七）

飛龍奪命丹　專治疔瘡發背。腦疽吹乳癰疽。一切無名腫毒。惡瘡無頭者。服之有頭。不痛者。服之知痛、已成形者。服之立愈。危惡者。服之無失。

蟾酥（乾者酒化）　雄黃（各二錢）　膽礬

寒水石（各一錢）　乳香　没藥

銅綠（各二錢）　輕粉　麝香（各五分）

海洋（即蝸牛連殼二十一個）　硃砂（一錢作衣）

爲末。先將海洋研爲泥。和末丸菉荳大。丸不就。加好酒多杵。毎服三丸。用葱白三寸。令病者嚼爛。吐於男左女右手心。將爛葱裹藥。無灰酒三

四盞。溫熱送下。避風蓋煖臥。約人行五里許。飲熱酒助藥力。發熱大汗爲度。重不過三服。

蟾酥丸　治疔黃一切惡瘡。

川烏　蓮花蕊　硃砂（各一錢半）

乳香　没藥（各二錢）　輕粉

蟾酥（各一錢）　麝香（五分）

爲末。糊丸菀豆大。毎服一丸。病重者二丸。依前奪命丹服法取汗。

佑賢曰以上三方爲瘍科神劑當預備救人

眞人活命飲　治一切癰疽癧毒。

川山甲（三片切碎蛤粉炒）　天花粉

甘艸節　乳香　白芷

赤芍　貝母（各一錢）　防風（七分）

沒藥　皁角刺（各五分）　當歸尾（酒洗）

陳皮（各一錢半）　金銀花（三錢）

在背。皁刺爲君。在腹。白芷爲君。在胸。加蔞仁二錢。在四肢。金銀花爲君。疔瘡。加紫河車草三錢。

作一貼。老酒鍾半。煎一鍾。温服。煎須用大瓦器。紙封口。勿泄氣。服看證上下。飢飽服之。能飲者。再飲數杯。忌酸物鐵器。宜服於未潰之先。

護心散　治發背癰疽。發腦發髭。腦虛頭暈。風濕等證。

甘草（炙一錢）　菉荳粉（炒二錢）　硃砂（研水飛過一錢）

右爲細末。作一服。白湯調下。

防風通聖散（見第六十一）

佑賢曰芙蓉涼血蒼耳祛風散熱敷患處四圍者不使毒氣散漫也露頭者欲令毒氣外出也

神効托裏散　治癰疽發背。腸癰妳癰。無名腫毒。焮赤疼痛。憎寒發熱。不問老幼。並治之。

黃耆（去蘆五兩）　當歸（一兩八錢）　粉草（炙八錢）

忍冬藤葉（五兩）

右爲細末。每服五錢。酒一盞半。煎至一盞。病在上。食後服。在下。食前服。少頃再進。留滓外傅。

正鐵箍散

貝母（去心）　白芷　蒼耳草灰（醋拌晒乾）

（各二兩）　或加龍骨（二錢尤妙）

右爲細末。水調。或香油調。貼瘡上。

鐵井欄　治無名腫毒。或背疽。

芙蓉葉（重陽前收研末）　蒼耳（端午前收燒灰存性）

右同研細。以蜜水調。敷患處四圍。露頭。

補中益氣湯（見第三十九）

玉樞丹（見第六十三）

十全大補湯（見第十六）

當歸補血湯（見第十六）

神仙太乙膏　治一切癰疽瘡毒，已潰未潰者，如發背，以溫水洗淨，軟絹拭乾，用緋帛攤貼，更為丸，冷水送下。血氣不通，溫酒下。赤白帶，當歸酒下。咳嗽及喉閉纏喉風，並用新綿裹置口中噙化。一切風赤眼，捏作小餅，貼太陽穴，更以山梔子湯下。打撲傷損，外貼內服橘皮湯下。腰膝痛貼患處，鹽湯下。唾血，桑皮湯下。以蛤粉為衣。其

膏可收十餘年不壞。又治瘰癧，用鹽湯洗貼，酒下一丸。楊梅瘡毒潰爛者，尤效。婦人經脈不通腹痛，芎歸湯下，并攤貼之。疥瘡，用麻油煎滾和膏塗之。虎犬蛇蝎傷、刀斧傷，皆可內服外貼。

玄參　白芷　當歸

赤芍　肉桂　大黃

生地（各一兩）　麻油二斤，入銅鍋內煎至黑，濾去滓。入黃丹十二兩再煎，滴水撚軟硬得中，即成膏矣。臃毒跌撲疼痛，加乳香沒藥。

製丹法：黃丹先炒紫色，傾缸內，用滾水一桶泡之，再汲凉水滿缸，用棒常攪，浸一宿，去水，再炒如前二次，方研令極細用。

佑賢曰：雀糞硇砂能爛好肉，故可代針。

替針丸

雄雀糞（二十粒）　硇砂　陳倉米

沒藥（各一字）

右研勻，以米飯丸，如粟大，每用一粒，貼瘡口，眼

中即潰膿出。

六君子湯（見第十六）

佑賢曰：方妙絕奇，其得力全在白芨。

圍藥

南星　草烏頭　黃蘗

白芨（各二兩）　五倍子（炒，一兩）

右為細末，調如糊，隨血圍匝如墻壁，可移險處於不險處，如神。

金絲萬應膏　治攧撲損傷，手足肩背，并寒濕脚

作[illegible]曰此膏功在行於消滯

氣。疼痛不可忍。小兒脾疳。瀉痢。咳嗽。不肯服藥者。

瀝青（二斤半）　威靈仙　黃蠟（各二兩）

萞麻子（一百個去殼研）　沒藥　乳香（各一兩別研）

麻油（夏二兩春秋三兩冬四兩）　木鱉子（二十八個去殼切片子研）

右先將瀝青同威靈仙。下鍋熬化。以槐柳枝攪候焦黑色。重綿濾過。以瀝青入水盆。候冷成塊。取出秤二斤淨。再下鍋鎔開。下麻油黃蠟萞麻

木鱉子泥。不住手槐柳枝攪勻。須慢火。滴入水中不黏手。扯拔如金絲狀。方可。如硬。再旋加油少許。如軟。加瀝青。試得如法。却下乳沒末。起鍋在炭火上。再用槐柳枝攪數百次。又以粗布濾膏在水盆內。扯拔如金絲。頻換水浸一日。却用小銚盛。如跌撲傷。於疼痛處火上炙熱貼。透骨肉爲驗。連換熱水數浴之。則血瘀自消。小兒脾疳。貼患處。瀉痢。貼肚上。咳嗽。貼背心。

八珍湯（見第十六）

疥瘡大楓膏　治一切乾濕疥瘡并膿窠爛瘡。

大楓子（二兩去殼）　枯礬（四兩）　蛇脫（燒存性）

樟腦　蜂窠（燒存性各三分）　水銀（五分用錫死之）

柏油燭（四兩）

楓子諸藥爲末。入燭油。次入水銀。搗勻塗擦。

桃花隔紙膏　貼久患臁瘡如神。驗過千百矣。

上好透明松香。水煮。隨換水。煮數十次。以色白

味不澁苦爲度。研細。入上上飛丹十分之四。再研勻。用猪板油。去膜切碎。同藥搗勻。攤油紙上。作隔紙膏。上針刺多孔。先將苦茶洗患處淨。拭乾貼上。以絹帛緊包紮。二日一換。雖二十年臁瘡。不消十紙。

千槌膏　治瘰癧。

瀝青（一兩）　杏仁（去皮十三粒半）　萞麻仁（四十九粒）

同搗爛。初搗甚燥。如不能成膏者。搗千下。則漸

佐賢曰陳小粉當於雞塢店多年缸已上刮之

柔粘矣。用布攤貼。未潰消，已潰出核。

烏龍膏　治一切癰疽發背，無名腫毒，初發焮熱未破者。

用陳年小粉，不拘多少，入鍋炒令成黃黑色，取出待冷。研極細，以陳米醋調，稀稠得所，如過稀微火熬之。其色如漆，用磁瓶收貯。遇有腫毒，量腫大小，用榜紙攤成膏藥，中剪一孔，露出毒頭，貼上。疼痛即止，少頃覺癢，久則腫毒自消，甚效。

佐賢曰凡石藥用火煅須停久出火毒研末須極細如塵庶不滯著

麥飯石膏　治膿潰後，闔瘡口。

白麥飯石（二兩，有小於鵝卵石者，有大於鵝卵石者，其色有青黑白紅點相間，惟懸臍爲佳。以炭火煅至紅，以好米醋淬之，如此煅淬十數次，研爲末，重羅去粗者，取細末入乳鉢，數人更遞研五七日，如麵極細爲妙）　白斂（二兩研爲細末）

鹿角灰（不用自脫者，須用帶腦頂骨全者，那是生取之角。截作二三寸長，灰火燒令烟盡，研羅爲末，再入乳鉢，更遞研令極細，二兩）

右三味，最要研得極細，方有效。粗則反致甚痛，細則大能止痛，收口排膿（精粗之異如此）。和合，量藥末多寡，用陳好米醋入銀石器內，熬令魚眼沸，却旋旋入藥末，用竹篦子不住手攪，熬一二時久，令稀稠得所，提出以磁器盛之，候冷，以紙蓋覆，勿令着塵。用時先以猪蹄湯洗去膿血，以軟絹挹乾。鵝翎蘸膏塗傅四圍，凡有赤處盡塗之，但留中心一口如錢大，未潰能令內消，已潰則排膿如瀉水，逐日令口收斂。瘡久肌肉腐爛，筋骨出露，用舊布片塗藥貼瘡，但內膜不穿，亦能取

安。洗瘡勿可手觸嫩肉，亦不可口氣吹着。合藥亦忌腋氣之人，及月經有孕婦人見之，仍可熬好米醋一大碗收磁器內，候逐日用藥，如瘡上久則藥乾，以鵝翎點醋拂拭藥上，勿令燥也。初則一日一洗一換藥，十日後兩日一換。

古方云：麥飯石顏色黃白，類麥飯，曾作磨者尤佳。按麥飯石不可作磨，狀如麥飯團，生粒點，如無此石，當以舊麵家磨近齒處石代之，取其有

麥性故也。或溪中尋白石如豆如米大者。即是也。其石大小不等。或如拳。如鵝卵。略如握聚一國麥飯。

精要神異膏　治諸般惡毒瘡癤。發背癰疽。其妙如神。

露蜂房（要用蜂兒多者爲妙剪淨一兩）　全蛇蛻（鹽水洗淨焙乾）

玄參（去蘆各半兩）　綿黃耆（七錢半）　黃丹（五兩研細後入）

杏仁（去皮尖切小片一兩）　男子亂髮（洗淨焙乾如雞子大）

真麻油（一斤）

右件藥。先將麻油入銀銚中。同亂髮於風爐上。慢慢文武火熬。候髮焦熔盡。以杏仁投入。候杏仁色變黑。好綿濾去滓。再將所熬清油。入銀銚內。然後入黃耆玄參二味。慢火熬一二時。取出銚子。安一冷風爐上。候半時久。火力稍息。旋入露蜂房蛇蛻二味。將柳枝急攪。移銚于火上。不任手攪。慢火熬至黃紫色。用綿濾過。後復入清油在銚內。乘冷投黃丹。急攪片時。又移銚於火上。文武火慢慢熬。不住手用柳枝攪千餘轉。候藥油變黑色。滴於水中凝結成珠子。則是膏成就矣。若珠子稀。再熬少時。必候得所。然後用瓷器內封收待用。或恐偶然熬火太過。稍硬難用却入少蠟熬添麻油在內。瓷器盛封。蓋于甑上蒸。乘熱攪勻。收而用之。膏藥熬成了。須用所盛瓷器置淨水盆中。出火毒一晝夜。歇三日方可

用。熬此膏藥。極難于火候。須耐煩看火緊慢。火猛。即藥中火發。千萬謹戒。（膏藥方甚多均無過於此）

內托復煎散　焮腫于外。根盤不深。形證在外而其脉浮者。病在皮肉。非氣盛。則必侵於內。急宜服之。托裏健胃。

地骨皮　黃芩　茯苓

芍藥　人參　黃耆

白术　桂　甘艸

防己　當歸（各一兩）　防風（二兩）

先以蒼朮一斤。水五升。煎三升。去朮。入前藥再煎至三四盞。取清汁。分三四次。終日飲之。如未已。再煎半料飲之。如大便秘。煩熱。少服黃連湯。如微利。及煩熱已退。仍與此散。使榮衛俱行。邪氣不能內傷也。

神仙蠟礬丸　治癰疽及腸癰。托裏消毒。固藏府。止疼痛。

黃蠟（二兩）　明礬（三兩）

先將黃蠟溶開。離火待少溫。入礬末和勻。衆手急丸如桐子大。每服二三十丸。食前酒下。每日二服。此藥不惟定痛生肌。且護膜止瀉。消毒化膿。內癰排膿。托裏之功甚大。金石藥毒發疽。非此莫治。更用白礬爲末。每日酒服一錢。尤效。有遍身生瘡狀如蛇頭者。尤宜服之。每日百丸。若蛇蝎。并一切毒蟲所傷。溶化熱塗患處。內更服

之。毒即解。服至三四兩以上。愈見其功。此宜于癰毒潰後服之。腸癰尤效。

癰疽收口藥

白龍骨　白蘞　乳香

沒藥（各半分）　爲末摻之

比天膏（此淮安王寡婦家秘傳）

麻黃　川芎　白芷　薄荷

草烏　全蝎（各二兩）　防風　連翹

黃芩　黃連　大黃　知母

貝母　當歸　蒼朮　羌活

桔梗　柴胡　荊芥　五倍子

海螵蛸　白芨　川山甲　木鱉子

大楓子　蛇蛻　梔子　血餘（各三兩）

椿皮　桑枝　槐枝　柳枝（二寸許者各二十段）

片腦（一錢）　麝香（二錢）　乳香　沒藥（各五錢）

龍骨　血竭（各三錢）　輕粉（二兩）　赤石脂（三錢）

右麻黃等粗藥。入麻油內浸一宿。文武火熬。至藥枯黑色。去滓再熬。滴水成珠。每油二斤。入密佗僧一斤。收成膏。下片腦細藥。柳枝不住手攪。入水中。出火毒收用

治癰疽發背。無名腫毒。疔瘡瘰癧。鼠瘡癧瘡。棒瘡刀傷。便毒魚口。風癬頑瘡。多日不滿。口常流膿水。婦人吹乳奶疽。瘡癤等項。先將花椒湯洗淨貼。○肩背風吹。兩膊酸疼。貼肩井穴。左右肘

疼。貼曲池穴。○風寒濕氣。腰眼大腿酸麻。貼患處。○兩曲膝冷痛。貼膝眼上。腳氣舉發貼疼處。○跌打損傷。貼患處。○以上諸證。俱用食鹽炒熱。布包熨患處。令透毛孔。方貼之。

仙傳萬靈膏（忌用鐵鍋煎）

羌活　獨活　山梔　兩頭尖

官桂　玄參　大黃　五倍子

當歸　白芷　皂角　天花粉

赤芍　生地　熟地　山茨菰

防風　黃連　川芎　紅牙大戟

連翹　桔梗　白芨（各六錢）　木鱉子（二十粒去殼）

白蘞　苦參（各六錢）　川山甲（十片）　蓖麻子（八十粒去殼）

杏仁（四十粒）　血餘（四兩）　槐枝　柳枝

桑枝（寸許長者各三十段）　巴豆（三十粒去殼）

用麻油二斤四兩。春秋浸三日。夏浸二日。冬浸五日。熬枯黑色。去滓再熬。滴水成珠。每油二斤

下飛丹一斤。松香三兩。黃蠟二兩。桐油二兩。熬不老不嫩。稍冷。入乳香沒藥各六錢。血竭。阿魏。孩兒茶。百草霜。輕粉。馬莧膏。各三錢。桑枝攪勻攤貼。

治癰疽發背癧瘡。用火烘手熱。摩百餘下貼。已出膿者。不必摩。○疥癬瘡。搔癢貼。○風癩。用木鱉子。火煨研爛。置膿上貼。○無名腫毒。貼患處。○跌撲刀斧傷。貼患處。○風痰壅塞。貼心上。熱

手摩百下。○痞塊。木鱉子。研爛。置膏藥上貼之。以皮硝一兩。鴿糞五錢。蒜二個。搗勻。用麵作一圈圍定在膏藥外。熨斗火運藥上。令氣透。○鼓脹。加煨木鱉貼心下臍上。熱手摩百次。○癱瘓濕氣痛。加煨木鱉貼患處。手摩百下。○月經不調。貼血海穴。手摩百下。

解輕粉毒

用佛前照過陳年琉璃。燒存性。為末。每服二錢酒調下。日服一二次。一月全愈

佑言曰跌撲金瘡只用陳石灰一味拌韭菜汁晒乾為末敷之止痛散血妙不可當

花蕊石散　治一切打撲金刃傷損。身體出血者。急于傷處摻藥。其血化為黃水。如有內損。血入臟府。熱煎童便。入酒少許。調一錢服之。若牛觝腸出不損者。急送入。用桑白皮為線縫合。摻藥血止立活。如無桑白皮。用生麻縷亦可。不得封裹瘡口。恐作膿血。以竹夾兩邊皮起亦好。如瘡乾。以津液潤之。然後摻藥。婦人產後敗血沖心。胎衣不下。並用童便調服。

硫黃（明淨者四兩搗粗末）　花蕊石（一兩搗粗末）

二味拌勻。先用紙筋和鹽泥。固濟罐子一個。候泥乾。入藥於內。再用泥封口。候乾。置四方磚上。書八卦五行字。用炭一秤。簇疊周匝。自巳午時後下火。令漸漸上徹。直至經宿。火冷炭消。又放經宿。罐冷。取出研貯。磁瓶內收用。

醫燈續焰卷十三終

醫燈續焰卷十四

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王聖翼佑賢評
葉　彝癸周
門人孫　標振宜校
胡靖策我屏

肺癰脉證第七十五

肺癰已成，寸數而實。肺痿之形。數而無力。肺癰色白。

脉宜短澀。不宜浮大。唾糊嘔血。

亡津液而虛爲肺痿熱迫稠痰爲肺癰二者治自迥別

金匱要略問曰。熱在上焦者。因欬爲肺痿。肺痿之病。何從得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脉數。其人欬。口中反有濁唾涎沫者何。師曰。爲肺痿之病。若口中辟辟燥。欬即胸中隱痛。脉反滑數。此爲肺癰。欬唾膿血。脉數虛者爲肺痿。數實者爲肺癰。○又問曰。病欬逆。脉之。何以知此爲肺癰。當有膿血。吐之則死。其脉何類。師曰。寸口脉微而數。微則爲風。數則爲熱。微則汗出。數則惡寒。風中于衛。呼氣不入。熱過于榮。吸而不出。風傷皮毛。熱傷血脉。風舍于衛。其人則欬。口乾喘滿。咽燥不渴。時唾濁沫。時時振寒。熱之所過。血爲之凝滯。蓄結癰膿。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。

之行乃[illegible]而[illegible]膿而[illegible]至矣[illegible]

○又云。肺痿吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此爲肺

中冷。必眩。多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者。屬消渴。　又云。肺癰喘不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。　又云。欬而胸滿振寒。脉數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。桔梗湯主之。　又云。肺癰胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞清涕出。不聞香臭酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。葶藶大棗瀉肺湯主之。已上數條。金匱要略辯肺痿肺癰之所成不同也。其言熱在上焦者。痿癰皆有熱

[illegible]乃肺實痰涎壅遏自然之理因痰知痰亦自然之理

節括[illegible]間[illegible]病但[illegible]方[illegible]道[illegible]此繆[illegible]法[illegible]肺痿要[illegible]已驗[illegible]何[illegible]熱何[illegible]醫之目將印此數端之見治病之人九矣

也。其言欬者。痿癰皆有欬也。其言亡津液者。痿癰皆亡津液也。其言脉數者。痿癰皆脉數也。但痿屬肺氣虛。虛則雖有熱而不烈。熱不烈。則雖亡津液不至燥涸。故雖欬而口中反有濁唾涎沫。熱雖客肺。亦不至腐敗爲膿。唯肺燥痿萃而已。其脉雖數而必虛。癰則不然。乃肺藏氣壅邪實。實則熱烈。熱烈。則津液亡而更加乾涸。故口中辟辟燥。烈熱迫肺。肺將腐傷。故氣逆而欬。欬卽胸中隱痛也。津液

既涸。脉應濇滯。而反滑數者。蓄熱腐化。挾有膿血之象。卽謂之數實亦可。次條云。寸口脉微而數者。以衛疎故微。邪鬱故數。衛疎邪鬱。故汗出表熱而且惡寒也。此言風之初襲。邪猶在表。不入于裏。唯隨呼出。中于衛而外傷皮毛。鬱而爲熱。其熱則不出于外。唯隨吸入。過於榮而內傷血脉。夫衛者。主表。主皮毛。陽也。風容之。則內關于肺。肺氣壅逆。故欬而喘滿。衛主氣。肺亦主氣。口咽爲氣之門戶。氣

肺癰亦甚急[illegible]膿成則欬[illegible]已傷豈得不死

不通調。則津液不周布。故口乾咽燥。或有時反唾濁沫。以熱不在胃。故不渴。衛疎邪客。時爲振寒。此皆風中於衛。激動肺氣之證驗也。榮主裏。主血脉陰也。熱迫之。則內及于脉。肺朝百脉而行榮衛。况邪自皮毛始。皮毛者。肺之合。由合入肺。肺受其熱。血爲之凝結。久則腐敗爲膿。隨吐而出。如米粥。此皆熱過于榮。敗傷肺體之證驗也。始萌則在陽。在衛。屬氣分。故云可救。久則入陰。傷血脉。傷藏體。故

云膿成則死。三條所云肺痿者。虛寒之痿。痿之變也。肺虛而寒。則液不流布。故亦吐涎沫。無熱迫肺。則肺氣不逆。故不欬。無熱。故不渴。肺居最上。爲諸氣之總司。而通調水道。下輸膀胱。遺尿小便數者。肺氣虛冷。有失通調之職。所謂不能制下也。氣虛于上。故眩。治以甘艸乾薑湯者。薑以溫冷。艸以補虛。艸補土而不補金者。虛則補其母耳。服此溫劑而渴者。肺中必熱。是知遺尿便數。非痿證。乃消渴

肺受命于脾補母者所以治其源也

也。卽氣厥論所謂飲一溲二。肺消之屬。下四條所載。已成癰。未成癰。皆肺氣壅塞之有餘者。前二條論中。頗悉其義。而阜角。葶藶。桔梗。葦莖。亦皆下氣瀉壅開結之藥。以方合證。理可想見。故不重解也。本文云。肺癰已成。寸數而實者。卽要略所謂脉數實者。爲肺癰。肺痿之形。數而無力者。卽要略所謂脉數虛者。爲肺痿。必候于寸者。以肺居最上也。肺癰色白。脉宜短濇者。言其面色白。爲肺色。短濇。爲肺

脉。色脉與證相符。故宜也。若脉浮大。是爲火象。唾如米糊。嘔見膿血。是火尅金。肺藏已傷。宜乎。

附方

金匱甘草乾薑湯

甘草（四兩炙）　乾薑（二兩炮）

右㕮咀。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

金匱葶藶大棗瀉肺湯　治肺癰喘欬。不得臥。或鼻塞清涕。不聞香臭酸辛。上氣迫塞。服此湯。可先服小青龍湯一劑。乃進此。（小青龍湯方見第十六）

葶藶（熬令黃色搗丸如彈子大）　大棗（十二枚）

右先以水三升。煮棗取二升。去棗。內葶藶煮取一升。頓服。

桔梗湯　亦治血痺。今人用此爲咽喉諸證要藥（見第三十二）

炙甘草湯（見第三十三）

千金甘草湯　治同桔梗湯。

甘草

右一味。以水三升。煮減半。分溫三服。

千金生薑甘草湯　治肺痿欬唾涎沫不止。咽燥而渴。

生薑（五兩）　人參（三兩）　甘草（四兩）

大棗（十五枚）

右四味。以水七升。煮三升。分溫再服。

佐按白瓜瓣多用苦絲瓜子

千金桂枝去芍藥加皂莢湯　治肺痿吐涎沫。

桂枝　生薑（各三兩）　甘草（二兩）

大棗（十枚）　皂莢（一枚去皮子炙焦）

右五味。以水七升。微微火煮取三升。分溫三服。

外臺桔梗白散　治欬而胸滿。振寒脉數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。

桔梗（去蘆）　貝母（去心各三分）　巴豆（一分去皮熬）

右三味爲散。彊人飲服半錢匕。羸者減之。病在膈上者。吐膿血。膈下者。瀉出。若下多不止。飲冷水一杯則定。

千金葦莖湯　治欬有微熱。煩滿。胸中甲錯。是爲肺癰。

葦莖（二升）　薏苡仁（半升）　桃仁（五十粒）

瓜瓣（半升）

右四味。以水一斗。先煮葦莖得五升。去滓。內諸藥煮取二升。服一升。再服當吐如膿。

[illegible]自治肺[illegible]用桔梗[illegible]乃藥開肺氣故也

瀉白散　治肺癰

桑白皮（炒二錢）　地骨皮（去骨）　甘草（炙）

貝母（去心）　紫菀　桔梗（炒）

當歸（酒拌各一錢）　瓜蔞仁（一錢半）

作一劑。水一鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

立齋云。此方乃瀉肺邪消毒之劑也。若喘咳唾痰沫。肺脉浮數者。用之有効。

四物湯　治肺癰吐膿。五心煩熱。壅悶欬嗽。

貝母（去心）　紫菀（去苗土）　桔梗（炒各兩）

甘草（炙半兩）

右搗篩。每服三錢。水一盞。煎五七沸。去滓。不拘時溫冷服。如咳嗽甚。加去皮尖杏仁三枚同煎。小兒量減。

肺癰神方

用薏苡米爲末。糯米飲調下。或入粥內煮喫亦可。一方用水煎服。當下膿血便愈。

[illegible]治肺癰大法先開提膿散次清涼後補養二方乃後局藥也

治時日用藥有先後不可不知有用白芨一味治此亦妙

濟生排膿散　治肺癰。得吐膿後。以此排膿補肺

生綿黃耆二兩。細末每二錢。水一盞。煎五分服。

排膿散

黃耆（鹽水拌炒）　白芷　五味子（炒杵）

人參（各等分）

爲細末。每服三錢。食後蜜湯調下。

肺癰收口方

肺癰收斂瘡口。止有合歡樹皮。或白斂煎湯飲之。然不可飲於未吐膿血之先也。

又肺癰方

野毛栗根二兩。水二鍾。煎五分服。覺肺中微有聲。數次即愈。

治吐膿血方

吐膿血如肺癰。口臭。他方不應。宜消風散。入男子髮灰。淸米湯下兩服。

又治肺癰方

熱結於腸始生癰毒小腹疼或腫痛或甲錯皆其驗也

敗醬[illegible]治腸癰上藥也

鮮百合搗汁。酒和服。六七次愈。

試肺癰法

凡人覺胸中隱隱痛。咳嗽有臭痰。吐在水內。沉者是癰膿。浮者是痰。

腸癰脈證第七十六

腸癰實熱。滑數可知。數而不熱。關脈芤虛。微濇而緊。未膿當下。緊數膿成。切不可下。

腸癰者。腸內生癰也。大腸小腸皆有之。大抵得之不節飲食。不適寒溫。或積垢瘀凝。或敗血留滯。壅塞不行。久鬱化熱。久熱腐膿。而癰斯成矣。如小腹腫痞。皮急。按之則痛。小便數如淋。或復自調。時或發熱。或自汗惡寒。身如甲錯。外無熱。內無積聚。而見上證者。皆腸癰之候也。甚者腹脹大。轉側有水聲。或繞臍生瘡。或膿自臍出。或大便出。其脈數者。小有膿也。洪數滑數者。大有膿也。（宜薏苡附子敗醬散）遲緊或微濇而緊者。未有膿也。（宜大黃牡丹湯萬氏桃仁承氣湯加連翹秦艽）

當下不當下此死生之機

（入風者加防風。準繩蠟礬丸亦効）鬱結成熱。其熱自實。熱實。則脈之滑數。不言可知。若數而無熱。則數爲虛促之數。非熱所鼓。不弦不實。而與腹中相應之關脈。亦且芤虛矣。雖見諸證。未必成膿。設的確有癰。亦瘀凝之血耳。蓋血瘀聚於腸腹。則流行之脈道中。反覺空虛。故脈芤也。若脈微澁而緊者。氣猶滯着飲實。未化膿也。下之足以蕩其留結之邪。若脈緊滑數。熱已沸湧消熔。膿已成也。下之反以奪其生新之力。卽癰瘍未潰。宜瀉實。已潰。宜補虛義。

佑賢曰腸癰之脈當滑數今數而不滑知虛而有熱也去邪熱用薏苡敗醬救虛寒用附子有附子之力則其藥又易行眞妙方也

附方

薏苡附子敗醬散　治腸癰爲病。其身甲錯。腹皮急。按之濡。如腫狀。腹無積聚。身無熱。脈數。此腸內有癰膿也。此方主之。

薏苡仁（十分）　附子（二分）　敗醬（五分）

右三味。杵爲末。取方寸匕。以水二升。煎減半。頓服。小便當下。

佑賢曰熱壅於腸自當攻下此正法

大黃牡丹湯　治腸癰少腹腫痞。按之痛如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。其脈遲緊者。膿未成。可下之。當有血。脈洪數者。膿已成。不可過下。總以此方主之。

大黃（四兩）　牡丹皮（一兩）　桃仁（五十個）

瓜子（半升）　芒硝（三合）

右五味。以水六升。煮取一升。去滓。內芒硝再煎沸。頓服之。有膿當下。如無膿當下血。

萬氏治腸癰方

桃仁承氣湯。加泰花連翹。（桃仁承氣湯見第二十）

薏苡仁湯　治腸癰。腹中疞痛。煩躁不安。或脹滿不食。小便澁。婦人產後虛熱。多有此病。縱非癰。但疑似間。便可服。

薏苡仁　瓜蔞仁（各三錢）　牡丹皮（去骨）

桃仁（各二錢）

右作一服。水二鍾。煎一鍾。不拘時服。

按此方。藥品和平。其功且速。常治腹痛。或發熱。或脹滿不食。水道澁滯。産後多有此證。或月經欲行。或行後作痛尤効。

四聖散　一名神効瓜蔞散。治腸癰。癰疽生於腦髭背腋。及便毒。服之神効。

生黃瓜蔞（一枚去皮）　粉草（四錢研末）　没藥（研末三錢）

乳香（研末一錢）

右用好紅酒二大碗。慢火煎至一碗。分作兩服。

兩日服盡。大便順導惡物妙。若乾瓜蔞。則用兩三枚。一方。若病在上。食後服。在下食前服。毒已結成即膿化爲水。毒未成。即於小便中出。疾甚。再合服。以退爲度。

神仙蠟礬丸（見第七十四）

雲母膏　治一切癰疽瘡癤。折傷等證。

蜀椒（去目及閉口者微炒）　白芷　没藥

赤芍藥　肉桂　當歸

佐賢曰癰疽折傷首屬氣血混一榮衛不分雲母生[illegible]使氣歸天[illegible]升則血行榮衛自分矣諸藥皆爲臣[illegible]蓋花之用能化雲母耳佐賢曰諸香細料須將成離火投之否則香散功減

鹽花　菖蒲　麒麟竭

黃耆　白芨　芎藭

木香　龍膽艸　白歛

防風　厚朴　麝香

桔梗　柴胡　松脂

人參　蒼朮　黃芩

乳香　附子　茯苓

良薑　合歡皮（各五錢）　硝石

甘艸　雲母（各四兩）　桑白皮

槐枝　柳枝　柏葉

水銀（以絹另包待膏成以手細彈在上名養膏母）　陳皮（各二兩）

清油（四十兩）　黃丹（二十兩）

右除雲母硝石麒麟竭乳香没藥麝香鹽花黃丹八味另研。外餘藥並細切。入油浸七日。文火煎。以柳枝不住手攪。候匝沸。乃下火。沸定。又上火。如此者三次。以藥黑色爲度。去滓。再熬。後入

丹與八味末。仍不住手以槐柳枝攪。滴水中成珠。不軟不硬爲度。磁器收貯。候溫。將水銀彈上。用時先刮去水銀。或服或貼。隨宜用之。其功甚大也。

排膿散　治腸癰小腹脹痛。脉滑數。或裏急後重。或時時下血。

黃耆（鹽水拌炒）　當歸（酒拌）　金銀花
白芷　穿山甲（蛤粉炒）　防風
連翹　瓜蔞（杵）　甘艸（各一錢）

作一劑。水二鍾。煎八分。食前服。若膿將盡。去穿山甲連翹。加當歸川芎。或爲末。每服三錢。食後酒調下。亦可。

醫燈續焰卷十四終

醫燈續焰目錄

卷之十五

胎產脉證第七十七

保生無憂散　八珍湯（見第十六）
四物湯（見第二十一）　神妙乳砂丹
葵子如聖散　加味芎歸湯
補中益氣湯（見第三十九）　龜殼散
十全大補湯（見第十六）　平胃散（見第四十四）
千金神造湯　半夏湯
束胎丸　達生散
張氏方　神寢丸
佛手散　三合濟生湯
黑神散　阿膠赤小豆湯
兎腦丸　如神散
黃金散　清魂散
六君子湯（見第十六）　當歸建中湯

奪命丹　牛膝湯

失笑散　胡氏法

加桂芎歸湯　紅花酒

荊芥散　白薇湯

花蕊石散（見第七十四）　起枕散

六味地黃丸（見第十六）　逍遙散見第五十一

加味歸脾湯（見第五十一）　加味四物湯

烏金散　蒲醋飲子

益母丸　金匱當歸散

白朮湯　縮砂散

三物解毒湯　白扁豆散

豆淋酒　枳實芍藥散

羊肉湯　回生丹

艾附煖宮丸　神方驗胎散

卷之十六

小兒脈證第七十八

畫眉膏　金朱散

生地黃湯　真金散

外臺方　豆豉膏

蘇合香丸（見第十八一）　辰砂僵蠶散

五苓散見第十七　龍骨散

白芍藥湯　外消散

雙金散　辰砂抱龍丸

雞腸散　外臺方

六味地黃丸（見第十六）　瀉黃散見第四十九

導赤散見第十七　大黃黃連瀉心湯（見五十五）

清液散　五福化毒丹

膠黃散　菖蒲丸

肥兒丸　布袋丸

錢氏地黃丸　大啓脾丸（即資生丸見第五十一）

參苓白朮散（見第四十四）　益黃散

瀉黃散見前　硃砂安神丸見第十九

涼膈散（見第十九）　花火膏
蟬花散　茅先生抹唇膏
白朮當歸煎　瀉白散（見第四十九）
塗龜尿法　補中益氣湯（見第三十九）
小兒錮顖藥　麝茸丹
千金楸葉方　榆木散
聖惠神劾黑豆膏・千金舉大豆方
清胃湯（見第四十九）　雄黃丸

醫燈續焰　卷十六目　四　陸挹舟

千金白鹽方　靈苑生齒方
柴胡清肝散　湯氏蘆黃散
立驗散　錢氏橘連丸
豆豉大丸摩法　譚氏殊聖治客忤方
張渙碎邪膏　竈中黃土方
三物燒髮散　皂角搐鼻法
沉香降氣湯　葱刺鼻法
葛氏肘後灸法　管吹下部法

千金牛舐方　熨兩脇法
治鬼魘死方　雞冠血方
灸法　圖經治鬼持方
外臺深師五邪方・太乙備急散
聖惠木香散　范汪十七物紫參丸
羖羊角散　雄黃散
小兒五種蠱毒方　敗鼓皮方

醫燈續焰　卷十六目　五　陸

醫燈續焰卷十五

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖期評
王　嘉綬青羽
門人宋　雖飛卿校
陳如玖德卿

胎產脉證第七十七

婦人之脉。以血爲本。血旺易胎。氣旺難孕。少陰動甚。謂之有子。尺脉滑利。姙娠可喜。滑疾不散。胎必三月。但疾不散。五月可別。左疾爲男。右疾爲女。女腹如箕。男腹如釜。欲產之脉。其至離經。水下乃產。未下勿驚。新產之脉。緩滑爲吉。實大弦牢。有證則逆。

男爲陽。女爲陰。陽主氣。陰主血。一定之常理也。故女人以血爲本。血旺是爲本足。本足而施之以陽。則生化自全。而成胎亦易易矣。氣旺。則血反衰。是爲本不足。且失常理。未有理失常而能孕者也。又

[illegible]陽自無不[illegible]於陰陽相搏之義

人之身。陰靜陽動。陰體陽用。則血固陰靜也。亦體也。凝胎結孕。必動由靜始。體成用先。是知女人以血勝氣者爲貴。少陰動甚者。心手少陰之脉動甚也。心主血。動甚則血旺。血旺易胎。故云有子。即素問平人氣象論。所謂婦人手少陰脉動甚者。姙子。也。有子者。有姙之謂。男女之通稱。非獨指男子。如下文所辨。則有男女之分矣。尺脉者。左右腎脉也。腎爲天一之水。主子宮以繫胞。孕胎之根蒂也。滑

利。則不枯濇。而且有替替含物之象。故喜其姙娠即素問陰陽別論。所謂陰搏陽別。謂之有子。叔和脉經。所謂尺中之脉。按之不絕。法姙娠。上文所謂動甚姙子者。同義也。即此滑利之脉。應指疾而不散。滑爲血液。疾而不散。乃血液欲結之象。是爲有胎三月矣。若但疾而不散。是從虛漸實。從柔漸剛。血液堅凝。轉爲形體。故不滑耳。此姙娠五月之脉狀也。其疾左勝于右。是爲男孕。以男屬陽居左。胎

總不外陰陽氣釜爲箕已見成象

氣鍾於陽。故左勝。右勝於左。是爲女孕。以女屬陰居右。胎氣鍾于陰。故右勝。勝者。甚不甚之謂。非左疾右不疾也。更視其腹。如箕者爲女胎。如釜者爲男胎。蓋男女之孕于胞中。女則面母腹。男則面母背。雖各肖父母之形。亦陰陽相抱之理。女面腹。則足膝抵腹。下大上小。故如箕。（箕簸箕也前淺而後深覆之則高下異）男面背。則背脊抵腹。其形正圓。故如釜。（釜食鍋也覆之正圓）二說女動於腹。動不一處而動甚。男動于腹。舉腹

動而動微。動不一者。四肢也。舉腹動者。背也。歷觀數說。則男女在腹之向。確信不誣矣。及其欲産也。其脈與十月懷姙平昔見者忽異。假如平日之脈原浮。臨産則脈忽沉。平日之脈遲。臨産則脈忽數。至如大小滑濇。臨産皆忽然而異。蓋十月胎氣安定。一旦欲落。氣血動蕩。胞胎迸裂。自與經常離異。而脈亦非平昔之狀貌矣。雖然亦必有水先下。俗謂之胞漿。養胎之液也。水下。則胞裂而産。不爾。猶

古人有胎教觀此知養胎之法関于經絡極爲鄭重

未卽下。勿認爲産難而驚詞也。及其已産也。氣血兩虛。其脈宜緩滑。緩則舒徐。不因氣奪而急促。滑則流利。不因血去而濇枯。均吉兆也。若脈實大弦牢。非産後氣血俱虛者所宜。實爲邪實。大爲邪進。弦爲陰斂而宣布不能。牢爲堅着而瘀凝不解。是皆相逆之脈。設外有證。又豈能順乎。

胎産雜述。

胎屬十二經所養

虞氏曰。脈經云。診其脈。手少陰之脈動甚者。姙子也。蓋手少陰。心脈也。心主血脈故也。又腎爲胞門子戶。尺中腎脈。按之不絶。當姙子也。又婦人姙娠一月之時。足厥陰脈養之。二月足少陽脈養之。三月手厥陰脈養之。四月手少陽脈養之。五月足太陰脈養之。六月足陽明脈養之。七月手太陰脈養之。八月手陽明脈養之。九月足少陰脈養之。十月足太陽脈養之。是以諸經脈各養三十日也。若夫

至期宮養之經、虛實不調、則胎孕爲之不安。甚則下血而墮矣。夫手足十二經、氣血盈虧不同。如手足厥陰太陽少氣多血、手足太陰少陰、少血多氣。手足少陽、氣多血少、手足陽明、氣盛血多。安胎之法、宜各按月依經、視其氣血虛實而調之、庶無胎墮之患。其或感冒風寒、別生異證、又宜各按法而調治之。

治難產三禁

絜古云。治胎產之病、從厥陰經論之、是主氣生化之源也。厥陰與少陽爲表裏、故治法無犯胃氣、及上二焦。有三禁。不可汗、不可下、不可利小便。發汗則傷上焦之陽、利大便則脉數而動脾、利小便則內亡津液、胃中枯燥。製藥之法、能不犯此三禁、則榮衛自和而寒熱止矣。如氣弱、則黃耆、血刺痛而和以當歸、腹中痛而加之芍藥。大抵產病天行、從小柴胡增損、雜證從四物增損、宜詳察脉證而用之。

（調理諸法毋之死生子之壽夭係抑胡可草草）

胎前調理法

集略云、母之腎臟係于胎、是母之眞氣、子之所賴也。受妊之後、宜令鎮靜、則血氣安和。須內遠七情、外薄五味、大冷大熱之物、皆在所禁。使霧露風邪不得投間而入、亦不得交合陰陽、觸動慾火。謹節飲食、若食兎缺脣、食犬無聲、食雜魚而致瘡癬。心氣大驚而癲疾、腎氣不足而解顱、脾氣不和而羸

瘦、心氣虛乏而神不足、見從母氣、不可不愼也。苟無胎動胎痛瀉痢及風寒外邪、不可輕易服藥。不得已、在審度疾勢輕重、藥性高下、不必多品。然父少母老、產女必羸、母壯父衰、生男必弱、氣受偏瘁。與之補之、補羸女則養血壯脾、補弱男則壯脾節色。羸女宜及時而嫁、弱男宜待壯而婚。昔人論年老有子者、男不過八八、女不過七七、則知血氣在人、固自有量、天豈逃陰陽之至數哉。

此治胎產大法圓機之士尤不叚析致

丹溪曰。胎前當淸熱養血。產婦因火逼動胎。逆上作喘急者。急用條芩香附之類。爲末調下。條芩水中取沉者爲佳。黃芩安胎。乃上中二焦藥。能降火下行。天行不息。所以生生而無窮。茺蔚子治血行氣。有補陰之妙。命名益母。以其行中有補也。故曰胎前無滯。產後無虛。難產可煎作膏。條芩白术。乃安胎聖藥。俗以黃芩爲寒而不用。反謂溫熱藥能養胎。殊不知胎孕。宜淸熱養血。使血循經而不妄行。乃能養胎。懷娠嗜物。乃一臟之虛。如愛酸。乃肝臟不能養胎而虛也。

孕婦食忌

雞肉合糯米食。令子生寸白虫。食犬肉。令子無聲。鯉魚同雞子食。令子生疳多瘡。食兎肉。令子缺唇。食羊肝。令子多厄。食鱉肉。令子項短縮頭。雞子與桑椹同食。令子倒生心寒。鮮魚同田雞食。令子瘖瘂。雀肉同豆醬食。令子面生䵟䵟黑子。食螃蟹。令子橫生。食生薑。令子多指。食水漿。令絕產。食雀肉飲酒。令子多淫無恥。食茨菰。消胎氣。食驢馬肉。過月難產。豆醬合藿香食。墮胎。食山羊肉。令子多病。食鰍鱔無鱗魚。難產。食諸般菌。生子驚風而夭。食雀腦。令子患雀目。

孕婦藥忌

歌曰。蚖斑水蛭及虻虫。烏頭附子配天雄。野葛水銀并巴豆。牛膝薏苡與蜈蚣。三稜代赭芫花麝。大戟蛇脫黃雌雄。牙硝芒硝丹皮桂。槐花牽牛皂角同。半夏南星與通草。瞿麥乾薑桃仁通。硇砂乾漆蟹脚爪。地膽茅根莫用好。

孕婦起居忌

臨產須知云。勿亂服藥。過飲酒。勿針灸擧重。登高涉險。心有大驚。犯之產難。子必頓癇。勿多卧。時時行步。勿勞力過傷。使腎氣不足。生子解顱腦破不

合。衣毋太温。食毋太飽。若脾胃不和。榮衛虛怯。子必羸瘦多病若自家。及鄰家。修造動土。犯其胎氣令子破形殞命。刀犯者形必傷。泥犯者竅必塞。打擊者色青黯。繫縛者相拘攣。此皆驗如影響。

候胎法

脉經曰。婦人懷軀七月而不可知。時時衄血而轉筋者。此爲軀也。　脉經曰。妊娠初時。寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。脉滑疾。重以手按之散者。胎

已三月也。脉重手按之不散。但疾不滑者。五月也。

尺脉左偏大爲男。右偏大爲女。左右俱大。產二子。大者。如實狀。　婦人妊娠四月。欲知男女法。左疾爲男。右疾爲女。俱疾爲生二子。　胎經曰。若胎病不動。欲知生死。令人摸之。如覆杯者則男。如肘頸參差起者。女也。觀此說。則前如箕如釜之義可然。

逐月養胎法

徐之才云。妊娠一月。名胎胚。宜飲食精熟酸美大麥。毋食腥辛。是謂纔正。　足厥陰肝養。不可針灸其經。（如大敦行間太衝中封五里中都等穴是也）　肝主筋及血。血行否澁。不爲力事。寢必安。無令恐畏。

妊娠二月。名始膏。毋食辛臊。居必靜處。男子勿勞百節皆痛。是爲胎始結。　足少陽膽養。不可針灸其經。（如膽竅血墟付陽絕骨外立陽陵泉等穴是也）　膽主精。兒精成。常愼護。勿驚動。

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐淸虛是謂外象而內感者也　手心主包絡養不可針灸其經（如中衝勞宫大陵內關間使郄門曲澤等穴是也）　包絡主脉毋悲哀思慮驚動

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羮宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡　手少陽三焦養不可針灸其經（如關衝陽池內關三陽天井曲垣等穴是也）　是時

兒六府成。宜靜形體，和心志，節飲食。

姙娠五月。始受火精以成其氣。卧必晏起，沐浴浣衣。深其居處，厚其衣服。朝吸天光，以避寒殃，其食稻麥。其羹牛羊。和以茱萸，調以氣味。是謂養氣。以定五藏。　足太陰脾養，不可針灸其經。（如隱白大都公孫商丘三陰交漏谷陰陵泉等穴是也）脾主四肢。兒四肢成。毋大饑甚飽。毋食乾燥炙熱，毋大勞倦。

姙娠六月。始受金精以成其筋。身欲微勞。毋得靜處。出遊於野。數觀走犬行馬。食宜鷙鳥猛獸之肉。是謂變腠理紉筋。以養其力。以堅背膂。　足陽明胃養，不可針灸其經，（如厲兌豐隆陰市上下廉三里等穴是也）兒口目成。調五味。食甘美，毋太飽。

姙娠七月。始受木精以成其骨。勞身搖肢。毋使定止。動作屈伸。以運血氣，居處必燥。飲食避寒。常食稻粳以密腠理。是謂養骨而堅齒。　手太陰肺養。不可針灸其經。（如少商魚際列缺尺澤天府等穴是也）肺主皮毛。兒皮毛已成，勿大言，勿號哭，勿薄衣，勿洗浴。勿寒飲。

姙娠八月，始生精以成膚革。和心靜息，毋使氣極，是謂密腠理而澤顏色。　手陽明大腸養，不可針灸其經，（如商陽二間合谷上下廉三里曲池肩井肩髃等穴是也）陽明主九竅。兒九竅成，勿食燥物。及失食。勿忍大便。

姙娠九月，始受石精以成皮毛，六府百節無不畢備，飲醴食甘。緩帶自持而待之，是謂養毛髮。致才力。　足少陰腎養，不可針灸其經。（如湧泉然谷太谿交信築賓伏溜等穴是也）腎主續縷，兒脈絡續縷皆成。勿處溫冷。勿着灸衣。

姙娠十月。五藏俱備，六府齊通。納天地氣于丹田，關節人神皆備，但俟時而生。

姙娠一月始胚，二月始膏。三月始胞。四月形體成，五月能動，六月筋骨力。七月毛髮生，八月藏府具。九月穀氣入胃，十月諸神備，即產矣。宜服滑胎束胎等藥。入月即服，

臨產調理

妊娠臨月。最要安神定慮。常步履。勿多睡。飽食。過飲酒。及雜藥。宜先貼產圖。依位鋪床帳。預請老練穩婆。備辦湯藥器物。欲產時。不可多人喧鬧。但用老婦二人扶行。及凭物站立。若見漿水。腰腹痛甚。是胎離經。令產母仰卧。令兒轉身。若兒頭向產門。方可用藥催生坐草。若心煩。用水調服白蜜一匙。覺饑。喫糜粥少許。勿令饑渴。恐乏其力。不可强服

早服催生滑胎等藥。及早於坐草。使穩婆亂動手。

薛氏曰。欲產之時。覺腹內轉動。即當正身仰卧。待兒轉身向下。時作痛。試捏產婦手中指中節。或本節跳動。方與臨盆。即產矣。若初覺。不仰卧以待轉胞。或未產而水頻下。此胞衣已破。血水先乾。必有逆生難產之患。若胎衣破而不得分娩者。保生無憂散。以固其血。自然生息。如血已耗。用八珍湯料一斤。益母艸半斤。水數十碗。煎熟不時飲之。亦有得生者。凡孕婦只腹痛。未產也。若連腰痛甚者。將產也。蓋腎候於腰。胞繫於腎故也。凡孕家。宜預請有仁心知事穩婆。先與說知。倘有生息不順。只說未產。或遇雙胎。只說胞衣未下。恐驚則氣散。愈難生息。

產值盛暑。或血暈血溢。當飲清水解之。冬末春初。產室用火和煖下部。衣服當溫厚。方免胎寒血結。若臨月洗頭足。亦致難產。

胞漿先破。惡水來多。胎乾不得下。須先與四物湯補養血氣。次濃煎葱湯。放溫。令坐婆洗產戶。須是款曲洗。令氣上下通暢。更用酥油滑石末塗產口裏。次服神妙乳砂丹。或葵子如聖散。

楊子建十產論

一曰正產。十月滿足。忽腰腹作陣。疼痛相似。胎氣頓陷。至于臍腹痛極。乃至腰間重痛。穀道挺迸。繼之漿破血出。兒乃遂生。

二曰傷產。蓋人之生。各有時日。不可改易。今有未產一月前。忽然臍腹疼痛。有如欲產。仍無事。是名試月。非正產也。但產母未有正產之候。不可令人抱腰。產母亦不可妄亂用力。蓋欲產之時。臍腹疼痛。兒身未順。收生者却教產母早用力。兒身纔轉動。卽便用力一逼。使兒錯路。忽橫忽倒。不能正生。皆緣產母用力未當所致。必須待兒順身逼戶。方始用力一送。令兒下生。此方是母之用力當也。若未有正產之候。而用力早。妄服藥。譬如揠苗助長。無益有害。

三曰催產。欲產時漿破血下。臍腹作陣疼痛。腰重穀道挺迸。已見正產之候。但未生下。可服藥以催之。或有經及數日。產母困苦。明是正產之候。但兒難生。亦可服藥以助母正氣。兒乃得下。

四曰凍產。冬月天冷。經血得冷則凝。以致兒不能下。此害最深。若冬月產者。下部不可去綿衣。并不可坐卧冷處。當滿房着火。常有煖氣。令母背身向火。令臍下腿膝間常煖。血煖則流利易生。

五曰熱產。盛夏之月。要温凉得所。勿恣意取凉。致傷胎氣。亦不可人多。熱氣逼母。使母血沸。致有發熱頭疼。面赤如醉。不知人事者。

六曰橫產。兒先露手。或先露臂。此由母未當用力而用之太過也。兒身未順。用力一逼。遂至身橫。不能生下。當令母安然仰卧。後令看生人。先推其手。

令入直上。漸漸逼身。以中指摩其肩。推上正之。或以手攀其耳而正之。須是母仰卧。然後推兒直上。徐徐正之。候其身正。服催生藥一盞。方用力令兒下生。

七曰倒產。產母胎氣不足。關鍵不牢。用力太早。致兒不能迴轉。便直下先露其足。當令母仰卧。令看生人推其足入。不可令母用力。亦不得驚恐。使兒自順。

八日偏產。兒身未正。母用力過早。致兒頭偏在左。或偏在右。故頭雖露。偏在一畔。不能生下。當令母仰卧。次令看生人輕輕推兒近上。以手正其頭。令兒頭端正。然後令母用力一送。即便生下。若是小兒頭後骨偏在穀道。只露其額。當令看生人。以綿衣炙溫裹手。於穀道外輕輕推兒頭正。便令母送兒生也。

九日礙產。兒身已順而露正頂。不能生下。蓋因兒身回轉。肚帶扳其肩。以此露正頂而不能生。當令母仰卧。令看生人輕推兒近上。徐徐引手以中指按兒肩下。撥其肚帶。仍須候兒身正順。方令母用力送。令兒生下。

十日坐產。兒將生。其母疲倦。久坐椅褥。抵其生路。急於高處。繫一手巾。令母以手攀之。輕輕屈足坐身。令兒生下。非坐在物上也。

更有盤腸產者。臨產母腸先出。然後兒生。若產後腸不收。甚苦。即以醋半盞。新汲水七分調勻。噀母面。每噀一縮。三噀盡收。此良法也。

交骨不開　交骨不開。產門不閉。皆元氣素弱。胎前失調。以致血氣不能運達而然。交骨不開。陰氣虛。（宜加味芎歸湯補中益氣湯龜殼散之類）產門不閉。氣血虛。（宜十全大補湯）

胎死腹中　子死腹中者。多因驚動太早。或犯禁忌。致令產難。胞漿已破。無血養胎。枯涸而死。須驗產母舌青黑。其胎死矣。當下之。（宜平胃散加朴硝千金神造湯半夏

湯之類）大法寒者。熱以行之。熱者。涼以行之。燥者。滑以潤之。危急者。毒藥下之。下之。下宜朴硝之類。

臨產束胎　臨產束胎。瘦斂則易生。（宜束胎丸達生散張氏方保生無憂散神寢丸之類）

臨產催生　催生大法。滑以流通澁滯。苦以驅逐閉塞。香以開竅逐血。氣滯者行氣。胞漿先破。疾困者固血。（宜佛手散三合濟生湯黑神散阿膠赤小豆湯兎腦丸如神散黄金散之類）

產後調理

凡產畢。飲熱童便一盞。不得便卧。宜閉目坐。須臾上牀。宜仰卧。不宜側。宜豎膝。未可伸足。高倚牀頭。厚鋪裀褥。遮圍四壁。使無孔隙。免致賊風。及以醋塗鼻。或用醋炭及燒漆器。更以手從心捺按至臍下。使惡露不滯。如此三日。以防血暈血逆。不問腹痛不痛。有病無病。以童便和酒半盞。溫服五七服。酒雖行血。亦不可多。能發昏暈。宜頻食白粥少許。一月後宜食羊肉猪蹄少許。仍慎言語七情寒暑。

梳頭洗足。以百日為度。若氣血素弱者。不計日月。否則患手足腰腿痠痛等證。名曰蓐勞。最難治療。初產時。不可問是男是女。恐因言語而洩氣。或以愛憎而動氣。皆能致病。不可獨宿。恐致虛驚。不可刷齒。恐傷心氣。不可漱齒。恐致血逆。須氣血平復。方可治事。犯時微若秋毫。成病重如山嶽。可不戒哉。產婦將息如法。臟府調和。庶無疾苦。須先服黑神散。四物湯。若壯熱頭痛。此乳脈將行。頭目不清。是血暈。用清魂散。粥食不美。是胃氣虛。宜大君子湯當歸建中湯。（東垣器云。清芎汁與產婦服之。將芎藭與婦人乾之。止血暈。產婦腹痛。暈芎下腹上則止。）

產後宜補　丹溪曰。產後當大補氣血。雖有雜證以末治之。○產後補虛。用參朮黃耆。陳皮。當歸。川芎炙甘草。如發熱輕則加茯苓淡滲之。其熱自除。重則加乾薑。○凡產後有病。先固氣血。○產後一切病。多是血虛。皆不可表。

新產三病　仲景云。問新產婦人有三病。一者病

痓。二者病鬱冒。三者大便難。何謂也。師曰。新產血虛。多汗出。喜中風。故令病痓。亡血復汗。寒多。故令鬱冒。亡津液。胃燥。故大便難。（鬱冒即今所謂血暈也）千金云。凡產後滿百日。乃可會合。不爾。至使虛羸。百疾滋長。慎之。凡婦人患風氣。臍下虛冷。莫不由此。早行房故也。

產後脈法　脈經曰。診婦人生產之後。寸口脈洪疾不調者死。沉微附骨不絕者生。○婦人新產乳

子。脉沉小滑者生。實大堅弦急者死。

丹溪曰。產前脉細小。產後脉洪大者。多死。○又曰。產前脉當洪數。既產而脉洪數如故者。主多死。

胞衣不下

胞衣不下者。謂之息胞。由產初用力。比兒出而體已疲憊。不復能用力。產胞停留間。而或外冷乘之。則血道澁。故不下。須急以方藥救治。不妨害於兒。所奈者。胞繫連兒臍。胞不出。即不得以時斷臍浴洗。冷氣傷兒。則成病也。舊法胞衣不

出。恐損兒者。依法截臍而已。產處須順四時方向。并避五行禁忌。若有觸犯。多令產婦難產。

郭稽中曰。胞衣不下。亦有流血入衣中。衣爲血所脹。故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘急者難治。但服奪命丹。以逐去衣中之血。血散脹消。衣自下也。牛膝湯亦効。

薛氏曰。有因惡露入衣。脹而不能出。有因元氣虧損而不能送出。其惡露流衣中者。腹中脹痛。用奪命丹。或失笑散。并胡氏法之類。以消瘀血。緩則不救。其元氣不能送者。腹中不脹痛。用保生無憂散以固補元氣。或用萆麻子肉一兩。細研成膏。塗母右足心。衣下即洗去。緩則腸亦出。如腸不收。仍用此膏塗腦頂。則腸自入。或加桂芎歸丸。紅花酒之類。

血暈（附厥逆）

大全云。產後血暈者。由敗血流入肝經。以致眼黑頭旋。不能起坐。甚至昏悶。不省人事。

謂之血暈。以細酒調黑神散服。若作暗風中風治之誤矣。有血熱乘風。逆上湊心。以致昏迷不省。氣閉欲絕者。服童便最妙。然其由有三。有用心使力過多而暈者。有下血過多而暈者。有下血少而暈者。其暈雖同。治之則異。當審詳之。下血多而暈者。昏而煩亂。當以補血清心。下血少而暈者。乃惡露不下而上搶心。心下滿急。神昏口噤。絕不知人。當以破血行血藥。古法云。產婦分娩訖。預將秤錘。或黃

石硬炭。燒令通赤。置器中。急於床前以醋沃之。得醋氣。可除血暈。產後一月內。時作爲妙。崔氏云。凡產婦者。皆是虛熱。血氣奔迸。腹中空虛所致。欲分娩者。第一須先取釅醋以塗口鼻。仍置醋于傍。使聞其氣。兼細細飲之。此爲上法。如覺暈。即以醋噀面甦來。即飲醋。仍少與解之。（一云仍少與水解之）一法燒乾漆令烟濃。薰產母面。即醒。（如無乾漆取舊漆器火燒烟薰亦妙）血暈用藥。（宜清魂散失笑散芎歸湯荊芥散白薇湯之類）

楷曰此方以歸身川芎芍藥益血而安胎以枳殼木香利氣乳香血餘和血守使兩得方也

保生無憂散　治妊娠身居安逸。口厭甘肥。憂樂不常。食物不節。致胞胎肥厚。根蒂堅牢。或瘦人血少胎弱。臨蓐難產。入月服之。則易生也。

當歸　川芎　白芍藥

枳殼（麩炒）　木香　甘草（炙各一錢半）

乳香（另研）　血餘（燒存性另研各五分）

右作一服水煎。入乳香血餘和勻。不拘時服。

八珍湯　見第十六

四物湯　見第二十一

神妙乳砂丹　治難產

明乳香爲末。以猪心血爲丸。如桐子。硃砂爲衣。日乾。每服一丸。嚼碎冷酒下。良久未生。再服。或以蓮蓬蒂七個。水煎化服二丸。良久未生。再服。

葵子如聖散　催生

黃蜀葵子。不拘多少。焙乾爲末。熱酒調下二錢。神效。如無子。花亦可。若胎漏血乾難產。痛極

者。并進三服。良久腹中氣寬胎滑。即產。須見正產候。方可服之。如打撲死胎。紅花酒下。

加味芎歸湯　產後血氣虛。感風寒。頭疼寒熱。

當歸　川芎（各二錢）　紫蘇

乾葛（各一錢）

右剉加生薑三片。水煎服。

補中益氣湯　見第三十九

龜殼散　治交骨不開。不能生產。

雜曰腎水失利破損胎而出死亦以和緩其中土以下

安生可以治漏不啻矜從新產藥至若一二三取效之藥亦可以取効用不息用東流水取下東行流取其疾易生取順理爲易急外於神也。

當歸　川芎　敗龜板（一個酥炙）

婦人頭髮（生長過者一握燒存性）

右爲散。每服五錢。水煎服。約人行五里即生。如胎死不下。灼過龜板亦可。

十全大補湯（見第十六）

平胃散（見第四十四）

千金神造湯　治動胎。及產難。子死腹中。或並娠兩兒一死一生。服之令死者出。生者安。神驗莫

測。

鱉爪（一斗）　甘草（二尺）　阿膠（三兩）

右三味。以東流水一斗。先煮鱉爪甘草。得三升。去滓。次內膠令烊。頓服之。不能下。再服。若人昏牙緊。拗口內藥。藥入即活。煎藥作東向竈。用葦薪煮之。

半夏湯　治胎衣不下。或子死腹中。或血衝上昏悶。或血暴下。及胞乾而不能產者。

詩曰羊羊七月曰牽逆即牽也逆生即羊生也其言其易

半夏麴（一兩半）　桂（去皮七錢半）　大黃（五錢）

桃仁（三十粒去皮尖炒）

右爲麁末。先服四物湯一二服。次用此藥二錢。生薑三片。水煎服。如未効。次服下胎丸。

束胎丸　胎瘦易生。服至產則已。

白朮　枳殼（去穰麩炒各等分）

爲末。燒飯丸如桐子大。八月一日。食前服三五十丸。溫水下。

達生散　八九個月內。服十數貼。易產。

大腹皮（三錢）　人參　陳皮

紫蘇莖葉（各五分）　歸身尾　白朮

白芍藥（各一錢）　甘草（二錢炙）

右作一服。入青葱五葉。黃楊腦七個。（即黃楊樹葉稍兒食少胎瘦者不須用）水煎服。○或加枳殼砂仁。○春加川芎。○夏加黃芩。○秋加澤瀉。○冬加砂仁。○氣虛。倍參朮。○氣實。加香附陳皮。○血虛。加當歸

地黃。○形實，倍紫蘇。○性急多怒，加黃連柴胡。○熱甚，加黃芩。○濕熱，加滑石半夏。○食積，加山查。○食後易饑，倍黃楊腦。○腹痛，加木香官桂。

張氏方　治妊娠胎肥壅隘，動止艱辛，臨月服之，縮胎易產，兼治腸中諸疾，下氣寬膈。

枳殼（五兩）　甘艸（一兩半）　香附子（三兩炒去毛）

右為末，薑湯點服。如丈夫婦人，冷氣攻刺脇肋疼痛者，用葱白三寸，同煎服。○婦人脾寒，血氣成塊作痛，熱酒調服。○大小便不通，白牽牛湯調服。

神寢丸　瘦胎滑利易產，臨月服之神効。

通明乳香（半兩另研）　枳殼（麩炒一兩）

為末，煉蜜丸如桐子大，每三十丸，空心溫酒下。

佛手散　治妊娠因事仆跌，子死腹中，惡露妄行，疼痛不已，口噤欲絕，用此藥探之，若子死腹中，立便逐下，若腹痛隨止，子母俱安。又治臨產艱難，胞衣不下，及產後血暈，不省人事，狀如中風，血崩惡露不止，腹中血刺疞痛，血滯浮腫，血入心經，語言顛倒，如見鬼神，血風相搏，身熱頭痛，或似瘧非瘧，一切胎前產後，危急狠損，垂死等證，並皆治之。○丹溪云，催生只用佛手散，最穩當，又効捷。

當歸（酒洗去蘆一兩）　川芎（七錢一方各等分）

右細剉，分作四分，每服先用水一盞，煎將乾，投酒一盞半，煎五七沸溫服。如口噤，斡開灌之，如人行五里許，再灌一服，盡此四服，便產神驗。○如產難倒橫，子死腹中，先用黑豆炒熟，入白水童便各一盞，用藥四錢煎服。○如胞產五七月不下垂死，及矮石女子，交骨不開者，加龜板，并生育過婦人頭髮燒灰為末，每三錢酒調服。

三合濟生湯　以枳殼芎歸逢生三方，抽其精粹

而成。合此湯。治臨產艱難。雖一二日不下者。服此自然轉動下生。

當歸（三錢）　川芎　枳殼（麩炒各二錢）

香附子（炒一錢）　蘇葉（八分）　粉草（七分）

大腹皮（薑汁洗一錢半）

右用水煎。待要腹痛甚。服之即產。○一方加白芷一錢。

黑神散（一名催生如神散）　治橫生逆產。其功甚大。並治

胎前產後虛損。月水不止。崩漏等證。

百艸霜　白芷（不見火各等分）

右為末。每服二錢。以童便米醋和如膏。加沸湯調下。或童便酒煎進二服。然血得黑則止。此藥大能固血。又免血涸。甚妙○一方加白滑石。煎芎歸湯調下。

阿膠赤小豆湯　治難產累日。氣力乏盡。不得生。此是宿有病者。宜此方。

阿膠（二兩）　赤小豆（二升）

右以水九升。煮豆令熟去滓。內膠令烊。每服五合。不覺。更服。不過三服即出。

兎腦丸（一名催生丹）　治難產及橫生逆產。

兎腦（臘月者去皮膜研如膏）　明乳香（二錢半細研）

母丁香（一錢為末）　麝香（一字另研細）

右研勻。用兎腦髓和為丸。如雞頭大。陰乾。油紙封裹。每一丸。破水後。溫水下。即產。隨男左女右

手握藥出。

如神散　催生累効。理則難通。

用路上草鞋一雙。取鼻梁上繩。洗淨燒灰。童便和酒調下三錢。一名千里馬。

黃金散　治生產一二日。難分娩者。服之如神。

眞金箔。大者五片。小者七片。以小磁鍾。將水少許。去紙。入箔在內。用指研勻。後再添水至半鍾。一面先令一人。扶產婦虛坐。又令一婦人。用兩

手大指。按定產母兩肩上肩井穴、前藥溫服、其胎即下。〇此催生聖藥、如產月未足。又能安之。

清魂散　產後血暈者。氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上、迷亂心神、故眼前生花。極甚者。令人悶絕、不知人、口噤神昏。氣冷。宜先取乾漆、或漆器。燒鼻中熏之。頻置醋炭房內。次進此藥即醒。

澤蘭葉　人參（各二錢半）　川芎（半兩）

荊芥穗（一兩）

右為細末。每服二錢、用溫酒熱湯各半盞、或入童便調、惡露之下、咽服即開、氣定即醒。

六君子湯（見第十六）

當歸建中湯　治產後勞傷。虛羸不足。腹中疼痛。呼吸少氣。小腹拘急痛連腰背、時自汗出。不思飲食。產訖直至月滿。一日三服。令人身壯強健。

當歸（四兩）　白芍（六兩）　桂心（三兩）

黃耆（一兩半）

右剉。每服四錢、加薑棗水煎、入飴糖一塊再煎稍熱服、〇如崩中衄血、加阿膠、地黃。

奪命丹　治胎衣不下。蓋兒之初生、惡血流入衣中、為血所脹。故不得下。須臾冲上逼心。即死急服此藥。

黑附子（炮五錢）　牡丹皮（一兩）　乾漆（炒烟盡二錢五分）

右為細末。用米醋一升。大黃末一兩。同煮成膏和前藥為丸。如桐子大、每服五七丸。溫酒下。

牛膝湯　治胞衣不出、臍腹堅脹急痛。即殺人、服此藥、胞即爛下、死胎亦下、

牛膝　瞿麥（各四兩）　當歸尾

通草（各六兩）　滑石（八兩）　葵子（五兩）

一方有桂心二兩。

右細切、以水九升。煮取三升、分三服。

失笑散　產後惡血上攻、心腹疞痛欲死。及兒枕痛、或牙關緊急。一服可愈。

蒲黃（炒）　五靈脂（各一錢）

右爲細末。作一服。用釅醋調停。入水一盞。煎服。

胡氏法

治產後胞衣不下。惟有花蕊石散一件。最爲要緊。若鄉居藥局遠者。倉卒無之。今有一妙法。產訖胞衣不下。稍久。則血流胞中。爲血所脹。上衝心胸。喘急疼痛。必致危篤。若有此症。宜急斷臍帶。以少物繫帶。必用力牢固繫之。然後絕斷。使

其子血脈不潮入胞中。胞衣自當痿縮而下。縱淹延數日。亦不害人。累驗。

加桂芎歸湯　有胞衣不下。因產時元氣虛薄者。以此溫之自下。

川芎　當歸（各二錢）　官桂（四錢）

右剉一服。水煎服。

紅花酒

紅花（一兩）

酒煮濃汁服。○如口噤。斡開灌之。速效。

芎歸湯（即佛手散）

荊芥散　治產後風虛血暈。精神昏昧。

荊芥（一兩三錢）　桃仁（炒五錢）

右爲細末。溫水調下三錢。○微喘。加杏仁炒。甘草（各三錢）。

白薇湯　治產後胃弱不食。脈微多汗。亡血發厥鬱冒等症。

白薇　當歸（各六錢）　人參（三錢）

甘草（一錢半）

右切分作二帖。水煎服。

花蕊石散（見第七十四）

起枕散　治產後惡血不行。心腹及兒枕作痛。甚危。

當歸　白芍藥（酒炒各三錢）　川芎（二錢）

官桂　玄胡索　牡丹皮

蒲黃（炒）　五靈脂（炒）　沒藥（各一錢）

白芷（一錢）

右剉水煎。入童便。空心服。

六味地黃丸（見第十六）

逍遙散（見第五十一）

加味歸脾湯（即歸脾湯加柴胡牡丹皮　見第五十八）

加味四物湯　治產後血崩。如豆汁紫黑過多者。

當歸　川芎　芍藥

生地黃　蒲黃　阿膠

薊根　白芷

右水煎服。

烏金散　治產後血迷血暈。敗血不止。淋瀝不斷。臍腹疞痛。昏眩多汗無力。及崩中下血不止。

麒麟竭　男子亂髮灰　松墨（煆醋淬）

百草霜　當歸　肉桂

赤芍　延胡索　鯉魚鱗（燒存性　各等分）

右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。

蒲醋飲子　治新產瘀血。逐敗滋新。此藥治血神効。又非黑神散之可比也。月內每日一二服尤良。及療一切惡露與血積。

真蒲黃不拘多少。熬米醋令稠。和藥成膏。每服一彈子大。食前醋湯化開服。

陰陽和而後孕。孕固有天成自然之妙也。不謂者。乃一意珍護。時進湯丸。久久氣血偏勝。反致

胎氣不安。及半產艱生者多矣。故胎前諸方不備錄。然有不得已者。於下外附驗過方中求之。

外附胎產驗過方

益母丸（又名千金保胎丸）　凡女人受孕。經三月而胎墮者。雖氣血不足。乃中衝脈有傷。中衝脈。即陽明胃經供應胎孕。至此時。必須節飲食。絕慾。戒怒。庶免小產之患。服此可以保全。

白朮（土炒）　熟地黃（薑汁炒）　杜仲（薑汁炒　各四兩）

當歸（酒洗）　續斷（酒洗）　阿膠（蛤粉炒）

香附米（四製）　益母草　條芩（各炒二兩）

陳皮　川芎　艾葉（醋炙各一兩）

砂仁（炒五錢）

右爲細末，煮棗肉爲丸，如桐子大。每服百丸。空心米飲下。

金匱當歸散　此方養血清熱。孕婦宜常服之。如瘦人血少有熱，胎動不安，素曾半產者，皆宜服

之，以清其源，而無後患也。

當歸　川芎　白芍藥

黃芩（各一兩）　白朮（二兩）

右爲末，每服二錢，酒飲調服，日再服。或用酒糊爲丸，如桐子大，每服五十丸，茶湯任下，日三服。

白朮湯　治胃虛惡阻吐水，甚至十餘日，水漿不入者。

白朮（一兩炒）　人參（五錢）　丁香（二錢半）

[illegible]扁豆[illegible]非去[illegible]不出[illegible]能[illegible]之[illegible]乎

[illegible]日餘血水不淨腎家虛黑豆[illegible]穀補腎而以酒行其[illegible]之方

甘草（一錢）

右爲細末，每服二錢，加生薑五片，水煎食前溫服。

縮砂散　治妊娠胃虛氣逆，嘔吐不食。

縮砂仁爲末，每服二錢，生薑湯或米飲調服。

三物解毒湯　治誤服毒藥動胎。

甘草　黑豆　淡竹葉（各等分）

右用水煎濃服。

白扁豆散　治妊娠誤服諸般毒藥，動胎欲墮。

白扁豆，生去皮，爲細末，米飲調服方寸匕。神效。或濃煎亦可。

豆淋酒　治產後猶有餘血水氣者。

黑豆五升，熬令烟盡，投磁器內，以酒一斗淬之飲，蒸豆淋酒，治污血，又能發表也。

枳實芍藥散　金匱云，產後腹痛煩滿，不得臥，此方主之。

枳實（炒令黑勿太過）　芍藥（各等分）

右杵爲散。服方寸匕。日三服。並主癰膿。以麥粥下之。

羊肉湯　治產婦脾虛。爲寒邪所乘。以致腹痛。及寒月生產。寒氣入于產門。臍下脹滿。手不可犯。

精羯羊肉（四兩）　當歸　川芎（各半兩）

生薑（一兩）

右以水十盞。酒三盞。煎至四盞。分四次。空心服。

加葱鹽亦可。

衍義云。一婦人產當寒月。寒氣入產門。臍滿手不得犯。此寒疝也。醫將治之以抵當湯。謂其有瘀血耳。予教之曰。非其治也。可服張仲景羊肉湯。少減。作二服愈。

回生丹　治產後瘀積等症。

大黃（一斤爲細末）　蘇木（三兩剉用河水五碗煎汁三碗）

黑豆（三升煮熟取汁三碗）　紅花（三兩酒四碗煎汁三碗）

右將大黃末。以好醋二斤攪勻。以文武火熬成膏。次下三項汁。攪開大黃膏。再熬成膏。如有鍋粑。焙乾入在後藥。

當歸　川芎　熟地黃

白茯苓　蒼朮　香附

玄胡索　桃仁　蒲黃

牛膝（各一兩）　白芍藥　甘艸

陳皮　木香　三稜

五靈脂　羌活　地榆

山茱肉（各五錢）　人參　白朮

木瓜　青皮（各三錢）　良薑（四錢）

乳香　沒藥（各二錢）

同末。大黃膏爲丸。如彈子大。每服一丸。好酒化下。

艾附煖宮丸　治婦人經水不調。小腹時痛。赤白帶下。子宮寒冷。

香附（四製一斤）　艾葉（醋浸炒）　當歸

川芎　白芍藥（酒炒）　熟地黃（薑汁炒各一兩）

玄胡索（炒一兩）　甘艸（生用八錢）

右爲細末。醋糊丸。如桐子大。每服七八十丸。米湯酒任下。

神方驗胎散　兩三個月。月經不行。疑而未決。此藥探之。

眞雀腦芎（一兩）　當歸（全用重一兩者只用七錢）

爲細末。分作二服。濃煎好艾湯一盞調下。或好酒調服亦得。可待三兩個時辰。覺臍腹微動而頻。卽有胎也。動罷卽愈。安穩無虞。如不是胎。卽不動。所滯惡物自行。如服藥不覺効。再煎紅花湯調下。

醫燈續焰卷十五　終

醫燈續焰卷十六

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖翼評
門人　高鴻奎君錫
　　　曹鋐貞元起校
壻施安祖孔安

小兒脉證第七十八

小兒之脉。七至爲平。更察色證。與虎口文。

三歲以下小兒純陽之體。形質小。呼吸促。脉之周行駃而應指疾。大約以七至爲平。非若大人四至爲平也。其太過爲數爲熱。不及爲遲爲寒。則與大人無異矣。雖然脉至七八。難全爲準。必察其色。與所見之證。更視虎口之文。而病情始無隱匿。蓋五藏之列於面。各有定部。如左腮屬肝。右腮屬肺。額上屬心。鼻屬脾。頦屬腎是已。諸邪之見於部。亦々有定色。如赤爲熱。白爲寒。黃爲積。青黑爲痛是已。

虎口者。食指內側。連大指作虎口形。故曰虎口。是處肌皮嫩薄。文色顯明。即肺手太陰經脉之書處。諸脉大會此經。察色者。即所以察脉也。故色赤爲熱。在脉則數。色白爲寒。在脉則遲。色黃爲積。在脉則緩。色青黑爲痛。在脉則沉弦。此皆自然之理。非可牽會。雖無五部之分。而有三關之別。指初節曰風關。二節曰氣關。三節曰命關。文色見風關者輕。再進。則上氣關爲重。再進。則直透命關爲最重。甚

說風氣命三字明透

則主死。由風邪而干正氣。正氣不能勝而迫及於命。漸進漸深之象也。至如外證。肝病。主諸風顫掉。實則目直叫呼。脇痛項急。呵欠頓悶。二便閉塞。虛則咬牙多欠。目閉羞明。心病。主驚。實則發搐叫啾。或笑。發熱。欲飲水。頻吐舌。虛則悸。臥不安。畏見人。舌痿不能乳。脾主困。實則困頓。身重肌熱。腹脹硬。唇腫而渴。虛則吐瀉不食。慢風。四肢不收。口流涎。肺主喘。實則胸滿喘促悶亂。虛則哽氣。呵欠寒慄。

腎主恐怖。畏明。不能立。二便清泄。足冷。但有虛證而無實證。已上諸證。不過言其大槩耳。至於傾移傳變。何可勝紀。惟圓機之士。參合色脉。識本知標。溯流窮源。錯綜體認。縱不能臻聖神之域。諒亦不在工巧之下矣。

小兒雜述

○襁褓　千金論云。小兒宜用父故絮。女用母故絮爲衣。勿用新綿。及過厚。令壯熱生瘡。發癇。又令筋

骨緩弱。宜時見風日爲佳。

○乳哺　乳者。奶也。哺者。食也。乳後不得便與食。哺後不得便與乳。小兒脾胃弱。乳食相併。難以尅化。周歲已上。必成乳癖食癖。作熱作疼。疳病從此始。丹溪曰。小兒腸胃薄窄。一切酸醎甜辣。魚肉水果。濕麵煎炒。俱是發熱難化之物。皆宜禁絕。只與熟菜白粥。非惟無病。且不縱口。可以養德。婦人無知。惟務姑息。畏其啼哭。無所不與。積成痼疾。雖悔何

及、乳母尤宜謹節。飲食下咽。乳汁便通。情欲中動。乳脈便應。兒得此乳、疾病立至。不吐則瀉。不瘡則熱。驚搐夜啼。口噤腹痛諸疾。所由來矣。病之初來。其溺必少。便須詢問。隨證治母。可消患於未形也。

乳母亦不宜用狐臭。癭瘻。喘嗽。疥癬。頭瘡。聾啞。齆鼻、癇證之人。

肘後云。兒生三日。宜助穀神、碎米作飲如乳。與兒大豆許。令嚥之。頻與三豆許。三七日可哺。

千金云。兒哺早。不勝穀氣。令頭面體生瘡。愈而復發。尩羸難養。一月後。雖哺勿多。不嗜食。勿强與之。

寶鑑云。兒五十日。可哺如棗核。百日彈丸。早晚二哺。莫當風解衣澡浴。及帶哭而乳。肩冷而哺。又不可在神佛驢馬畔。及各房異戶。皆令兒爲病。

錢乙云。惜兒過當。三兩歲猶未飲食。致脾胃弱。一生多病。半年後。宜煎陳米稀粥。時與之。十月後。漸與稠粥。助中氣。自然易養少病。

外臺崔氏。初哺兒。用平定成日。丑寅辰巳酉日吉。男忌戊巳。女忌丙丁日。

小兒四五歲。當斷乳而不肯斷者。（宜畫眉膏）斷後。肉食宜少少漸進。則無痃癖之患。

田氏曰。大凡小兒過煖生熱。熱極生風。提抱生癇。餵飼生癖。盛夏浴後。勿即乳兒。兒啼勿即與乳。令兒成胃蒻。或秋成痢。浴後良久。身體燥。兒啼後。俟氣息平。方可乳。盛啼即乳。多令氣逆成呃。

千金論曰。乳兒勿過飽。飽則溢而吐。若乳來多猛。取出挼後再乳。或先捏去宿汁乳之。乳母欲寐。當以臂枕兒頭。與乳平。母欲睡熟。即奪其乳。恐其不知飽足。亦成嘔吐。又母交合。兒卧於側。或驚起。勿與乳。蓋氣亂未定。亦能害兒。

顱顖經曰。夏不去熱乳。令兒嘔吐。冬不去寒乳。令兒瀉痢。侵早乳兒。皆須捏去宿乳。乳汁令擲於地。虫蟻食之。令乳無汁。宜沃東壁上。

張渙曰。乳母須每日三時。摸兒項後風池。若壯熱者。卽須熨之。使微汗卽愈。（風池在頭項筋兩轅之邊）切不可妄鍼灸。亦不可輒吐下。蓋鍼灸傷兒經絡。吐下動兒藏府也。

嬰兒半歲。尻骨已成。乳母當教兒學坐。二百日外。掌骨成。教令地上匍匐。三百日。臏骨成。教令獨立。周歲膝骨成。教令行步。此皆一定之法。世人惜兒。懷抱過時。柔瘦筋骨。爲害非淺。

○初生　兒在胎。稟胎液以生藏府。分娩時。口含血塊。啼聲出。卽嚥下此毒。內伏命門。外感天時。多發爲驚風瘡疹等病。須於未啼時。用綿裹指。急挖去用黃連豆豉硃砂甘艸解之。後出痘亦輕。又或難產。或冒風寒垂危者。勿卽斷臍帶。急烘綿絮。包抱懷中。以胎衣置火中。更用火紙撚。於臍帶上下往來燎之。使煖氣入腹。必自甦。尤戒洗。恐腠理泄而外邪乘也。看舌下有膜如榴子連舌。致啼不出。急

不轉。速以指爪斷。或用葦刀割之。微有血出卽活。若血出多。燒髮灰。豬脂和塗之。兒上下唇。與齒齦連處。皆有一筋牽引。若上唇筋緊。卽生上煉。下唇筋緊。卽生下煉。上煉生瘡滿頭。或眉間如癬狀。癢痒不已。復流黃汁。至處生瘡。下煉起腰背。漸至四肢。患亦如上。若不治。或頭面相通。累年不輕。令天折。或成大病。唯每早拭口佳。

兒生三日。以桑槐榆桃柳嫩枝。各三寸。長者二三十節。煎湯適冷熱。入猪胆汁一枚浴之。勿久。浴湯用猪胆。益母草。不生疥瘡。用金銀花。虎頭骨。麝。丹砂。辟惡氣。客忤驚癇。用桃梅李楮根葉。解穢熱溫疫。須臨浴時煮。紀用經浴法。用寅卯酉日吉。壬午丁未癸巳凶。不能上三日。勿犯下三日。又三日五日七日宜浴。

小兒浴。勿先斷臍帶。恐水濕侵臍。有臍風臍瘡等證。用清油調髮灰傅臍佳。

千金云，臍勿以刀割，隔单衣咬斷，以煖氣呵七遍，即纏結。所留帶，致兒足趺上，斷訖，看臍帶中多有蟲，急剔去。不爾，入臍成疾，臍當長六寸。長則傷肌，短則傷藏，不以時斷及挼汁不盡，煖氣漸微，即生寒，令兒臍風。寶鑑論斷臍，若用剪刀，先於懷中令剪煖，又水入臍，多天釣，痛苦啼叫，面青黑，臍傷動，久不乾，傷外風，即口噤不可救。聖惠云，兒生一宿，抱近明無風處，看臍上有赤脈直上者，即於脈盡

頭灸三壯，赤散即無患矣。裹臍必用軟練帛，若十許日，怒啼不止，必臍燥刺腹，或衣中有刺物，或換衣或換裹，須細察之。

崔氏云，兒衣須清水洗，勿令污濁，新瓶盛，密蓋，置便宜處，三日後，依月吉地向陽處埋之，入土三尺，須牢築，令兒壽，若不謹，或爲蟲畜傷食，令兒不壽，或横亡。宜天德月空處埋吉。（正月天德在丁月空在丙辰餘詳官本曆）日若遇反支，宜挂宅外福德上，向陽高燥處，待過月，然後依法埋藏吉。甲乙日生，丙丁日藏，丙丁日生，戊己日藏，戊己日生，庚辛日藏，庚辛日生，壬癸日藏吉。

集驗方云，小兒初剃頭，不擇日，皆於滿月日剃之，蓋俗所尚，前產婦未得出房，於滿月即與兒俱出，謂胎髮穢惡，有觸神靈，令兒不安，故於此日剃頭而出。凡剃頭須避風，就煖，剃後，以杏仁三枚，去皮尖研碎，入薄荷三葉，再同研，却入生麻油三四滴，

臙粉拌和，頭上擦，免生瘡疥熱毒。

○初生噤死　千金云，兒初生輒死，視口中懸壅前上齶，有泡者，以指甲摘取頭，決潰去血，勿令入咽。

○不能啼　三因云，兒初生不能啼者，必難產冒寒所致。急用綿絮包抱懷中，勿斷臍帶，將胞衣置爐炭中燒之，再撚大紙條，蘸油點火，於臍帶下燎之，令火氣入臍，更以熱醋湯盪洗臍帶，須臾氣回啼哭，方可浴，浴後斷帶。又或有泡在上齶，即如上救

一七〇〇七　子　續修四庫全書第8　反正勻

初生輒死法治之。

〇眼不開　兒初生、眼不開呻吟、胎熱故也。宜天竺黃散。生地黃湯、及與乳母喫。亦有洗拭不淨。使穢汁漬於眥中、致赤爛、長亦不瘥、（宜真金散洗之）

〇不喫乳　此亦拭口不淨。惡穢入腹、令兒腹滿氣短。不能吮乳、或母取冷過度、胎中受寒。令兒腹痛也。（宜外臺方之類灸承漿七壯亦好）

不小便　此多因母恣食熱物。熱毒入胎所致。如

臍腹腫脹。四旁青黑色。及口撮。即不可救。如未見色、（宜外臺方豆豉膏之類）

〇不大便　由胎中受熱、熱結肛門、燥澁所以如此若三日不通、急令乳母以温水漱口、咂兒前後心并臍下。手足心、共七處。凡四五次、仍以輕粉半錢齊少許、温水化開。時時服少許、以通為度、如仍不通、須透而通之、金簪玉簪俱可、須刺入一二寸。肉少蘇合丸於內、撚出為快。若腹膨脹。呻吟不乳。至

一七則難救。用硬筯鉸紙肛門亦好。

〇鵝口　初生口中舌上。白屑如鵝之口、由在胎受穀氣盛。心脾熱氣薰發、用髮纏指。蘸井花水揩拭之。啞時、煆黃丹出火氣、摻舌上。如屑不脫、可濃煮栗挾汁。綿纏指蘸拭、如無栗挾。栗木皮代之。

〇撮口　其證舌強脣青。聚口撮面。面目黃赤、喘急聲不出、飲乳有妨、若口出白沫、四肢冷。不治。其或肚脹青筋、弔腸卵疝。內氣引痛。皆腸胃鬱結不通

所致。治宜疏利、過七日乃免。（宜辰砂殭蠶散之類）

臍風●臍濕●臍瘡●氣臍●凸臍●　此皆因斷臍不慎。為風冷水濕所乘、入於臍。流入心脾、令腹脹臍腫。四肢不收。多啼不乳。甚者發搐。久不瘥。為臍瘡。入於經脉。多變為癇。若臍凸肚緊。微有青色。口撮不開。肝氣盛而尅脾土。不可施治。縱使得安。亦非長壽。（宜五苓散之類）又法。小兒七日內、患臍風撮口。百無一愈但看兒齒齦上。有小泡子如粟米狀。以熱帛裹指

蘸溫水輕輕擦破。即安。又灸然谷穴。在內踝前。大骨下陷中。灸三壯。鍼入三分。不宜見血。顱顖經治臍濕。用枯礬龍骨爲末。入射少許。拭臍乾用。避風。絳帛灰傅妙。蓋破舊襴草爲末摻之。亦好。氣臍。大如栗。虛腫而軟疼。用竹瀝塗。日數上。消臍瘡。宜龍骨散。凸臍。因兒有熱在胸。頻頻伸引。呃呃作聲。努張其氣。抑入根本之中。所以凸起。虛大可畏。不必以藥傅之。恐反爲害。（宜白芍藥湯加米仁煎湯空心溫服以外消散塗貼自平）

○天釣　亦驚風之類。但發時頭而仰視。翻眼抬睛。故名天釣。（宜雙金散或灸兩手大拇指兩甲內相半男先灸左女先灸右及兩足大拇指中間各三五壯又灸前後手心各五壯妙）頭目不仰。乃驚風之類。（宜辰砂抱龍九）

○遺尿　原病式。謂遺尿不禁爲冷。內經云。不約爲遺溺。仁齋曰。小便者。乃津液之餘也。腎主水。膀胱爲津液之府。腎與膀胱俱虛。而冷氣乘之。不能拘制。其水出不禁。謂之遺尿。睡裏出者。謂之尿牀。此

看舌大法盡此數語

皆腎與膀胱俱虛。而挾冷所致。（宜雞腸散外臺方）亦有熱結於腎部。干於足厥陰之經。庭孔鬱結。氣血不能宣通。則痿痺而神無所用。故液滲入膀胱而溺遺失。（宜六味丸）

○舌●齦●齶●諸病●　樵師王紹隆先生云。心爲一身君主。神識之舍。外候於舌。無論外感內傷。皆當察之。其色紅潤而淨者吉。有胎者病。胎薄少。色鮮明者輕。厚滿。色黑闇者危。色枯燥不澤。圓縮强硬者死。

至於傷寒痘疹。更宜細察。又脾之脉絡絡舌本。心脾有熱。無處疏泄。而發證於舌者。如弄舌。重舌。木舌。舌白。舌黃。舌瘡。舌血之類。弄舌者。時時微吐其舌。如火之燄。心脾積熱所致。兼脾證者。（宜瀉黃散兼心證宜導赤散或大黃黃連瀉心湯）重舌者。舌下有形如舌。（宜刺出血及服瀉黃散敷摻清液散馬牙硝蒲黃末之類）木舌者。舌腫漸大。塞滿口。不治殺人。（宜瀉黃散）舌白者。舌上有厚白胎也。（宜桑白皮汁敷之薄荷汁生薑蘸擦亦妙）舌黃者。即舌上黃胎也。（宜瀉黃散）舌瘡者。舌上

生瘡也。（宜白礬塗足法）舌血者舌上黑。有孔出血不止。心火熾盛故也。（宜蒲黃末敷之）重齦重齶者。齦上齶上腫也。總不外一熱。俱宜刺決洗拭。（宜雞內金爲末乾摻或服五福化毒丹）

○鼻衄　小兒鼻衄者。因肺胃熱盛。迫血妄行。出于上竅。春冬衄者。宜用生地黃汁。加生蒲黃末少許。砂糖井花水浸服之。秋夏宜用車前草一握。洗淨。同生薑一處研取汁。入白蜜一匙。先拌查塞鼻。次用新汲水。和蜜并車前薑汁飲之。又生蘿蔔擣汁。

仰頭滴入鼻即止。次以新汲水和蜜蘿蔔汁飲之。又宜服膠黃散。

○語遲　應語不語曰語遲。由母受驚怖。內動兒藏。邪乘於心。舌乃心苗。心氣不和。舌痿無力故也。（宜菖蒲丸或灸心俞三壯）

○無辜疳　巢氏云。古謂天上有鳥。名無辜。晝伏夜遊。小兒衣衲。夜露失收。鳥從上過。小兒親體。染其毒氣。遂致面黃髮直。壯熱。能飲食而不生肌肉。累積月日而死。故名無辜。漢東王先生非之曰。此由八邪所乘。八邪者何。謂。饑。飽。勞。役。風。驚。暑。積。也。若然。是皆有因而成。不得名無辜矣。楷謂夜露陰沉。百邪皆出。狐狸梟鵬之類。何所不有。衣染其氣。小兒氣虛體薄者。理應成病。以其不在八邪之內。無辜而得。故名無辜。非獨因鳥名也。（宜肥兒丸布袋丸之類）

○鶴節　小兒稟賦不足。血氣不榮。肌肉瘦瘁。骨節聳露。如鶴膝之節。乃腎虛不生骨髓耳。（宜錢氏地黃丸）

○哺露　小兒哺乳不節。不消。致脾胃衰弱。弱則愈不能消。令肌肉尫羸。骨如柴露。吸吸苦熱。以其得之乳哺。故曰哺露。（宜大啓脾丸肥兒丸）

○丁奚　小兒脾胃尚弱。若哺食過度不消。水穀之精減少。不榮肌肉。日漸瘦削。其頸項四肢。骨立零丁。而腹則獨大如奚奱也。故名丁奚。與哺露大同小異。其證吐泄不時。色慘潮熱。或黃瘦。顖開顱陷。手足如筒。（宜參苓白术散大啓脾丸之類）

○滯頤　俗名口水。流滯於頤下。故名。由脾虛冷液多。不能收攝耳。亦有脾虛挾熱而流者。宜審證施治。（虛冷宜益黃散。熱宜瀉黃散之類。）

○啼哭　有驚啼。夜啼。軀啼。驚啼者。精神不定。睡臥不安。如驚而啼。屬臟熱。夜啼者。入夜即啼。陰寒相感。屬臟寒。軀啼者。腹中痛甚。張氣促倡。身軀而啼。屬食不消。或有積滯。（驚啼宜安神丸。涼膈散。夜啼宜花火膏。蟬花散。茅先生扶脾膏。軀啼宜白朮當歸煎丸之類。）

○龜胸。龜背。　龜胸者。毋食五辛。或兒食宿乳。熱熏于肺。肺氣不寧。以致欬逆上氣。壅滯胸中。久則胸亦高腫。如龜之胸也。龜背者。是强兒坐。或坐風中。邪乘于脊。或乘于督脉。不能解散。漸如傴僂而背高如龜狀也。（龜胸者宜瀉白散。外治塗龜尿法。龜背者宜羌活防風及龜鹿膠等藥。外亦宜塗龜尿。）

○解顱。顖陷。顖塡。　解顱者。小兒數歲。顖不合而頭顱開也。顖陷者。顖門深陷也。顖塡者。顖門腫起也。皆屬腎虛髓少。骨氣不實。多主夭折。間有臟府有熱。熱上衝而成者。然腎虛固本病耳。（宜補中益氣湯。錢氏地黃丸。小兒錮顖藥之類。）

○行遲　腎主骨。主髓。虛則髓少骨柔。故行遲耳。（宜錢氏地黃丸。麝茸丹之類。）

○齒遲　亦腎虛也。夫齒爲骨之餘。藉髓榮養。腎髓虛少。不能充骨。又安能及齒。故久不生也。（宜六味地黃丸）

○髮遲髮黃　亦少陰腎藏虛耳。腎主藏精。其華在髮。少陰氣血不足。即髮疎薄不生。亦有因頭瘡而禿落者。（宜千金楸葉方。榆木散。聖惠黑豆膏選用）

錢氏曰。小兒長大不行。行則脚弱。齒久不生。生則不固。髮久不生。生則不黑。皆屬氣血虛也。宜大劑補之。（髮黃宜千金黑大豆方）

○齒牙頰車　齒者。腎之餘。其本在腎。而經則屬胃與大腸。病在本者。多屬虛。在經者。多實火。宜細察形脉兼證治之。（宜清胃湯。雄黃丸。千金白鹽方。靈芝生齒方）

耳　耳者，心腎之竅，肝膽之經也。心腎主內，爲精血不足；肝膽主外，爲風熱有餘。或聾聵，或鳴響者，稟賦虛也。或腫痛，或膿癢者，邪氣客也。（虛者宜六味地黃丸，[illegible]熱[illegible]者宜柴胡[illegible]散）其他諸證不一，在後方對證選用，（宜湯[illegible]體黃散，若諸虫入耳，宜[illegible]蟲散）

（一）五軟　五軟者，頭項軟、手軟、脚軟、肌肉軟、口軟是也。頭軟，頭不舉，項脉軟而難收，治雖暫差，他年必再發。手軟，則手垂，四肢無力，亦懶抬肩。若得聲圓還進飲食，乃慢脾風候也，尚堪醫治。脚軟者，五歲不能行，虛羸脚細小，不妨榮衛，但服參耆等藥，併錢氏地黃丸，長大自然肌肉充滿。肌肉軟，則肉少皮寬，自離飲食，不長肌肉。（宜錢氏[illegible]連丸）若瀉利頻者，難治。口軟，則虛舌出口，唇青氣喘，則難治。薛氏曰：頭項軟者，天柱骨弱，臟府骨脉皆虛，諸陽氣不足也。手足軟者，脾主四肢，中州不足，不能榮養四肢，故肉少皮寬而飲，不爲肌膚也。口軟者，口爲脾竅，上下齦屬手足陽明，陽明主胃脾，胃氣虛，舌不能藏而常舒出也。此五者，皆因五臟氣弱，不能滋養充達。原其要，則總歸於胃，以胃爲水穀之海，五臟六府之大源，故治必先以脾胃爲主，皆宜用補中益氣湯以滋化源。頭項、手、足三軟，兼服地黃丸。

（一）五鞕　五鞕者，仰頭取氣，難以動搖，氣壅作痛，連於胸膈，手足心冷而鞕，此陽氣不營於四末也。經曰：脾主四肢。又曰：脾主諸陰。今手足冷而鞕者，獨

陰無陽也，故難治。若肚筋青急者，木乘土位，急用六君子湯加炮薑、肉桂、柴胡、升麻，以復其真氣。若係風邪，當參驚風治之。此證從肝脾二臟受患，補脾平肝。

（一）魃病　魃，小鬼也。乳兒未能行，而母復有娠，其兒忽微下利，寒熱往來，毛髮鬇鬡，爲有惡鬼神，導腹中之胎，妬嫉而爲此，故名魃病也。以他兒食其乳，亦能相繼而病，故俗又名繼病。雖然，妊娠乳兒，不

必悉致魃，亦偶有此耳。女子氣血，上爲乳汁，下爲經水。小兒飲交乳且病，況氣血既榮於胎，而乳汁必自漓薄，兒飲之，能無病乎。鬼神之咎，似無稽也。

○客忤　客忤者，是小兒神氣輭弱。忽有非常之物，或未經識見之人觸之，與兒氣相忤而發病，謂之客忤。亦名中客，又名中人。其狀吐下青黃白色，水穀解離，腹痛，反倒夭矯，而變易五色，狀似癇。但眼不上插耳，其脉弦急數者，是也。失時不治，久則難

治。若乳母飲酒過度，醉及房勞。喘後乳者最劇，能殺兒。凡兒衣有綿帛挂襪中，不得有頭髮。凡小兒中客，急視其口中懸癰左右，當有青黑腫脉核，如麻豆大，或赤，或白，或青者，便宜用針速刺，或爪摘決之，并以綿纏釵頭，拭去血，能愈。（宜豆豉大丸摩法，譚氏殊聖治）（客忤方，張渙辟邪膏，竈中黃土方，三物燒髮散之類）

○中惡　小兒中惡者，是卒中鬼邪之氣也。其證先無他病，卒然心腹刺痛，悶亂欲死，是也。此必精氣衰弱，而後鬼惡得以中之。若腹大而滿，脉緊大而浮者死，緊細而微者生。治之餘邪不盡，留滯藏府，更發變爲疰病矣。（宜先下蘇合香丸，未醒以皂角末搐鼻取嚏，次服沉香降氣湯）（又宜葱刺鼻法，耳後灸法，管吹下部法，已上救客忤中惡法，及一切卒死，皆可參用）

○卒死　小兒卒死者，是三虛而遇賊風，故無病倉卒而死。三虛者，乘年之衰，逢月之空，失時之和也。（詳靈樞歲露篇）人因此三虛，復遇賊風，令陰氣偏竭于內，陽氣阻隔於外，榮衛壅閉，陰陽不通，故暴絕而死。

若藏府未竭，良久乃甦。亦有挾鬼神氣者，皆須治令邪退乃生。若有餘邪留蓄，再發則成疰病矣。其證眼合齘齒，遍身綿軟，面青黑，口鼻冷。（宜蘇合香丸，千金牛黃方，熨兩脇方，治卒魘方，皂角搐鼻法，雞冠血方，灸人中及心下之類）

○鬼持　小兒鬼持者，乃神氣弱，爲鬼所持。其狀無他疾，乃痿黃啼喚，口氣常臭，是也。（宜圖經治鬼持方，外臺深師五邪丸之類）

○疰病　疰者，注也。亦言住也。謂風邪鬼氣，住人身

內，又復注易傍人。無問人之大小，若血氣衰弱，則陰陽失守，風邪鬼氣因而客之，留住肌膚，延着藏府，或皮膚掣動，遊易不常，或心腹刺痛，或體熱皮腫，沉滯至死，死後注易人。小兒襁褓居室，無因觸冒風邪，多緣乳母解脫之時，不避溫凉暑濕，或抱持出入早晚，其神魂軟弱，為鬼氣所傷故耳。（宜太乙備急散）

○尸疰　尸疰者，是五尸之中一尸疰也。人無問大小，腹內皆有尸虫，尸虫為性忌惡，多接引外邪，共

為患害。小兒血氣衰弱者，精神亦羸，故尸疰因而為病，其狀沉默，不的知病之所在，或寒熱淋瀝，涉引歲月，遂至於死，死又疰易傍人，故曰尸疰也。宜聖（惠木香散之類）

○蠱疰　蠱疰者，人以蛇虫諸毒聚於器中，令相啖食，食盡存一物最惡最毒，名曰蠱，能隨飲食變化入腹，還生食人五臟。小兒中者，證與大人無異。其狀心腹多刺痛，懊悶，急者即死，緩者延涉歲月，羸困下血，藏爛乃死，死又疰易傍人，故為蠱疰也。宜（范汪十七味紫參丸、羖羊角散、雄黃散，小兒五種蠱毒方，敗鼓皮）

附方

畫眉膏

山梔（三個，存性）　雄黃（少許）　朱砂（少許）

右為細末，入麻油、輕粉各少許，調勻。候兒睡着，濃抹于兩眉上，醒便不食乳。未效，再用。加黃丹一錢。

金朱飲（本名天竺黃散）　治驚壯熱，傷寒伏熱，上焦虛熱，重舌，口鼻生瘡，赤眼。

川鬱金（剉，皂莢水煮乾，細者如蟬狀佳）　天竺黃

甘艸（炙）　馬牙硝（各半兩）　朱砂（一分，研）

蟬殼（十四個，水洗去土）　麝香（少許）

右為末，每服半錢至一錢，蜜湯調下。

生地黃湯　治初生兒眼不開。

乾地黃　赤芍藥　川芎

當歸（去蘆）　瓜蔞根　甘艸（各等分）

右爲細末。少許，用燈心煎湯調，抹口中。

眞金散　治兒初生，洗眼不淨，穢汁浸漬眼背，赤爛，至長不瘥，母食熱物熱藥，名曰胎赤。

黃連（去鬚）　黃柏　當歸

赤芍藥（各一錢）　杏仁（去皮尖，半錢）

右剉散，乳汁浸一宿，晒乾，爲極細末。用生地黃汁調一字，頻頻點眼。新綿裹荆芥湯浸濕，時時

洗浴，毋服洗心湯。

外臺方

乳兩合，葱白一寸，煎一兩沸，去葱，喫即乳。

豆豉膏

黑豆（一勺）　田螺（十九個）　葱（一大把）

右搗爛，芭蕉汁調，貼臍下。

蘇合香丸（見第十八）

辰砂殭蠶散　治初生撮口。

辰砂（水飛，半錢）　殭蠶（直的，去絲嘴，炒，一錢）　蛇蛻皮（炒，一錢）

麝香（研，半錢）

右爲極細末，少許，用蜜調，傅唇口。

五苓散（見第十七）

龍骨散　治臍中瘡。

龍骨（煅）　輕粉（各半錢）　黃連（去鬚，一錢半）

右爲極細末，少許，乾摻臍。

白芍藥湯　治冷疝腹痛，及誤汗下，即壞症傷寒

是也，並宜先服，次投對證之劑。

白芍藥（一兩半）　澤瀉（去粗皮，七錢半）　甘艸（炙，二錢）

薄桂（去粗皮，一錢半）

右件㕮咀，每服二錢，水一盞，煎七分，空心溫服。誤汗誤下，加人參、南木香各二錢。臍下痛，入生薑及鹽同煎，或加鈎藤亦好。

外消散　治兒初生臍突，或痛或不痛，痛則啼不已，及小兒因感濕熱，陰囊浮腫。

大黃　牡蠣（各半兩）　朴硝（二錢）

前二味，剉焙爲末，仍入朴硝鉢内同杵勻，用一二錢。先取田螺淨洗。水半碗活過宿。去螺。用水調，塗臍處即消，其螺放生勿害。治陰囊腫。用車前子煎湯，候冷調傅。

雙金散　治天釣驚風。目久不下。

蜈蚣（一條去頭足尾用真酥塗慢火炙黃置砧子上面南立用竹刀子當脊縫中停剖作兩半俱左邊者入一貼子内寫左字右邊者亦入一貼子内寫右字不得錯悮）

麝香（一錢細研先將左邊者同于乳鉢内研作細末却入在左字貼内收起別用乳鉢將右邊字者入麝香同研極細却入有字貼内收不得相犯每有病者眼睛釣上止見白睛兼角弓反張更不能出聲者用此藥法治之）

右用細華筒子，取左字貼内藥少許。吹在左邊鼻裏。右亦如之。用藥不可多。若眼未全下，更添些小，以意斟度。其眼即下。

神砂抱龍丸　治小兒驚風。痰喘。風痰。

膽星（四兩）　朱砂（水飛五錢）　麝香（五分）

雄黃（二錢五分）　天竺黃（一兩）

右爲極細末。甘草膏和丸。朱砂爲衣。一方加金箔十張。

雞腸散　治因膀胱有熱。服冷藥過多。小便不能禁止。或遺尿病。

雞腸（一具男用雌雞女用雄雞燒存性）　牡蠣

茯苓（去皮）　桑螵蛸（炒各五錢）　桂（去粗皮）

龍骨（各二錢半）

右爲極細末，仍以雞胜胵一具。雞腸一具。燒存性。研極細末，卻用和前藥末一錢。用溫酒調化，食前服。

外臺方　療小兒睡中遺尿，不自覺。

桂末，雄雞肝，等分搗丸一豆大，溫水下。日三服。

六味地黃丸（見第十六）

瀉黃散（見第四十九）

導赤散（見第十七）

大黃黃連瀉心湯（見第五十五）

清液散　治小兒重舌。及口瘡。

青黛　朴硝（各一錢）　龍腦（一字）

右爲細末。用蜜調。鵝翎蘸少許傅之。

五福化毒丹　治積熱驚惕。狂躁煩渴。頰赤咽乾唇口生瘡。夜臥不寧。頭面遍身瘡癤。及小兒驚風痰熱潮搐等證。如大人口臭。及小兒瘡疹。上攻口齒。涎血臭氣。用生地自然汁化一丸。以雞

翎刷口內。熱疳黃瘦雀目者。陳粟米泔下。食後臨臥服。

玄參　桔梗（各三兩）　人參

牙硝　青黛（各一兩）　甘艸（七錢五分）

麝香（一分）

蜜丸芡實大。金銀箔各四十片爲衣。每一丸作四服。薄荷湯下。

膠黃散　治小兒大衄。口鼻耳出血不止。十五六歲兒陽盛。多此病。

阿膠（一兩）　蒲黃（半兩）

右爲末。三歲半錢。生地黃汁。微煎。調服食前。

菖蒲丸　治小兒心氣不足。五六歲不能言。

石菖蒲（二錢）　人參（切去蘆焙半兩）　丹參（二錢）

天門冬（去心皮）　麥門冬（去心焙各一兩）　赤石脂（三錢）

直指有當歸。川芎朱砂。

右爲細末。煉蜜丸如菉豆大。或麻子大。溫水下

五七丸至一二十丸。不拘時。日三服。久服取效

又有病後腎虛不語者。宜兼服錢氏地黃丸。

肥兒丸　治小兒腦後項邊。有物如彈子。按之轉動。軟而不痛。名無辜瘡。久服神效。

胡黃連　神麯（炒）　麥蘗（各五錢）

檳榔（三錢）　木香（二錢）　肉豆蔻（麵裹煨）

使君子（肉各二錢半）

右爲細末。蒸餅丸如黍米大。用米飲。食遠服。

詳曰脾色黃主肌肉納穀食腹乃其府胃乃其臣是方以四君補脾臣上治其[illegible]本史蕪砂殺蛔消積治其標食肉不食藥者收藥味于肉并肉并味從類而歸脾若脾疳面黃腹大飲食不調肌肉枯瘁每見蛔者服之自効恐誅疳則未必也

布袋丸　治諸疳疾，面黃腹大，飲食不調，肌肉枯瘁。

夜明砂（揀淨淘澄淨）　蕪荑（炒去皮各二兩）　白茯苓（去皮）

白朮（無油者去蘆）　人參（去蘆）　甘艸

蘆薈（細末各半兩）　史君子（肥白者微炒去皮二兩）

右爲末，湯浸蒸餅和丸，如彈子大。每服一丸，以生絹袋盛之，次用精猪肉二兩，同藥一處煮，候肉熟爛，提取藥於當風處懸挂，將所煮肉并汁

令小兒食，所懸之藥，第二日仍依前法煮食，只待藥盡爲度。

錢氏地黃丸　治頭顖不合，體瘦，骨露如鶴膝，皆腎虛也，并治腎疳天柱傾倒，腎主骨故。

熟地黃（洗焙八錢）　澤瀉（洗去毛）　牡丹皮（去心）

白茯苓（各三錢）　山茱萸肉　牛膝

鹿茸（酥炙）　山藥（各四錢）

右爲末，煉蜜丸，如梧子大。三歲已下，三二丸，溫水空心化下。

大啓脾丸（即資生丸見第五十一）

參苓白朮散（見第四十四）

益黃散（又名補脾散）　治脾胃虛寒，泄瀉嘔吐，腹痛，鼻氣冷，有熱證，不可服。

陳橘皮（一兩）　青橘皮　訶子肉

甘艸（各半兩剉炒）　丁香（二錢）　白茯苓（一兩）

右爲細末，每服三錢，水一盞，煎至六分，食前溫

服。

瀉黃散（見第四十九）

安神丸（見第十九）

涼膈散　治小兒藏府積熱，煩躁多渴，頭昏，唇焦咽燥，舌腫喉閉，目赤鼻衂，頷頰結硬，口舌生瘡，痰實不利，涕唾稠粘，睡卧不寧，譫語狂妄，腸胃燥結，便溺赤澁，一切風腫，並宜服之。（方見第十九）

花火膏　取燈火一顆，塗乳上，令兒咂之。

栢曰晝則蟬噪暝則雞鳴故聲于夜冠則最高發則最表出邪于陽正向冠者定驚安神燈火熱蘇清心熱

蟬花散　治小兒夜啼不止。狀若鬼祟。用蟬蛻下半截爲末。一字。薄荷湯入酒少許調下。或者不信。將上半截爲末。煎湯調下。即復啼也。古人立方。莫知其妙。

茅先生抹唇膏　主小兒夜啼。內有驚熱。

蟬殼（一個去足）　燈花（兩朶）　朱砂（少許）

右爲末。如小兒夜啼。遇夜用雞冠血調藥。抹兒上下兩唇。即止。夾朱砂膏與服。

白朮當歸煎丸　治胎寒腹痛。遇夜啼叫。身體繃張。有如癎狀。吐哯不止。大便酸臭。乳食雖多。不生肌膚。

白朮　當歸　木香

右等分。爲細末。煉蜜爲丸如桐子大。每服一丸。煎木香湯化下。

瀉白散（見第四十九）

塗龜尿法　取龜置荷葉上。鏡照之。則自尿。一法

栢曰腎脉總膀胱經絡血二脉會于顖頂二脉虛亦能令顖解白芍藥益肝歛而透頂雄雞冠取陽高而發顖實虛不合者無効

以鬃搐其鼻。亦自出。

補中益氣湯（見第三十九）

小兒錮顖藥

白芍藥粉

右取黃雄雞。臨兒顖上。刺其冠。以血滴顖上。血止。以芍藥末傅上。掩血令不見。一日立瘥。不愈再如法傅之。

麝茸丹　治數歲不能行。

麝香（別研）　茄茸（酥炙黃）　生乾地黃

虎脛骨（酥塗炙黃）　當歸（洗焙乾）　黃耆（剉）

右件各一兩。爲細末。用羊髓四兩煮爛。和成膏如黍米大。每服十粒。磨沉香湯下。乳食前。日三服。

千金楸葉方　治少小頭不生髮。以楸葉搗取汁傅頭上。立生。

榆末散　治小兒白禿髮不生。搗榆皮末。苦酒調

塗。

聖惠神効黑豆膏　治兒腦疳。髮連根作穗。脫落不生。或白禿瘡髮不生者。兼能黑鬢。

黑豆　苣藤　訶梨勒皮（一兩）

右件藥。搗羅末。水拌令勻。內于竹筒中。以亂髮塞口。煻灰內煨。取油貯甆器中。先以米泔皂莢湯洗頭。拭乾塗之。日再用。十日髮生。

千金翼大豆方　治髮黃。以醋煮大豆爛。去豆煎

令稠塗髮。

清胃湯　治胃火牙痛。或連頭面。方見第四十九

雄黃丸　治小兒牙齒黑蚛。氣臭疼痛。

雄黃（二錢）　麝香（半錢）

右爲細末。軟飯和爲梃子。安在牙內。

千金白鹽方　常以白鹽末封齒齦上。日三夜二。

齧死生齒方

右用雄雌雞糞。各十四顆。焙乾同研如粉。入麝香少許。仍先以針挑破損齒脚下血出。將散子傳之。年高者。不過二十日生。年少者。十日。不計傷損。及少自退落。並再生。

柴胡清肝散　治肝膽三焦風熱怒火。或乍寒乍熱。往來寒熱。發熱或頭髮瘡毒等證。

柴胡（一錢半）　黃芩（炒）　人參

川芎（各一錢）　山梔（炒一錢半）　連翹

甘草（各五分）　桔梗（八分）

右水煎服。

湯氏龍黃散　治小兒停耳。汁出不止。

枯白礬　龍骨末　黃丹（炒各半兩）

麝香（一錢）

右同研細。先以綿杖子搌膿水盡。用散一字半。分爲兩處入耳內。日二次。

立驗散　治蚰蜒及諸虫入耳

川芎　白芷　夜明砂（炒）

豬牙皂角（炙）　南星（炮各七錢五分）　百部

白丁香　藜蘆（各四錢）　草烏（半兩）

砒霜（另研）　蓽撥（各二錢）　海金砂（二錢半）

右爲細末研勻。臨時更用鉛丹調色勻。磁器收。如蚰蜒入耳。取少許。以醋一滴調化。以細翎蘸藥入耳竅。微吹。令藥氣行。立出。藥不得多。多則蚰蜒成水不出。如蝸螯。先點少醋在螯處。摻藥半字許。擦令熱即効。

錢氏橘連丸　治疳瘦。久服消食和氣。長肌肉。

橘皮（一兩）　黃連（米泔浸一宿一兩半）

右爲細末。另研入麝香五分。用豬胆七個。分藥入胆內。漿水煮。候臨熟。以針微刺破。以熟爲度。煮粟米粥和丸。如菉豆大。每服十丸。至二三十丸。米飲下。量兒加減無時。

豆豉大丸摩法　用豉數合。水拌濕。搗熟。丸如雞子大。摩兒顖上足心。各五六遍。又遍摩兒心。及臍上下。食頃。破視其中。當有細毛。即擲丸道中。

譚氏殊聖治客忤方

驚啼哭不休。壯熱脉如鉤。莫識爲何病。傷心不自由。犀角雄黃搗。桃符煎水稠。參苓芣苡子三粒化無憂。

張渙辟邪膏　兒血氣未實。神氣軟弱。除父母及乳養人外。勿令見生人。及抱往別房異戶。及見牛馬畜獸等。其父母家人之類。自外夜行歸家。

亦勿令見。恐經觸鬼神惡氣犯兒。令吐下五色。水穀解離。狀似發癇。但眼不上戴。脉不弦急。名曰客忤。

真降香（剉）　白膠香　沉香

虎頭骨（微炒）　鬼臼（去毛）　草龍膽

人參　白茯苓

右各半兩。搗羅細末。次入水磨雄黃半兩。細研水飛。次研麝香一錢。拌勻。煉蜜和丸雞頭大。每

一粒、煎乳香湯化下、及別丸如彈子大。用絲絹袋盛、佩兒衣上、仍臥內常燒神妙、

竈中黃土方　客忤因而驚忤者、治法用竈中黃土、研二兩、雞子一枚。去殼。二件相和。入少許水調、先以桃柳枝湯浴兒。後將此藥塗五心。及頂門上。（原無擇法用竈中黃土蚯蚓屎等分如此法塗之）

三物燒髮散　治小兒見生人、驚忤啼不止。

卽用來人頂上髮十莖。斷兒衣帶少許。合燒灰

細末、和乳飲兒愈、

皂莢搐鼻法（見第七十三）

沉香降氣湯（卽前辟邪膏）

葱刺鼻法

右取葱黃心、刺其鼻、男左女右。入七八寸。小兒量度之、若使目中血出佳。扁鵲法同是。

葛氏肘後灸法　以繩圍其死人肘腕。男左女右畢。伸繩從背上大椎度以下、又從此灸橫行。各半繩。此法三灸各三。卽起。又令爪其病人人中。取醒。不起者。捲其手灸下文頭。隨年壯。又灸鼻中三壯也。又灸頤下宛宛中。名承漿穴。十壯。大効。又灸兩足大指爪甲聚毛中七壯。此華佗法一云三七壯。又灸臍中百壯也。

管吹下部法　以管吹下部。須數人互吹。氣通則活。

千金牛舐方　治卒死無脈。無他形候。陰陽俱竭

故也。

用牽牛臨兒鼻上。二百息。牛舐必差。牛不肯舐着鹽汁塗面上。卽牛肯舐。

熨兩脇法　右炙熨斗。熨兩脇下。（備急方云又治尸厥）

治鬼魘死方　擣韭汁灌鼻孔中。刺者灌兩耳。（張仲景云灌口中）

雞冠血方　治小兒不知所病。便死絕方。

右取雄雞冠。臨兒口上。割血滴入口。下卽活。

灸法　卒死而四肢不收。尿便者。灸心下一寸。臍上三寸。臍下四寸。各一百壯。兒小者隨年。

圖經治鬼持方　用虎睛瓜。并猪骨毛。繫兒臂上。辟惡鬼。

外臺深師五邪方　療鬼魅。妄言狂走。恍惚不識人。此爲鬼忤。

丹砂　雄黃（各別研）　龍骨

馬目毒公　鬼箭（各五兩）　鬼臼（二兩）

赤小豆（三兩）　芫青（一枚）　桃仁（百枚去皮尖熬別研）

右搗末。細絹篩。合諸藥拌令勻。後內蠟。和如彈丸。絳囊盛繫臂。男左女右。小兒繫頸。合時勿令婦人雞犬見。服者。蜜和圓如桐子大。一服三丸。日三服。忌五辛生血物。

太乙備急散　主卒中惡客忤。五尸入腹。鬼刺鬼痱。及中蠱疰吐血下血。及心腹卒痛。腹滿。傷寒陰毒病。六七日。

稍曰生陽丸死陰附子桂心丁茯苓首丹砂是也大赤蘇小豆芫花藜蘆巴豆

野葛是也又藜蘆湧于上巴豆泄于下吐利汗如得一則生所以然者運轉三氣通正氣內張邪氣外散故耳

雄黃　芫花　桂心（各二兩）

丹砂　蜀椒（各一兩）　藜蘆

巴豆（各一分）　附子（炮裂去皮臍五分）　野葛（三分）

右九味。巴豆別治如脂。餘合治下篩。以巴豆合和。更搗令勻。以銅器密貯之。勿泄。有急疾。水服一字七。可加至半錢七。老小半之。病在頭。當鼻衂。在膈上吐。在膈下利。在四肢當汗出。神効。

聖惠木香散　治小兒尸疰。心腹脹痛。不可忍。

木香　鬼箭羽　桔梗（去蘆頭）

當歸（剉微炒）　紫蘇莖葉（各半兩）　檳榔（三分）

右搗爲粗散。每一錢。以水一小盞。入生薑少許。煎五分。去滓。不計時溫服。更量兒大小加減。

范汪方十七物紫參丸　療大人小兒蠱疰。癥瘕積聚。瘦削。大小便不利。卒忤惡風。臚脹腹滿。淋水轉注。殫門盡尸。延及子孫。醫不能療者。

紫參　人參　半夏（湯洗）

藜蘆　代赭石　桔梗
白薇　肉蓯蓉（各二分）　石膏
大黃　牡蠣（熬）　丹參（各一分）
蝦蟆（燒灰）　烏頭（炮各四分）　狼毒（七分）
附子（炮五分）　巴豆（七十枚去心皮熬）

右藥搗篩。蜜和爲圓。以飲下如小豆一丸。日三服。老小以意減之。蜂蠆所螫。塗上神良。忌豬羊肉。冷水。一方無蝦蟆。有乾薑四分。

羖羊角散　治小兒中蠱。腹內堅如石。面目青黃。小便淋瀝。變易無常。

羖羊角（屑）　蘘荷（各一兩）　梔子仁（七枚）
赤芍藥　牡丹皮　黃連（去鬚各一分）
犀角（屑半兩）

右搗粗末。羅爲散。每服一錢。以水一小盞。煎至五分。去滓溫服。日三四服。更量兒大小加減與之

雄黃散　治小兒飛蠱。狀如鬼氣者。宜服。

雄黃　麝香（各研）　犀角（末各半兩）

右藥都研令勻。每服以溫水調下半錢七。日四五服。量兒大小加減。

小兒五種蠱毒方

右搗馬兜鈴根。羅爲散。每服一錢。水一盞。煎五分。去滓空腹頓服。當時吐蠱出。未吐再服。

敗鼓皮方

右用敗鼓皮一片。燒灰。細研爲粉。空心粥飲調服一錢。病人須臾呼蠱主姓名。便愈。

醫燈續焰卷十六終

醫燈續焰目錄

卷之十七

奇經八脉脉證第七十九
羌活勝濕湯（見第六十五）　生鐵落飲
瀉青丸（見第四十九）　丁香楝實丸（見第六十四）
三因散聚湯　三因化氣湯
蘇子降氣湯（見第十七）　黑錫丹（見第七十）
震靈丹　金匱桂枝龍骨牡蠣湯

和劑威喜丸　東垣柴胡升陽湯
東垣退熱湯　本事枳實散
奇効拈痛丸　四七湯（見第十七）
胃風湯　交加散
海藏愈風湯　加味逍遙散（見第五十一）
十全大補湯（見第十六）
反關脉第八十
真藏脉第八十一

卷之十八（補遺）

嘈雜
三聖丸　越鞠丸（見第四十一）
二陳湯（見第十六）　丹溪導飲丸
烏梅圓（見第六十三）　酒煮黃連丸（見五十五）
吞酸吐酸
藿香安胃散（見第二十）　加減二陳湯
三因鞠朮丸

二陳加茱連神麴蒼朮方
酒煮黃連丸（見第五十五）
噎膈
生薑半夏湯　統旨香砂寬中湯
和劑五膈寬中散　和劑穀神嘉禾散
統旨補氣運脾湯　代抵當丸（見第二十）
自汗
當歸補血丸　得効玉屏風散

保元湯　黃耆建中湯（見三十三）
桂枝湯（見第十九）

盗汗

當歸六黃湯　大建中湯

悸怔忡

導痰湯（見第四十一）　溫膽湯（見第三十）
茯苓甘艸湯　蒼术湯
補中益氣湯（見三十九）　四君子湯（見第十六）

六君子湯（見第十六）　小建中湯（見第二十二）
黃耆建中湯（見二十二）　四物湯（見第二十一）
朱雀丸（見第五十一）　當歸補血湯（見第十六）
經驗定心丹　炙甘草湯（見第三十二）

徤忘

歸脾湯（見第五十八）　讀書丸
朱雀丸（見第五十一）　二參丸
開心散　壽星丸（見第五十）

導痰湯（見第四十一）　代抵當丸（見第二十）

不寐

八珍湯（見第十六）　歸脾湯（見第五十八）
仲景酸棗仁湯　溫膽湯（見第二十）
六君子湯（見第十六）　內經半夏湯
導痰湯（見第四十一）

呃

二陳湯（見第十六）　溫膽湯（見第二十）

導痰湯（見第四十一）　和劑枳實半夏湯
麴蘗枳术丸（見第二十）　法製陳皮
法製檳榔　六君子湯（見第十六）
四君子湯（見第十六）　橘皮竹茹湯
理中湯（見第十七）　潔古柿錢散
金匱腎氣丸（見第十六）　艮方參附湯

面

升麻胃風湯　升麻順氣湯

犀角升麻湯　補胃湯
茯苓桂枝五味甘艸湯
七白散　洗面藥
面上五色瘡方　面上豆痕斑點瘢方
面上粉刺方　斗門方
指爪破面方　又方
平胃散　白防子散
祛風白芷散

目

易簡補肝散　本事菊花散
瀉青丸（見弟四十九）　局方湯泡散
湯泡散　分珠散
清涼散　二黄散
照水丸　千金磁硃丸
煮肝散　洗眼方
菊睛丸　駐景丸
枸杞子酒　地芝丸
定志丸

耳

清神散　磁石湯
益腎散　犀角飲子

鼻

通氣湯　防風散
单南星散　蓽撥餅

瓜蒂散　芷夷散
鼻衂不止方

口脣

瀉白湯　黄檗散
五福化毒丹（見七十八）　水檗丸

舌

薄荷煎　黑參丸
薏苡仁湯　舌血舌腫舌出方

齒
清胃湯（見第四十九）　香鹽散
謝傅笑去散　白蒺藜散
青白散　齒縫出血方
齒肉壅出
鬚髮
天寶單方　巨勝丸
旱蓮膏　地黃膏

筆峰雜興方
六淫方
陰淫上下厥逆中外寒慄
附子理中湯（見第十七）　四逆湯（見第二十二）
陽淫狂譫煩渴血泄浸淫
白虎湯（見第四十三）　犀角地黃湯
風淫肢癈毛落髮習瘈瘲
寶鑑醉仙散　通天再造散

雨淫腹滿腫脹腸鳴濡瀉
平胃散（見第四十七）　五苓散（見第十七）
晦淫百合狐惑熱中藏燥
百合知母湯　滑石代赭湯
百合雞子湯　百合地黃湯
甘草瀉心湯　苦參湯
雄黃薰法　赤小豆當歸散
金匱甘麥大棗湯

明淫恍惚動悸錯妄失神
金匱桂枝去芍藥加龍骨牡蠣救逆湯
東垣朱砂安神丸（見第十九）
卷之十九
望診
藏府部分　五官
診病新久　面部圖
藏府色見面部圖　肢節色見面部圖

統論色　面
口　鼻
血脉　毛髮
形體　死證
五藏絕證　詐病

聲診

聲　息

問診

人品起居　病證
嗜欲苦樂
附辯舌

醫燈續焰卷十七

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佐賢聖翼評
門人張芝蘭畹如
姪　世韶夔司
　　世韺子咸　校

奇經八脉脉證第七十九

奇經八脉。其診又別。直上直下。浮則爲督。牢則爲衝。

緊則任脉。寸左右彈。陽蹻可決。尺左右彈。陰蹻可別。關左右彈。帶脉當訣。尺外斜上。至寸陰維。尺內斜上。至寸陽維。督脉爲病。脊强癲癇。任脉爲病。七疝瘕堅。衝脉爲病。逆氣裏急。帶主帶下。臍痛精失。陽維寒熱。目眩僵仆。陰維心痛。胸脇刺築。陽蹻爲病。陰緩陽急。陰蹻爲病。陽緩陰急。癲癇瘈瘲。寒熱恍惚。八脉脉證。各有所屬。

（經絡爲識病之要奇經乃）

一奇經八脉者。在十二經脉之外。無藏府與之配偶。

二經維持爲至要今於正經尚屬偏況奇經乎備于此詳按部推分[illegible]眞生人司命者所當共寶也

故曰奇。夫藏府之脈，寸關尺有定位。（左寸心小腸，右寸肺大腸，左關肝膽，右關脾胃，左尺腎膀胱，右尺命門三焦。）浮中沉有定體。（難經以三菽六菽九菽十二菽按之至骨分肺心脾肝腎。）弦鉤毛石有定形。（春弦肝木，夏鉤心火，秋毛肺金，冬石腎水。）此則另爲一脈，形狀固異，而隨經亦殊，病證不同，而診治自別。蓋督任衝三脈，皆起於胞中。一源而三派，督行於背，總督諸陽；任行於腹，總任諸陰；衝則後行於背，前行於腹，上行於頭，下行於足，以至谿谷肌肉，無處不到，誠十二經內外上下之要衝也。故靈樞順逆肥瘦篇曰：衝脈者，五藏六府之海也。五藏六府皆稟焉。二脈直行上下，發源最中，故見於脈，亦皆直上直下也。直上直下者，即三部俱長透之義。若直上下而浮，則氣張揚，陽象也，故屬督；若直上下而緊，則勢斂束，陰象也，故屬任；若直上下而牢，則體堅實，有餘之象也，故屬衝。陽蹻陰蹻者，皆起於足跟，人身之超越蹻捷者，亦莫過於足跟，故曰蹻。一則爲足太陽之別，循外

維持得力全在交會處

踝上行，入風池，合於太陽，故名陽蹻；一則爲足少陰之別，循內踝上行，至咽喉，交貫衝脈，故名陰蹻。寸以候陽，寸左右彈者，言在寸左右，皆有彈石搏手之勢，是陽蹻脈也；尺以候陰，尺左右彈者，言在尺左右，皆有彈石搏手之勢，是陰蹻脈也。二經之起，以踝之內外分陰陽者，外踝屬太陽，而內踝屬少陰也。二經之脈，以尺寸分陰陽者，以陽蹻入風池，合太陽至頭，故以寸候之；陰蹻合少陰而不至頭，故以尺候之也。帶脈者，圍身一周，不上不下，如束帶然，故彈搏之脈，雖見於左右中關耳。陽維陰維者，維持一身。陽維維陽，起於諸陽之會；陰維維陰，起於諸陰之交。夫人身經脈繁寄，二脈能於陰交陽會處加一紫繩，舉綱齊目，而陰陽斯得維持之力矣。其見於脈，自尺至寸，皆刺斜而上。陰則自外入內，陽則自內出外，蓋其經亦皆自下而起。陽自外踝，出肩至腦；陰自內踝，入腹至喉故也。此八

[illegible]可補前用桑椰貫宜湯花没藥射

經之脉狀，病則見，不病則不見。難經二十八難曰：入脉陰盛，入於八脉而不環周，故十二經亦不能拘之。不能拘之者，謂十二經不能拘此八脉在環周之內，然而八脉之元元已寓於十二經中矣。故平和不病，則不見也。其脉曰浮，曰牢，曰緊，曰左右彈，曰斜上，雖皆各因其陰陽道路呈象，而脉狀則俱似有邪而實者。本難云：畜則砭射，豈有以哉。其病督脉脊强癲癇者，蓋督脉起於少腹以下骨中

央，女子入繫廷孔之端，絡陰器，繞篡，繞臀，至少陰與太陽少陰合，入股內，貫脊屬腎，與太陽起目內眥，上額交巔，上入絡腦，還出別下項，循肩髆內，夾脊抵腰中，入循膂絡腎。（自目內眥上額下循膂絡腎皆合太陽而並行者也）其男子循莖下至篡，與女子等。其少腹直上者，貫臍中央，上貫心，入喉，上頤環脣，上繫兩目之下中央。其脉之別，名曰長强，俠脊上項，散上頭，下當肩胛，左右別走太陽，入貫膂。二十八難亦曰：督脉者，起於下極之俞，並於脊裏，上至風府，入屬於腦。由是觀之，則督脉與太陽合行者十九。故邪客則脊强。以其貫脊也。脊與太陽皆主表，而督爲諸陽之總，太陽爲諸陽之長，又曰巨陽。風邪從類傷陽，表必先受。故甚則爲癲癇疾也。癲癇時發時止，或筋脉牽引，或項背反張。雖云風傷督脉，亦太陽主筋故耳。（宜羌活勝濕湯生銕落飲瀉青丸之類）

任脉爲病，七疝瘕堅者，蓋任脉總諸陰之會，其脉起於胞中，循腹裏，爲經

諸疝之有風名者總不離厥陰氣耳

絡之海。其浮而外者，循腹裏上行於咽喉，別而絡脣口。難經亦云：起於中極之下，以上毛際，循腹裏，上關元，至咽喉。七疝者，在巢氏則曰厥疝、癥疝、寒疝、氣疝、盤疝、胕疝、狼疝。張子和非之，另立七名，曰寒疝、水疝、筋疝、血疝、氣疝、狐疝、癩疝。而諸經所載，如素問四時刺逆從論所云狐疝風，肺風疝，脾風疝，心風疝，腎風疝，肝風疝，骨空論所云疝瘕，脉解篇所云癩疝，玉機真藏論所云疝瘕，少腹冤熱而

婦人衝任有（經不調）不調者不受孕不得心此

痛、出白。一名曰蠱。靈樞邪氣藏府病形篇所云。小腸病者。小腹痛。腰脊控睪而痛。時窘之後。此亦疝類也。名雖多種。總不能出於七疝之外。蓋七疝之發。必在前陰少腹之間。任脈所經之地。雖屬他經。未有不以任爲原者。瘕者。假也。氣聚則堅。氣散則平。亦似疝之時作時止。發則亦在任脈界分。多屬血凝經澀。女子之病也。（宜東垣丁香楝實丸、三因散聚湯、化氣湯之類）衝脈爲病。逆氣裏急者。衝之與任。皆起胞中。上循背

若使可廢附人間

裏。爲經絡之海。亦名血海。其浮而外者。亦循腹上行。會於咽喉。別而絡脣口。强半與任脈同。素問骨空論曰。衝脈者。起於氣衝。並足少陰之經。俠臍上行。至胸中而散。二十八難則曰。起於氣衝。並足陽明之經。俠臍上行。至胸中而散。痿論亦曰。衝脈者。經脈之海。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。二論所並。雖有少陰陽明之不同。要知自臍至胸。與陽明則並於前。與少陰則並於後也。故與陽明皆得稱

帶下人所易忽然此疾不除亦難受孕故是人亦多帶下皆子嗣鄙也

爲五藏六府之海。其氣不順。血不和。則胸腹之氣。循經蹷逆而裏急矣。（宜蘇子降氣湯、黑錫丹、震靈丹之類）帶脈爲病。帶下臍痛。精失者。以帶脈起於季脇。廻身如帶。藏府十二經絡。皆過於此。若飲食不節。勞慾縱傷。致令濕熱下流。邪火內鬱。外或風入胞宮。邪凝臍腹。帶脈不任。與邪俱陷。或赤或白。如涕如膿。或青黃雜色。或濁黑異形。溢漏不時。淋瀝不淨。其兼證則腰腹痠疼。足膝痠軟。頭目暈眩。經脈參差。甚或寒

蓋素隱鈎玄有二之白則書壁

熱往來。容顏枯瘁。然而發源於衝任脾胃者多。以衝爲血海。任總諸陰。脾胃司水穀故耳。是以骨空論曰。任脈爲病。女子帶下瘕聚。又痿論曰。衝脈與陽明合於宗筋之會。而陽明爲之長。皆屬於帶脈。帶脈起於季脇章門。前則當臍上。故又或爲臍痛。靈樞經別篇曰。腎足少陰。當十四椎出屬帶脈。蓋腎主藏精。帶固腰腎。虛則一不能藏。一不能固。而精有自失者矣。（宜金匱桂枝龍骨牡蠣湯、和劑威喜丸之類）陽維爲病。

管子曰四維不張國乃滅今人身陰陽無維亦猶是也

寒熱目眩僵仆者。以陽維維絡一身之陽。陽主衞。主氣。主表。病則不能維陽。是陽無護持。而衞氣亦因之不固。故在表則生寒熱。其脈氣所發。別於金門（在足太陽外踝下）以陽交爲郄。（足少陽外踝上）與手足太陽及蹻脈。會於臑俞（手太陽肩後）與手足少陽會於天髎。（手少陽缺盆上）又會於肩井（足少陽肩上）其在頭也。與足少陽會於陽白（足少陽眉上）上於本神。及臨泣。（俱在足少陽眉上）上至正營（足少陽目窗上）及腦空（足少陽枕骨下）下至風池。（足少陽頭顳後）與督脈會於風府（督脈髮際後）瘂門。（督脈風府後）觀此。則知本脈之維於頭目手足。頭項肩背諸陽。無一不到。其脈不榮則不能維。在頭目無維。則眩。在頭項肩背無維。則僵。在手足無維。則仆矣。（宜東垣柴胡升陽湯東垣退熱湯之類）陰維爲病心痛。胸腹刺築者。以陰維維絡一身之陰。陰主榮。主裏。不能維陰。則陰無約束。而榮氣因之不和。故在裏則心痛。又榮主血。血合心。故心痛也。其脈氣所發。陰維之郄。名曰築賓。（足少陰內踝上）與

足之舉上蹻提蹻脈猶之

足太陰會於腹哀。（足太陰乳下）大橫。（足太陰腹哀下）又與足太陰會於府舍。（足太陰少腹下）期門。（足厥陰乳下）與任脈會於天突（任脈喉下）廉泉。（任脈舌本下）觀此。則知本脈之維於胸腹諸陰。亦無一不到。其脈不榮。則不能維。在胸脇失所維。則動築而刺痛矣。（宜本事枳實散奇効拈痛丸四七湯之類）陽蹻爲病。陰緩陽急。陰蹻爲病。陽緩陰急。及癲癇瘈瘲寒熱恍惚者。蓋二蹻之脈。同發一源。難經二十八難曰。陽蹻脈起於跟中。陰蹻脈亦起於跟中。不唯同起於跟。而又同絡於目。靈樞脈度篇曰。蹻脈者少陰之別。起於然骨之下。上內踝之上。直上循陰股。入陰。上循胸裏。入缺盆。上出人迎之前。入頄。屬目內眥。合於太陽陽蹻而上行。氣并相還。則爲濡目。（氣不榮則目不合）又曰。男子數其陽。女子數其陰。當數者爲經。不當數者爲絡。觀此。則知二蹻之脈。雖以男女分陰陽。而實則迭爲經絡。是一本也。故其爲病。亦不似前六脈。逐經分屬。本文以癲癇瘈瘲。寒熱

也惟此經有二所文若爲經精亦大奇矣。先以陰陽總揭于前而後條析之詮莊之妙

八種脈證洞若觀火內外明徹自陽蹻以及無人道

缺一字摘思落筆若有神助

恍惚。總系二經之下。以二經均可病此。證雖云四。而病機可分爲八。陰陽緩急之義。自是顯然。夫人之身。背爲陽。腹爲陰。開爲陽。闔爲陰。外爲陽。內爲陰。熱爲陽。寒爲陰。癲則目閉俛首。陰急而陽緩也。癇則目直僵仆。陽急而陰緩也。大惑論所謂衛氣不得入於陰。常留於陽。留於陽則陽氣滿。陽氣滿則陽蹻盛。不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑。衛氣留於陰。不得行於陽。留於陰則陰氣盛。陰氣盛則陰蹻滿。不得入於陽。則陽氣虛。故目閉。脈度篇亦云。蹻之陰脈榮其藏。陽脈榮其府。又云。內溉五藏。外濡腠理。又陰出陽則交於足太陽。陽入陰則交於足少陰。雖一爲太陽之別。一爲少陰之別。而實則隨衛氣相終始者。故衛氣之行留。即可徵二蹻之虛盛。瘈者。拏也。筋脈拏向裏拘。陰急而陽緩也。瘲者。縱也。筋脈縱從外弛。陽急而陰緩也。寒則氣收斂。從裏從陰。陰急而陽緩也。熱則氣散漫。從表從陽。陽急而陰緩也。恍者。目前恍然。若有所見。謬刺論曰。邪客於足陽蹻之脈。令人目痛。從內眥始。且合太陽上行而并濡於目。病屬目而從外。陽蹻之病。陽急而陰緩也。惚者。胸中惚惚。若有所失。脈度篇曰。蹻脈者。少陰之別。起於然骨之後。循陰股入陰。上循胸裏。入缺盆。二十八難曰。陰蹻脈者。亦起於跟中。循內踝上行。至咽喉。交貫衝脈。病屬胸腹而從內。陰蹻之病。陰急而陽緩也。二脈一爲經一爲絡。病在經。則經急絡緩。病在絡。則經緩絡急。總之皆可言經。皆可言絡。但以男女分陰陽之所屬。緩急辨病邪之所在。而正文以諸證爲二經共義見矣。宜（可系湯或加散海藏愈風湯加味逍遙散十全大補湯之類）

附方

羌活勝濕湯（見第六十五）

生鐵落飲　治肝木有餘。或大怒諸火上炎。上盛下虛。發爲癲狂。神氣不寧。渴煩譫妄

生鐵四十斤，入火燒赤沸，砧上鍛之。有花出如蘭如蛾，紛紛墜地者，是鐵落。用水二斗，煮取一斗，入後藥。

石膏（三兩）　龍齒（研）　白茯苓

防風（去蘆各一兩半）　玄参　蓁艽（各一兩）

右為粗散，入鐵汁中，煮取五升，去滓，入竹瀝一升和勻，溫服二合，無時，日五服。

瀉青丸（見第四十九）

東垣丁香楝實丸（見第六十四）

三因散聚湯　治九氣積聚，狀如癥瘕，隨氣上下，發作心腹絞痛，攻刺腰脅，小腹䐜脹，大小便不利。

半夏（湯洗七次）　檳榔　當歸（各七錢五分）

陳皮（去白）　杏仁（去皮尖麩炒）　桂心（各二兩）

茯苓　炙甘草　附子（炮去皮臍）

川芎　枳殼（去穰麩炒）　厚朴（薑製）

吳茱萸（湯浸各一兩）

每服四錢，水一盞，薑三片，煎七分，食前溫服。大便不利，加大黃。

三因化氣湯　治息積。

砂仁　桂心　木香（各二錢五分）

甘艸　茴香（炒）　丁香皮

青皮　陳皮　乾薑

蓬朮（炮各半兩）　胡椒　沉香（各一錢）

右為細末，每服二錢，薑蘇鹽湯調下，婦人醋湯下。

蘇子降氣湯（見第七十）

黑錫丹（見第七十）

震靈丹（紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹）　治男子真元衰憊，五勞七傷，臍腹冷疼，肢體酸痛，上盛下虛，頭目眩暈，心神恍惚，血氣衰微，及中風癱瘓，手足不遂，筋骨拘攣，腰膝沉重，容枯肌瘦，目暗耳聾

口苦舌乾。飲食無味。心腎不足。精滑夢遺。膀胱疝墜。小腹淋瀝。夜多盜汗。久瀉久痢。嘔吐不食八風五痺。一切沉寒痼冷。服之如神。及治婦人血氣不足。崩漏虛損。帶下。久冷胎藏無子。

禹餘糧（火煅醋淬不計遍數手撚得碎爲度）　紫石英

赤石脂　丁頭代赭石（如禹餘糧炮製各四兩）

已上四味。並作小塊。入坩鍋內。鹽泥固濟。候乾用炭十觔。煅通紅。火盡爲度。入地埋。出火毒二

宿。

滴乳香（另研）　五靈脂（去砂石篩）　沒藥（去砂石研各二兩）

朱砂（水飛過一兩）

右八味。並爲細末。以糯米粉煮糊爲丸。如雞豆大。曬乾出光。每一丸。空心溫酒。或冷水任下。常服鎮心神。駐顏色。溫脾胃。理腰臍。除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘。久服輕身。漸入仙道。忌猪羊血。恐減藥力。婦人醋湯下。孕婦不可服。

金匱桂枝龍骨牡蠣湯　金匱要畧云。夫失精家少腹弦急。陰頭寒。目眩髮落。脈極虛芤遲。清穀亡血。失精。脈得諸芤動微緊。男子失精。女子夢交。桂枝龍骨牡蠣湯主之。（小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白薇附子各三分名二加龍骨湯）

桂枝　芍藥　生薑（各三兩）

甘艸（二兩）　大棗（十二枚）　龍骨

牡蠣（各三兩）

右七味。以水七升。煮取三升。分溫三服。

和劑威喜丸　治丈夫元陽虛憊。精氣不固。餘瀝常流。小便濁。夢寐頻泄。及婦人血海久冷。白帶白濁。白淫。下部常濕。小便如米泔。或無子息。

黃蠟（四兩）　白茯苓（去皮四兩作塊用猪苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出日乾不用猪苓）

右以茯苓爲末。熔黃蠟搜爲丸。如彈子大。空心細嚼。滿口生津。徐徐嚥服。以小便清爲度。忌米

醋，尤忌使性氣，只吃精醋。

東垣柴胡升陽湯　治陽虛下陷。發熱。

柴胡　升麻　葛根

獨活　羌活（各半兩）　防風（二錢半）

甘艸（生二錢、炙二錢）　人參　白芍藥（各半兩）

右㕮咀。每服半兩。水三大盞。煎一盞。去滓。稍熱服。忌冷物冰水月餘。

東垣退熱湯　治表中虛熱。或遇夜則甚。

黃耆（一錢）　柴胡（七分）　生甘艸

黃連（酒製）　黃芩　芍藥

地骨皮　生地黃　蒼朮（各五分）

當歸身　升麻（各三分）

右㕮咀。作一服。水二盞。煎一盞。去滓。食遠溫服。

本事枳實散　治男子兩脇疼痛。

枳實（一兩）　白芍藥（炒）　雀腦芎

人參（各半兩）

右細末。薑棗湯調二錢。酒亦得。食前日三服。

奇效拈痛丸　治九種心痛。

五靈脂　蓬莪朮（煨）　木香

當歸（各等分）

右爲末。煉蜜和丸如桐子大。每服二十丸。食前用橘皮煎湯下。

四七湯（見第十七）

胃風湯

白芷（一錢二分）　升麻（二錢）　葛根

蒼朮　蔓荊子　當歸身（各一錢）

甘艸　柴胡　藁本

羌活　黃蘗　草豆蔻

麻黃（不去節各五分）

水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。溫服。

交加散　治瘈瘲。或顫振。或產後不省人事。口吐痰涎。

此種脈須詳審勿認爲脈脫而藥誤也

當歸　荊芥

右爲細末。每服二錢。水一盞。酒少許。煎七分。溫下神效。

海藏愈風丹（一名舉卿古拜散）　治一切失血。筋脈緊急。產後及汗後搐搦。

荊芥（爲細末）

先以炒大豆黃卷。以酒沃之。去黃卷。取清汁調前末三五錢。和滓服之。輕者一服。重者二服。三

服即止。氣虛者忌服。童便調亦得。

加味逍遙散（見第五十一）

十全大補湯（見第十六）

反關脈第八十

平人無脈。移於外絡。兄位弟乘。陽谿列缺。

平人無脈者。非無脈也。謂寸口脈不應指。而反從尺傍過肺之列缺。大腸之陽谿。剌斜出於外絡。其三部定位。九候淺深。俱與平常應見於寸口者無異。若兄固有之位。弟竊而乘之。此反常異衆之脈。千百中僅一見也。

真藏脈第八十一

病脈既明。吉凶當別。經脈之外。又有真脈。肝絕之脈。循刀責責。心絕之脈。轉豆躁疾。脾則雀啄。如屋之漏。如水之流。如盃之覆。肺絕如毛。無根蕭索。麻子動搖。浮波之合。腎脈將絕。至如省客。來如彈石。去如解索。命脈將絕。蝦遊魚翔。至如湧泉。絕在膀胱。真脈既形。

胃氣已無。參察色證。斷之以臆。（此部正文論終）

已上正文之論脈。首先源派。次及流行。次則左右男女定位。次則五藏陰陽合時。寒熱。則爲之遲數。內外。則別之浮沉。以至虛實異形。正邪各狀。因脈知病。因病識脈。病則該於瘡瘍女幼。脈則窮於奇經反關。可謂明且詳矣。然而諸脈之外。更有所謂真脈者。大關生死。故又審別於卷末焉。夫人稟五行而生。則五行原吾身之固有。外與天地通。內與

一九二一。廾　欽定四庫全書　第50　版反大

以平脉形而脉使人反按自明非吾於詮解者不能述

解散明切

穀神合。是得以黙運潛行。而不顯然彰露。設五藏之元眞敗絶。穀神不將。則五行之死形。各隨藏而見矣。在肝如循刀責責。（強勁弦急按之切手）所謂輭弱輕虚而滑。端直以長者無有也。在心如轉豆躁疾。（前曲後居）（柔滑全無）所謂累累如連珠。如循琅玕者。無有也。在脾如雀啄粒。（堅鋭連屬）如屋之漏。（許久一滴二脉作踈作數）如水之流。（去而不返）如杯之覆。（止而不撈）所謂和柔相離。如雞踐地者。無有也。在肺如毛。無根蕭索。（上則微浮下則斷絶）麻子動揺。

（微散而亂）浮波之合。（浮促無根）所謂厭厭聶聶。如落楡莢者。無有也。在腎至如省客。（省問之客一至即去）來如彈石。（彈搏而來）（所藏盡出）去如解索。（解散而去欲盡無入）所謂喘喘累累如鈎。按之而堅。若無有也。在命門右腎。與左腎同。但内涵相火。故其絶也。如蝦之游。如魚之翔。忽爾靜中一躍。火欲絶而忽焰之象也。在膀胱至如涌泉。（泛濫不收）以其藏津液而爲州都之官。故絶形如此。蓋脉之和柔得體者。胃氣與之俱耳。胃氣者。即生生水穀之氣也。胃氣微少。亦成病。何況於無。無則生生之根本先絶。而五藏欲自持久。不可得矣。若能再察色證而以臆斷之。理當不爽。

醫燈續焰卷十七　終

醫燈續焰卷十八（補遺）

錢塘後學潘　楫碩甫補

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人　陳潘杲中旋　馮子異西平　校

正文病頗多矣。考之方書。尚缺多種。皆屬常見之疾。何可竟無方治。今補入。

嘈雜

嘈雜一證。有火。有痰。有飲。有虫。雖云多種。而源則不離乎脾胃。膏粱之人。每多患此。其發也。如饑之欲食。甚則煩怫雜亂。與吞酸。吐酸。乾嘔。胃痛等疾。皆爲噎膈反胃之漸。宜（三聖丸越鞠丸之類挾痰者二陳加梔連挾飲者丹溪導飲丸挾虫者烏梅圓酒煮黃連丸之類）

附方

三聖丸　治嘈雜神効

白朮（四兩）　橘紅（一兩）　黃連（五錢炒）

右爲細末。神麯糊丸。如菉豆大。每服七八十丸。食遠津唾下。薑湯亦得。

越鞠丸（見第四十一）

二陳湯（見第十六）

丹溪導飲丸　治水飲嘈雜

吳茱萸（三錢）　白茯苓（一兩）　黃連（五錢）

蒼朮（一兩炒）　獨活（七錢）

右爲細末。神麯糊丸服。

烏梅圓（見第六十三）

酒煮黃連丸（見第五十五）

吞酸吐酸

吞酸與吐酸。大同小異。吞酸酸在胸胃。忽作忽止。黃胃刺心。吐酸酸水酸物。隨吐而出。味如釀醋。甚喉輒齒。是皆形寒胃冷。食鬱飲停。穀氣不分。中[illegible]鬱。會正猶釀酒不發。過時而成酸味也。天[illegible]之[illegible]以異者。吞則胃中飲少。吐則胃中飲多耳。間有[illegible]

火者。乃熱不得散。屬木者。乃氣不得伸。火不散者發之。木不伸者達之。故統宜温中散寒。令鬱滯開而病自愈矣。（宜發明藿香安胃散加減二陳湯三因麴朮丸二陳加茱連神麴蒼朮方）（酒煮黃連丸）

附方

藿香安胃散（見第二十）

加減二陳湯　治痰飲爲患。嘔吐。頭眩。心悸。或因食生冷。脾胃不和。吞酸吐酸等證。

丁香（一兩）　半夏　陳皮（各五兩）

茯苓（三兩）　甘草（一兩半）

右㕮咀。每服四錢。水煎。入生薑三片煎服。

三因麴朮丸　治中脘宿食留飲。酸蜇心痛。口吐清水。

神麴（炒三兩）　蒼朮（泔浸三宿洗淨日乾炒一兩半）

右爲末。生薑汁別煮神麴糊爲丸。薑湯送下。

二陳加茱連神麴蒼朮方

陳皮（一錢）　白茯苓（一錢）　蒼朮（炒一錢二分）

黃連（吳茱萸汁煮炒一錢）　神麴（炒一錢）

水二鍾。生薑一片。煎八分服。

酒煮黃連丸（見第五十五）

噎膈

噎者。食入不利。或梗塞而下。或負痛而納。其病在喉。膈者。食雖入膈。或氣逆。或滿悶。或隱痛。或得噯少寬。或得吐反快。其病在膈。二疾多並見。噎者必膈。膈者必噎也。即胸胃之先驅。積鬱沉憂。氣結不散。久久成此。張雞峯方論曰。此病不在外。不在內。不屬冷。不屬熱。不是實。不是虛。所以藥難取效。多緣憂思恚怒。動氣傷神。氣積於內。動則諸證見。氣靜疾平。手捫之而不得疾之所在。目視之而不知色之所因。耳聽之而不知音之所發。故鍼灸藥石。皆不獲効。乃神意間病也。旨哉言乎。（宜生薑半夏湯香砂寬中湯五膈寬中散蔡神嘉禾散絕吉補氣運脾湯代抵當丸之類選用）

附方

生薑半夏湯　止嘔吐。開胃消食。

半夏　生薑（各三錢）

右㕮咀水二盞煎七分服

統旨香砂寬中湯　治氣滯、胸痞噎塞。或胃寒作痛。

木香（臨服時磨水入藥三四匙）　白朮（炒）

陳皮　香附（各一錢五分）　白豆蔻（去殼）

砂仁（去殼）　青皮　檳榔

半夏麴　白茯苓（各一錢）　厚朴（薑製一錢二分）

甘艸（三分）

水二鍾薑三片。煎八分。入蜜一匙。食前服。

和劑五膈寬中散　治七情四氣。傷于脾胃。以致陰陽不和。胸膈痞滿、停痰氣逆。遂成五膈。并治一切冷氣。

白豆蔻（去皮二兩）　甘艸（五兩）　木香（三兩）

厚朴（去皮薑汁炒一斤）　縮砂仁（去殼）　丁香

青皮（去白）　陳皮（去白各四兩）　香附子（炒去毛十六兩）

右為細末。每服二錢。薑三片。鹽少許。不拘時、沸湯點服。

和劑穀神嘉禾散　治脾胃不和。胸膈痞悶。氣逆生痰。不進飲食。或五噎五膈。

白茯苓（去皮）　縮砂仁（去皮）　薏苡仁（炒）

枇杷葉（去毛薑汁炙香）　人參（去蘆各一兩）　白朮（炒二兩）

桑白皮（炒）　檳榔（炒）　白豆蔻（炒去皮）

青皮（去白）　穀蘗（炒）　五味子（炒各半兩）

沉香　杜仲（去皮薑汁酒塗炙）　丁香

藿香　隨風子　石斛（酒和炒）

半夏（薑汁搗和作餅炙黃色）　大腹子（炒）

木香（各七錢半）　甘艸（炙二兩）　陳皮（去白）

神麴（炒各二錢半）

每服三錢。水一盞。薑三片。棗二枚。煎七分。不拘

時温服。五噎。入乾柿一枚。膈氣吐逆。入薤白三寸。棗五枚。

統旨補氣運脾湯　治中氣不運。噎塞。

人參（二錢）　白朮（三錢）　橘紅

茯苓（各一錢五分）　黄耆（蜜炙一錢）　砂仁（去皮八分）

甘艸（炙四分）　有痰加半夏麴（一錢）

水二鍾。薑一片。棗一枚。煎八分。食遠服。

代抵當丸　治瘀血噎膈。食下疼痛。方見第二十

自汗

自汗者。不因勞動。不因天暑。不因熱飲食。時時汗自出。故曰自汗也。乃衛氣虛而不能固密。心液因之漏泄。（宜當歸補血湯倍黄耆玉屏風散保元湯黄耆建中湯之類）若表中風邪者。亦能令衛勝疏。而汗時自出。此邪去則汗止。（宜桂枝湯）

附方

當歸補血湯（見第十六）

解盜汗之因

[illegible]莿節

得效玉屏風散　治自汗。

防風　黄耆（各一兩）　白朮（炒二兩）

每服三錢。水二盞。薑三片。煎六分。不拘時温服。

保元湯　治自汗無休止。

黄耆（蜜炙三錢）　人參（二錢）　甘艸（炙一錢）

水二盞。煎七分。温服。

黄耆建中湯（見第三十三）

桂枝湯（見第十九）

盜汗

盜汗者。睡中偷出。多發於夜。如盜之乘人不覺而夜出也。屬陰虛。盜人之衛氣。晝行於陽出外。夜行于陰。入內。入內則內熱。內熱。則不足之陰受其蒸。入內。則表虛。表虛。則蒸泄之液無從固。於是陰失其守。陽失其衛。而汗淋漓于睡夢闌者有矣。（宜當歸六黄湯大建中湯之類）

附方

當歸六黃湯　治盜汗久不愈。面白黃。肌瘦。或夜熱骨蒸。飲食減少。四肢無力。足膝酸疼。發無虛夜。服此神效。

當歸　生地黃　熟地黃

黃蘗　黃芩　黃連（各一錢）

黃耆（二錢）

右作一服。水二鍾。煎一鍾。臨卧服。

大建中湯　治虛熱盜汗。百節酸疼。肢體倦怠。日漸羸弱。口苦舌澁。心怔短氣。

綿黃耆（炙）　遠志（燈心煮去心）　當歸（酒洗）

澤瀉（各二錢）　白芍藥　龍骨（煅）

人參（各一錢五分）　炙甘艸（一錢）

右作一服。水二鍾。薑五片。煎一鍾。食前服。氣弱。加炮附子（二錢）。腰痛筋急。加官桂。（去皮一錢）

悸怔忡

準繩云。悸即怔忡。今歷觀病狀。則二證少有分別。悸則心中微動。如恐如驚。怔忡則心胸振築。莫知其來。忽爾寧寂。莫知其去。甚則頭目眩暈。神氣若浮。蓋悸之重者也。大抵因痰積飲停。氣衝火擊所致。（宜導痰湯溫膽湯茯苓甘草湯薑术湯之類）亦有中氣虛而忡悸者。（宜補中益氣湯四君子湯六君子湯小建中湯黃耆建中湯之類）亦有心經氣血不足。火不定。神不安而忡悸者。（宜四物湯朱雀丸當歸補血湯經驗定心丹之類）有心液過耗。汗多亡陽。脉代而忡悸者。（宜炙甘草湯）

附方

導痰湯（見第四十一）

溫膽湯（見第二十）

茯苓甘艸湯　治心下停水忪悸。

白茯苓（去皮）　桂枝（各三錢）　生薑（半兩）

甘草（二錢）

水二鍾。煎一鍾。不拘時服。

薑术湯　治停飲怔忡。

白薑（生）　白朮　茯苓

半夏麴（各一錢）　辣桂　甘草（各五分）

水一鍾。薑三片。紅棗一枚。煎六分。不拘時服。

補中益氣湯（見第三十九）

四君子湯（見第十六）

六君子湯（見第十六）

小建中湯（見第六十九）

黃耆建中湯（見第三十三）

四物湯（見第二十一）

朱雀丸（見第五十一）

當歸補血湯（見第十六）

經驗定心丹（楷自製）

茯神（去皮木一兩）　遠志（酒浸輭去心五錢）　人參（去蘆八錢）

沉香（黑重沉水者三錢不見火）　龍骨（煅七錢）

懷生地（洗去土一兩半）　當歸身（酒洗一兩）　白芍藥（酒炒八錢）

丹參（去蘆一兩）　桂枝（去骨三錢）　甘草（炙二錢）

荷葉（出水面未開者焙乾一個）

爲極細末。煉蜜爲丸如菉豆大。用上好水飛過朱砂爲衣。每服二錢。食遠白湯下。午後勿服。此方驗過多人矣。

炙甘草湯（見第三十三）

健忘

道過之言。行過之事。久不記憶曰忘。若當下即不能記。索之胸臆。了不可得者。健忘也。乃心虛腎憊水火不交。精血之府空。榮衛之道澁。致令機關不利。靈巧不開。高年衰朽者。多得之。（宜歸脾湯讀書丸朱雀丸二參丸開心散之類）亦有痰血瓣積。礙其機關而成者。此又不以年高論也。（宜壽星丸導痰湯代抵當丸選用）

附方

歸脾湯（見第五十八）

讀書丸

石菖蒲　菟絲子（酒煮）　遠志（酒浸去心各一兩）

地骨皮（去骨洗淨二兩）　生地黃　五味子

川芎（各一兩）

右爲末。蒲糊丸桐子大。每服七八十丸。臨卧白湯下。

朱雀丸（見第五十一）

二參丸　治健忘。養神定志。和血安神。外華腠理。

天門冬（去皮）　熟地黃（酒蒸搗）　丹參（各一兩半）

白茯苓（去皮）　麥門冬（去心）　甘草（各一兩）

遠志（酒浸去心）　人參（去蘆各半兩）

右爲細末。煉蜜和丸如桐子大。以朱砂研極細。水飛過半兩。爲衣。每服五十丸。加至百丸。空心煎愈風湯送下。（愈風湯係潔古方其方三十三味皆風藥繁雜之甚故不錄今只以白湯送之）

開心散　治好忘。

石菖蒲（一兩）　白茯苓（去皮二兩）　遠志（去皮）

人參（去蘆各二錢半）

右爲細末。每服一錢。食後米飲調下。

壽星丸　治痰滯經絡多忘。（方見第五十八）

導痰湯（見第四十一）

代抵當丸　治瘀血喜忘。（方見第二十）

不寐

難經四十六難曰。老人寤而不寐。少壯寐而不寤者何也。然經言少壯者。血氣盛。肌肉滑。氣道通。榮衛之行。不失其常。故晝日精。夜不寤。老人血氣衰。

肌肉不滑。榮衛之道濇。故晝日不能精。夜不寐也。故知老人不得寐也。（宜八珍湯歸脾湯之類）　虛勞虛煩不得眠者。（宜仲景酸棗仁湯）　膽虛驚悸不寐者。（宜溫膽湯六君子湯之類）　痰飲停中。煩惑不合目者。（宜內經半夏湯導痰湯之類）

八珍湯（見第十六）

歸脾湯（見第五十八）

仲景酸棗仁湯　治虛勞虛煩不得眠。

酸棗仁（二升）　甘艸（一兩）　知母

茯苓　芍藥各二兩　澤瀉　有生薑二兩

右五味。以水八升，煮酸棗仁得六升。內諸藥，煮三升，分溫三服。

溫膽湯　見第二十

六君子湯　見第十六

內經半夏湯　治陰陽之氣偏勝，不相和諧，陽不得入陰。故不瞑不寐。服此陰陽通，臥可立至。黃帝所謂決瀆壅塞，經絡大通，陰陽和得者也。亦

[illegible]夏轉相見[illegible]之內經信不[illegible]矣

治痰氣阻塞，陽不入陰，成上證。大抵轉動樞機，則陰陽自諧矣。其湯方，以流水千里以外者八升，揚之萬遍，取其清五升，煮之。炊以葦薪火，沸置秫米一升（秫米，北人謂之黃米，可以釀酒），治半夏五合，徐炊，令竭為一升半，去其滓，飲汁一小杯，日三，稍益，以知為度。故其病新發者，覆杯則臥，汗出則已。久者，三飲而已也。

導痰湯　見第四十四

呃

呃，即噦也。有火，有痰飲，有寒，有虫，有食，有胃虛，有腎虛，種種不同，但虛寒者，十九。然必細察得之久暴，聲之遠近，形之盛衰，及病之所由起，則施治自多功也。蓋潛行默運，無聲無臭者，中氣之常也。若有所激，氣即為火，易其常性，卒暴上衝，仍欲其潛行默運，無臭無聲，安可得乎。至若痰飲停中，礙其清道，陰寒迫裏，遏其陽升，或蛔卒動而氣阻，或食

暴入而氣壅，或胃氣虛於上而氣不舒，或腎氣虛於下而氣不續，皆能撓挫運機，行不順利，而呃呃之聲，有自來矣。故因於火者，其聲頻以促，兼面赤而脈數（宜二陳湯加山梔黃連之類）。因於痰飲者，其聲緩勻，兼吞酸面澤而脈滑（宜二陳湯溫膽湯導痰湯之類）。因於陰寒者，其聲短，而聲呃呃不揚，兼面色青白，惡寒而脈緊（宜二陳湯加乾薑丁桂之類）。因於虫者，其聲或作或止，或緩或促，兼面色不一，胃中或痛，或吐清水冷涎，或心中嘈

雜。脉遲數大小不定。（宜二陳湯去甘草加吳茱萸製黃連乾薑細辛之類）因於食者。其聲濁而頻嘔。兼噯逆酸腐。惡食。面黃脉緊滑。（宜和劑枳實半夏湯麯蘗枳术丸法製陳皮法製檳榔之類）因胃氣虛寒者。其聲促而無力。或得食少止。面青白畏寒。脉緩弱無力。（宜六君子湯四君子湯橘皮竹茹湯理中湯絜古柿錢散之類）因腎氣虛寒者。其聲遠而長。或作或止。半刻一聲。臍下或動築。面黑。腰疼。或足冷惡寒。脉沉微。（宜金匱腎氣丸良方參附湯之類）

附方

二陳湯（見第十六）

溫膽湯（見第二十）

導痰湯（見第四十一）

和劑枳實半夏湯

枳實（麩炒）　半夏（各等分）　加麥蘗（炒）

每服七錢。水二盞。薑五片。煎八分。溫服無時。

麯蘗枳术丸（見第二十）

法製陳皮　消食化氣。寬利胸膈。美進飲食。

茴香（炒）　甘草（炙各二兩）　青鹽（炒一兩）

乾生薑　烏梅肉（各半兩）　白檀香（二錢半）

右六味為末。外以陳皮半斤。湯浸去白。淨四兩。切作細條子。用水一大盞。煎藥末三兩。同陳皮條子一處慢火煮。候陳皮極軟。控乾少時。用乾藥末拌勻。焙乾。每服不拘多少。細嚼。溫薑湯下。無時。

法製檳榔　治酒食過度。胸膈膨滿。口吐清水。一切積聚。

雞心檳榔（一兩切作小塊）　縮砂（取仁）

白豆蔻（取仁）　丁香（切作細條）　粉草（切作細塊各一兩）

陳皮（去白切作細條）　生薑（切作細條各半斤）　鹽（二兩）

右用河水二碗。浸一宿。次日用慢火砂鍋內煮乾。焙乾。入新瓶收。每服一撮。細嚼酒下。或為細末。湯調服亦可。

六君子湯（見第十六）

四君子湯（見第十六）

橘皮竹茹湯　治胃虛寒、嘔逆、或呃、

陳皮（二升）　竹茹（二升）　大棗（三十枚）

生薑（半斤）　甘草（五兩）　人參（一兩）

以水一斗。煮取三升。溫服一升、日五服。

理中湯（見第十七）

潔古柿錢散　治胃虛寒呃逆。

柿錢　丁香　人參（各等分）

右為細末。水煎。食後服。

金匱腎氣丸（見第十六）

良方參附湯　治陽氣虛寒、自汗惡寒、或手足逆冷、大便自利。或臍腹疼痛、呃逆不食、或汗多發痙等證。

人參（一兩）　附子（炮五錢）

右薑棗水煎、徐徐服。去人參。加黃耆、名耆附湯。

面

夫手足六陽之脈、皆上至頭、而面為諸陽之會、胃足陽明之脈、又起於鼻之交頞中、故面獨能耐寒也、設反惡寒、及面寒者。胃寒惡熱、及面熱者、胃熱面寒者、面多青白。面熱者、面多赤面黃而斑駁者、胃中虫積面黃而已食如饑者、胃疸。面腫者。胃風面瘡者、胃火、膏粱積熱、以胃脈起於面。故面病多屬胃、亦有面瘡之屬脾肺風熱、面塵之屬肝膽燥

熱。面皯黯之屬風濕痰飲。又不獨一陽明胃也。宜後方選對證者、主治之。

附方

升麻胃風湯　治胃風面腫或麻木。牙緊目瞤。

升麻（二錢）　白芷　當歸

葛根　蒼朮（各一錢）　甘草（一錢）

柴胡　藁本　羌活

黃蘗　草豆蔻（各三分）　麻黃（五分不去節）

蔓荆子（二分）

薑一片。棗一枚。水二盞。煎七分。食後服。

升麻順氣湯　治憂思。飲食失節。面色黧黑。心懸氣促。

升麻（一錢半）　乾葛　防風

白芷　黄耆　人參（各一錢）

白芍藥（六分）　甘艸　蒼术（各五分）

水二盞。薑一片。大棗一枚。煎七分。食遠溫服。

犀角升麻湯　治陽明經絡受風熱。口唇。頰車髮鬢腫痛。及鼻額間。連頭面痛。口不可開。雖能言語。有妨飲食。亦治面熱。

犀角（七錢半）　川升麻（半兩）　防風

黄芩（各三錢半）　香白芷　白附子、

川芎（各二錢半）　羌活（三錢一字）　生甘草（一錢半）

右㕮咀。都作一服。水五盞。煎至三盞半。去滓。分作三服。一日一服。訖。其證必減。如識府有些澹

不妨。足陽明。胃經也。經云。腸胃爲市。又云。陽明多血多氣。胃之中。腥羶五味。無所不納。如市廛無所不有也。六經之中。血氣俱多。腐熟飲食之毒。聚於胃。故此方以犀角爲主。升麻佐之。入胃經。餘藥皆滌除風熱。用之有効也。

補胃湯　治胃虛惡寒。面目浮腫。亦治面寒。

柏子仁　防風　細辛

桂心　陳皮（各一錢）　川芎

吳茱萸　人參（各一錢半）　甘草（五分）

水二鍾。煎七分。食遠溫服。

茯苓桂枝五味子甘艸湯加大黄　治欬逆。倚息不得卧。面熱如醉。此爲胃熱上衝。熏其面故耳。

七白散　治面䵟面垢。

白歛　白术　白牽牛

白附子　白芷　白芍藥

白殭蠶（各等分）

爲末。每用五錢煎湯洗之

洗面藥　治面生䵟䵳。或生小瘡。或生痱痤。粉刺皮膚瘙癢。面垢。

皂角（三斤）　升麻（八兩）　楮實子（五兩）

菉豆　白芨　白芷

天花粉（各一兩）　甘松　砂仁

白丁香（各五錢）　三奈（三錢）

右爲末。糯米飯搗丸。如彈子大。量用洗面。

面上五色瘡方

用鹽湯綿浸搨瘡上。日五六度

面上豆瘢或斑䵟黯方

用密佗僧細末。夜以人乳汁調敷。

面上粉刺方

用不語唾塗之。或搗兔絲子汁塗。或以白礬末少許酒調塗。（不語唾。恐是平旦未言語先者。）

斗門方　治黑䵟令面色好

白殭蠶　黑牽牛　北細辛（各等分）

爲粗末。作澡豆。又去小兒胎穢。

指爪破面方

用生薑自然汁。調輕粉敷破處。無瘢瑕

又方

橄欖汁敷之。無痕

平胃散

面瘡。水調平胃散塗之。

白附子散　治面上熱瘡似癬。或生赤黑斑點。

白附子　密佗僧　白茯苓

白芷　定粉（各等分）

右爲末。先用蘿蔔煎湯洗面淨。後用羊乳調。至夜敷患處。次早洗去。效。

祛風白芷散　治面上風癬瘡。

白芷（三錢）　黃連　黃檗

黃丹（各二錢）　茯苓（一錢五分）　輕粉（一錢）

右爲細末。用油調搽癬瘡上。或加孩兒茶二錢麝香二分亦可。

目

靈樞大惑論曰。五臟六府之精氣。皆上注于目而爲之精。精之窠爲眼。（窠者窩也。聚精成窩。搏結之義。）骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲絡。（大小眥赤絡）其窠氣之精爲白眼。肌肉之精爲約束。裹擷。（上下眼胞。爲目約裹。）筋骨血氣之精而與脈并爲系。（衆精并脈以系于目）上屬於腦後。

出于項中。又曰。瞳子黑眼法于陰。白眼赤脈法于陽。故陰陽合轉而精明也。觀是論。則後人診眼疾而分五輪八廓者。蓋本乎此。其所云氣輪者。金精之騰結也。卽經所謂窠氣之精爲白眼。白眼屬肺。肺主氣。故曰氣輪。肺在行爲金。金至堅。故白珠獨堅實。風輪者。木精之騰結也。卽經所謂筋之精爲黑眼。黑眼屬肝。肝主筋。在行爲木而應風。故曰風輪。風性動。故黑精左右不定而色帶青也。血輪者

道藏目中底經真瞳子之謂家也

火精之騰結也。卽經所謂血之精爲絡。絡屬心。心主血。故曰血輪。心在行爲火。火有君相二種。故眥分于兩角。無正輪也。肉輪者。土精之騰結也。卽經所謂肌肉之精爲約束裹擷。屬脾。脾主肌肉。故曰肉輪。脾在行爲土。土包萬物。該四藏。四藏皆爲裹束。故開則動而萬用。閉則靜而萬寂矣。水輪者。水精之騰結也。卽經所謂骨之精爲瞳子。瞳子屬腎。腎主骨。在行爲水。故曰水輪。水爲天一之精。故獨

得居中。內有大絡六。以通心肺脾。肝。腎。命門。中絡六。以通膽。胃。大小腸。三焦。膀胱。外有小細之絡。莫知其數。（其絡明視之了了可數卽禽獸異類皆有此也）皆血貫於腦。下達臟府。通暢血氣往來以滋於目。故凡病目。則有形色經絡顯見而可驗內之何藏何府受病。外有二竅。以通其氣。內涵諸液。出而爲淚。更有神膏。神水。神光。真氣。真精。皆滋目之源液也。神膏者。目內包涵膏液。破則黑稠水出。由膽中滲潤精汁積成。

敘眼之生成如秋水出

涵養瞳神。衰則有損、神水者、由三焦發源、先天真一之氣所化、在目之內、不可得見、觸物損破。則見黑睛、形如稠痰、在目之外者、即目上潤澤之水也。水衰、則有火勝燥熱之患。水竭、則有目輪大小之疾、耗澁、則有昏眇之危、虧者多。盈者少、神光者。目自視之精華也。心火發源。膽火用事、夫神之于人也、亦大矣、不獨一視為然。即行走執捉、言笑聽聞。無神宰宰、則塊然一形而已。真血者、職藏在肝。升以滋目。指五藏六府經絡之血、非肌膚散漫之血。故曰真也。真氣者、以經絡滋養、必先氣呴而後血濡、即發生真一之元氣也。真精者。即先後二天。真元化汁。根於腎、施於膽、以及瞳仁之精也。凡此數者。一有所損。則目病矣。大槩目形圓而長。外有堅殼數重、中含清脆、內包神膏、膏外神水。水外皆血、血以滋水。水以滋膏。膏內一點黑瑩。即是腎膽所聚之精華也。唯此一點、空明淨徹。燭照無窮。是曰

水輪、然必三者具而後靈明全。三即膽汁。腎精。心神也。五輪足而外應溥、五即氣風血肉水也。合之渾然、分之井然、水為體、火為用、氣為運動。神為維持、妙合陰陽。光同日月。午前小。午後大。隨天地之盈虧、男左勝。女右勝、別陰陽之稟賦、至若剛柔壽夭、詐直智愚。皆能以目驗知、神哉寶乎。更有八廓其說以八卦八方。內配藏府、分別經絡。似亦有理。前五輪說中。已悉其義、今不更贅、唯錄八廓之名。以備考證。一曰傳送廓、應乾卦、位居西北。絡通大腸而屬肺。二曰津液廓。應坎卦、位居正北。絡通膀胱而屬腎。三曰會陰廓。應艮卦、位居東北、絡通上焦而配屬命門、四曰清淨廓、應震卦。位居正東。絡通膽而屬肝。五曰養化廓、應巽卦、位居東南。絡通中焦而配屬肝絡。六曰胞陽廓、應離卦、位居正南、絡通小腸而屬心。七曰水穀廓、應坤卦、位居西南、絡通胃而屬脾、八曰關泉廓。應兌卦、位居正西。絡

只此數行能胸中領畧眼科算門却步倍矣

道下焦而配屬腎絡、以六配八。餘二無配。專肝絡腎絡配之者。蓋目根源於腎。專竅於肝。故較他藏爲獨勝焉、已上五輪八廓之生成配合也。知此。則知內傷者、內動臟氣、災及五輪。外感者、不從臟變。外邪先襲於絡。由絡及廓。由廓及輪、故內傷見證。不腫不痛。痛亦不甚。或視物漸覺不明。或遇晚即爲矇瞀。（俗名雞盲亦名雀目）或羞明畏日、或不能久視。遠視或澁不欲開。或眼胞收小。或倒睫拳毛。或青翳白

膜。或白珠黃色。黑睛藍色。或瞳仁散大。或緊小。或欹側。或兩眥膚糊。或弦爛。或淚流。或視物以一爲二。以紅爲白。以正爲斜。以曲爲直。種種由漸而成者。屬內傷臟也。陰也。外感見證。則發如風火。癢痛不堪。或中如砂石。或外見瘡瘍。或膚淚不時。或星障卒起。或向天日如針刺。或近燈燭如火烘。或兼鼻塞齒疼。或兼身熱頭痛。種種卒暴而來者。屬外感。府也。陽也。是故病府者易愈。病臟者難瘳。臟則視其何藏何因。府則視其何邪何絡而後調之。散之。補之。瀉之。溫凉升降。在圓機者自爲斟酌也。學

方

附方

簡易補肝散　治肝虛目睛疼。冷淚不止。筋脈痛。及羞明怕日。

夏枯草（五錢）　香附子（一兩）

右爲末。每服一錢。臘茶調下。服無時。

本事菊花散　治肝腎風毒氣上衝眼痛。

甘菊花　牛蒡子（炒各八兩）　防風（三兩）

白蒺藜（去刺一兩）　甘草（一兩五錢）

右爲細末。每服二錢。熱水調下。食後臨臥。

瀉青丸　治眼暴發赤腫疼痛。方見第四十九

局方湯泡散　治肝經風熱上壅。眼目赤澁睛疼多淚

赤芍藥　當歸　黃連（各等分）

右爲末。每二錢湯頓調。熱洗。日三五次。御藥院方。加荊芥。

湯泡散　治肝經風熱攻眼。赤腫羞明。漸生瞖膜。

杏仁　防風　黃連（去鬚）

赤芍藥　當歸尾（各半兩）　銅青（二錢）

薄荷葉（三錢）

右剉散。每用二錢。極沸湯泡。乘熱先熏後洗。冷則再煖用。日兩三次。一方入白鹽少許。閉目沃洗。鹽亦散血。

分珠散　治眼患血灌瞳神。惡血不散。

槐花　白芷　地黃

梔子　荊芥　甘草

黃芩　龍膽草　赤芍藥

當歸（各一兩）

右水煎服。春加大黃瀉肝。夏加黃連瀉心。秋加桑白皮瀉肺。

久效過赤

清涼散　氷瑕深瞖。

蔓荊子　荊芥　苦竹葉

甘草（各半兩）　梔子（二錢半）

右薄荷水煎服。

二黃散　治努肉攀睛

黃芩　大黃　防風

薄荷（各等分）

右水煎。入蜜少許。食後服。

照水丸　治瞖神驗。

海螵蛸　蛤粉（南康真者各五分）　片腦（半分）

黃蠟（五分）

右末先熔蠟攪微冷。入末和爲丸。如麻子大。帶臨些。臨卧納眼中瞖膜上。次日照水自落。

千金磁朱丸　治神水寬大漸散。昏如霧露中行。漸覩空中有黑花。漸覩物成二體。久則光不收。及內障神水淡綠色。淡白色者。

磁石（吸針者）　辰砂　神麯

先以磁石置巨火中煆。醋淬七次。晒乾。另研極細二兩。辰砂另研極細一兩。生神麯末三兩。與前藥和勻。更以神麯末一兩。水和作餅。煮浮爲度。撈入前藥煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸。加至三十丸。空心飯湯下。（按此方磁石法水。入腎。朱砂法火。入心。而神麯尊入脾胃。乃道家黃婆媒合嬰姹之理。或加沉香半兩。升降水火尤佳）

煮肝散　治內外障翳眼。

右用猪肝二兩。批開。以夜明砂末二錢七。摻在肝內。麻繩縛定。用水一盞。煮令肝轉色白。取出爛嚼。用煮肝湯送下。食後服。

洗眼方　治內外障。翳膜赤脉昏澀。

右以桑條。於二三月間採嫩者。曝乾。淨器內燒過。令火自滅。成白灰。細研。每用三錢。入磁器或銀石器中。以沸湯泡。打轉候澄。傾清者入於別器內。更澄。以新綿濾過。極清者。置重湯內令熱。

開眼淋洗。逐日一次。但是諸眼疾皆效。

菊睛丸　治肝腎不足。眼昏。常見黑花。多淚。

枸杞子（三兩）　蓯蓉（酒浸炒）　巴戟（去心各一兩）

甘菊花（四兩）

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服五十丸。溫酒鹽湯食遠任下。余太宰方。加熟地黃二兩。

駐景丸　治肝腎虛。眼昏翳。

熟地黃　車前子（各三兩）　兔絲子（酒煮五兩）

爲末。煉蜜丸。桐子大。每服五十丸。食前白茯苓石菖蒲湯任下。又方加枸杞子一兩半。尤佳。

枸杞子酒　治肝虛當風眼淚。

右用枸杞子最肥者。二升。搗破。內絹袋。置罐中。以酒一斗浸訖。密封勿泄氣。候三七日。每日取飲之。勿醉。

地芝丸　治能遠視。不能近視。亦能治脉風成癘。

生地黃（焙）　天門冬（去心各四兩）　枳殼（炒）

甘菊花（去蒂各二兩）

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服一百丸。茶清送下。

定志丸　治能近視。不能遠視。

遠志（去心）　菖蒲（各二兩）　人參

白茯苓（去皮各一兩）

爲細末。煉蜜丸。以朱砂爲衣。每服十丸。加至二十丸。食後米飲下。

耳

素問陰陽應象大論曰。腎主耳。在竅爲耳。靈樞脉度篇曰。腎氣通於耳。腎和。則耳能聞五音矣。五閱五使篇曰。耳者。腎之官也。金匱真言又曰。南方赤色。入通於心。開竅於耳。是耳一也。爲兩藏共開之竅。豈非心腎交通。水火相濟之義乎。若二藏不和。虛實寒熱。皆能上致耳疾。即經絡之過於耳者。亦皆能作疾。如靈樞經脉篇曰小腸手太陽之脉。入耳中。其病耳聾。三焦手少陽之脉。從耳後。入耳中。出走耳前。其病耳聾渾渾焞焞。大腸手陽明之別脉。入耳。合宗脉。實則齲聾。口問篇曰。耳中鳴者。宗脉之所聚也。胃中空。則宗脉虛。虛則下溜而脉竭故上虛而鳴。選方四首。

附方

清神散　治風氣壅上。頭目不清。耳常重聽。

殭蚕　菊花（各一兩）　荆芥

羌活　木通　川芎

香附　防風　菖蒲

甘草（各二錢）

爲末。每三錢。食後臨卧茶清下。

磁石湯　治腎虛耳聾。面黑。饑不欲食。腰脇背痛。

磁石　五味子　杜仲

白术　白石英（各二錢）　黄耆

白茯苓（各一錢）

水煎服

益腎散　治腎虚耳聾

磁石　巴戟　沉香

菖蒲　川椒（各一兩）

爲末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥

用濕紙十重包裹煨熟空心細嚼酒下

犀角飲子　治風熱上壅耳聾腫痛膿水流出

犀角　菖蒲　木通

玄參　赤芍藥　赤小豆

甘菊花（各五分）　甘艸（二分半）

薑煎温服

鼻

素問金匱真言曰西方色白入通於肺開竅於鼻陰陽應象大論曰肺主鼻在竅爲鼻脉度篇曰肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣五藏別論曰五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻爲不利也氣厥論曰膽移熱於腦則爲辛頞鼻淵經脉篇曰胃足陽明之脉起於鼻之交頞中其病爲鼽衄大腸手陽明其病亦爲鼽衄膀胱足太陽亦爲鼽衄又曰脾熱者鼻先赤選方七首

附方

通氣湯　治鼻塞不聞香臭

羌活　獨活　蒼术

防風　升麻　葛根（各六分）

白芷　甘草　川椒（各二分）

冬月加麻黄二分薑棗葱白煎服

防風散　治鼻淵腦熱滲下濁涕不止

防風（五分）　黄芩　人參

甘草　川芎　麥門冬（各二分）

爲末食後沸湯調服

单南星飲　治風邪入腦宿冷不消鼻内結物壅塞腦氣遂流濁髓

南星爲細末每二錢用棗七枚甘艸少許同煎食後服三四服其物自出涕自收外貼蓽撥餅

蓽撥餅

蓽撥　香附　大蒜（等分）

搗作餅紗襯炙熱貼顖門上用熨斗火熨透其涕自止

瓜礬散　治鼻痔肉化水自下

瓜蒂（四錢）　甘遂（一錢）　白礬（枯）

螺殼（四錢）　草烏尖（各五分）

爲末真麻油調丸如鼻孔大每日一次以藥入鼻內令著痔肉上

芷荑散　治鼻流濁涕

白芷（一兩）　辛夷（五錢）　蒼耳仁（三錢半）

薄荷（五分）

爲末每二錢葱茶清調服

鼻衂不止方

鮮生地搗汁飲之立止蘿蔔汁無灰酒和服陰煉人中白溫湯調服及单飲童便俱妙

口脣

金匱真言論曰中央黃色入通於脾開竅於口五藏生成論曰脾之合肉也其榮脣也六節藏象論曰脾胃之華在脣四白脉度篇曰脾氣通於口脾和則口能知穀味矣經脉篇曰大腸手陽明之脉挾口交人中其病爲口乾胃足陽明之脉挾口交

承漿其病口喎脣胗（胗即瘡疹字通用）足少陽病爲口苦足太陰終者脣反衛氣失常篇曰脣青黃赤白黑黑者病在肌肉邊方四首

附方

瀉白湯　治大腸實熱便結臍痛口瘡

橘皮　竹茹　黃芩

山梔　黃檗（各五分）　芒硝

茯苓（各一錢）　生地黃（三錢）

薑棗煎服

黃檗散　治蠒脣

黃檗（二兩）　五倍子　密陀僧（各二錢）

甘草（二分）

爲末水調塗黃檗上炙乾再塗藥盡爲度後將黃檗切作薄片貼蠒脣上

·五福化毒丹（見第七十八）

氷檗丸　治口舌生瘡

黃檗　薄荷　硼砂（各等分）

氷片（減半）

爲末蜜丸彈子大每噙化一丸

舌

陰陽應象大論曰心主舌在竅爲舌脉度篇曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣夫言出于心非舌不能發故云舌者心之苗其色赤其形尖而善動火之象也經脉篇曰脾足太陰之脉連舌本散舌下其病舌本強及舌本痛腎脉循喉嚨挾舌本其病口熱舌乾口問篇曰少陰脉至則嚙舌已上一目耳鼻口舌爲藏之開竅固當見五藏之變病所謂五藏不和則七竅不通然而經絡病多藏氣病少若識別不真即有毫釐千里之謬難諦審而治之則善矣選四方與第七十八小兒門參看

附方

薄荷煎　治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞

薄荷（二兩半）　川芎（二錢）　甘草

砂仁（各二錢半）　片腦（五分）

各另爲末和勻鍊調成膏任意嚼嚥

黑參丸　治口舌生瘡久不愈

玄參　天門冬　麥門冬（各等分）

爲末蜜丸彈子大每一丸綿裹噙化津液下

薏苡仁湯　治風熱在脾脣口瞤動或結核

薏苡仁　防己　赤小豆

甘艸（等分）

加生薑煎服

舌血舌腫舌出方

炒槐花細末摻之即止腫脹者蒲黃末摻之患熱病多舌出不能入者氷片搽之愈

齒

齒者骨之餘骨不外露齒質乃骨而外露故曰餘如脣爲肉餘爪爲筋餘髮爲血餘俱內藏者餘出

而外露也氣則不言餘以氣呼出可見耳腎主骨故齒屬腎言其本也胃足陽明之入上齒齦大腸手陽明之入下齒齦言其經也是故本病者多病齒骨經病者多病齒齦然有虛實風火蟲蝕之不同在診之細爲分別則無不効選方七首

附方

清胃湯（見第四十九）

香鹽散　治蟲牙及腎虛宣露一切齒疾

香附（三兩）　青鹽（五錢）

謝傳笑去散　治牙疼。

乳香　沒藥　雄黃

胡椒　烏藥　兩頭尖（各等分）

爲末擦牙初時甚痛良久涎出便愈。

白蒺藜散　治風虛牙疼。齒齦搖動。

白蒺藜生擣去刺。篩末擦牙。或煎水入鹽一捻。帶熱時漱。

青白散　治一切牙疼。及漱水洗目尤妙。

青鹽（二兩）　白鹽（四兩）

用川椒四兩。煎汁拌炒二鹽。爲末擦之。

齒縫出血（一名牙宣）

唯以白鹽擦之妙。

齒肉癰出

鮮生地黃汁一碗。牙皂角數錠。火上炙熱。蘸汁。再炙再蘸盡汁焙燥末之。傳上立消。

鬚髮

素問五藏生成論曰。腎之合骨也。其榮髮也。上古天真論曰，腎氣實，齒更髮長，是髮爲屬腎。又心主血，髮者血之餘，是髮又屬心。髮生上指，象火，用心過度者，髮早白，皆心之驗也。巢氏云。臍之榮在鬚。又靈樞曰，衝任二脈，不榮於口脣者，故鬚不生焉。是鬚髮雖殊，總不外榮血之爲潤養也。選方五首

附方

天寶單方

治丈夫婦人，久患頭風眩悶，頭髮乾落。胸中痰壅，每發，即頭旋眼昏，不覺欲倒者，是其候也。先灸兩風池各二七壯，并服此酒及散，永瘥。其法春末夏初，收白菊軟苗，陰乾，搗末。空腹取一方寸匕，和無灰酒服之，日再服，漸加三方寸匕。若不飲酒者，但和羹粥汁服，亦得。秋八月合花收暴乾，切取三大斤，以生絹袋盛，貯三大斗酒中，經七日服之，日三次，常令酒氣相續爲佳。

巨勝丸　治風眩能返白髮爲黑。

巨勝子　白茯苓　甘菊花（等分）

煉蜜丸如桐子大。每服三錢，清晨白湯下。

旱蓮膏　黑鬚髮，益腎陰。

旱蓮草，用泉水煮汁熬膏，日服外。即以膏揩之。

地黃膏　久服烏鬚髮。

生地黃（三斤搗取汁）　茜草（一斤水五大盌煎絞取汁滓再煎二三次取汁）

合二汁，緩火煎如膏，以瓶盛之，每日空心溫服半匙。一月髭鬚如漆。

筆峰雜興方（[illegible]）

用何首烏雌雄各半斤。分作四分。一分用當歸汁浸。一分生地黃汁浸。一分旱蓮汁浸。一分人乳浸。三日取出，各暴乾。瓦焙。石臼搗末，蒸棗肉和丸梧子大。每服四十丸。空心百沸湯下。

附擬補內外因第九六淫方

陰淫、上下厥逆、中外寒慄、

附子理中湯（見第十七）

四逆湯（見第二十二）

陽淫、狂譫煩渴、血泄浸淫

白虎湯（見第四十三）

犀角地黃湯　治小腸淋瀝、出血疼痛、及心血妄行、吐血衄血等疾。食後臨臥服。

犀角（如無以升麻代之半兩）　白芍藥（二錢）

牡丹皮（半兩）　生地黃（二錢）

右剉作一服、水一盞、煎八分、空心服。

風淫、皮膚毛落、鬚習瘾瘀

寶鑑醉仙散　治癘風遍身麻木。

胡麻子（炒）　牛蒡子（炒）　枸杞子

蔓荊子（炒各一兩）　白蒺藜　苦參

防風　瓜蔞根（各五錢）

右為細末、每一兩四錢。入輕粉二錢。拌勻每服

一錢、茶清調。晨午各一服至五七日。於牙縫中出臭涎。令人如醉或下膿血。病根乃去、仍量病之輕重。人之虛實用、病重者、須先以再造散下之。候元氣將復、再用此藥、忌一切炙煿厚味。止可食淡粥將菜諸蛇、以淡酒蒸熟食之。可以助藥力、

通天再造散　治大風惡疾、

鬱金（半兩）　大黃（煨一兩）　皂角刺（黑大者炒一兩）

白牽牛（六兩半生半炒）

為末。每服五錢、日未出、面東、無灰酒調下。

雨淫、腹滿腫脹、腸鳴濡瀉。

平胃散（見第四十七）

五苓散（見第十七）

胃苓湯（見第十七）

晦淫、百合狐惑、熱中臟燥

金匱百合病論曰、百合病者。百脈一宗、悉致其病

也、意欲食、復不能食、常默默欲卧、不能卧、欲行不能行、飲食或有美時、或有不用、聞食臭、時如寒無寒。如熱無熱、口苦小便赤、諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者、身形如和。其脉微數。每溺時頭痛者、六十日乃愈。若溺時頭不痛淅然者、四十日愈。若溺快然但頭眩者、二十日愈。其證或未病而預見、或病四五日而出。或病二十日。或一月微見者、各隨證治之。

百合知母湯　百合病、發汗後者、主此方。

百合（擘）七枚　知母（切）三兩

右先以水洗百合、漬一宿、當白沫出。去其水。更以泉水二升、煎取一升、去滓、別以泉水二升、煎知母、取一升、去滓。後合和煎取一升五合。分溫再服。

滑石代赭湯　百合病。下後者、主此方。

百合（擘）七枚　滑石（三兩碎綿裹）　代赭石（如彈丸大一枚

碎綿裹）

右先以水洗百合、漬一宿。當白沫出、去其水、更以泉水二升、煎取一升。去滓、別以泉水二升、煎滑石代赭、取一升。去滓。後合重煎、取一升五合。分溫再服。

百合雞子湯　百合病、吐後者、主此方。

百合（擘）七枚　雞子黃一枚

右先水洗百合、漬一宿。當沫出。去其水。更以泉水二升、煎取一升、去滓、内雞子黃攪勻。煎五分溫服。

百合地黃湯　百合病、不經吐下發汗。病形如初者、主此方

百合（擘）七枚　生地黃汁一升

右以水洗百合、浸一宿、當白沫出。去其水。更以泉水二升、煎取一升、去滓。内地黃汁。煎取一升五合、分溫再服、中病勿更服、大便當如漆

狐惑之爲病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。臥起不安。蝕於喉爲惑。蝕於陰爲狐。不用飲食。惡聞食臭。其面目乍赤。乍黑。乍白。蝕於上部。則聲喝。（一作嗄）甘草瀉心湯主之。

甘草瀉心湯

甘草（四兩）　黃芩　人參

乾薑（各三兩）　黃連（一兩）　大棗（十二枚）

半夏（半升）

蝕於下部。則咽乾。苦參湯主之。

蝕於肛者。雄黃薰之。

雄黃

右一味爲末。筒瓦二片合之。燒向肛薰之。

脉經云。病人或從呼吸。上蝕其咽。或從下焦蝕其肛陰。蝕上爲惑。蝕下爲狐。狐惑病者。猪苓散主之。

病者脉數。無熱。微煩。默默但欲臥。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日。目四眥黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

赤小豆當歸散

當歸　赤小豆（三升浸令芽出曝乾）

右二味。杵爲散。漿水服方寸匕。日三服。

金匱甘麥大棗湯　治婦人喜悲傷。欲哭。象如神靈所作。數欠伸。名曰藏躁。

甘草（三兩）　小麥（一升）　大棗（十枚）

右三味。以水六升。煮三升。溫分三服。亦補脾氣。

明浮。恍惚動悸。錯妄失神。

金匱桂枝去芍藥加龍骨牡蠣救逆湯。　治驚狂不安。陽氣散失。或因灸熨火邪。而陽氣浮越。致成上證。

桂枝（三兩去皮）　甘草（二兩炙）　生薑（三兩）

牡蠣（五兩熬）　龍骨（四兩）　大棗（十二枚）

蜀漆（三兩洗去腥）

右爲末。以水一斗二升。先煮蜀漆減二升。內諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。

東垣朱砂安神丸（見第十九）

醫燈續焰卷十八終

醫燈續焰卷十九（補遺）

錢塘後學潘楫碩甫補

同邑社盟王佑賢聖與評

男　杓燦象承
　　杓煥序承　校

古有四診。謂望聞問切也。經以神聖工巧配之。正文八十一條。其言非以脉求證。則問證合脉。僅從事于工巧。而望聞之法。十無一二。豈以後學庸劣。皆不足與語神聖之道乎。今彙輯補入。至若觸類引申。又不止此數條已也。唯同志者屬意焉。

望診

藏府部分

[illegible]料觀面知[illegible]法本諸此[illegible]藏眞府表

靈樞五色篇曰。五藏六府。各有部分。能別部分。萬舉萬當。自額而下闕庭上。屬咽喉之部分也。自闕中循鼻而下鼻端。屬五藏之部分也。自內眥挾鼻而下至承漿。屬六府之部分也。自顴而下頰。屬肩背手之部

分也。自牙車以下。頤屬股膝脛足之部分也。

又曰。五藏次于中央。六府挾其兩側。首面上于闕庭。王宮在于下極者是也。

五官

靈樞五閱五使篇曰。鼻者。肺之官也。目者。肝之官也。口脣者。脾之官也。舌者。心之官也。耳者。腎之官也。故肺病者。喘息鼻張。肝病者。眥青。脾病者。脣黃。心病者舌卷短顴赤。腎病者。顴與顏黑。

診病新久

素問脉要精微論曰。徵其脉小色不奪者。新病也。徵其脉不奪。其色奪者。此久病也。徵其脉與五色俱奪者。此久病也。徵其脉與五色俱不奪者。新病也。

面部圖


庭
上
闕
闕
下極
背
內
明堂
面王
蔽
蔽
方
巨分
方
巨分
蕃
蕃
牙車
牙車
巨屈
巨屈

五色篇曰。明堂者鼻也。闕者。眉間也庭者。顏也。蕃者。頰側也。蔽者。耳門也其間欲方大。去之十步。皆見於外。如是者。壽必中百歲明堂骨高以起。平以直。五藏次于中央。六府挾其兩側首面上於闕庭。王宮在於下極。五藏安於胸中。真色以致。病色不見。明堂潤澤以清。五官惡得無辨乎。

藏府色見面部圖


首面
咽喉
肺
心
肝
小腸
小腸
大腸
大腸
腎臍
腎臍
胃脾膽
膀胱
膀胱
子處

庭者。首面也。闕上者。咽喉也。闕中者肺也。下極者。心也直下者。肝也。肝左者。膽也。下者。脾也方上者。胃也。中央者。大腸也。挾大腸者。腎也。當腎者。臍也。面王以上者。小腸也。面王以下者膀胱子處也。男子色在於面王。爲小腹痛。下爲卵痛。其圜直爲莖痛。在女子。爲膀胱子處之病。散爲痛。搏爲聚

肢節色見面部圖



顴者。肩也。顴後者。臂也。臂下者。手也。目內眥上者。膺乳也。挾繩而上者。背也。循牙車以下者。股也。中央者。膝也。膝以下者。脛也。當脛以下者。足也。巨分者。股裏也。巨屈者。膝臏也。此五藏六府肢節之部也。

統論色

素問脉要精微論曰。能合色脉。可以萬全。五色者。氣之華也。赤欲如帛裹朱。不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如鹽。青欲如蒼璧之澤。不欲如藍。黃欲如羅裹雄黃。不欲如土黃。黑欲如重漆色。不欲如地蒼。素問五藏生成篇曰。青如翠羽者生。赤如雞冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕膏者生。黑如烏羽者生。此五色之見生也。青如草茲者死。黃如枳實者死。黑如炲者死。白如枯骨者死。此五色之見死也。又云。生於心。如以縞裹朱。生於肺。如以縞裹紅。生於肝。如以縞裹紺。生於脾。如以縞裹栝樓實。生於腎。如以縞裹紫。此五藏所生之外榮也。

夫氣由藏發。色隨氣華。如青黃赤白黑者。色也。如帛裹朱。如鵝羽。如蒼璧之澤。如羅裹雄黃。如重漆色。又云。如翠羽。如雞冠。如蟹腹。如豕膏。如烏羽。或有鮮明外露。或有光潤內含者。氣也。氣至而後色

彰。故曰欲。曰生。若赤如赭。白如鹽。青如藍。黃如土色。黑如地蒼。甚則青如草茲。黃如枳實。黑如炲。赤如衃血。白如枯骨。或晦黯不澤。或悴槁不榮。敗色雖呈。氣於何有。故曰不欲。且曰死。由此觀之。則色與氣。固不可須臾離也。然而外露者。不如內含。內含則氣藏。外露則氣泄。亦猶脉之弦鉤毛石。欲其微。不欲其甚。下文所云。如以縞裹者。正取五色之微見。方是五藏之外榮。否則過於彰露。與弦鉤毛

[illegible]澤是有氣枯槁者無氣故不單言色而曰氣色

合色脉全在生克

石之獨見。而無胃氣。名曰真藏者。何以異乎。

面

難經十三難曰。五藏有五色。皆見於面。亦當與寸口尺內相應。假令色青。其脉當弦而急。色赤。其脉浮大而散。色黃。其脉中緩而大。色白。其脉浮澁而短。色黑。其脉沉濡而滑。脉數。尺之皮膚亦數。脉急。尺之皮膚亦急。脉緩。尺之皮膚亦緩。脉濇。尺之皮膚亦濇。脉滑。尺之皮膚亦滑。假令色青。其脉浮澁而短。若大而緩

為相勝。（色青為肝脉得浮澁而短為肺脉為金剋木大而緩為脾脉為木剋土是謂相勝）浮大而散。若小而滑。為相生也。（浮大而散為心脉為木生火小而滑為腎脉為水生木是謂相生）

玉機真藏論曰。凡治病。察其形氣色澤。脉之盛衰。病之新故。乃治之。無後其時。形氣相得。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。脉從四時。謂之可治。脉弱以滑。是有胃氣。命曰易治。取之以時。形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難治。脉實以堅。謂之益甚。脉逆四時。為不可治。必察四難而明告之。

五藏生成篇曰。色味當五藏。白當肺辛。赤當心苦。青當肝酸。黃當脾甘。黑當腎鹹。故白當皮。赤當脉。青當筋。黃當肉。黑當骨。

靈樞五色篇曰。五藏六府之皮節。各有部分。有部分。用陰和陽。用陽和陰。當明部分。萬舉萬當。（和陰陽之盛衰裒多益寡和而平之萬舉萬當矣）能別左右。是謂大道。男女易位。故曰陰陽。審察澤夭。謂之良工。（左右乃陰陽之道路而男女從逆不同故位亦異位

定然後能察潤澤枯夭也）其沉濁為內。浮澤為外。（內為藏外為府以沉浮別之然在色上看非心會不能得）黃赤為風。青黑為痛。白為寒。黃為膏潤為膿。赤甚者。為血。痛甚為攣。寒甚為皮不仁。五色各見其部。察其浮沉。以知淺深。察其澤夭。以觀成敗。察其散摶。以知遠近。視色上下。以知病處。（浮則病淺沉則病深澤則成全夭則敗亡散解者新近摶聚者久遠上則在上下則在下皆以色形知病也）積神於心。以知往今。故相氣不微。不知是非。屬意勿去。乃知新故。（視色之道必積神屬意乃知已往來今及新病故疾）色明不麤。沉夭為甚。不

明不澤。其病不甚。（明澤不相顯而但見沉夭病必甚也若無沉夭雖不明澤病亦不甚）其色散。駒駒然未有聚。其病散而氣痛。聚未成也。（駒小馬也奔逸不定言其色散無定所氣聚聚病未成形也）腎乘心。心先病。腎爲應。色皆如是。（藏必自虛而後賊邪乘之所見之色自是勝我者五藏皆然）男子色見於面王。爲小腹痛。下爲卵痛。其圜直爲莖痛。高爲本。下爲首。狐疝㿉陰之屬也。（卵莖狐㿉乃膀胱小腸子處之病也其部位在於面王上下故色見於彼圜直象莖故以色見之高下分莖病之本末俗以鼻之大小驗前陰之巨細有以哉）

詮證入俗亦近自然

女子在於面王。爲膀胱子處之病。散爲痛。摶爲聚。方圓左右。各如其色形。其隨而下至胝爲淫。有潤如膏狀。爲暴食不潔。（女子部分亦同而病亦在下但所見皆衝任帶脉如淫帶淋濁瘕聚之類）（或有因暴食濕熱下注而成前證者若色摶則聚而結色散者但痛而已）左爲左。右爲右。其色有邪。聚散而不端。面色所指者也。（病見於色左右不爽故隨其色之所指察聚散而知邪之摶與痛也）色者。青黑赤白黃。皆端滿有別鄉。別鄉赤者。其色亦大如榆莢。在面王。爲不日。（五色之正端滿合時日者是爲無邪有別鄉者猶言正色之外別部又見一色也如赤見于面王則非其部不當見而見又非其時矣）其色上銳。首空上向。下銳下向。在左右如

[illegible]色觀向而[illegible]五藏之使[illegible]氣內又[illegible]稽焉此經[illegible]明辭顯如指諸掌

法。（色之侵乘必觀其尖銳處爲乘之首上銳上乘下銳下乘左右皆如其法）以五色命藏。青爲肝。赤爲心。白爲肺。黃爲脾。黑爲腎。肝合筋。心合脉。肺合皮。脾合肉。腎合骨也。（別五色而知五藏因五藏而知五合再察在何部而分生死吉凶病因無遁情矣）

面上白點。腹中蟲積。

面青白黃色不常。及面上如蟹爪路。一黃一白者。食積。兩顴時赤。虛火上炎。

病人面無血色。無寒熱。脉沉弦者。衄也。

病人見黃色光澤者。爲有胃氣。不死。乾黃者凶。

赤色出兩顴。大如拇指。病雖小愈。必卒死。

黑色出于庭。大如拇指。必不病而卒死。

冬月面慘。傷寒。紫濁。時病。色白而肥。氣虛多痰。黑而瘦。陰虛火旺。

目

五藏之精華注於目則病色亦見於目

靈樞論疾診尺篇曰。目赤色者。病在心。白在肺。青在肝。黃在脾。黑在腎。黃色不可名者。病在胸中。

兼脉爲痰飲若[illegible]看

白睛黃淡。脾傷泄痢。黃而濁。兼面如熏。濕盛黃疸。黃如橘子明者。熱多。黃中兼青紫。脉芤。是瘀血。胸中兩脇必有塊。

眼黑而頰赤者。熱痰也。眼胞上下如烟煤者。痰也。眼黑而行走艱難。呻吟者。入骨痰也。其證遍體骨節酸痛。眼黑面帶土色。四肢痿痺。屈伸不便者。風痰也。

目黃大煩。脉大爲病進。目黃心煩。脉和者。爲病將愈。

目精暈黃。衄未止。平人見黑氣起口鼻耳目者凶。

目睛黃。酒疸。黃白及面。眼胞上下腫者。穀疸。其人心下必痞脹。

明堂眼下青色。多慾。精神勞傷。不爾。卽未睡。

面黃目青。爲傷酒。

面無精光。齒黑者凶。

瘰癧赤脉貫瞳者凶。一脉。一歲死。一脉半。歲半死。二脉。二歲死。三脉。三歲死。

目間青脉起者。掣痛（乃少陽膽經之滯也）瞳子高大者。太陽不足。

病人面目俱等者吉。

面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑。皆不死。

面赤目白。面青目黑。面黑目白。面赤目青。皆死。

面目有黃色。是有胃氣。爲吉。（前二節。一有胃氣。一無胃氣。）

傷寒眼下青色。屬挾陰。挾陰者。俗指房事也。

金匱要略曰。其目正圓者。痓不治。（痓直屬太陽經絕太陽主筋故痓）（一作死）又色青爲痛。色黑爲勞。色赤爲風。色黃者。小便

難。色鮮明者。有留飲。（鮮明者俗言水汪汪也俱指白珠）

目睛不了了。鼻中呼不出。吸不入。氣短促而冷者。陰病。目睛了了。鼻中呼吸出入。能往能來。口鼻息長而皆熱者。陽病也。

鼻

金匱要略曰。病人有氣色見於面部。願聞其說。師曰。鼻頭色微黑者。有水氣。色黃者。胸上有寒。色白者。亡血也。設微赤非時者死。

鼻頭色黄。小便必難。（上云胸上有寒寒則水穀不運故小便難也）餘處無恙。獨鼻尖青黄者。其人必爲淋也。

鼻頭青。腹中痛。舌冷者死。

鼻孔忽仰起者死。

鼻枯槁不澤者死。

鼻冷如氷。連兩顴者。多死。

病人鼻。頭明。山根亮。目背黄光。起色。

鼻頭微白者。亡血。

血脉

論疾診尺篇曰。診血脉者。多赤多熱。多青多痛。多黑爲久痺。多赤多黑多青。皆見者寒熱。（血脉即絡脉肌皮嫩薄者視之可見）

素問平人氣象論曰。臂多青脉曰脱血。（絡中血脱故不紅而多青）

毛髪

髪枯生穗。血少火盛。

毛髪不堅。多墮落者。衛氣踈。或有風。

屑墮者風也。

病人頭毛上逆者凶。（血枯不榮如枯草不柔順而勁直小兒疳病多此亦主有虫）

形體

人之大體爲形。形之所充者氣。形勝氣者夭。（肥白氣不充）

氣勝形者壽。（修長黑色有神）

氣實形實。氣虚形虚。

形盛脉細。少氣不足以息者死。形瘦脉大。胸中多氣者死。

形氣相得者生。參伍不調者死。

肥人多中風。以形厚氣虚。難以周流。而多鬱滞生痰。

痰壅氣塞成火。而多暴厥也。

瘦人陰虚。血液衰少。相火易亢。故多勞嗽。

病人形脱而氣盛者死。（正虚則形脱邪實則氣盛）形體充大而皮膚寛緩者壽。形體充大而皮膚緊急者夭。

形氣相失。謂之難治。

形盛氣虚。氣盛形虚。形濇而脉滑。形大脉小。形小脉

大。形長脈短，形短脈長，形滑脈澁，肥人脈細小輕虛如絲，羸人脈躁，俱凶。

血實氣虛則肥，氣實血虛則瘦，肥者能寒不能熱。能（讀耐）瘦者能熱不能寒。

美鬚而長至胸，陽明血氣盛，鬚少血氣弱，不足則無鬚。美鬚者，太陽多血。

坐而下一脚者，腰痛也。

行遲者，痺也。或表強，或腰脚痛，或麻木風疾，裏實護

腹，如懷卵物者，心痛也。

持脈，病人欠者，無病也。（經云：陽引而上，陰引而下，則陰陽相引，故云無病，病亦即愈）

息搖肩者，心中堅。息引胸中上氣者，欬。息張口短氣者，肺痿吐沫。

形肉已脫，九候雖調者死。

掌中寒者，腹中寒；掌中熱者，陰不足，虛火盛。

診時病人叉手捫心，閉目不言，必心虛怔忡。

爪甲下肉黑有瘀血亦有下出能生者

倉廩不藏者，門戶不要也。水泉不止者，膀胱不藏也。

頭者，精明之府，頭傾視深，精神將奪。

背者，胸中之府，背曲肩隨，府將壞矣。

腰者，腎之府，轉搖不能，腎將憊矣。

膝者，筋之府，屈伸不能，行則僂附，筋將憊矣。

骨者，髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣。

眼胞腫，十指頭微腫者，必久欬。

死證

屍臭，舌卷，囊縮，（肝絕）○口不合，（脾絕）○肌肉不滑，唇反，（胃絕）○髮直，齒枯，及遺尿，（腎絕）○毛焦，面黑，直視，目瞑不見。（陰氣絕）○目眶陷，目系傾，汗出如珠，（陽絕系）○病後喘瀉。（脾脉將絕）○目正圓，手撒，戴眼，（太陽絕）吐沫，○聲如鼾睡，○面赤，○面青黑，唇青，○人中滿，唇反，○髮與眉衝起，○爪甲下肉黑，○手掌無紋，臍凸，足趺腫，○面青但欲伏眠，目視不見，汗出如油，肝絕，八日死，○眉傾者膽死，○手足爪甲青，或脫落，呼

罵不休。筋絕。八日死。○肩息直視。心絕。立死。○髮直如麻。不得屈伸。自汗不止。小腸絕。六日死。○口冷。足腫。腹熱。臚脹。泄利無時不覺。脾絕。五日死。○脊痛腫。身重不可反覆。胃絕。五日死。○耳乾舌背腫。溺血。大便赤泄。肉絕。九日死。○口張氣出不返。肺絕。三日死。○泄利無度。大腸絕。○齒枯。面黑。目黃。腰欲折。自汗。腎絕。四日死。○齒黃枯落。骨絕。

五藏絕證

五藏已奪。神明不守。聲嘶。循衣摸床。譫語。（陽明絕）妄語錯亂。及不語失音。熱病猶可生。

脈浮而洪。身汗如油。喘而不休。肺絕。（汗膩不流。脈洪而喘不休。真氣外散）

陽反獨留。形體如烟熏。直視搖頭。心絕。（心爲火藏。故陽熱獨存。烟熏火極焦灼之象）

脣吻反青。四肢漐漐汗出。肝絕。（脣吻屬脾。而青色屬木。木乘土。故曰反）

環口黎黑。柔汗發黃。脾絕。（水色凌土。冷汗身黃。脾真散越）

溲便遺失。狂言。目反直視。腎絕。（溲便二陰。腎藏所司。遺失則門戶不閉。水精敗絕。目背瞳人）

陽氣先絕。陰氣後竭者。死時身面必青。（陽先脫。陰絕于後。故青色存也）

陰氣先絕。陽氣後竭者。死時身面手足必赤。腋下溫。心下熱。（陰先脫。陽絕于後。故赤色見。餘陽未即盡。故腋溫心熱）

水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。胃絕。（胃納水穀。合肌肉。故）

六府氣絕。足冷腳縮。五藏氣絕。便利不禁。手足不仁。

手太陰氣絕。則皮毛焦。太陰者肺也。行氣溫於皮毛者也。故氣不榮。則皮毛焦。而津液去。津液去。則皮節傷。（皮上之紋）皮節傷。則皮枯毛折。（津液去而皮節平。毛無潤養而折）毛折者。則毛先死。丙日篤。丁日死。（火剋金。餘倣此）

手少陰氣絕。則脈不通。脈不通。則血不流。血不流。則色澤去。故面色黑如黧。此血先死。壬日篤。癸日死。

足太陰氣絕。則脈不榮其口脣。口脣者。肌肉之本也。

脉不榮。則肌肉不滑澤。肌肉不滑澤。則肉滿。肉滿。則唇反。唇反。則肉先死。甲日篤。乙日死。

足少陰氣絕。則骨枯。少陰者。冬脉也。伏行而溫於骨髓。故骨髓不溫。則肉不着骨。骨肉不相親。則肉濡而却。肉濡而却。故齒長而垢。（齒齦肉退却而齒則長垢也）髮無潤澤。無潤澤者。則骨先死。戊日篤。己日死。

足厥陰氣絕。則筋縮引卵與舌。厥陰者。肝也。肝者。筋之合也。筋者。聚于陰器而絡于舌本。故脉不榮。則筋

縮急。筋縮急。則引卵與舌。故舌卷囊縮。此筋先死。庚日篤。辛日死。

三陰氣俱絕。則目眩轉。目瞑。目瞑者。為失志。失志。則志先死。死即目瞑也。（目不見也脫陰者目瞑）

六陽氣俱絕。則陰與陽相離。陰陽相離。則腠理泄。絕汗乃出。大如貫珠。轉出不流。旦占夕死。夕占旦死。

詐病

向壁卧。聞師到。不驚起而目盼視。若二言三止。脉之嚥唾者。此詐病也。若脉和平。當言此病太甚。須鍼灸數十處。服吐下藥乃愈。（嚇其詐也）

聲診

聲

難經六十一難曰。聞其五音以別其病。以五藏有五聲。以合于五音。謂肝呼應角。心言應徵。脾歌應宮。肺哭應商。腎呻應羽是也。然此義深與。非尋常所可彷彿者。今惟以名賢簡易之法。彙著于左。

脉之呻者。痛也。（為彼診時有呻吟之聲）

言遲者。風也。（風滯于氣機關不利出言遲吃而蹇澁）

聲如從室中言。此中氣之濕也。（濕濁淆氣言不清亮）

言而微。終乃復言者。此奪氣也。（謂氣短弱不相接言未已停止半晌復言）

衣被不斂。言語罵詈不避親踈者。此神明之亂也（即風狂之類。熱病不論）

出言懶怯。先輕後重者。內傷不足。

出言壯厲。先重後輕者。外感有邪。

攢眉呻吟者、苦頭痛。

叫喊、或呻吟。以手捫心下者、中脘痛。

呻吟不能轉身、或轉而作楚態者。腰痛。

呻吟搖頭。或攢眉以手捫腮唇者、齒痛。

呻吟不能行起者。腰腳痛。

爲彼診時。數吁氣者、屬鬱結。（吁則氣鬱少伸）

搖頭言者。裏痛。

形羸聲啞。勞瘵不治。（此必咽中有瘡肺金火尅肺主聲故耳）

暴啞者。風痰。伏火、或忿怒叫、喊所致。

聲嘶色敗。久病不治。

坐而氣促喉聲者。痰火哮喘。

言語蹇澁者、風痰。

中年人聲濁。痰火。

譫時獨言獨語、言談無緒者、思慮傷神。（心神他寄故耳）

傷寒壞證聲啞。爲狐惑。上唇有瘡。虫食其藏。下唇有瘡。虫食其肛。

能傳聲氣
阻礙礙則
爲之變動
病而出焉
心靜聽其
乃得

雖病而聲音、響如故者、吉。

金匱要畧曰。病人語聲寂然。喜驚呼者。骨節間病。語聲喑喑然不徹者。心膈間病。語聲啾啾然細而長者。頭中病。（欲言復寂忽又驚呼非深入骨節之病不如此也况骨節中屬大筋筋爲肝合骨乃腎主驚呼亦出于肝膽故耳喑喑低澁之聲聽不明徹必心膈間有所阻碍啾啾細長之聲所謂如室中甕中出者頭中有濕混其清陽故鼻窒發聲如此也）

息

氣短促不足以息虛甚。（氣不能應呼吸）

平人無寒熱、短氣不足以息者、實也。（中焦有碍或痰火）

吸而微數。其病在中焦實也。當下之即愈。（中實吸不得入還出復入故微數也）虛者不治。（實則可下中虛吸不盡入而微數者肝腎欲絕）在上焦者。其吸促、在下焦者。其吸遠。此皆難治。呼吸動搖振振者不治。（病在上焦氣宜通下病在下焦氣宜達上上下交通病斯愈矣今上焦者吸促而不能通下下焦者吸遠而不能達上上下不交通病豈易治乎動搖振振氣不載形也）

問診

人品起居

[illegible]欲處見

凡診病、必先問所看何人。或男或女、或老或幼、或童僕、或婢妾。次問得病之日、受病之原。及飲食胃氣如何。便利如何。曾服何藥。日間何如。夜間何如。或寒或瘧。有無脹悶痛處。

病證

問病不答。必耳聾。卽當詢之。是素聾否。不則病久。或汗下過傷虛聾。

問而懶言答。唯點頭者。是中氣虛。

昏憒不知人。問是暴厥。抑是久病。

婦女僵厥。多是中氣。亦須問其曾大怒否。

婦女。當問其月水如何。寡婦氣血凝滯。兩尺多滑。不可慨斷爲胎。室女同。

心腹脹痛。問是舊病新病。

嗜欲苦樂

問其所欲何味。所嗜何物。或縱酒。或齊素。喜酸者。則知肝虛。喜甘脾虛。他味準此。

頭身臂脚作痛。必問曾病懸瘡否。臨病必審形志。或形勞志苦。或抑鬱傷中。故貴脫勢。眷戀于心。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。（謂脫散營氣）常富後貧。悲憂內結。名曰失精。（謂精神喪失）二者皮焦筋屈。痿躄爲攣。以其外耗於衛。內奪于榮。良工診之。必知病情。再問飲食起居。暴樂暴苦。始樂後苦。暴怒傷陰。暴喜傷陽。形體毀沮。精華日脫。邪氣內并。（邪乘虛而襲）

附辨舌

張三錫曰。金鏡錄載三十六舌。辨傷寒之深淺吉凶。可稱詳備。然細討究。不過陰陽表裏寒熱虛實而已。

陶節菴曰。傷寒邪在表。則舌無胎。熱邪傳裏。則胎漸生。自白而黃。黃而黑。甚則黑裂矣。黑胎多凶。若根黑或中黑。或尖黑。皆屬裏熱。全黑。則熱極而難治。常見外感挾內傷。宿食重而結於心下者。五六日。舌漸黃。或中乾而邊潤。名中焙舌。此則裏熱尚淺。若全乾。無

論黃黑。皆屬裏證。分輕重下之。若曾經下。或屢下不減。乃宿滯結于中宫也。詢其脉之虚實。及中氣何如。實者潤而下之。虚人神氣不足。當生津固中氣。有用生脉散。對解毒湯而愈者。有用附子理中湯。冷服而愈者。一則陰極似陽。一則陽極似陰。不可不辯。

白胎屬寒。外證煩躁。欲坐卧于泥水中。乃陰寒逼其無根失守之火而然。脉大不鼓。當從陰證治。若不大躁。嘔吐者。從食陰治之。

白胎燥　虚而微熱。或不得汗。或胃中必有飲而不行。宜温解。

白滑胎　虚寒胃寒。陽氣不振。宜温。

白胎起芒刺　津液不足。胃中有物。宜運動。

黃胎　微熱。熱漸入裏。或燥渴之象。宜清解。

灰色胎　胃中有物。中氣虚熱渴。而不能消飲者。宜温解。

黑色胎　熱入裏實。燥厚者。宜下。滑潤者。水困火。宜温。雖黑而潤。所謂水極似火也。不燥爲異。

凡傷寒辯舌者。以舌屬心而主火。寒爲水也。水寒凌火。舌受其困。

産後辨舌者。以心主血也。經云。少陰氣絶。則血不流。故舌紫黑者。爲血先死。

凡見黑舌。要問曾食酸甜鹹物。否。能染成黑色。凡視舌色。雖有成見。亦必細審兼證。及脉之虚實。不爾。恐有毫釐千里之謬。

醫燈續焰卷十九　終

醫燈續焰目錄（附餘）

卷之二十

醫範

醫學源流（張仲景）　醫學難精（孫真人）
醫必讀書（史愁）　醫貴博（戴能）
臨機應變（商輅）　立意弗偏（醫說）
治病如操舟（楊仁齋）　如救焚溺（陸宣公）
施仁獲報（張彥明）　勿畏難（孫真人）

勿笑譏（孫真人）　勿自安（孫真人）
醫救人苦（老君）　讓功（錢乙）
妄斥朱李（程篁墩）　謗與（譚景升）
誨子和衆（朱丹溪）　劫謝（洎宅編）
誤灸韓報（中志）　貪財天杖（已志）
拯病陰譴（續醫說）　下胎啞腑報（名醫錄）
故授毒藥甩打（醫說）　診有四失（素問）
診有五過（素問）　醫攻（周禮）
庸醫自信（陶貞白）　用心精微（張湛）
問證（孫真人）　三繆
偏執之誤（王忠文公禕）　王道（王文恪公）
藥性（孔志約）　市藥（陳嘉謨）
本草贖過（陶貞白）　藥貴專一（許胤宗）
太微仙君功過格　醫罪（大明律）
醫殺人於法外（燕談）　祝醫五則（繆仲淳）
袁氏醫家十事（袁荊泉）　爲醫八要（潘楫）

采芝八則（蔣式金）　太素脈論（吳崑皐）
又　脈案式（又三條　吳崑皐）
回頭歌（宋道人婺語）　謗醫閑忪（潘楫）

卷之二十一（附餘）

病則

病有六不治（史記）　療病勿殺（秦觀）
戒殺（沈蓮池）　婦女習俗自誤（冠宗奭）
試脈自誤（王海藏）　禁忌（朱丹溪）

易醫之弊（龔庭賢）　治藥不擇人（王海藏）
嫉醫誤事（孫真人）　托市僞藥（陶貞白）
速更醫誤（龔庭賢）　病家六失（寇宗奭）
先告所患（蘇東坡）　任醫（褚澄）
拘於鬼神（素問）　病家須知五則（潘之淇）
尊生十二鑑（潘楫）　四狗五病（寇宗奭）
保養防患（寇宗奭）　預攝（朱丹溪）
飲食性情（食鑑）　擇醫（寇宗奭）
擇品（物理論）　醫不在名（陶貞白）
重名宜審（吳球）　信任成功（宋景濂）
議多誤事（孫真人）　逕殺相仍（見聞搜玉）
不攝損命（徐春甫）　保養說（本艸衍義）
和氣湯方（養生纂）　自致百病（養生纂）
吳山里人日記（鄭弼）　奉親養老書（奉親養老書）
老人藥餌（同上）　老人事宜（同上）
老人起居（同上）　早漱不如暮漱

交合有時（千金要方）　生子定理（同上）
患目忌（同上）　謹抑陽事（同上）
解惡夢（同上）　救魘法（巢氏病原）
救不寤法（肘後方）　浴出帶衣睡（瑣碎錄）
患目勿浴（渭宅編）　沐浴五香（沐浴身心經）
饒水黑髮（本艸）　粳米反蒼耳（同上）
食粥益人（張文潛）　食飲以時（食治通鑑）
飲酒消養餌（瑣碎錄）　盛夏節食（食治通鑑）
勿食生冷炙煿（同上）　飲冷先溫（翰府名談）
飲食饑渴之先（千金要方）　飲食宜細（食治通鑑）
飲食後成疾（王叔和）　日宜服嚵（瑣碎錄）
野鴨宜食（食療本艸）　食物宜熟（本草）
湯水忌（瑣碎錄）　蒔萊毒（本艸拾遺）
秋蟹毒（博物志）　治產倒生（食療本草）
醒酒（瑣碎錄）　去韭氣（瑣碎錄）
雪行勿熱（瑣碎錄）　勿臥食（雲笈七籤）

藥食諸忌（本草）　醫家難事有三情（張介賓）
煮湯藥法（陶貞白）　又（李時珍）
諸病男女不同（孫真人）　倩人合藥之獘（孫真人）
斷除因念（王華子）　全生愈疾（筆談）

醫燈續焰卷二十（附餘）

錢塘後學潘（楫碩甫）輯
同邑社盟王佑賢（聖翼）評
男　杓（燦絜承）　杓（擬序承）校

醫範

張仲景曰。夫天布五行以運萬類。人稟五常以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農。黃帝。岐伯。伯高。雷公。少俞。少師。仲文。中世有長桑。扁鵲。漢有公乘陽慶。及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎趺陽。三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知。決診九候。曾無髣髴。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實爲難矣。孔子云。生而知

（自衒者當諦認之）

之者上、學則亞之、多聞博識、知之次也。余宿尚方術、請事斯語。

孫真人曰、醫方卜筮、藝能之難精者也。既非神授。何以得其幽微。世有愚者、讀方三年、便謂天下無病可治。及治病三年。乃知天下無方可用。故學者必須博極醫源、精勤不倦。至者道聽塗說而言醫者、豈不深自誤哉。

史松曰。夫爲醫者在讀書耳、讀而不能爲醫者有矣。

（切中時病）

未有不讀而能爲醫者也、不讀醫書又非世業。殺人豈不甚于梃刃乎。

金華戴叔能曰醫以活人爲務。與吾儒道最切近。自唐書列之技藝、而吾儒不屑爲之。世之習醫者。不過誦一家之說。守一定之方。以幸其病之偶中。不復深探遠索。上求聖賢之意。以明夫陰陽造化之會歸。又不能博極群書。采擇衆議。以資論治之權變。甚者至于屏棄古方。附會臆見。展轉相迷、而其爲患不少矣。是豈聖賢慈惠生民之本意哉。

學士商輅曰。醫者意也。如對敵之將、操舟之工。貴乎臨機應變。方固難于盡用。然非方。則古人之心弗傳。茫如望洋。如捕風。必有率意而失之者矣。方果可以弗用乎。雖然。方固良矣。然必熟之素問以求其本。熟之本草以究其用。熟之診視以察其證。熟之治療以通其變。始于用方。而終至于無俟于方。夫然後醫之道成矣。昔許胤宗謂我善讀仲景書而知其意。然未嘗專用其方。誠名言哉。

（臨機而應之方妙論）

續醫說云近時醫者偏執己見。或好用熱藥。或好用涼藥。然素問有異法方宜論。抑何嘗偏執耶。古之良醫必量人之虛實。察病之陰陽。而後投以湯劑。或補或瀉各隨其證。若的是陽虛失血。治以乾薑附子。諸虛百損。補以人參黃耆。痰熱壅嗽。清以芩連。大便結熱。利以硝黃。其法豈盡廢乎。許叔微有云。形有寒邪。雖嬰孩亦可服金液。藏有熱毒。雖老羸亦可服大黃。

知彼知此百戰百勝

至哉通變之說也。

楊仁齋曰、治病如操舟、操舟在手、當風波、震蕩之衝、一有轉移、則舟覆矣。醫衛主持在我、不可偏狥病家所欲、尤不可張皇。使病人驚悶。有病家粗識皮膚。辨難反覆、萬勿鼓焉、又有摭後觸犯再復。隱諱不言。須詰問其由、庶得對病施藥。

陸宣公論云、醫以活人爲心。故曰醫乃仁術、有疾而求療、不啻求救焚溺于水火也。醫乃仁慈之術、須披

左景閻之[illegible]作念

髮攖冠而往救之可也、否則焦濡之禍及。求有仁心者能忍乎。竊有醫者、乘人之急而詐取貨財、是則孜孜爲利、跖之徒也。豈仁術而然哉、此之作不善者。尤甚也。天地豈不報之以殃乎。今見醫家後裔、多獲餘慶、欺擢高科、此天道果報之驗。奚必計一時之利而戕賊仁義之心。甚與道術相反背。有乖生物之天理也、從事者、可不鑒哉。

醫者當自念云。人身疾苦。與我無異、凡來請召急。去無遲、或止求藥、宜即發付、勿問貴賤、勿擇貧富。專以救人爲心、冥冥中、自有祐之者。乘人之急、故意求財。用心不仁、冥冥中、自有禍之者。吾鄉有張彥明。善醫。僧道貧士。軍兵及貧者求藥、皆不受錢、或反以錢米與之。人來請召。雖至貧下。亦去。富者以錢求藥。不問多寡、必多與藥。期于必愈。未嘗萌再携錢來求藥之心、病若危篤、亦多與好藥、以慰其心、終不肯受錢。予與處甚久、詳知其人爲醫而口終不言錢。可謂醫人

中第一等人矣。一日城中火災。周回焚爇、煙焰中獨存其居。一歲牛災尤甚、而彥明莊上獨全。此神明祐功之也。其子讀書。乃與趙鷹孫二三人、皆厖厚俊爽、亦天道福善之信然也、使其孜孜以錢物爲心。失此數者、所得不足以償其所失矣、同門之人、可不鑑哉。

孫真人曰。其有患瘡痍下痢。臭穢不可瞻視。人所惡見者。但發憐憫愛恤之心。不得起畏難帶介之意。是吾志也。

孫真人曰。夫爲醫之法。不得多語調笑。談謔諠譁。道說是非。議論人物。衒燿聲名。訾毁諸醫。自矜巳德。偶然治瘥一病。則昂頭戴面。而有自許之貌。謂天下無雙。此醫人之膏肓也。

孫真人曰。醫到病家。縱綺羅滿目。勿左右顧眄。絲竹湊耳。無得自有所娛。珍羞迭薦。食如無味。醽醁兼陳。看若無有。所以爾者。夫一人向隅。滿堂不樂。而况病人苦楚。不離斯須。而醫者安然懽娛。傲然自得。真人神之所共恥。至人之所不爲也。

可畏

老君曰。人行陽德。人自報之。行陰德。鬼神善之。陰陽報施。豈誣也哉。所以醫人不得恃巳所長。專心經畧財物。但作救苦之心于冥冥之中。自膺多福矣。

錢乙在神宗時。治皇子儀國公病瘛瘲。國醫莫能治。乙進黃土湯。遂愈。神宗問曰。黃土湯何以愈斯疾。乙對曰。以土勝水。木得其平。則風自止。且諸醫所治垂瘉。但小臣適當其瘉耳。神宗悅其對。賞賚甚厚。

醫有古今運讀備具

程篁墩云。近世有儒名者。立說斥東垣丹溪之書。爲不足觀。曰。二家動引素難。猶儒者動引唐虞三代。何益于事。噫。爲此言者。亦悖之甚矣。

譚景升化書云。醫人者。人醫之。謗人者。人謗之。

朱丹溪先生誨子十說。其一云。同道中。切宜謙和。不可傲慢于人。年尊者。恭敬之。有學者。師事之。倘有醫類。但當義讓。不可攘奪。致慼招謗。經云。禮之用。和爲貴。

泊宅編云。王居安秀才。久苦痔疾。聞蕭山有善工。力不能招致。遂命舟自烏程走錢塘。舍于静邸中。使人迎醫。醫絕江至杭。既見。欣然爲治藥餌。且云。請以五日爲期。可以除根本。初以一藥。放下大腸數寸。又以一藥洗之。徐用藥線結痔。信宿痔脫。其大如桃。復以藥餌調養。數日遂安。此工初無難色。但放下大腸了。方議報謝之物。病者知命懸其手。盡許行橐所有爲酬。方許治療。又玉山周僅。調官京師。舊患膀胱氣。外

醫偏墜。有貨藥人云。只立談間。可使之止。約以萬錢及三縑之報。相次入室中。施一鍼。所苦果平。周大喜即如數酬金帛而去。後半月。其疾如故。使人訪醫者。已不見矣。古之賢人或在醫卜之中。今之醫者。急于聲利。率用詭道以劫流俗。殆與穴坏挾刀之徒無異。

予目擊二事。今書之以為世警。

申志載温州醫僧法程。字無枉。少瞽。百端治之不愈。但晝夜誦觀世音菩薩名號。如是十五年。夢中聞菩薩呼之使前。若有物縶其足。不可動。菩薩歎曰。汝前世為灸師。誤灸損人眼。今生當受此報。難以免。但吾憐汝誠心。但使汝衣食豐足。遂探懷中。擲寶珠滿手與之。既寤。醫道大行。衣鉢甚富。至七十猶在。

己志載宜興民承務。醫術精高。然貪顧財賄。非大勢力者。不能屈致。翟忠惠公居常熟。欲見之不可。誘平江守梁尚書邀之。始來。既回平江。適一富人病。求謁醫。民曰。此病不過湯藥數劑可療。然非五百千為謝

不可。其家始許半酬。拂衣去。竟從其請。別奉銀五十兩為藥資。民求益至百兩。乃出藥為治。數日愈。所獲西歸中途。夜夢一朱衣曰。上帝以爾為醫。而厚取賄賂。殊無濟物之心。命杖脊二十。遂劾左右捽而鞭之。既寤。覺脊痛。呼僕視之。捶痕宛然。還家未幾而死。

宣城符裏鎮人符助教。治癰疽。操心亡狀。病者瘡不毒。先以藥發之。忽一黃衣卒來。持片紙示之云。陰司追汝。以藤杖點其背。符大叫痛。黃衣曰。汝元來也知痛。隨手成大疽而死。

名醫錄云。京師有一婦人。姓白。有美容。京人皆稱為白牡丹。貨下胎藥為生。忽患腦疼。日增其腫。名醫治之皆不愈。日久潰爛。臭穢不可聞。每夜聲喚。遠近皆聞之。一日遂與家中云。我所蓄下胎方。盡為我焚之。戒子弟曰。誓不可傳此業。其子告母云。我母因此起家。何棄之有。其母曰。我夜夜夢數百小兒。咂我腦袋所以疼痛叫喚。此皆是我以毒藥累胎。獲此果報。言

記遂死。

醫說載宣城管內水陽村。醫陸陽。字義若。以技稱。嘉炎中。朱萃老編修妻。避冠驚憂致疾。陸誤投以小柴胡湯殺之。溧水高淳鎮李氏子。病瘵召之。用藥未效。從出婿家飲。索錢并酒餌。不與。投以剛劑數十粒。又殺之。紹興九年。陸暴病。呼曰朱宜人。李六郎。休打我。我便去也。旬日死。

黃帝曰。經脉十二。絡脉三百六十五。此皆人之所明知。工之所循用也。所以不十全者。精神不專。志意不理。外內相失。故時疑殆。診不知陰陽逆從之理。此治之一失也。受師不卒。妄作雜術。謬言爲道。更名自功。妄用鍼藥。後遺身咎。此治之二失。不適貧富貴賤之居。生之厚薄。形之寒溫。不適飲食之宜。不別人事之勇怯。不知比類。足以自亂。不足以自明。此治之三失也。診病不問其始。憂患飲食之失節。起居之過度。或傷於毒。不先言此。卒持寸口。何病能中。妄言作名。爲粗所窮。此治之四失也。

黃帝曰。凡未診病者。必問嘗貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。嘗富後貧。名曰失精。五氣留連。病有所并。醫工診之。不在藏府。不變軀形。診之而疑。不知病名。身體日減。氣虛無精。病深無氣。灑灑然時驚。病深者。以其外耗于衛。內奪于營。良工所失。不知病情。此亦治之一過也。凡欲診病者。必問飲食居處。暴樂暴苦。始樂後苦。皆傷精氣。精氣竭絕。形體毀沮。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣上行。滿脉去形。愚醫治之。不知補瀉。不知病情。精華日脫。邪氣乃并。此治之二過也。善爲脉者。必以比類奇恒。從容知之。爲工而不知道。此診之不足貴。此治之三過也。診有三常。必問貴賤。封君敗傷。及欲侯王。故貴脫勢。雖不中邪。精神內傷。身必敗亡。始富後貧。雖不傷邪。皮焦筋出。痿躄爲攣。醫不能嚴。不能動神。外爲柔弱。亂至失常。病不能移。則醫事不行。此治之四過也。凡診者。必知終始。有知

餘緒、切脈問名、當合男女、離絶菀結、憂恐喜怒、五藏空虛。血氣離守、工不能知。何術之語、嘗富大傷。斬筋絶脈、身體復行、令澤不息、故傷敗結。留薄歸陽、膿積寒炅、粗工治之、亟刺陰陽。身體解散。四肢轉筋。死日有期、醫不能明、不問所發。唯言死日。亦爲粗工。此治之五過也、凡此五者。皆受術不通。人事不明也。

周禮、醫師掌醫之政令、聚毒藥以共醫事。凡邦之有疾病者、疕瘍者造焉、則使醫分而治之。（政謂聚毒藥以供醫事令謂使醫分而治之毒藥藥之辛苦者頭瘡曰疕身瘡曰瘍分治者醫各有能也凡藥有有毒者有無毒者無毒所以療病有毒所以發病而藥物之性隨四時而生死金石之性稟五行而厚薄其類不一其性必偏而人之身感陰陽寒暑之偏而有病病以偏而感藥以偏而用必相攻而後相濟用之不善則無毒者亦毒矣必欲醫者知用藥之爲毒而不敢輕辨君臣佐使之制調溫涼燥濕之宜審表裏出納之方達造化性命之理則雖毒不毒矣故其職以聚毒藥爲王者重之也）

歲終、則稽其醫事以制其食。十全爲上。十失一。次之。十失二。次之。十失三。次之。十失四爲下。（稽計也食祿也十全謂所治十人皆愈也失謂其不效者失四爲下則其祿最薄失五者黜之而無祿罰之重者重民命也豈他職之可比也）

疾醫。掌養萬民之疾病。四時皆有癘疾。春時有痟首疾。夏時有痒疥疾。秋時有瘧寒疾。冬時有嗽上氣疾。（天有六氣謂陰陽風雨晦明皆足以傷形人有六疾謂寒熱末腹惑心皆足以傷氣運行於榮衛周流於四肢交通則爲和有餘不足則爲疾苟調攝不得其道而與之值焉是以氣疾交攻甚者或至於病此疾醫於治病言養者精察夫六疾之本而順適夫六氣之運此醫之良者也癘疾者氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也嗽咳也上氣逆喘也凡人四時之間冬傷於寒陽主於內春木用事而陽發於外然後寒氣搏之爲痟首之疾春木爲肝而主色火勝於夏以子勝母故暑氣溢而爲疥痒之疾夏傷於暑陰主於內秋金用事而陰發於外然後暑氣搏之爲瘧寒之疾秋金爲肺而主聲水勝於冬以子勝母故寒氣壅而爲欬上氣疾是四者皆四時不和之氣故謂之癘）

以五味五穀五藥養其病。以五氣五聲五色眡其死生。兩之以九竅之變。參之以九藏之動。（五味醯酒飴蜜薑鹽之屬）（五穀麻黍稷麥豆也五藥草木虫石穀也養猶治也病繇氣勝負而生氣之贏則攻之其不足則養之也五氣者肝氣溫心氣熱脾氣和肺氣涼腎氣寒是也五聲者肝聲呼心聲笑脾聲歌肺聲哭腎聲呻是也五色者肝色青心色赤脾色黃肺色白腎色黑是也三者劇易之徵見於外察其盈虛休王則吉凶可知矣九竅者陽竅七兩耳兩目兩鼻一口也陰竅二大小二府也竅謂其有形而見於）

（外者兩之謂陰陽變謂陰陽之變觀其證之變而有通塞之二候九藏者正藏五謂肺心肝脾腎及六府中胃膀胱大腸小腸四者藏謂皆有形而藏於內者參之謂陽陰與冲氣察其脉之動而有浮中沉之二部以要而言九藏皆不出於五藏而上關九竅兩之參之而得其要則五要可用而醫無過誤之失矣）

凡民之有疾病者分而治之。死終。則各書其所以而入於醫師。（少者曰死老者曰終所以謂治疾不愈之狀也入於醫師者醫師得以制其祿且以爲後戒）

瘍醫。掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊。（腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者祝當爲注以藥附之也劀刮去膿血也殺以藥食其惡肉也）

凡療瘍。以五毒攻之。以五氣養之。以五藥療之。以五味節之。（止病曰療五毒五藥之有毒者今醫方有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹砂雄黃礜石磁石其中燒之三日夜其烟上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出劀謂刮去膿血殺謂蝕去惡肉蓋腫者欲散潰者欲合傷者欲復斷者欲續故必先攻之以五毒而後養之以五穀療之以五藥節之以五味也）

凡藥以酸養骨。以辛養筋。以鹹養脉。以苦養氣。以甘養肉。以滑養竅。凡有瘍者。受其藥焉。（此言各以其類相養也酸木味木根立地中似骨辛金味金之纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脉苦火味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅然治瘍以骨爲主而筋脉氣不可以過盛用藥宜得其中焉）

陶弘景曰。今庸醫處療。皆耻看本草。或倚約舊方。或聞人傳說。或遇其所憶。便攬筆疏之。俄然戴面。以此表奇。其惡畏相反。故自寡昧。而藥類違僻。分量參差。亦不以爲疑。脫或偶爾值差。則自信方驗。若旬月未瘳。則言病源深結。了不反求諸己。詳思得失。虛搆聲稱。多納金帛。非惟在顯宜責。固將居幽貽譴矣。

張湛曰。夫經方之難精由來尚矣。今病有內同而外異。亦有內異而外同。故五藏六府之盈虛。血脉榮衛之通塞。固非耳目之所察。必先診候以審之。而寸口關尺。有浮沉弦緊之亂。俞穴流注。有高下淺深之差。肌膚筋骨。有厚薄剛柔之異。惟用心精微者。始可與言于玆矣。今以至精至微之事。求之于至粗至淺之

癒。豈不殆哉。若盈而損之。虛而徹之。塞而塞之。寒而滯之。是重加其疾。而望其生。吾見其死矣。

孫眞人曰。凡古今病名。率多不同。緩急尋檢。常致疑阻、若不判別、何以示衆。且如世人呼陰毒傷寒。最為劇病。嘗深摭其由。然口稱陰毒之名。意指少陰之證。病實陰陽之候。命一疾而涉三病。以此為治。豈不誤昧。殊不知陰毒少陰陰陽。自是三候。為治全別。古有方證、其說甚明。今而混淆。害人最急、又如腸風藏毒

欬逆慢驚、遍稽方論。無此名稱。深窮其狀。腸風乃腸痔下血、藏毒乃痢之蠱毒。咳逆者。噦逆之名。慢驚者。陰癇之病。若不知古知今。何以為人司命。加以古之經方。言多雅奧、以利為滯下。以歷為腳氣。以淋為癃。以實為秘。以天行為傷寒。以白虎為歷節。以膈氣為膏肓。以喘嗽為欬逆。以強直為痓。以不語為癔。以緩縱為痱。以怔忪為悸。以痰為飲。以黃為癉。諸如此論。可不討論。而況病有數候相類。二病同名者哉。宜其

視傷寒、中風、熱病、瘟疫、通曰傷寒、虛脹、鼓脹、腹[illegible]、[illegible]瘵、率為水氣、療中風專用乎痰藥、指滯下或以為勞疾、伏梁不辨乎風根、中風不分乎時疾、此今天下醫者之公患也、是以別白而言之。

古云、不得為賢宰相、則為明醫。甚哉醫之難明也。略舉數事。一曰涼藥治損謬、其說盛于丹溪、謂人之一身、陽常有餘、陰常不足、而用知母黃蘗等。謂之滋陰。

（治虛勞始終要保胃氣）

至今治虛勞者、遵而用之。初服胃氣尚強。久之則中

寒。而食減、陰未滋、陽已竭矣。或曰瀉南方。補北方。經語也、然不知經云、東方實、西方虛、乃不治東西、而惟瀉南補北、腎為肝母、水旺則金不受爍、而能制木、故曰母能令子虛也、為金木謀則然、而非槩治虛勞也。

（攻病用毒藥元用純主熱亦自不同）

以王節齋之高明、亦因仍而不覺、豈一時之誤否耶。

二曰炮製失宜謬。今人以童便浸參。曰肺熱還傷肺也。本草參忌鹵與溲。鹵。鹽也。溲。便溺也。何反用其忌也。又附子者。正取其勇悍之性。亦用童便煮之。至三

方中時病

五日。譬如用猛將以禦勍敵。取其猛也。而損傷其手足。饑餓其體膚。乃使其臨陣。可乎。夫用藥者。宜察其當用與否。如不當用。寧若已之。三曰認藥舛錯謬。青皮則以小枳實混之。其枳殼則以香圓混之。石膏則以方解石混之。又另立軟石膏軟柴胡之說。猶未也。以五倍子爲文蛤。以蓮花鬚爲蓮花蕋。以山蘿蔔爲沙參。皆舛也。夫青皮入足厥陰經。故陳皮治高。青皮治低。小枳實。胸中藥也。何由入厥陰經也。餘可類推

矣。又枸杞子。地骨皮。根之于實。一樹也。主節齋分屬草木二部。皆舛也。四率意處方謬。古人處方。慎重不苟。所有成方。如四君子。四物。二陳。平胃等號。王笈三十六方。孫思邈真人傳自龍宮。而雜布于諸方書中。名各皆有深意。後人合宜則用。稍爲增減出入。無不應者。乃今時處方。或散漫無紀。或任便自用。或慣作平淡庸柔之劑。無大益。亦無大損者。將謂成則歸功。敗則無所歸咎。而不知緊要之疾。乃作悞害矣。又王氏類方。最爲精密。而四君子。易甘艸以黃耆。夫臨證處方。自無死法。而錄刻古方。不宜變損。或古有之則可。古未有。則仍舊爲是。愚謂用藥如用兵。兵本殺人。善用之。則生人。醫本生人。不善用之。則殺人。旨哉言乎。故孔子以戰疾並慎。而醫家者言。則有四診九候。五科八要。誠慎之也。不然而平日不調習。臨敵無節制。鹵莽决裂。其不以兵爲戲乎。

王忠文公禕云。李明之弟子。多在中州。獨劉守真之

學。傳之荊山浮圖師。師至江南。傳之中八羅知悌。而南方之醫。皆宗之矣。及國朝天下之言醫者。非劉氏之學。弗道也。劉李之法。雖攻補不同。會而通之。隨證而用之。自中其病矣。近時吾吳中稱良醫師。則以能持東垣者。謂之王。持張劉者。謂之伯。噫。堯舜以揖讓湯武以干戈。苟合道濟世。何必曰同。余嘗病世之專于攻伐者。邪氣未退。而真氣先薾然矣。專于補養者。或致氣道壅塞。爲禍不少。正氣未復。而邪氣愈熾。古

人有云。藥貴合宜，法當應變，泥其常者，人參反以殺人，通其變者，烏頭可以活命。孫眞人所謂随時增損物無定方，眞知言哉。

震澤王文恪公云。今之醫者，祖述李明之，朱彥修，其處方不出參朮之類，所謂醫之王道，信知本者矣。然病出於變，非朮參芪所能效者，則藥亦不得不變。可變而不知變，則坐以待亡。變而失之毫釐，則反促其死，均之爲不可也。故曰。可與立，未可與權。藥而能權，

可謂妙矣。明之彥修，未嘗廢權也。世醫師其常，而不師其變。非用權之難乎。

孔志約云，動植形生，因方舛性，春秋節變，感氣殊功。離其本土，則質同而效異，乖于採摘，乃物是而時非。名實既爽，寒溫多謬。用之凡庶，其欺已甚。施之君父，逆莫大焉。

陳嘉謨曰。醫學貿易，多在市家。諺云。賣藥者，一眼。用藥者，兩眼。服藥者，無眼。非虛語也。古壙灰云死龍骨，苜蓿根爲土黃耆，麝香擣荔核攙，藿香採茄葉雜，煮半夏爲玄胡索，鹽松梢爲肉蓯蓉，草仁充草豆蔻，西呆代木香，熬廣膠入蕎麥作阿膠。煮雞子及魚枕爲琥珀。枇杷蕊代款冬花。驢脚脛作虎骨，松脂混麒麟竭，番硝和龍腦香。巧詐百般，甘受其侮，甚至殺人，歸咎用藥，乃大關係。非比尋常，不可不慎也。

陶貞白外傳云。有弟子桓闓，先得道，將超昇，弘景問曰，其行教修道，勤亦至矣，得非有過而淹延在世乎。

桓闓曰。君之陰功著矣，所修本草。以蝱虫水蛭爲藥，功雖及人，而害于物命，以此一紀之後，當解形去世，署蓬萊都水監耳。言訖乃去，弘景復以草木之藥，可代物命者，著別錄本草三卷，以贖其過焉，後陶弘景果解形仙去，又爲茅山上淸第九代宗師也。

許胤宗曰，醫特意耳，思慮精，則得之。脈之候，幽而難明，吾意所解，口莫能宣也。古之上醫，要在視脈。病乃可識，病與藥值。惟用一物攻之，氣純而愈速，今之人

不善爲脉、以情度病。多其物以幸有功。譬猶不知兎、廣絡原野。冀一人獲之。術亦疏矣。一藥偶得。它味相制。弗能專力。此難愈之驗也。脉之妙處不可傳。虚著方劑。終無益于世。此吾所以不著書也。

太微仙君功過格云。以符法鍼藥救重疾。一人爲十功。小疾。一人爲五功。如受病家賄賂。則無功。施藥一服、爲一功。傳人保益性命符法藥術等。每一事爲五功。如受賄而傳、則一、功。凡有重疾告治。不爲拯救者。一人爲二過。小疾。一人爲一過。治不如法。爲一過。不愈而受賄。百錢爲一過。貫錢爲十過。修合毒藥。欲害于人。爲十過。害人性命。爲百過。害人不死而病。爲五十過。害一切衆生禽畜性命。爲十過。害而不死。爲五過。故傷殺人性命者。爲百過。誤傷殺性命、爲八十過。

害人性命過著有限

大明律。凡庸醫爲人用藥鍼刺。誤不依本方。因而致死者。責令別醫辯驗藥餌穴道。如無故害之情者。以過失殺人論。不許行醫。若故違本方。詐療疾病而取財物者。計贓。准竊盜論。因而致死。及因事故。用藥殺人者。斬。

樵談有曰。殺人者死。法也。庸醫殺人。不死、猛將殺人不死。酷吏殺人。不死。法在乎。

繆仲淳祝醫五則

凡人疾病。皆由多生不惜衆生身命。竭用人力。好殺鳥獸昆虫。好箠楚下賤。甚則枉用毒刑。加諸無罪。種種業因。感此苦報。業作醫師。爲人司命。見諸苦惱。當興悲憫。詳檢方書。精求藥道。諦察深思。務期協中。常自思惟。藥不對病。病不對機。二者或乖。則下咽不返。人命至重。冥報難逃。勿謂一時衣食。自貽莫懺之罪於千百劫。戒之哉。宜懼不宜喜也。

凡爲醫師。當先讀書。凡欲讀書。當先識字。字者。文之始也。不識字義。寧解文理。文理不通。動成窒礙。雖詩書滿目。於神不染。觸途成滯。何由省入。譬諸面牆。亦同木偶。望其拯生民之疾苦。顧不難哉。故昔稱太醫

今曰儒醫，太醫者，通天地人者也。儒醫者，讀書窮理，本之身心，驗之事物，戰戰兢兢，求中於道，造次之際，罔敢或肆者也。外此，則俗工耳，不可以言醫矣。

凡爲醫師，當先識藥。藥之所產，方隅不同，則精麤頓異；收采不時，則力用全乖。又或市肆飾僞，足以混眞。苟非確認形質，精嘗氣味，鮮有不爲其誤者。譬如將不知兵，立功何自？醫之於藥，亦猶是耳。旣識藥矣，宜習修事，雷公炮炙，固爲大法，或有未盡，可以意通，必

期躬親，勿圖苟且。譬諸飲食，烹調失度，尚不益人，反能增害。何況藥物，關乎軀命者耶？可不愼諸。

凡作醫師，宜先虛懷。靈知空洞，本無一物。苟執我見，便與物對，我見堅固，勢必輕人。我是人非，與境角立，一靈虛竅，動爲所塞。雖日親至人，終不獲益。白首故吾，良可悲已。執而不化，害加於人。淸夜深思，宜生媿耻。況人之才識，自非生知，必假問學，問學之益，廣博難量。脫不虛懷，何由納受？不耻無學，而耻下問，私心自勝，於道何益？苟非至愚，能不儆省乎。

醫師不患道術不精，而患取金不多。舍其本業，專事旁求，假寵貴人，冀其戶脗，以希世重。縱得多金，無拔苦力。於當來世，豈不酬償？作是思惟，是苦非樂。故當勤求道術，以濟物命。縱有功效，任其自酧，勿責厚報。等心施治，勿輕貧賤。如此，則德植厥躬，鬼神幽贊矣。

（已上所說五條，皆關切醫師才品道術利濟功過。仰願來學，俯從吾說，則進乎道而不圖于艾矣。詎非生人之至幸，醫道之大光也哉。）

陶弘景曰：五經四部，軍國禮服，若詳用乖越者，猶可矣。止於事迹，非宜爾。至於湯藥，一物有謬，便性命及之。千乘之君，百夫之長，何不深思戒愼耶？昔許太子侍藥不嘗，招弑君之惡；季孫饋藥，仲尼有未達之辭。知其藥性之不可輕信也。

袁氏醫家十事

一醫之志，須發慈悲惻隱之心，誓救大地含靈之苦。視衆生之病，不論親疎貴賤，賢愚貧富，皆當恫瘝乃

身。盡心殫力、曲爲極理。

二醫之學、須上通天道、使五運六氣、變化鬱復之理無一不精、中察人身、使十四經絡、內而五藏六府之淵涵、外而四肢百骸之貫串、無一不徹、下明物理、使昆蟲艸木之性情氣味、無一不暢、然後可以識病而用藥。

三醫之識、醫之用藥、如將之用兵、縱橫合變、呼吸異宜、非識見之高、不能神會而獨斷也。然此識非可襲取。非可商量。全在方寸中。虛明活潑、須滌除嗜慾、恬澹無爲、則虛空自然生白也。

四醫之愼、醫爲人之司命。生死係之。用藥之際。須兢兢業業、不可好奇而妄投一藥。不可輕人命而擅試一方。不可騁聰明而遽違古法。倘或稍悞。明有人非。幽有鬼責、可懼也。

五醫之養、君子之游藝、與據德依仁。皆爲實學。故古人技藝之工。都從善養中得來。若承蜩。若養雞。皆是法也。醫雖小道、實具甚深三昧。須收攝心體、涵泳性靈。動中習存、忙中習定。外則四體常和。內則元神常寂。然後望色聞聲、問病切脈。自然得其精。而施治得宜也。

六醫之術、醫非徒仁術。亦仙術也。諺云。古來醫道通仙道、此豈無稽之言哉。凡欲學醫、須將玄門之旨。留神講究、玄牝之門。生身之戶。守中養氣之訣。觀竅觀妙之理。務求明師指示。親造其藩而闖其室、此處看得明白。則病候之生滅。身中之造化。已洞悉矣。以之治疾。豈不易易、況人之疾、有草木金石所不能治者、則教之依法用功。無不立愈。天台智者禪師。謂一日一夜。調息之功、可以已二十餘年之痼疾。蓋天之陽氣一回。則萬物生色、人之元氣一復、則百體皆和。宿疾普消、特其餘事耳。

七醫之量、書云。必有忍。其乃有濟。有容德乃大。醫者術業既高、則同類不能無忌。識見出衆。則庸庶不能

無疑。疑與忌合。而誹謗指摘。雖所不至矣。須容之於不校。付之於無心。而但盡力於所事。間有排擠毀詈。形之辭色者。亦須以孟子三自反之法處之。彼以逆來。我以順受。處之超然。待之有禮。勿使病家動念可也。

八醫之言。仲尼大聖。屢以慎言爲訓。而醫者之言。尤當慎者。不可誇己之長。不可談人之短。不可浮誕而而駭惑病人。不可輕躁而詆誹同類。病情之來歷。用

藥之權衡。皆當據實曉告。使之安心調理。不可誣輕爲重。不可誑重爲輕。即有不識。亦須委曲明諭。病未劇。則寬以慰之。使安心調理。病既劇。則示以全歸之道。使心意泰然。寧默毋譁。寧慎毋躁。

九醫之行。語曰。以身教者從。以言教者訟。故慎吾之言。不若端吾之行。道高天下。守之以謙。智絕人羣。處之以晦。敦孝弟。重倫理。而於禮義廉耻四字。則秉之如蓍龜。遵之如柱石。久而勿失。自然起敬起信。而醫

道易行也。

十醫之守。醫雖爲養家。尤須以不貪爲本。凡有病人在。即舉家不寧。當此時而勸人酬謝。家稍不足。則百計營求。艱難更倍。即充足之家。亦於滿堂懊惱之中。而受其咨詛痛苦之惠。亦非心之所安也。故我生乎於病人所餽。不敢纖毫輕受。有不給者。或更多方周給之。非以市恩。吾盡吾心而已矣。子孫習醫而能依此十事。古之聖賢。何以加此。

爲醫八要　楫著

醫家存心。當自重。不當自輕。當自謙。不當自傲。當計功。不當計利。當憐貧。不當諂富。自重必多道氣。自輕必無恒心。自謙者。久必學進。自傲者。久必術疎。計功則用心于治病而伎巧生。計利。則用心于肥家而詭詐出。憐貧。則不擇人而醫。陰德無窮。諂富。則不待請而至。卑污莫狀。

采芝八則　明州蔣式金著

持心立品學道養身八則要矣

立己宜養重，不宜自輕。

吾黨既已斯道爲己任，則此一人之身，實千萬人之所繫命者也。必當立志清華，持躬敦樸，以示吾道之不苟。倘復徇人喪己，徑竇卑趨，且非懷珍待聘之心，難免枉尋直尺之誚。

臨證宜計功，不宜圖利。

業以治生，若謂憂道不憂貧，斯不近情之語也。第貪得之念勝，則隨在而急欲奏功，未能殫厥心以從事，有以人國僥倖者矣。是宜痌瘝乃身，以祈必濟，庶功成而利亦隨之。洵不必覬倖得失，而已祿在其中。

持心宜善下，不宜恃能。

學問之道，虛己者多功，自恃者罔功。況岐伯之傳，義精理奧，豈一人之私智所能洞測者乎。若彼管窺，狃於一得，遂有蔑視儕類之思。是以安於寡陋，而所業日荒。古人所以有持滿之戒也。良賈深藏，名宜被服。

行道宜憐貧，不宜諂富。

炎凉醜態，涉世恒情，吾黨雖無是行，而或存是心。每見遇貴介之子，持術惟恐其不精，值窶寒之徒，用意輒擠于忽略。抑思此術，原爲救人而設。煢獨無告者，更宜加以矜憐。匪第完濟世之初心，是亦陰行善之一節。

看書宜辨理，不宜執方。

陳言往論，雖古人已試之明驗，然神而明之，存乎其人。況五方之風氣強弱不齊，古今人之稟性厚薄亦異。若必執成法而不善變，是何異強方枘以就圓鑿也。淵博之士，宜出自心之玄解，毋泥括帖之舊聞。

治病宜究因，不宜務末。

標本之說，昔人論之甚詳。今之圖治者，不審其致之之繇，而濫施補救。如救焚者，第撲其燎原之焰，而不滅其火燼，雖熄而火性尚存，終必復燃也。是宜培其根，塞其源，殲厥渠魁，而群醜自向風而遁矣。

處友宜從厚，不宜懷讒。

慨自人不古處、交道澆薄、在同途共事者。更深操戈下石之慘。不知譖人者、人亦譖之、曷若息厥雌黃。互相規勸。宏其籲類。各借聲援。一以收同人之益。一以經聲氣之窮。

製藥宜求精、不宜就簡。

質本五行、各宜其用。製法咸宗雷公矣。然考諸出處、或一本而根稍異治。或一味而咀吹不同。所產有地土之殊。所蔵有新舊之别、慎毋指鹿為馬。徒取充籠、認魯為魚、漫誇具眼、致令奇方聖劑、竟介於效與不效之間。不惟無以起沉疴。而適足以損令望。

吳崔臯太素脈論

醫家以岐黃為祖、其所論脈。不過測病情。決、死生而已。未有所謂太素也。扁鵲倉公之神。仲景叔和之聖。亦無所謂太素也。何後世有所謂太素者。不惟測人之病情。而能占人之窮通。不惟決人之死生。而能知人之禍福。豈其術反過於先聖耶。是亦風鑑巫家之教耳。初學之士。先須格致此理。免為邪說搖惑。則造詣日精。而倉扁張王之堂可闖矣。故太素乃醫之旁門、不得不辨。亦惡紫亂朱。距邪放淫之意。

又

太素之說。固為不經。然其間亦有可採者。如曰脈形圓淨、至數分明、謂之清。脈形散濇、至數模糊。謂之濁。質清脈清。富貴而多喜。質濁脈濁。貧賤而多憂。質清脈濁。此謂清中之濁、外富貴而内貧賤。失意處多。得意處少也。質濁脈清、此謂濁中之清。外貧賤而内富貴。得意處多。失意處少也。若清不甚清、濁不甚濁。其得失相半而無大得喪也。富貴而壽、脈清而長。貧賤而夭。脈濁而促。清而促者、富貴而夭。濁而長者、貧賤而壽。此皆太素可採之句也。然亦不能外乎風鑑。故業太素者。不必師太素。但師風鑑。風鑑精、而太素之說自神矣。至其甚者、索隱行怪。無所不至。是又巫家之教耳。孔子曰。攻乎異端。斯害也已。吾士豈為之。

吳崔臯脉案式

脉案者。竊公案之義。醫者察得病情。立定方法。使病邪不能逃吾之方論。藥至而邪伏。譬之老吏聽訟。援律定刑。使奸人無所逃也。

一書其年。其月。其地。其人。二書其人年之高下。形之肥瘦長短。色之黑白枯潤。聲之清濁長短。三書其人之苦樂病由。始於何日。四書初時病證。服其藥。次服其藥。再服其藥。其藥少效。其藥不效。五書時下晝夜

孰甚。寒熱孰多。喜惡何物。脉之三部九候如何。六引經旨以定病名。其證爲標。其證爲本。其證爲急當先治。其證爲緩當後治。其藏當補。其藏當瀉。七書當用其方。加減其藥。其藥補其藏。其藥瀉其藏。君臣佐使之理。吐下汗和之意。一一詳盡。

書年之干支。月之春秋者。占運氣也。書其地者。占方宜也。書年形聲色者。用之以合脉也。書苦樂者。占七情也。書始於何日者。占久近也。歷問其病證藥物而書其驗否者。以之斟酌已見也。書晝夜寒熱者。辨氣血也。書喜惡何物者。察陰陽藏府也。書脉狀者。以之合年形聲色病證也。書經旨者。如法家引律。使確乎不可逃也。書病名者。用藥如用兵師出貴有名也。書標本者。識輕重也。書方藥君臣之理者。欲病人達而嘗也。

凡看王公大人。貴宦儒門之病。必書此一案。使無一毫苟且。自然奏功。即不愈。亦免誤投藥劑之疑

也。

陶弘景曰。昔時有一才人。欲刻正周易。及諸藥方。先與祖訥共論。祖云。辯釋經典。縱有異同。不足以傷風教。至于湯藥。小小不達。便至于壽夭所由。則後人受弊不少。何可輕以裁斷。祖之此言。可爲仁識。足爲龜鏡矣。

曲禮曰。醫不三世。不服其藥。宋景濂云。古之醫師。必通於三世之書。所謂三世者。一曰黃帝鍼灸。二曰神

農本草。三曰素問脈經。脈經所以察證。本草所以辨藥。鍼灸所以祛疾。非是三者。不足以言醫。傳經者。旣明哉其說。復斥其非。而以父子相承三世爲言。何其惑與。夫醫之爲道。必志慮淵微。機穎明發。然後可與于斯。雖父不能必其子也。

施發濟曰。愚按古今之稱神醫者。莫若扁鵲倉公。而扁鵲之術。則受之長桑君。倉公之術。則傳之公乘陽慶。初未聞以世傳也。至如李東垣。朱丹溪。滑伯仁輩。

皆豪傑自振者。是知醫在讀三世書。而不在于祖父之三世也明矣。

張顧存先生回頭歌

奉勸仁術們。亟回頭。從寬譬。不爲良相爲良醫。願得博濟行仁義。貧彼青蚨半養身。先要陰功積漸次。念關天。休計利。朱（秀水宰相）錢（山陰宰相）嚴（雲南冢宰）廖（雲南中丞）齊昌嗣。

幘曰虛言謗人而不知悔。大言譽已而不知慚。唯以利亂厥心。不顧醜出其口。此小人之尤者也。而醫黨特甚。殊不知世有明眼。虛言大言。如見肺肝。不旋踵而爲人鄙笑者多矣。所謂謗人譽已者。適所以譽人謗已也。吳因之先生曰。造謗者甚忙。受謗者甚閒。忙者不能造閒者之命。閒者則能定忙者之品。亦名言哉。

醫燈續焰卷二十終

醫燈續焰卷二十一　附餘

錢塘後學潘　楫碩甫輯
同邑社盟王佑賢聖翼評
男　杓燦象承
　　杓煥序承　校

病則

史記曰。病有六不治。驕恣不論于理。一不治也。輕身重財。二不治也。衣食不能適。三不治也。陰陽并藏氣不定。四不治也。形羸不能服藥。五不治也。信巫不信醫。六不治也。

秦觀勸善錄云。今人或爲湯火所傷。或爲鍼刀誤傷。手足痛已難忍。必號叫求救。至于暫時頭昏腹痛。或小可疾病。便須呼醫買藥。百般救療。于我自身。愛惜如此。至于生物。則恣意屠宰。不生憐憫。未論佛法。明有勸戒。未論天理。明有報應。若不仁不恕。唯知愛物。亦非君子長者之所當爲。諦觀物情。當念衆生。不可

（豪富婦女坐此自害）

不戒。不可不戒。

沈蓮池曰。世人有疾。殺牲祀神。以祈福祐。不思己之祀神。欲免死而求生也。殺他命而延我命。逆天悖理。莫甚于此矣。夫正直者爲神。神其有私乎。

寇宗奭曰。治婦人雖有別科。然亦有不能盡聖人之法者。今豪足之家。居奧室之中。處帷幔之內。復以帛幪手臂。既不能行望色之神。又不能殫切脈之巧。四者有二闕焉。黄帝有言曰。凡治病察其形氣色澤。形氣相得。謂之可治。色澤以浮。謂之易已。形氣相失。謂之難治。色夭不澤。謂之難已。又曰。診病之道。觀人勇怯。骨肉皮膚。能治其情。以爲診法。皆患人脈病不相應。既不得見其形。醫人止據脈供藥。其可得乎。如此言之。烏能盡其術也。此醫家之公患。世不能革。醫者不免盡理質問。病家見所問繁遝。爲醫業不精。往往得藥不肯服。似此甚多。扁鵲見齊侯之色。尚不肯信。況其不得見者乎。嗚呼。可謂難也已。

王海藏云、常人求診拱默、苟令切脈、試其能知病否。且脈者、人之氣血、附于經絡、熱勝則脈疾、寒勝則脈遲。實則有力、虛則無力。至于得病之由、及所傷之物、豈能以脈知乎。故醫者不可不問其由、病者不可不說其故。孫真人云、未診先問、最為有準。

丹溪云、病而服藥、須守禁忌。孫真人千金方、言之詳矣。但不詳言所以禁忌之由、敢陳其略、以為規戒。夫胃氣者、精純冲和之氣、人之所賴以為生者也。若謀私加壽藥。令人增疾。漸以致困。如此者非一。特須慎之。寧可不服其藥、以任天真。不得使愚醫相嫉、賊人性命、甚可哀傷

朐弘景曰、王公貴勝合藥之日、悉付群下。其中好藥貴石、無不竊換。乃有紫石英丹砂吞出洗取一片動經十數過賣、諸有此例、巧偽百端、雖復監檢、終不能覺。以此療病、故難即効、如斯並是藥家之盈虛、不是醫人之淺拙也。

亂、莫知其所以誤也。吁。此由病家之過歟。抑醫家之不明歟。

王海藏曰。病人服藥、必擇人煎藥、能識煎熬制度、須令親信恭誠至意者。煎藥銚器。除油垢腥穢。必新淨甜水為上。量水大小。斟酌以慢火煎熬分數、用紗濾去滓。取清汁服之。無不効也。

孫真人曰。古來醫人。皆相嫉害、扁鵲為秦太醫令李醯所害、即其事也。一醫處方、不得使別醫和合。脫或

慮神勞動作形苦。嗜慾無節。思想不遂、飲食失處、藥餌違法、皆能致傷、況傷之後。須用調補。恬不知怪。而又恣意犯禁、舊染之疴、與日俱積。吾見醫將日不給。而傷敗之胃氣、無復完全之望。去死近矣。

龔廷賢曰、南方人。有患病者。每延醫至家診視後。止索一方、令人搆藥于市。不論藥之真偽新陳、有無炮炙製度、輒用服之。不效。不責己之非。惟責醫之庸。明日遂易一醫。如是者數。致使病症愈增、而醫人亦惑

龔廷賢曰。北方有患病者。每延醫至家。不論病之輕重。時刻欲效。否則即復他攻。朝秦暮楚。殊不知人稟有虛實。病感有淺深。且夫感冒腠理之疾。一二劑可愈。至于內傷勞瘵之證。豈可以一二劑而愈哉。此習俗之弊。誤人者多矣。唯智者辯之。

寇宗奭曰。夫病不可治者。有六失。失于不審。失于不信。失于過時。失于不擇醫。失于不識病。失于不知藥。六失之中。有一于此。即爲難治。非止醫家之罪。亦病家之罪也。又有醫不慈仁。病者猜鄙。二理交馳。于病何益。由是言之。醫者不可不慈仁。不慈仁。則招非。病者不可猜鄙。猜鄙則招禍。惟賢者動達物情。各就安樂。亦治病之一說耳。

蘇東坡曰。脉之難明。古今之所病也。至虛有盛候。大實有羸狀。疑似之間。便有死生之異。士大夫多秘所患以求瘥。驗醫能否。使索病于冥漠之中。辯虛實冷熱于疑似之間。醫者不幸而失。終不肯自謂失也。巧飾遂非。以全其名。間有謙愿者。雖合主人之言。亦參以所見。兩存而雜治。吾平生求醫。蓋于平時默驗其工拙。有疾求療。必盡告以所患。使醫了然知患之所在。然後診之。虛實冷熱。先定于中。脉之疑似。不能惑也。故雖中醫。治吾疾常愈。吾求疾愈而已。豈以困醫爲事哉。

褚澄曰。用藥如用兵。用醫如用將。善用兵者。徒有車之功。善用藥者。薑有桂之用。知其才智。以軍付之。用將之道也。知其方伎。以生付之。用醫之道也。世無難治之疾。有不善治之醫。藥無難代之品。有不善代之人。非命而絕。從可知矣。

素問曰。拘于鬼神者。不可與言至德。惡于鍼石者。不可與言至巧。病不許治者。病必不治。治之無功矣。

王符潛夫論曰。疾棄醫藥。更往事神。故至于死亾。不自知爲巫所欺誤。乃反恨事巫之晚。此熒惑細民之甚者也。

病家須知

潘之淇著

一養神明。凡人一身。精血從氣。氣從神。神者。精氣之母也。禮曰。有疾。疾者齋。養者皆齋。齋也者。清明之至也。心不苟慮。身不苟動。志一氣應。達乎神明。所以理陰陽而迎天庥也。肝主仁。心主禮。肺主義。腎主智。脾主信。性情之宅也。是故却病法有曰。靜坐觀空。覺四大皆從假合。此上之上者也。又曰。常將不如我者。巧自寬解。萬事到來。以死譬之。庶亦心安意定。清虛日來。又曰。時請高明親友。講開懷出世之事。亦足以蕩滌煩襟。開發志意。若夫愁思纏結。則神鬱于內。內而不出。爲滯爲幽。暴怒炎攻。則氣衝於上。上而不下。爲張爲蹶。又或悽悽身後。盼盼妻孥。視眼前一切可欣可喜。難割難捨之物。繫戀不已。營度不休。未有不至于傷生隕命者也。試想到傷生隕命時。那一人能替得我。那一物能將得去耶。蘇東坡曰。因病得閑殊不惡。安心是藥更無方。此真病人一服清涼散也。

不但愈疾更可長生

大覺之語

一防邪物。房室不遠。則耗其精。勞動不戒。則耗其力。言語不省。則耗其氣。此邪之自內受者也。起居不謹。則風露侵。飲食不節。則腸胃損。此邪之自外入者也。健人有此。不免於病。況病者而可以益之壽乎。然病人性情多恣。稍不當意。忿悁意生。父母妻子。懼其拂也而任之。偏於數事。多所違犯。故病者不可自輕其生。而侍病者。尤不可不慎防容攝。事事留心。若縱其所欲。未有不至於壞者。慎之慎之。

一戒諱疾。醫家四要曰望聞問切。猶人之有四肢也。一肢廢。不成其爲人。一要缺。不成其爲醫。然必先望先聞而後切者。所重有甚于切也。乃病家不知此理。往往秘其所患。以俟醫之先言。卽以驗醫之能否。豈知病固有證似脉同。而所患大相刺謬。若不先言明白。猝持氣口。其何能中。昔丹溪有叔祖。年七十。患泄瀉。脉濇而帶弦。詢其喜食鯉魚。遂以茱萸陳皮生薑砂糖等藥探吐膠痰而瀉止。又有鄰人。素患痺瘡。夏

初泄瀉、脉亦濇而弦。丹溪曰。此下痢之重者。與當歸蘆薈丸去麝。四劑而得止。此兩人症似脉同。而治之迥別者。以其問之詳。言之明也。又如其人。或先貴後賤。或先貧後富。暴樂暴苦。始樂後苦。及所思所喜。所惡所欲。所疑所懼之云何。其始病所傷所感。所起所在之云何。以至病機日逐轉變之情形。病後所服藥餌之逆合。必詳言之。則切脉自無疑惑。投劑便可奏功。若種種諱忌不言。而懵然伸臂授腕。使其倖邀射覆之一中。是直以性命為戲也。（以性命為戲。舉世皆然。不識何以如此顛倒耳。）王海藏曰。常人求診拱默。惟令切脉。殊不知氣血附於經絡。熱則脉疾。寒則脉遲。實則有力。虛則無力。若得病之因。與所傷之物。豈能以脉知之乎。蘇東坡曰。吾疾必盡告醫者。使胸中了然。然後診脉。疑似不能惑也。吾求疾愈而已。豈以困醫為事哉。兩翁真高明之見也。病家不可不知。

一諱微疾。凡服藥於微。則其病易療。若過半而治療者什三矣。過七八而治療者什不得一矣。昔齊中尉潘滿如小腹痛。倉公診曰。病得之酒且内。中尉不復自止于内。二十八日當溲血而死。居二十五日。果溲血。三日死。王仲宣年二十。仲景謂之曰。君有病。四十歲當眉落。半年而死。授五石湯。令服。可免。居數日。復問之。詭云已服湯。仲景曰。色候固非服湯之診。君何輕命也。後至期果如其言。眉落而死。今人染病在身。不自珍惜。罔避醫戒。忽略初機。直至深重。乃始張皇。卒以喪亡而不救。噫。晚矣。

一慎藥石。病家有三種陋習。一者聽信師巫。廣行殺戮。禱賽鬼神。而醫藥反若可緩。煎調漫託匪人。二者不明藥理。且疑更醫。致使源流不清。臧否淆溷。亂投雜劑。罔知適從。三者自命知醫。膠持意見。妄為加減。以掣醫人之肘。有此三弊。雖倉扁無以見其能矣。善養者知之。

尊生十二鑑（徐著）

館衍善防之法

遠房室　經脈篇云、人始生先成精、又上古天真論爲素問首篇、亦單提得一精字、蓋精者、先天之胚胎、生生之種子也。故欲修長年。必先遠色。矧病者乎。病既因虛致邪、務宜堅城却寇、

節嗜欲　嗜欲不節、心無寧時、損耗精神。莫此爲甚。人非木石、安能絕無、節而寡之、斯爲得矣。

斷思想　思想無窮。神結於內、展轉勿置。煩由以生、時日未覺、久則暗損氣血多矣、亟宜斷絕、

消暴怒　內經云、怒則氣上、上而不下。病從生矣、甚有嘔血者。痰塞仆蹶者、皆氣上不下故耳。能臨事顧身、怒將潛滅、

戒勞動　動而生陽。勉力動之、成火矣、故勞字上從火、下從力。動亦從力、從重、非重力不能動也。勞動、則氣血煩沸、諸火上騰、病變不出、而素有火疾者、更爲甚焉、唯靜逸爲對治之法、

省言語　言由心發、既發於心。則恐其錯誤、未免煩費吾心、細爲檢點、又人之一言一語、必由呼吸而出、費心損神、呼吸損氣、神氣兩虧、於人何益

慎起居　起居者何。一切行住坐臥。早起晚息也。慎起居者何、言一切行住坐臥、早起晚息間、謹而慎之。勿使風寒暑濕之邪。乘虛侵襲。而病中尤當防備。要令我城堅固。莫教闖寇益兵。

勿迎送　迎送勞形、周全於迎送之間。則勞神矣。諒我病夫、雖禮可廢。

節飲食　飲食賴以養生、而養生中、有戕生者。故生氣通天論云。陰之所生、本在五味、陰之五宮、傷在五味、傷者、言其偏勝也、五味且不可偏、而乃有偏於凉冷、偏於炙煿、偏於膏粱、偏於麴蘗者、漸令濕熱垢膩久積腸胃。一旦發爲癃瘍疔毒、痰火癰疽、種種惡疾。必不能免。人又何苦取一時之快、而博他日之大不快也。愚哉。

檢藥石　藥石聽醫、吾何以檢之哉、擇其善者從之。

其不善者薬之。善與不善。訴之於理而已。更有効醫自試。君佐妥施。致令輕者困。重者篤。忽於入口。遺禍噬臍。愚之甚矣。

修德行　古語云。人有善念。天必從之。故國有災異。君雖修德。可以弭之。是君一身修德。即能蔭庇一國。而人一心修德。豈不能獲免已身。所謂修德者何。即懺悔改過也。要在掃除舊習。頓悟昨非。束步繩趨。兢持惕日。如此不輟。如此終身。是之謂眞懺悔。真改過

也。天意自然向汝。兇眚自然潛消。若急來抱佛脚。上岸討行李。試問頭上翁。已早知之矣。

明用度　諺言黃白為世間活寶。寶固不可浪費。活豈教人死守乎。有等家富矣。而貧狀浮面。窮語挂唇。惟利是圖。卑汚不顧。詎知此生之光景有限。饒君粟貫陳紅。究竟來一樣耳。較彼處貧安。隨分樂者。果孰得孰失乎。噫。良可悲也。

閩李凜泉者。商吾浙。戊辰正月。忽中風昏憒。延醫治療。至四月不愈。召余診。余與藥。復諄諄戒忌。踰月。復不減。詢知其以余所囑戒忌者。竟忘矣。因命錄書調攝事宜十二則。令置座右。不月而李疾頓愈。是知調攝力。勝吾籠中物百倍。敢梓傳為病家一助云。

寇宗奭曰。夫未聞道者。放逸其心。逆於生樂。以精神徇智巧。以憂畏徇得失。以勞苦徇禮節。以身世徇財利。四徇不置。心為之病矣。極力勞形。躁暴氣逆。當風

縱酒。食嗜辛鹹。肝為之病矣。飲食生冷。溫涼失度。久坐久臥。大飽大饑。脾為之病矣。呼叫過常。辯爭陪答。冒犯寒暄。恣食鹹苦。肺為之病矣。久坐濕地。强力入水。縱欲勞形。三田漏溢。腎為之病矣。五病既作。故未老而羸。未羸而病。病至則重。重則必斃。嗚呼。是皆弗思而自取之也。衛生之士。謹此五者。終身無苦。經曰不治已病治未病。正此謂矣。

寇宗奭曰。夫安樂之道。在能保養者得之。况招來和

氣之藥少。攻炎之藥多。不可不察也。是知人之生。須假保養。無犯和氣。以資生命。纔失將護。便至病生。苟或處治乖方。旋見顛越。防患須在閑日。故曰安不忘危。存不忘亾。此聖人之預戒也。

朱丹溪曰。與其救療於有疾之後。不若攝養於無疾之先。是故已病而求治。所以爲醫家之法。未病而先治。所以明攝生之理。夫如是。則思患而預防者。何患之有哉。此聖人不治已病治未病之意也。

食治通說云。燕居暇日。何所用心。善養形神。周防疾患。常存謹畏。無失調將。食飲之間。最爲要務。安危所繫。智力可分。與其畏病而求醫。孰若明理以自求。與其有病而治以藥。孰若抑情而預治。情斯可抑。理亦自明。能任理而不任情。則所養可謂善養者矣。防患却病之要。其在茲乎。

寇宗奭曰。夫用藥如用刑。刑不可誤。誤卽干人命。用藥亦然。一誤。卽便隔生死。然刑有鞫司。鞫成。然後議定。議定。然後書罪。蓋人命一死。不可復生。故須如此詳謹。今醫人纔到病家。便以所見用藥。若高醫識病知脈。藥又相當。如此卽應手作効。或庸下之流。孟浪亂投湯劑。逡巡便至困危。如此殺人。何太容易。世間此事甚多。良由病家不擇醫。平日未嘗留心于醫術也。可不懼哉。

物理論曰。夫醫者。非仁愛不可托也。非聰明達理。不可任也。非廉慤淳良。不可信也。是以古之用醫。必選

名姓之後。其德能仁恕博愛。其智能宣暢曲解。能知天地神祇之次。能明性命吉凶之數。處虛實之分。定逆順之節。原疾疹之輕重。而量藥劑之多少。貫微達幽。不失細小。如此乃謂良醫。豈區區俗學者能之哉。

陶弘景曰。醫貴有恒。不可權飾妄造。所以醫不三世。不服其藥。九折臂者。乃成良醫。蓋謂藥功積深故也。今之承藉者。多恃術名價。不能精心研習。虛傳聲美。京邑諸人。皆尚聲譽。不取實學。聞風競往。自有新學

之流

該明、而名稱未播貴勝。以爲始習、多不信用。委命虛名、良可惜也。

吳球曰。西鄉一人患病、久蘇城聞名醫。輿迎治病。因事絆不得親行。遂令伊兄前去。患者不樂。服藥無効。遂送歸。仍請本醫。至途遇兄。詢其病源。兄曰。其病、其脈、用某藥。今在此囊中。遂將藥帶至病家。病者聞至。遂有喜色。診脈後。竟將前藥煎與服之。病者曰。此藥氣味、與前者大不相同。須臾問曰、何如。答曰。稍可。次

日又進。其病瘳矣。吁。藥一也。其氣味異焉。蓋其人疑心故耳。

宋景濂贈鄭院判序云。有其術而無所於用。値可用之、機而人不能任之。欲望其以有成者。百家之所難也。惟醫爲甚。扁鵲華佗。天下固不常有也。使有之。而値淺易之疾。遇難語之人。上之不足展吾術。次之不能從吾所欲爲。法宜鍼而責我以砭。法宜實而命我以虛。乖迕拘執。卒之與恒醫無異。是豈醫之罪哉。勢

令之通矣

使然也。誠有善任人者。惟吾所用而不較。期以成効而不泥于私謀。人人皆可得而効矣。故疾有死乎過愛而生于違理。過愛者。恐其危而不肯任人。違理者。知非己之所能爲。則信人而求其成效。其違者。乃所以生之。而愛乃所以殺之也。若福建承宣布政使陳君彥銘。其違理者歟。陳君之妻。偶得寒疾。寢弱已甚徵太醫院判官鄭某治之。鄭請曰。愈否在我。幸無撓我。陳君許諾。鄭君乃視脈而療之。或謂藥性與疾戾

以語陳君。君不聽。任之不變。已而果愈。陳君出金帛謝之。鄭君辭曰。子善任吾故爾。使子不我任而自用。雖欲愈可得耶。

孫真人曰。世間凡有病人親朋故舊交游。來問疾。其人曾不經事。未讀一方。自誇了了。詐作明能。談說異端。或言是虛。或言是實。或云是風。或云是氣。或云是水。或云是痰。紛紛謬說。種種不同。破壞病人心意。不知孰是。遷延未就。時不待人。欻然致禍。各自散走。是

故大須好人、及好名聲、識病深淺。探賾方書、博覽古今。事事明解者看病、不爾、大悞人事。

見聞搜玉云、欲食男女、人之大欲存焉。制之若無、斯爲聖人。節而不縱。可謂賢人。縱而不節。是爲下愚。蓋殺生以資口腹、淫欲以喪天真。二者更相助法。因美飲食、則血氣盛。血氣盛則淫欲多、淫欲多。則反損血氣。血氣損、則又賴飲食以資補、是二者、更相造罪也。若欲省口腹、先節淫欲、若能節淫欲、即可省口腹。此

乃安身延年之道。若縱之。則人生受用之數有限。限盡則早終矣。

徐春甫云。愚見患者小愈。胃氣纔回。咸謂以爲能食者不死。率意恣欲。妄投厚味。惟其不嗜勝人爲憂。噫。弗思甚也。殊不悟厚味逐邪。古人攝養。無以寡嗜欲。薄滋味爲先。況病人傷敗之際。而又重傷。其不危殆者寡矣。又見久病之人少愈。而目尚昏。腰尚重痛、謂病久鬱抑。精閉不通。率爾入房以疏鬱精。往三行而病遂起。反至不救者多矣。飲食不節、反輕爲重。反安爲危者。歷歷有之。此天下之通弊。惟賢者知之。

本草衍義云。身以安樂爲本。安樂以保養爲本。本既固。疾病何由而生。天横何由而至。攝生之道。無逮于此。夫草木無知。猶假灌溉。矧人爲萬物之靈。豈不資保養。然保養之義。其理萬計、約而言之。其術有三。一養神。二惜氣。三隄疾。忘情去智。恬惔虛無。離事全真。內外無寄。如是則神不內耗。境不外惑。真一不雜。神

自寧矣。此養神也。抱元一之本根。固歸真之精氣。三焦定位。六賊忘形。識界既空。大同斯契。則氣自定矣。此惜氣也。飲食得宜。滋凉合度。出處無犯于八邪。寤寐不可以勉強。則身自安矣。此隄疾也。

和氣湯　專治一切客風怒氣怨氣抑鬱不平之氣

先用一忍字後用一忘字右二味和勻不語嚥送下服後更飲醇酒五七杯使熏然半酣尤佳

快活無憂散　除煩惱斷妄想右二味等研爲極細

末。用清淨湯調服，凡合此藥，先要灑掃一淨室，窗楞虛朗，前列小檻，栽花種竹，貯水養魚，室中設一几。一榻。一蒲團，每跏趺靜坐，瞑目調息，將前藥服之。至三柱香久，任意所適，或散步空庭，吟弄風月，或展玩法帖名畫，或歌古詩二三首，倦則啜苦茗一甌，就枕偃息，久之。覺神清氣爽，天君泰然，不知人間有煩惱，不見我心有妄想，斯則效可睹矣。

我命在我，不在于天。愚人所自致百病風邪者，皆由恣意極情，不知自惜，故虛損生也。譬如枯朽之木，遇風即折，將崩之岸，值水先頹，今若不能服藥，但知愛惜節情，亦得一二百年壽也。

吳山里人日記云。太上曰，真人在己，莫問鄰，老子曰事天治人莫如嗇。是為深根固蒂，長生久視之道，則彼家採戰之說，决非真道可知矣，其原始于富貴人既欲長生，又躭情慾，方術之士，因進其說以逢其慾而要重將。據余所見，士大夫悮信而悮用之，弱者必夭，強者必衰，大都不得終其天年，況長生乎。夫參者，草木也，可以補虛，酒肉長食也，可以助龐，秋石河車，人所棄也，製而服之，可以起癈，如所云二弦真氣，童少津液，豈得無補，但採取之法，既無真傳，臨境之時，又多危險，所得者少。所失者多。不如一切屏絕可也。

奉親養老書云。老人之食。宜其溫熱熟軟，忌粘硬生冷，每日晨朝，宜以醇酒先進平補下元藥一服，女人則平補血海藥一服，無燥熱者良。葷猪羊腎。煮一盃壓之。五味葱薤鶉膂等粥皆可。至辰時，服人參平氣散一服。然後次第以順四時溫軟飲食進之。食後引行一二百步，令運動消散，臨臥時，進化痰利膈人參半夏圓一服。尊年之人。不可頓飽，但頻頻與食，使脾胃易化，穀氣長存。若頓令飽食。腸胃虛薄，不能消納。故成疾患。為人子者，深宜體悉，此養老之大要也。日止可進前藥三服。不可多餌，如無疾患，亦不須服藥。但只調停飲食。自然無恙矣。

老到之部

奉親養老書云。老人藥餌、止是扶持之法、只可用温平順氣、進食補虚、中和之藥治之、不可用市肆贖買、他人惠送、不知方味、及狠虎之藥。與之服餌、切宜詳審。

奉親養老書云、天癸數窮。則精血耗竭。神氣浮弱、返同小兒。全假將護以助衰晚。若遇水火兵寇。非横驚怖之事、必先扶持老人于安穩處避之。不可喧忙驚動尊年之人、一遭大驚、便至冐昧、因生餘疾。凡喪葬

凶禍、不可令弔疾病危困、不可令問、殺戮飲食、不可令驚。悲哀憂愁不可令人預報、穢惡臭敗、不可令聞、生冷粘硬毒物、不可令食、敝漏卑濕、不可令居、卒風暴寒、不可令冐、煩燠大熱、不可令中、動作行步。不可令勞、暮夜之食、不可令飽、陰霧晦瞑、不可令饑、假借鞍馬、不可令乘、偏僻藥餌、不可令服、廢宅欹宇、不可令入、荒閣塚墓、不可令遊、危險之地、不可令登。淵急之水、不可令渡、闇昧之室、不可令孤。凶禍遠報、不可令知、輕薄婢使不可令親、家國冗事。不可令管、皆宜忌之、以保長年。

奉親養老書云、老人骨肉疎。冷風易中。若窄衣貼身。暖氣着體、自然氣血流利、四肢和暢、雖遇盛夏。亦不可袒露其頸後連項、常用紫軟夾帛。自頸後巾幘中。垂下脊肉、入衣領中、至背胛間以護腠理中年人。肌肉瘦怯、腠理開疎、若風傷腠中、便成大患、深宜慎之、

瑣碎錄云、老不醫風非不醫風也、只當調氣爾、必不

醫勞。非不醫勞也。只當調脾爾。

瑣碎錄云。世人奉養往往倒置。早漱口、不若將晚而漱。去齒間所積、牙亦堅固。

千金要方云大喜大悲、男女熱病未差、女子月血新產者、不可合陰陽。熱疾新差。交者死。

千金要方云。老子曰。凡人生多疾病者、是風日之子、生而早死者。是晦日之子。在胎而傷者。是朔日之子。生而母子俱死者、是雷霆霹靂日之子。能行步有知

一第996冊 續修四庫全書 第53 反正外

死者是下旬之子。兵血死者是月水盡之子。又是月傾之子。能胎不成者是弦望之子。命不長者是大醉之子。不痴必狂者是大勞之子。生而不成者是平曉之子。意多恐悸者是日出之子。好爲盗賊貪欲者是禺中之子。性行不良者是日中之子。命能不全者是日昳之子。好詐及妄者是晡時之子。不音耳聾者是人定之子。天地閉氣不通其子。死夜半合陰陽。生子上壽賢明。夜半後合會生子中壽。聰明智慧。雞鳴

合會。生子下壽。尅父母。此乃天地之常理也。

千金要方云。患赤目。須忌房事。不然令人患内障。

千金要方云。善攝生者。凡覺陽事輒盛。必謹而抑之。不可縱心竭意以自賊也。若一度制得。則一度火滅。一度增油。若不能制。縱情施瀉。即是膏火將滅。更去其油。可不深自防。

千金要方云。夜夢惡。不須說。旦以水面東噀之。咒曰。惡夢著草木。好夢成寶玉。即无咎也。

巢氏病源論云。人卧不悟。皆是魂魄外遊。爲他邪所枕錄。欲還未得。致成魘也。忌火照。則神魂不復入。乃至于死。而人有于燈光前魘者。是本由明出。故不忌火。

葛洪肘後方云。人忽不寤。勿以燈照之。殺人。但痛嚙撮指甲際而唾其面。則活。取韭擣汁。吹鼻中。薤汁亦得。冬月用韭根汁。灌于口中。

瑣碎錄云。浴出不可和衫裙寢熟。恐成外腎疼。腰背

攣曲。

方勺泊宅篇云。眼疾不可浴。浴則病甚。至有失明者。能斷沐頭。則一生無眼疾。

沐浴身心經云。沐浴用五種香湯。一者白芷。能去三尸。二者桃皮。能辟邪氣。三者柏葉。能降真仙。四者零陵香。能集靈聖。五者青木香。能消穢召真。

本草云。髗氣水浴髮。令髮長密黑潤。

本草云。乾粳米飯。常食令人熱中。唇口乾。不可和蒼

耳、食令人卒心痛、惡燒倉米炭。和蜜漿服之。不爾、即死。不可與馬肉食。發痼疾。陳倉米亦然。

張文潛云。張安道每旦起。食粥一大甌。空腹胃虛。穀氣便作。所補不細。又極柔膩。與藏府相得。妙齊和尚說山中僧每將旦一粥。甚繫利害。如不食。則終日覺藏府燥渴。蓋能暢胃氣。生津液也。東坡云。夜坐饑甚。吳子野勸食白粥。云能推陳致新。利膈養胃。

食治通說云。食飲以時。饑飽得中。水穀變化。冲氣和

融。精血以生。榮衛以行。府藏調平。神志安寧。正氣充實于內。元真通會于外。內外邪沴莫能干。一切疾患無從作。

瑣碎錄云。喫羹飦之類過多。覺不快者。唯飲酒至醉。則既醒之後。所苦皆差。其効過于服藥。陳橘皮湯亦能解。

食治通說云。當盛暑時。食飲加意調節。緣伏陰在內。腐化稍遲。又果蓏園蔬。多將生啖。蘇水桂漿。唯冷飲生冷相值。化尤難。微傷即飧泄。重傷即霍亂吐利。是以暑月食物。尤要節減。使脾胃易于磨化。戒忌生冷。免有腹藏之患。

食治通說云。好食生冷者。將為腹痛心疼。嘔吐泄痢之疾。好食炙爝者。將為口瘡咽痛。壅熱癰瘍之疾。

（先飲湯後食冷何取於冷可笑）

韜府名談云。今人食冷物。必飲湯。將溫其脾。已冰其脾。何溫之有。不若未食冷物。先飲湯溫之。繼食冷無患。

千金要方云。善養性者。先饑而食。先渴而飲。食欲數而少。不欲頓而多。則難消也。常欲令如飽中饑。饑中飽耳。蓋飽則傷脾。饑則傷氣。故每學淡食。食當熟嚼。使米脂入腹。

食治通說云。食飲之宜。當候已饑而進食。食不厭熟嚼。仍候焦渴而引飲。飲不厭細呷。無待饑甚而後食。食不可太飽。或覺微渴而省飲。飲不欲太頻。食不厭精細。食不厭溫熱

王叔和、洞識攝生之道、常謂人日食不欲雜、雜則或有所犯、當時或無災患、積久爲人作疾、尋常飲食、每令得所、多食令人膨脹短氣、或致暴疾、夏至秋分、少食肥膩餅臛之屬、此物與酒食瓜果相妨、當時不覺病、入秋陽消陰盛、寒氣總至、多諸暴卒、良由涉夏取冷太過、飲食不節故也、而不達者、皆至病至之日、謂是受病之始、不知其所由來者漸矣、豈不惑哉。

瑣碎錄云、食後以小紙撚打噴嚏數次、氣通、則目自明、痰自化。

食療本草云、野鴨九月已後、卽中食、全勝家者、雖寒不動氣。人身上小熱瘡、多年不好者。但多食之卽瘥。

本草云、飲食須逐日煮熟用、經宿卽動氣、有牙齒并脾疾人、切不可吃。

瑣碎錄云。伏熱者、不可飲水、衝寒者、不可飲湯、

本草拾遺云、溫病起、食蓴菜多死、

博物志云、秋蟹毒者。無藥可療、自相向。足班者、尤甚。

食療本草云。女人倒生、吞麻子二三粒、卽順生、

瑣碎錄云、欲醒酒、食橄欖、

瑣碎錄云。食韭後、楊枝皮揩牙、用冷水漱之、不作氣、

瑣碎錄云、大雪中跣足、不可便以熱湯洗、或飲熱酒。足指隨墮、

雲笈七籤云、飲食伏床內、不可向北奧食。

本草服藥食忌、凡藥中有甘草、忌食猪肉。菘菜、海菜、○黃連、胡黃連、忌猪肉、冷水、○蒼耳、忌猪肉。馬肉、米泔、○桔梗、烏梅、忌猪肉、○仙茅、忌牛肉、牛乳。○半夏菖蒲、忌羊肉、羊血、飴糖。○牛膝、忌牛肉。○陽起石、雲母、鐘乳、硇砂、礬石、並忌羊血。○商陸、忌犬肉。○丹砂空青、輕粉、並忌一切血、○吳茱萸、忌猪心、猪肉、○地黃、何首烏、忌一切血、葱、蒜、蘿蔔、○補骨脂。忌猪血、蕓薹、○細辛、藜蘆、忌狸肉、生菜、○荊芥、忌驢肉、黃顙魚、河豚、一切無鱗魚、蟹、○紫蘇、天門冬、丹砂、龍骨、忌鯉魚、○巴豆、忌野猪肉、菰筍、蘆筍、醬、冷水、○蒼朮。白朮。

忌雀肉青魚菘菜桃李○薄荷忌鱉肉○麥門冬。忌鯽魚。○常山。忌生葱。生菜。○附子。烏頭。天雄。忌豉汁。稷米。○牡丹。忌葱。胡荽。○厚朴。萆麻。忌炒豆。○鱉甲。忌莧菜。○威靈仙。土茯苓。忌醋。及一切酸味。○蜜。忌鮓。及生葱。

凡服藥。不可雜食肥猪。犬肉。油膩。羹膾。腥臊陳臭諸物。

凡服藥。不可多食生蒜。胡荽。生葱。諸菓。諸滑滯之物。

凡服藥。通忌見死屍。產婦。淹穢等事。

瑣碎錄云。凡服藥。藥氣與食氣。不得相逢。食氣消。則服藥。藥氣散。則進食。其藥有食前食後者。皆宜審此。

醫家難事有三情

張介賓著

一曰。病人之情。所謂病人之情者。有素稟之情。如五臟各有所偏。七情各有所勝。陽臟者。偏宜於凉。陰臟者。偏宜於熱。耐毒者。緩之無功。不耐毒者。峻之爲害。此臟氣之有不同也。有好惡之情者。不惟飲食有憎愛。抑且舉動皆關心。性好吉者。危言見非。意多憂者。慰安云僞。未信者。忠告難行。善疑者。深言則忌。此情性之有不同也。有富貴之情者。富多任性。貴多自尊。任性者。自是其是。真是者。反成非是。自尊者。遇士或慢。自重者。安肯自輕。此交際之有不同也。有貧賤之情者。貧者。衣食不能周。况乎藥餌。賤者。焦勞不能釋懷抱。可知。此調攝之有不同也。又若有良言甫信。謬說更新。多歧亡羊。終成畫餅。此中無主而易亂者之

爲害也。有最畏出奇。惟求穩當。車薪杯水。寧甘敗亡。此內多懼而過慎者之爲害也。有以富貴而貧賤。或深情而挂牽。戚戚於心。心病焉能心藥。此得失之情爲害也。有以急性而遭遲病。以更醫而致雜投。皇皇求速。速變所以速亡。此緩急之情爲害也。有偏執者。曰吾鄉不宜補。則虛者受其禍。曰吾鄉不宜寫。則實者被其傷。夫十室且有忠信。一鄉焉能皆符。此習俗之情爲害也。有參朮入脣。懼補心先否塞。硝黃沾口。

[illegible]神即飄揚，夫杯影亦能為祟，多疑豈法之良，此成心之情為害也。有諱疾而不肯言者，終當自悞。有隱情而不敢露者，安得其詳，然尚有故隱病情，試醫以脉者。使其言而偶中。則信為明良，言有弗合。則目為庸劣，抑孰知脉之常體。僅二十四，病之變象。何啻百千，是以一脉所主非一病。一病所見非一脉。脉病相應者。如其病得其脉則吉。脉病相逆者。其脉值其病則凶。然則理之吉凶。雖融會在心。而病之變態，又

安能以脉盡言哉。故知一，知二。知三。神聖諄諄於參伍。曰工。曰神，曰明。精詳豈獨於指端，彼俗人之淺見。固無足怪，而士大夫之明慧。亦每有蹈此弊者。故忌望聞者。診無聲色之可辨，惡詳問者，醫避多言之自褻。是於望聞問切，已舍三而取一。且多有并一未明。而欲得夫病情者。吾知其必不能也。所以志意未通。醫不免為病困，而朦朧猜擬，病不多為醫困乎。凡此皆病人之情。不可不察也。

二曰傍人之情。所謂傍人之情者。如浮言為利害所關，而人多不知檢，故或為自負之狂言。則醫中有神理，豈其能測，或執有據之鑿論。而病情多亥豕。最所難知，或操是非之柄，則同於我者是之，異於我者非之，而真是真非。不是真人不識。或執見在之見。則頭疼者。云救頭。脚疼者。云救脚。而本標綱目。反為迂遠庸談，或議論於貴賤之間，而尊貴執言。孰堪違抗，故明哲保身之士。寧為好好先生，或辯析於親疎之際

而親者主持，牢不可拔。雖真才實學之師，亦當唯唯而退，又若薦醫，為死生之攸係。而人多不知慎，有或見輕淺之偶中而為之薦者。有意氣之私厚而為之薦者，有信其便便之談而為之薦者，有見其外飾之貌而為之薦者，皆非知之真者也。又或有貪得而薦者，陰利其酬。關情而薦者，別圖冀望。甚有斗筲之輩者。妄自驕矜。好人趨奉。薰蕕不辨，擅肆品評。譽之。則盜跖即堯舜。毀之，則鸞鳳亦鴟鴞。洗垢索瘢。無所不

只此數條說盡醫家病處肯綮矣

至。而懷眞抱德之士。必其不倦。若此流者。雖其發言容易。欣戚無關。其於淆亂人情。莫此爲甚。多致明醫有掣肘之去。病家起刻骨之疑。此所以千古是非之不明。總爲庸人擾之耳。故竭力爲人任事者。豈不岌岌其危哉。凡此皆傍人之情。不可不察也。

三曰同道人之情。所謂同道人之情者。尤爲閃灼。更多隱微。如管窺蠡測。醯雞笑天者。固不足道。而見偏性拗。必不可移者。又安足論。有專恃口給者。牽合支

吾。無稽信口。或爲套語以誑人。或爲甘言以悅人。或爲强辯以欺人。或爲危詞以嚇人。儼然格物君子。此便佞之流也。有專務人事者。典籍經書。不知何物。道聽途說。拾人唾餘。然而終日營營。綽風求售。不邀自赴。假媚取容。偏投好者之心。此阿諂之流也。有專務奇異者。腹無藏墨。眼不識丁。乃詭言神授。僞託秘傳。或假脉以言禍福。或弄巧以亂經常。最覺新奇。動人甚易。此欺詐之流也。有務飾外觀者。誇張侈口。羊質虎皮。不望色。不聞聲。不詳問。一診而藥。若謂人淺我深。我明人昧。此粗疎孟浪之流也。有專務排擠者。陽若同心。陰爲浸潤。夫是曰是。非曰非。猶避隱惡之嫌。弟以死生之際。有不得不辨者。固未失爲眞誠之君子。若以非爲是。以是爲非。顚倒陰陽。掀翻禍福。不知而然。庸庸不免。知而故言。此其良心已喪。讒妒之小人也。有貪得無知。視人性命者。如事已疑難。死生反掌。斯時也。雖在神良。未必其活。故一藥不敢苟。一着

不敢亂。而僥倖貪於挽回。忽遇若輩。求速貪功。謬妄一投。中流失楫。以致必不可救。因而嫁謗自文。極口反噬。雖朱紫或被混淆。而若輩亦何辜受害。此貪倖無知之流也。有道不同。不相爲謀者。意見各持。異同不決。夫輕者不妨少謬。重者難以畧差。故凡非常之病。非非常之醫不能察。用非常之治。又豈常人之所知。故獨聞者。不侔於衆。獨見者。不合於人。大都行高者謗多。曲高者和寡。所以一齊之傅。何當衆楚之咻。直

至於敗。而後草然退散、付之一人。則事已無及矣。此庸庸不揣之流也、又有久習成風。苟且應命者。病不關心、些須惟利、盜病家既不識醫。則僥趨僥錢。醫家莫肯任咎、則惟苓惟梗、或延醫務多、則互爲觀望。或利害攸係、則彼此避嫌、故爬之不癢。過之不痛。醫稱穩當、誠然得矣、其於坐失機宜。奚堪號悞乎、此無他、亦惟知醫者不真、而任醫者不專耳、詩云、發言盈庭。誰執其咎。築室於道。不潰於成。此病家醫家近日之

通弊也。尚多難盡。必期不失。未免遷就。但遷就。則礙於病情。不遷就。則礙於人情。有必不可遷就之病情而復有不得不遷就之人情、其將奈之何哉。當局者。能詳察斯言。而各爲儆省。非惟病人之情。傍人之情同道人之情。不難於不失。而相與共保天年。同登壽域之地。端從此始。惟明者鑒之。

陶弘景曰。凡煮湯。欲微火。令小沸。其水。依方大略二十兩藥。用水一斗。煮取四升。以此爲準。然利湯欲生。少水而多取汁。補湯欲熟。多水而少取汁。不得令水多少。用新布兩人以尺木絞之。澄去垽濁。紙覆令密。溫湯勿用鐵器。服湯寧小沸。熱則易下。冷則嘔湧。

李時珍曰。陶氏所說。乃古法也。今之小小湯劑。每一兩。用水二甌爲準。多則加。少則減之。如劑多水少。則藥味不出。劑少水多。又煎耗藥力也。凡煎藥。並忌銅鐵器。宜用銀器瓦罐。洗淨封固。令小心者看守。須識火候。不可太過不及。火用木炭蘆葦爲佳。其水須新

汲味甘者。流水井水沸湯等。各依方法。若發汗藥。必用緊火熱服。攻下藥。亦用緊火煎熟。下硝黃再煎。溫服。補中藥。宜慢火溫服。陰寒急病。亦宜緊火急煎服之。又有陰寒煩燥及暑月伏陰在內者。宜水中沉冷服。

孫真人曰。夫百病之本。有中風。傷寒。寒熱。溫瘧。中惡。霍亂。大腹。水腫。腸澼。下利。大小便不通。賁豚。上氣。咳逆。嘔吐。黃疸。消渴。留飲。癖食。堅積。癥瘕。驚邪。癲癇。鬼

疹。喉痺。齒痛。耳聾。目盲。金瘡。踒折。癰腫。惡瘡。痔瘻。瘤瘿。男子五勞。七傷。虛乏羸瘦。女子帶下。崩中。血閉。陰蝕。蟲蛇蠱毒。此皆大略宗兆。其間變動枝葉。各依端緒以取之。又有冷熱勞損。傷飽。房勞。驚悸。恐懼。憂恚怵惕。又有瘡乳。落胎。墮下。瘀血。又有貪餌五石。以求房中之樂。此皆病之根源為患。生諸枝葉也。不可不知其本末。但尚醫說。男女長幼之病。有半與病源相附會者。便可服藥也。男子者。衆陽所歸。常居於燥。陽

氣游動強力施泄。便成勞損。損傷之病。亦以衆矣。若比之女人。則十倍易治。凡女子十四已上。則有月事。月事來日。得風冷濕熱。四時之病相協者。皆自說之。不爾。與治誤相觸動。更增困也。處方者。亦應問之

孫真人曰。比來田野下里家。因市得藥。隨便市上顧人搗合。非止諸不如法至于石斛菟絲子等。難搗之藥。費人功力。賃作搗者。隱主悉盜棄之。又為塵埃穢氣入藥中。羅篩粗惡。隨風飄揚。衆口嚼之。衆鼻嗅之。藥之精氣。一切都盡。與朽木不殊。又復服餌不能盡如法。服盡之後。反加虛損。遂謗醫者處方不效。夫如此者。非醫之咎。自緣發意甚誤。宜熟思之。

王華子云。知邪思者覺也。斷邪思者。不續也。人之有疾。必有所因。及知其因。則謹于本因。及去其因。勿復其因。此愈疾之功也。斷念之覺。由于不續。毋覺毋去。勿續則已。故曰瞥求是病。不續是藥。

張大復曰。殺物以療病。不若全物以療之之善也。昔

予舅氏之病疹也。外大父將求鷄卵而療焉。既得之矣。鷄且逐卵而仆於地。大父傷之曰。有死子而求生之。有生卵而必傷之。何見之外也。遂舍之。夜半疹愈。夫使食卵而愈。未有不以為卵驗矣。鷄有其卵而子得生。亦非鷄之能生之也。然而生非卵驗也。因是可以解世人之惑。余常病悸。有醫者教之食鱉。曰。食鱉則血滋。血滋則悸去。從之期月而悸自如也。一夕夢群鱉來嚙余。自頸以及於臂。膚無完者。覺而心怦怦

爲悸乃益甚。嗟乎。固有以殺而病甚者矣。

醫燈續焰卷二十一終

醫燈續焰書後

粵自水泉既登。彭伯肇興。凡知物家言。爛爛乎如揭中天之日月矣。迨姬周著典。醫師屬之天官。嬴始殃書。醫編不與同燼。梁簡文製有要勸之章。太史氏獨詳倉公之傳。於是六技之理。始大彰著於天下。聖者剏焉。賢者述之。述其理不得不重其人。重其人因以重其人之所述之理。苟非傾虛實之分。定逆順之節。原痕瘵之輕重。量藥劑之多寡。闡幽洞玄。照示來學。譬之冥行錯處。神丘失其穴。臨

卭藪其井耳。余外父鄧翁。蚤擅文名。怙營醫國。蓋自伊耆以採而降。上下數千載間。研夫四難九折之微。求之寸口三候之際。凡得手應心。即方之主。談玄陳宿之疊。須臾生駢繫之至者。未易更僕數也。余以兒倒。得蹯

諸賢後。並傳諸帏。外父有秘必抽。靡精不殫。察之究之。無異雷公俞跗也。攻之療之。何殊巫子桐君也。絳帳之間。殆已如芳茂龍膏。種之如丹矣。然而不挾其奧者。旨不螢。不壽諸世者。理易晦。外父曰。嘻蒐羣要。是可為出地之晉也。是可為繼焰之離也。爰為廣其名類。會其指歸。詳採情蒐。鈎深致遠。或緣脈而言證。或因證而臚方。固不啻列宿之髙縣。金張勿亂。深泉淨瀅。纖介畢分。顏曰醫燈續焰。誠有然也。何能爾。方其

風雨雞鳴。一室之燈也。懷中授受。函丈之燈也。宣暢曲解。觸類引伸。及天下萬禩之燈也。然則余所稱日月揭中天者。得是編而不患其焰之不永。且無庸熘火為也。嗟乎。世之學者。執一編為指南焉。人精其術。世葆其生。

域躋仁壽。與時阜和。胥于茲鐫有裨矣。又寧直爲吾鄉厚幸乎哉。

門下子壻施安祖頓首百拜謹書

跋

嘗謂天地無脉。則轆轤不轉。山川無脉。則靈秀不鍾。草木無脉。則蒼翠不舒。凡所以能生生者。唯有脉之紆迴運行而已。乃知

人。一小天地耳。胎形於先。生成於後。形具而氣周。氣周而脉見。是人之生於脉也益信。今欲治生者。孰不洞悉脉之原委。以察陰陽之虛實。辨臟腑之寒熱。定

吉凶於呼吸乎。苐紫虛以四言舉要闡奥於前。意括未該。我師推廣於今。鈎深致遠。因脉及症。因症及方。辯析無剩義。而且多別解。即郭象之註莊。張湛之註

老。不是過焉。書成。顯曰醫燈續燄。夫以五都九市之奇。羅於暗室。非太乙之藜。無以別其珍奇異寶。是集也。洵紫虛之薪傳。後學之指南也欤。所謂一燈絻煌。

而千百世之暗皆除。予追随歷有年。所周旋於風雨晦明。得藉離明之照。茲殺青告成。分校及門。因附言於殿。以是知壽天下。壽萬世者。端此矣。寧小補哉。

壬辰浴佛日甬東門人蔣式

金頓首謹跋并書